



Habitudes de vie et état de santé des immigrants adultes au Québec

Par rapport aux non-immigrants¹

Les immigrants sont :

moins susceptibles...



... de présenter une incapacité
... d'avoir une maladie cardiaque
... de présenter des troubles anxieux et des troubles de l'humeur



... de fumer la cigarette



... d'avoir consommé du cannabis régulièrement ou à l'occasion sur une période de 12 mois

plus susceptibles...



... de percevoir leur santé buccodentaire comme étant passable ou mauvaise



... d'être sédentaires




... d'avoir utilisé un condom dans toutes ou la majorité de leurs relations sexuelles sur une période de 12 mois

Les immigrants RÉCENTS² sont moins susceptibles...



... d'être affiliés à un médecin de famille
... de faire de l'hypertension
... de faire de l'asthme

Les immigrants DE LONGUE DATE³ sont plus susceptibles...



... de faire de l'hypertension
... de faire du diabète
... d'avoir une perception négative de leur santé

Les immigrantes de 18 à 69 ans sont moins enclines à avoir passé un test de dépistage Pap au cours de leur vie que les femmes du même âge nées au Canada.

1. Personnes nées au Canada résidant au Québec de 15 ans et plus ou de 18 ans et plus selon l'indicateur. Résultats obtenus après avoir pris en compte certaines caractéristiques sociodémographiques.

2. Arrivés au Canada depuis 10 ans ou moins au moment de l'enquête.

3. Arrivés au Canada depuis plus de 10 ans au moment de l'enquête.

Sources : *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESSC) 2011-2012*, *Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV) 2010-2011* et *Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015*. Pour l'interprétation complète des données, consultez les bulletins de la collection *Zoom santé* (numéros 42, 53 et 65) disponibles sur le site web de l'ISQ à cette adresse : www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/zoom-sante.html.