


INSTITUT  
DE LA STATISTIQUE  
DU QUÉBEC

[www.stat.gouv.qc.ca](http://www.stat.gouv.qc.ca)

**SANTÉ**

Enquête québécoise  
sur la santé de la population,  
2008 : analyse des données  
régionales

Recueil statistique



Québec 

Pour tout renseignement concernant l'ISQ  
et les données statistiques dont il dispose,  
s'adresser à :

**Institut de la statistique du Québec**  
**200, chemin Sainte-Foy**  
**Québec (Québec)**  
**G1R 5T4**  
**Téléphone : 418 691-2401**

**ou**

**Téléphone : 1 800 463-4090**  
**(sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)**

**Site Web : [www.stat.gouv.qc.ca](http://www.stat.gouv.qc.ca)**

Dépôt légal  
Bibliothèque et Archives Canada  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
4<sup>e</sup> trimestre 2010  
ISBN 978-2-550-60331-3 (version imprimée)  
ISBN 978-2-550-60332-0 (PDF)

© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, 2010

Toute reproduction est interdite  
sans l'autorisation du gouvernement du Québec.  
[www.stat.gouv.qc.ca/droits\\_auteur.htm](http://www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm)

**Novembre 2010**

# AVANT-PROPOS

L'Institut de la statistique du Québec présente le *Recueil statistique* constitué à partir des données de l'*Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008* (EQSP). Cette enquête, réalisée auprès de 38 000 personnes dans 16 régions sociosanitaires du Québec, a été mise sur pied en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'EQSP s'inscrit dans une nouvelle génération d'enquêtes planifiées à des fins de surveillance au *Plan ministériel d'enquêtes sociales et de santé*. Elle permet non seulement de mesurer l'état de santé des Québécois et d'en comprendre les déterminants, mais contribue également à soutenir l'évaluation des programmes et des services du Ministère et de son réseau.

Le présent recueil fournit des données régionales sur certains aspects de la santé physique et mentale ainsi que des habitudes de vie des Québécois de 15 ans et plus vivant en ménage privé. Il a pour objectif d'appuyer la mise en place et le suivi des programmes destinés à l'amélioration de l'état de santé de la population à l'échelle des régions. Cette publication accompagne les analyses à portée provinciale présentées dans le rapport intitulé *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois*.

Le directeur général,



Stéphane Mercier

Cette publication a été réalisée par : Issouf Traoré, Hélène Camirand et Jimmy Baulne  
Institut de la statistique du Québec

Avec la collaboration de : Francine Bernèche et Linda Cazale  
Institut de la statistique du Québec

Sous la coordination de : Mikaël Berthelot  
Institut de la statistique du Québec

Ont assuré la vérification,  
la révision linguistique et l'édition : Maude Dumont, Nicole Descroisselles,  
Marie-Ève Cantin et Claudette D'Anjou  
Institut de la statistique du Québec

Enquête subventionnée par : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Recueil subventionné par : Institut de la statistique du Québec

Pour tout renseignement concernant  
le contenu de cette publication : Direction des statistiques de santé  
  
Institut de la statistique du Québec  
1200, avenue McGill College, bureau 500  
Montréal (Québec) H3B 4J8

Téléphone : 514 873-4749  
ou  
1 800 463-4090  
(sans frais d'appel au Canada  
et aux États-Unis)

Télécopieur : 514 864-9919

Site Web : [www.stat.gouv.qc.ca](http://www.stat.gouv.qc.ca)

**Citation suggérée pour le recueil :**

TRAORÉ, Issouf, Hélène CAMIRAND et Jimmy BAULNE (2010). *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : analyse des données régionales. Recueil statistique*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 878 p.

**Signes conventionnels :**

- x Donnée confidentielle
- ... N'ayant pas lieu de figurer
- \* Coefficient de variation supérieur à 15 % mais ne dépassant pas 25 %; interpréter avec prudence.
- \*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

# TABLE DES MATIÈRES

Liste des tableaux .....	9
Introduction .....	41
Présentation et ventilation des tableaux statistiques .....	43
Lexique.....	45
<b>Région 01 Bas-Saint-Laurent.....</b>	<b>47</b>
Caractéristiques sociodémographiques .....	49
État de santé .....	50
Santé mentale.....	52
Blessures.....	57
Santé buccodentaire .....	64
Statut pondéral .....	70
Drogues.....	86
Sexualité et contraception.....	91
Comportements de santé propres aux femmes.....	97
<b>Région 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean .....</b>	<b>99</b>
Caractéristiques sociodémographiques .....	101
État de santé .....	102
Santé mentale.....	104
Blessures.....	109
Santé buccodentaire .....	116
Statut pondéral .....	122
Drogues.....	138
Sexualité et contraception.....	143
Comportements de santé propres aux femmes.....	149
<b>Région 03 Capitale-Nationale .....</b>	<b>151</b>
Caractéristiques sociodémographiques .....	153
État de santé .....	154
Santé mentale.....	156
Blessures.....	161
Santé buccodentaire .....	168
Statut pondéral .....	174
Drogues.....	190
Sexualité et contraception.....	195
Comportements de santé propres aux femmes.....	201

<b>Région 04</b>	<b>Mauricie et Centre-du-Québec .....</b>	<b>203</b>
	Caractéristiques sociodémographiques .....	205
	État de santé .....	206
	Santé mentale.....	208
	Blessures.....	213
	Santé buccodentaire .....	220
	Statut pondéral .....	226
	Drogues.....	242
	Sexualité et contraception.....	247
	Comportements de santé propres aux femmes.....	253
<b>Région 05</b>	<b>Estrie.....</b>	<b>255</b>
	Caractéristiques sociodémographiques .....	257
	État de santé .....	258
	Santé mentale.....	260
	Blessures.....	265
	Santé buccodentaire .....	272
	Statut pondéral .....	278
	Drogues.....	294
	Sexualité et contraception.....	299
	Comportements de santé propres aux femmes.....	305
<b>Région 06</b>	<b>Montréal.....</b>	<b>307</b>
	Caractéristiques sociodémographiques .....	309
	État de santé .....	310
	Santé mentale.....	312
	Blessures.....	317
	Santé buccodentaire .....	324
	Statut pondéral .....	330
	Drogues.....	346
	Sexualité et contraception.....	351
	Comportements de santé propres aux femmes.....	357
<b>Région 07</b>	<b>Outaouais .....</b>	<b>359</b>
	Caractéristiques sociodémographiques .....	361
	État de santé .....	362
	Santé mentale.....	364
	Blessures.....	369
	Santé buccodentaire .....	376
	Statut pondéral .....	382
	Drogues.....	398
	Sexualité et contraception.....	403
	Comportements de santé propres aux femmes.....	409

<b>Région 08</b>	<b>Abitibi-Témiscamingue .....</b>	<b>411</b>
	Caractéristiques sociodémographiques .....	413
	État de santé .....	414
	Santé mentale.....	416
	Blessures.....	421
	Santé buccodentaire .....	428
	Statut pondéral .....	434
	Drogues.....	450
	Sexualité et contraception.....	455
	Comportements de santé propres aux femmes.....	461
<b>Région 09</b>	<b>Côte-Nord .....</b>	<b>463</b>
	Caractéristiques sociodémographiques .....	465
	État de santé .....	466
	Santé mentale.....	468
	Vlessures .....	473
	Santé buccodentaire .....	480
	Statut pondéral .....	486
	Drogues.....	502
	Sexualité et contraception.....	507
	Comportements de santé propres aux femmes.....	513
<b>Région 10</b>	<b>Nord-du-Québec .....</b>	<b>515</b>
	Caractéristiques sociodémographiques .....	517
	État de santé .....	518
	Santé mentale.....	520
	Blessures.....	525
	Santé buccodentaire .....	532
	Statut pondéral .....	538
	Drogues.....	554
	Sexualité et contraception.....	559
	Comportements de santé propres aux femmes.....	565
<b>Région 11</b>	<b>Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine .....</b>	<b>567</b>
	Caractéristiques sociodémographiques .....	569
	État de santé .....	570
	Santé mentale.....	572
	Blessures.....	577
	Santé buccodentaire .....	584
	Statut pondéral .....	590
	Drogues.....	606
	Sexualité et contraception.....	611
	Comportements de santé propres aux femmes.....	617

<b>Région 12</b>	<b>Chaudière-Appalaches.....</b>	<b>619</b>
	Caractéristiques sociodémographiques.....	621
	État de santé.....	622
	Santé mentale.....	624
	Blessures.....	629
	Santé buccodentaire.....	636
	Statut pondéral.....	642
	Drogues.....	658
	Sexualité et contraception.....	663
	Comportements de santé propres aux femmes.....	669
<b>Région 13</b>	<b>Laval.....</b>	<b>671</b>
	Caractéristiques sociodémographiques.....	673
	État de santé.....	674
	Santé mentale.....	676
	Blessures.....	681
	Santé buccodentaire.....	688
	Statut pondéral.....	694
	Drogues.....	710
	Sexualité et contraception.....	715
	Comportements de santé propres aux femmes.....	721
<b>Région 14</b>	<b>Lanaudière.....</b>	<b>723</b>
	Caractéristiques sociodémographiques.....	725
	État de santé.....	726
	Santé mentale.....	728
	Blessures.....	733
	Santé buccodentaire.....	740
	Statut pondéral.....	746
	Drogues.....	762
	Sexualité et contraception.....	767
	Comportements de santé propres aux femmes.....	773
<b>Région 15</b>	<b>Laurentides.....</b>	<b>775</b>
	Caractéristiques sociodémographiques.....	777
	État de santé.....	778
	Santé mentale.....	780
	Blessures.....	785
	Santé buccodentaire.....	792
	Statut pondéral.....	798
	Drogues.....	814
	Sexualité et contraception.....	819
	Comportements de santé propres aux femmes.....	825
<b>Région 16</b>	<b>Montérégie.....</b>	<b>827</b>
	Caractéristiques sociodémographiques.....	829
	État de santé.....	830
	Santé mentale.....	832
	Blessures.....	837
	Santé buccodentaire.....	844
	Statut pondéral.....	850
	Drogues.....	866
	Sexualité et contraception.....	871
	Comportements de santé propres aux femmes.....	877



# LISTE DES TABLEAUX

## RÉGION 01 BAS-SAINT-LAURENT

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 49	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 61
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 50	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 62
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 51	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 63
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 52	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 64
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 53	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 65
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 54	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 66
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 55	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 67
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 56	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 68
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 57	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 68
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 58	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 69
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 59	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 71
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 60	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 72

Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 73	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 92
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 75	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 93
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 77	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 94
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 78	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 95
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 79	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 96
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 80	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 97
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 83	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 97
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 84		
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 87		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 88		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 89		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 90		
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 90		
Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 ..... 91		

## RÉGION 02 SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 101	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008..... 113
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 102	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculo-squelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 114
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 103	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculo-squelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 115
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 104	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 116
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008..... 105	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008..... 117
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 106	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 118
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 107	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 119
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008..... 108	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 120
Tableau 9	Proportion des personnes victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 109	Tableau 21	Répartition de la population population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 120
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008..... 110	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 121
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 111	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008..... 123
Tableau 12	Proportion des personnes victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 112	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 124
		Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 125

Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 127	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 145
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 129	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 146
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 130	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 147
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 131	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 148
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 132	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 149
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 135	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 149
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 136		
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 139		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 140		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 141		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 142		
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 142		
Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 143		
Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 ..... 144		

## RÉGION 03    CAPITALE-NATIONALE

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	153	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	165
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	154	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	166
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	155	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	167
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	156	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	168
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	157	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	169
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	158	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	170
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	159	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	171
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	160	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	172
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	161	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	172
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	162	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	173
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute, population de 65 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	163	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	175
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	164	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 .....	176

Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	177	Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	195
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	179	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	196
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	181	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	197
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	182	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	198
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	183	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	199
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	184	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	200
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	187	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	201
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	188	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	201
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	191			
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	192			
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	193			
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	194			
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.....	194			

## RÉGION 04 MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 ..... 205	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 217
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 206	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 218
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 ..... 207	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 219
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 ..... 208	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 220
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 209	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 221
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 210	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 ..... 222
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 211	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 223
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 ..... 212	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 224
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 ..... 213	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 224
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 214	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 225
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 215	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 ..... 227
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 216	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 ..... 228

Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	229	Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	247
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	231	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	248
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	233	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	249
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	234	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	250
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	235	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	251
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	236	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	252
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	239	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	253
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	240	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	253
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	243			
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	244			
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	245			
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	246			
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	246			



**RÉGION 05 ESTRIE**

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 257	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 269
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 258	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 270
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 259	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 271
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 260	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 272
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 261	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 273
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 262	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 274
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 263	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 275
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 264	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 276
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 265	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 276
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 266	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 277
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 267	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 279
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 268	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 280
		Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 281

Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 283	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 301
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 285	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 302
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 286	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 303
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 287	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 304
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 288	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 305
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 291	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 305
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 292		
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 295		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 296		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 297		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 298		
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 298		
Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 299		
Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Estrie et ensemble du Québec, 2008 ..... 300		

**RÉGION 06 MONTRÉAL**

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 309	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 321
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 310	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 322
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 311	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 323
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 312	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 324
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 313	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 325
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 314	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 326
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 315	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 327
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 316	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 328
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 317	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 328
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 318	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 329
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 319	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 331
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 320	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 332
		Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 333

Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 335	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 353
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 337	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 354
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 338	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 355
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 339	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 356
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 340	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 357
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 343	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 357
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 344		
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 347		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 348		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 349		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 350		
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 350		
Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 351		
Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montréal et ensemble du Québec, 2008 ..... 352		

## RÉGION 07 OUTAOUAIS

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 361	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 373
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 362	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 374
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 363	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 375
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 364	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 376
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 365	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 377
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 366	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 378
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 367	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 379
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 368	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 380
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 369	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 380
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 370	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 381
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 371	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 383
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 372	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 384
		Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 385

Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 387	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 405
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 389	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 406
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 390	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 407
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 391	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 408
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 392	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 409
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 395	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 409
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 396		
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 399		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 400		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 401		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 402		
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 402		
Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 403		
Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 ..... 404		

## RÉGION 08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	413	Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	424
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	414	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	425
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	415	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	426
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	416	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	427
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	417	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	428
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	418	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	429
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	419	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	430
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	420	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	431
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	421	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	432
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	422	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	432
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	423	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008.....	433

Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	434	Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	454
Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	436	Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	454
Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	437	Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	455
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	439	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	456
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	441	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	457
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	442	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	458
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	443	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	459
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	444	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	460
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	447	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	461
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	448	Tableau 44	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	461
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	451			
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	452			
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 .....	453			



## RÉGION 09 CÔTE-NORD

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	465	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008.....	477
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	466	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008.....	478
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	467	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008.....	479
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	468	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	480
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	469	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008.....	481
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	470	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008.....	482
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	471	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	483
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008.....	472	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008.....	484
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008.....	473	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008.....	484
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	474	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	485
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	475	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	487
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	476	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 .....	488

Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 489	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 508
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 491	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008..... 509
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 493	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008..... 510
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 494	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 511
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 495	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 512
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008..... 496	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 513
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008..... 499	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 513
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 500		
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 503		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 504		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008..... 505		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 506		
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 506		
Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 ..... 507		

**RÉGION 10 NORD-DU-QUÉBEC**

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	517	Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	528
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	518	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	529
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	519	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	530
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	520	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	531
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	521	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	532
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	522	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	533
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	523	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	534
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	524	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	535
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	525	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	536
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	526	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	536
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	527	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 .....	537

Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	539	Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	558
Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	540	Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	558
Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	541	Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	559
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	543	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	560
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	545	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	561
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	546	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	562
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	547	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	563
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	548	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	564
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	551	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	565
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	552	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	565
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	555			
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	556			
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008.....	557			

## RÉGION 11 GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	569	Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	580
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	570	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	581
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	571	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	582
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	572	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	583
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	573	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	584
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	574	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	585
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	575	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	586
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	576	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	587
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	577	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	588
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	578	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	588
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	579	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	589
			Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	591

Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	592	Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	610
Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	593	Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	610
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	595	Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	611
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	597	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	612
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	598	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	613
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	599	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	614
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	600	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	615
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	603	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	616
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	604	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	617
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	607	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	617
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	608			
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008.....	609			

## RÉGION 12 CHAUDIÈRE-APPALACHES

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	621	Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	632
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	622	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	633
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	623	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	634
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	624	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	635
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	625	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	636
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	626	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	637
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	627	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	638
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	628	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	639
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	629	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	640
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	630	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	640
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	631	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	641
			Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008.....	643

Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 644	Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 662
Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 645	Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 663
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 647	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 664
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 649	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 665
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 650	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 666
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 651	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 667
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 652	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 668
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 655	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 669
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 656	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 669
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 659		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 660		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 661		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 ..... 662		



## RÉGION 13 LAVAL

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	673	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	685
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	674	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	686
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	675	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	687
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	676	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	688
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	677	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	689
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	678	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	690
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	679	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	691
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	680	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	692
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	681	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	692
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	682	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	693
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	683	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	695
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	684	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	696
			Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008.....	697

Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	699	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	717
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	701	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	718
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	702	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	719
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	703	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	720
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	704	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	721
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	707	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	721
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	708			
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	711			
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	712			
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	713			
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	714			
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	714			
Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	715			
Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laval et ensemble du Québec, 2008 .....	716			

## RÉGION 14 LANAUDIÈRE

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 725	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 737
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 726	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 738
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 727	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 739
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 728	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 740
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 729	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 741
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 730	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 742
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 731	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 743
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 732	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 744
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 733	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 744
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 734	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 745
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 735	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 747
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 736	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 748

Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 749	Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 767
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 751	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 768
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 753	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 769
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 754	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 770
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 755	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 771
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 756	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 772
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 759	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 773
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 760	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 773
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 763		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 764		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 765		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 766		
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ..... 766		

## RÉGION 15 LAURENTIDES

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 777	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 789
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 778	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 790
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 779	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 791
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 780	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 792
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 781	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 793
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 782	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 794
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 783	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 795
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 784	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 796
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 785	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 796
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 786	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 797
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 787	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 799
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 788	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 800

Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 801	Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 819
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 803	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 820
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 805	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 821
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 806	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 822
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 807	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 823
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 808	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 824
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 811	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 825
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 812	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 825
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 815		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 816		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 817		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008..... 818		
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 ..... 818		

## RÉGION 16 MONTÉRÉGIE

Tableau 1	Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 829	Tableau 13	Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 841
Tableau 2	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 830	Tableau 14	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 842
Tableau 3	Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 831	Tableau 15	Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 843
Tableau 4	Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 832	Tableau 16	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 844
Tableau 5	Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 833	Tableau 17	Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 845
Tableau 6	Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 834	Tableau 18	Proportion des personnes édentées selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 846
Tableau 7	Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 835	Tableau 19	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 847
Tableau 8	Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 836	Tableau 20	Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 848
Tableau 9	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 837	Tableau 21	Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 848
Tableau 10	Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 838	Tableau 22	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 849
Tableau 11	Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 839	Tableau 23	Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 851
Tableau 12	Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 840	Tableau 24	Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 852

Tableau 25	Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 853	Tableau 38	Proportion des personnes actives sexuellement selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 871
Tableau 26	Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 855	Tableau 39	Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montérégie et ensemble du Québec, 2008..... 872
Tableau 27	Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 857	Tableau 40	Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 873
Tableau 28	Répartition de la population selon le nombre de consultations auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 858	Tableau 41	Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 874
Tableau 29	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 859	Tableau 42	Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montérégie et ensemble du Québec, 2008..... 875
Tableau 30	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008..... 860	Tableau 43	Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 876
Tableau 31	Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 863	Tableau 44	Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 877
Tableau 32	Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 864	Tableau 45	Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 877
Tableau 33	Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 867		
Tableau 34	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 868		
Tableau 35	Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 869		
Tableau 36	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 870		
Tableau 37	Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 ..... 870		



# INTRODUCTION

## CONTEXTE LÉGAL ET ADMINISTRATIF

L'*Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008* (EQSP) s'inscrit dans le cadre de l'application de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2), sanctionnée par l'Assemblée nationale en 2001. La loi prescrit la réalisation d'enquêtes sociosanitaires auprès de la population afin d'obtenir, de manière récurrente, les renseignements nécessaires à la fonction de surveillance continue de l'état de santé de la population, elle-même légalement reconnue comme fonction essentielle de santé publique. La loi précise que les enquêtes nationales sont confiées à l'Institut de la statistique du Québec, qui les exécute en conformité avec les objectifs établis par le ministre de la santé et des services sociaux, après consultation des directeurs régionaux de santé publique.

Du côté administratif, l'EQSP 2008 découle du Plan ministériel d'enquêtes sociales et de santé, élaboré en 2006 pour répondre aux besoins d'information du ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) et du réseau de la santé et des services sociaux. Plusieurs enjeux sont à considérer dans la mise en œuvre du plan : la représentativité régionale des données, la périodicité dans la réalisation des enquêtes pour suivre l'évolution des indicateurs, la complémentarité avec les enquêtes fédérales en place depuis 2000, la couverture d'indicateurs de santé pour lesquels peu ou pas de données sont disponibles ainsi que la mise à profit des données d'enquêtes à des fins de planification sociosanitaire.

L'objectif du Plan ministériel d'enquêtes sociales et de santé est d'alimenter en données d'enquêtes le *Plan commun de surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants 2004-2007* (PCS), afin de permettre la mesure d'indicateurs de santé et, de ce fait, la réalisation d'études et d'analyses visant à éclairer la prise de décision liée au processus de planification. Dans son volet « État de santé de la population », le plan ministériel propose un programme

d'enquêtes sociosanitaires quinquennales, qui comprend notamment l'EQSP, première enquête réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du PCS.

Une consultation tenue au printemps 2007 par le MSSS au sein de certaines de ses directions, et auprès des directions régionales de santé publique, des cinq tables de concertation nationales et de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), avait permis de faire un premier exercice de priorisation du contenu de l'EQSP en fonction des besoins ainsi que de différents éléments et critères de faisabilité (prévalence, temps d'entrevue, périodicité, budget, etc.).

La mise en œuvre de l'EQSP 2008 s'est appuyée sur les travaux d'un comité d'orientation de projet (COP) mis sur pied au printemps 2007 pour conseiller l'ISQ et le MSSS dans la réalisation de l'enquête, afin que celle-ci réponde adéquatement aux besoins d'information du Ministère et du réseau de la santé et des services sociaux. Co-présidé par l'ISQ et le MSSS, le COP réunit des représentants des directions régionales de santé publique, des tables de concertation nationales en maladies infectieuses, en santé au travail et en santé environnementale, de même que de l'INSPQ.

## À PROPOS DE L'ENQUÊTE<sup>1</sup>

La population visée par l'EQSP 2008 est composée de l'ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus qui vivent dans un ménage privé au Québec. Ne font pas partie de l'enquête les personnes vivant dans un ménage collectif et les personnes vivant sur une réserve amérindienne. L'enquête couvre 16 des 18 régions sociosanitaires (RSS) du Québec. Seules les régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (RSS 17 et 18) ne sont pas couvertes par l'enquête. La collecte des données s'est déroulée du 13 février 2008 au 15 mars 2009. Au terme de celle-ci, 38 154 entrevues téléphoniques ont été réalisées.

1. Pour de plus amples renseignements sur les aspects méthodologiques, le lecteur est invité à consulter les documents suivants qui sont aussi consultables sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec à l'adresse suivante : [www.stat.gouv.qc.ca](http://www.stat.gouv.qc.ca).

BAULNE, Jimmy (2010). « Aspects méthodologique », dans : *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois*, Québec, Institut de la statistique du Québec, chapitre 1, p. 25-39.

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (2010). *Guide spécifique des aspects méthodologiques des données d'enquêtes sociosanitaires du Plan commun de surveillance – Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*, Québec, Gouvernement du Québec, 117 p.

TRAORÉ, Issouf, Brigitte BEAUVAIS, Danny Du MAYS, Maude DUMONT et Guillaume MAROIS (2010). *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008. Cahier technique : Livre de codes et définition des indices (Fichier maître)*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 704 p.

L'objectif général de l'EQSP est de dresser un portrait de santé de la population par la collecte, l'analyse et l'interprétation des données, avec une représentativité régionale. Il s'agit :

- de combler certains besoins d'information prioritaires, à l'échelle du Québec et de ses régions, sur l'état de santé de la population et ses déterminants;
- de suivre l'évolution temporelle, au sein de la population, de certains problèmes spécifiques de santé et de leurs déterminants (en assurant la récurrence de l'enquête).

Plus spécifiquement, l'enquête vise à :

- recueillir des informations sur les indicateurs non couverts ou mal documentés au niveau régional par les sources de données existantes. Une sélection a été effectuée pour l'EQSP 2008 parmi environ 80 indicateurs du Plan commun de surveillance, pour lesquels l'enquête constitue la meilleure source. Les indicateurs sélectionnés sont rattachés aux thématiques suivantes :
  - perception de l'état de santé
  - rhinite allergique
  - statut pondéral, perception à l'égard de son poids et utilisation de produits ou moyens amaigrissants
  - santé et hygiène buccodentaire
  - blessures dues et non dues à des mouvements répétitifs
  - environnement organisationnel, troubles musculo-squelettiques et exposition à certains agresseurs ou situations à risque au travail
  - satisfaction à l'égard de sa vie sociale
  - détresse psychologique et suicide
  - consommation de drogues
  - comportements sexuels, usage de la contraception et infections transmissibles sexuellement
  - prise de tension artérielle lors de la dernière visite chez un médecin généraliste
  - test de Pap et contraception orale combinée chez les fumeuses
- documenter le développement socio-émotionnel des enfants de 3 à 14 ans (à l'échelle provinciale seulement).

# PRÉSENTATION ET VENTILATION DES TABLEAUX STATISTIQUES

Ce recueil statistique présente les résultats de l'enquête pour chacune des 16 régions sociosanitaires couvertes. Il a été conçu à titre de complément de l'analyse des données provinciales que l'on retrouve dans le rapport de l'enquête intitulé *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois*. Comme dans cette publication, le recueil ne couvre pas les sujets suivants : rhinite allergique, prise de tension artérielle, santé au travail et développement socio-émotionnel des enfants.

Le recueil se divise en neuf sections, où l'on retrouve 45 tableaux repris pour chacune des 16 régions sociosanitaires. La première section présente les caractéristiques sociodémographiques de la population visée par l'enquête, et celles qui suivent sont consacrées à la présentation des résultats par thématique : perception de l'état de santé, santé mentale, blessures, santé buccodentaire, statut pondéral, consommation de drogues, sexualité et contraception, comportements de santé propres aux femmes.

## CONCEPTS STATISTIQUES

### Interprétation du test global d'association

Dans la plupart des tableaux présentés dans ce recueil statistique, un test global d'association a été effectué afin de permettre au lecteur de savoir si l'indicateur analysé varie selon les catégories d'une variable de croisement. L'utilisation de ce test nous permet de vérifier la présence d'une association entre deux variables, tout en contrôlant le seuil global du test. Le test retenu pour l'EQSP est celui du khi-deux. Lorsqu'un test d'association a été fait, la valeur P du test est affichée dans le tableau. Dans certains tableaux possédant un troisième niveau, le sexe, un test d'association a été effectué pour chacun des deux sexes et pour les sexes réunis. Le cas échéant, trois valeurs P apparaissent : une pour les hommes, une pour les femmes et une pour les sexes réunis.

Par ailleurs, l'absence d'indication « P= » sur une ligne sous-entend qu'il ne s'agit pas d'un croisement. De plus, lorsqu'il est impossible de calculer la statistique du test, en raison d'une ligne ou d'une colonne ne contenant aucun répondant, l'indication affichée correspond à « P=. ». Également, lorsque la valeur peut être calculée, mais que les conditions de validité du test ne sont pas satisfaites<sup>2</sup>, l'indication affichée est « P=nd ».

Sachant que l'indicateur analysé prend des valeurs différentes selon les catégories de la variable de croisement, il s'avère intéressant d'identifier exactement ces catégories. Pour ce faire, il est suggéré d'utiliser les intervalles de confiance affichés dans le tableau.

### Interprétation de l'intervalle de confiance à 95 %<sup>3</sup>

Les estimations obtenues par le biais d'une enquête par sondage ne sont pas des valeurs exactes et sont entachées d'une erreur d'échantillonnage. L'intervalle de confiance à 95 % est l'une des mesures de précision des estimations retenues. Il s'interprète de la façon suivante : « Si on répétait l'enquête un grand nombre de fois et qu'à chaque reprise on estimait la proportion et on calculait son intervalle de confiance, alors 95 % des intervalles ainsi créés contiendraient la vraie valeur de la proportion dans la population ».

Dans le cas d'un test global significatif, les intervalles de confiance présentés dans les tableaux peuvent être utilisés afin de comparer les proportions. Pour déterminer si deux proportions sont différentes, il suffit de comparer les deux intervalles de confiance, un pour chacune des proportions estimées. On peut conclure que celles-ci sont différentes lorsque les deux intervalles de confiance sont disjoints. Ce test basé sur la comparaison de deux intervalles de confiance est toutefois très conservateur. En présence d'un faible chevauchement, il est possible qu'un test plus puissant permette de détecter une différence significative entre les proportions<sup>4</sup>.

2. La condition de validité du test du khi-deux est liée au nombre de cellules du tableau analysé auxquelles correspondent des fréquences espérées inférieures à 5. Lorsque plus de 20 % des cellules ont une fréquence espérée inférieure à 5, la valeur P affichée est « P=non disponible », indiquant que le test n'est pas disponible et pourrait ne pas être valide.

3. Les intervalles produits pour l'EQSP sont des intervalles de confiance bootstrap. Ces derniers peuvent présenter une certaine asymétrie. Leur construction est basée sur le calcul des percentiles de la distribution empirique bootstrap. Pour plus de détails, consulter le guide méthodologique de l'enquête (ISQ et collab., 2010).

4. Pour plus d'information, consulter : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (2010). *Guide spécifique des aspects méthodologiques des données d'enquêtes sociosanitaires du Plan commun de surveillance – Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*, Québec, Gouvernement du Québec, 117 p.

Le lecteur pourra constater l'absence d'intervalle de confiance dans les tableaux pour les estimations à l'échelle de la province. Cette omission est volontaire et a pour but de prévenir une mauvaise utilisation des intervalles lors de la comparaison d'une région avec le reste du Québec. En effet, le résultat provincial présenté dans les tableaux correspond à l'estimation pour l'ensemble du Québec, et non à celle du reste du Québec, laquelle devrait servir à une telle comparaison.

### **Interprétation du coefficient de variation**

Le coefficient de variation (CV) est une mesure relative qui permet de quantifier la précision de l'estimation et qui, de ce fait, contribue à en faciliter l'interprétation. Plus le CV est élevé, moins l'estimation est précise, et inversement.

Les estimations dont le CV est inférieur ou égal à 15 % sont présentées dans ce recueil sans commentaire parce qu'elles sont suffisamment précises. Celles dont le CV est supérieur à 15 %, mais est inférieur à 25 %, sont marquées d'un astérisque (\*) et doivent être interprétées avec prudence. Finalement, les estimations dont le CV est supérieur ou égal à 25 % sont accompagnées d'un double astérisque (\*\*) pour en signaler l'imprécision, et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

## Composition du ménage

Description du type de situation correspondant au foyer du répondant en tenant compte de tous les membres du ménage. Le ménage privé est constitué de la personne ou des personnes occupant un même logement privé. Cinq catégories ont été établies : personne vivant seule, couple sans enfant, couple avec enfants, famille monoparentale, autre. Cette dernière catégorie inclut principalement des ménages composés de personnes apparentées par des liens autres que conjugaux ou filiaux ou de personnes non apparentées (colocataires).

## Idées suicidaires sérieuses

Information couvrant deux périodes de référence, soit « au cours de la vie » et « sur une période de douze mois », recueillie par les questions : « Avez-vous déjà sérieusement songé à vous suicider ou à vous enlever la vie? » et « Est-ce que cela s'est produit au cours des 12 derniers mois? ». Dans l'analyse des données, les personnes ayant fait une tentative de suicide sont soustraites de la population ayant eu des idées suicidaires sérieuses.

## Indice du niveau de revenu du ménage

Indice inspiré d'une variable créée par Statistique Canada dans *l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005*. Il est établi à partir du revenu total du ménage, du nombre de personnes composant ce ménage et des seuils de faible revenu définis en fonction de la taille du ménage et de la communauté de résidence du répondant. Il se divise en cinq quintiles, allant des revenus les plus faibles (quintile 1) aux plus élevés (quintile 5). Cet indice comporte une imputation des valeurs manquantes.

## Langue parlée à la maison

Langue parlée le plus souvent à la maison, avec possibilité d'indiquer deux langues si elles sont parlées aussi souvent l'une que l'autre. Les résultats sont regroupés en trois catégories (au moins le français, au moins l'anglais mais pas le français, ni français ni anglais) ou en quatre catégories (français seulement, français et autre(s) langue(s), anglais avec ou sans autre(s) langue(s) en excluant le français, ni français ni anglais).

## Naissance au Canada ou durée de résidence

Information tirée d'une question demandant à la personne si elle est née au Canada ou non, et de deux questions sur la durée de résidence au Canada pour les personnes ayant répondu « non ». Le répondant pouvait indiquer l'année de son arrivée au Canada pour s'y établir ou choisir parmi les trois durées proposées (moins de 5 ans, 5 à 10 ans, plus de 10 ans). Les résultats sur la durée de résidence concernent les personnes nées dans un autre pays selon qu'elles demeurent au Canada depuis moins de cinq ans ou depuis cinq ans ou plus.

## Niveau de détresse psychologique

Mesure faite au moyen de l'échelle K6 élaborée par Kessler. Cette mesure est fondée sur six questions et établit à quelle fréquence, au cours du dernier mois, la personne s'est sentie nerveuse, désespérée, agitée, si déprimée que plus rien ne pouvait la faire sourire, a eu l'impression que tout lui demandait un effort ou, finalement, a eu le sentiment d'être bonne à rien. Les scores globaux, qui résultent de la somme des scores obtenus aux six questions, varient de 0 à 24; plus la cote est élevée, plus la détresse psychologique est prononcée. Un score de 7 ou plus correspond à la valeur du quintile supérieur de l'échelle et indique que la personne se situe à un niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique.

## Niveau de scolarité

Plus haut niveau de scolarité complété par un individu, en indiquant le diplôme le plus élevé obtenu. Quatre catégories ont été retenues : niveau inférieur au DES, diplôme d'études secondaires (DES), diplôme ou certificat d'études collégiales, diplôme d'études universitaires. La seconde catégorie (DES) inclut aussi les études partielles menées au niveau suivant. La troisième catégorie comprend les diplômes ou les certificats d'études d'un cégep, d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle et les études partielles à l'université.

**Occupation principale**

Activité exercée de manière habituelle au cours des douze derniers mois. Quatre catégories d'individus sont identifiées : les travailleurs, les étudiants, les personnes sans emploi, les retraités. Les travailleurs comprennent les personnes occupant un emploi à temps plein ou partiel ainsi que les travailleurs en congé (maladie, maternité ou paternité, etc.). Les personnes sans emploi incluent les personnes qui reçoivent des prestations (assurance-emploi, aide sociale) et celles qui tiennent maison.

**Perception à l'égard de son poids**

Autoévaluation de son poids provenant d'une question, soit « Considérez-vous que vous... 1) avez un excès de poids, 2) êtes trop maigre, 3) êtes à peu près normal(e)? ». Ces choix de réponse forment les trois catégories utilisées dans l'analyse.

**Perception de l'état de santé (ou de sa santé)**

Autoévaluation de son état de santé global. Les répondants sont préalablement informés que le terme « santé » signifie non seulement l'absence de maladie ou de blessure, mais englobe aussi leur bien-être. Les résultats sont regroupés en trois catégories de santé (excellente ou très bonne; bonne; passable ou mauvaise) ou en deux catégories (excellente, très bonne ou bonne; passable ou mauvaise). Ce dernier regroupement permet d'établir la proportion de personnes qui ne se perçoivent pas en bonne santé.

**Perception de sa situation financière**

Information tirée d'une question où les individus évaluent leur situation financière comparativement à celle des personnes de leur âge. Quatre catégories de réponse sont présentées : à l'aise (financièrement), revenus suffisants, pauvre ou très pauvre. L'information est aussi dichotomisée en regroupant, d'une part, les deux premières catégories et, d'autre part, les deux dernières.

**Période de référence**

Période sur laquelle portent les données recueillies au moment de la collecte. Certaines questions de l'enquête peuvent faire référence à des périodes différentes, soit le dernier mois, les six derniers mois ou les douze derniers mois. La présentation des résultats évite de faire référence, par exemple, aux douze mois ayant précédé l'enquête, puisque les répondants ne se réfèrent pas tous aux mêmes douze mois. Les termes « au cours d'une période de douze mois » ou « sur douze mois » sont généralement préférés.

**Satisfaction à l'égard de sa vie sociale**

Information tirée d'une question où les individus évaluent leur satisfaction à l'égard de leur vie sociale en général, c'est-à-dire de leurs relations avec les gens qui les entourent (parents, amis, connaissances). Les catégories « plutôt insatisfaisante » et « très insatisfaisante » ont été regroupées pour décrire la population insatisfaite de sa vie sociale; les catégories « très satisfaisante » et « plutôt satisfaisante » ont été analysées séparément ou ont été combinées pour identifier les personnes satisfaites.

**Statut de fumeur**

Information provenant d'une question où les individus déclarent si, « actuellement », ils fument tous les jours, à l'occasion ou jamais. Le statut de fumeur est divisé en deux catégories : les fumeurs actuels, qui regroupent les fumeurs réguliers ou occasionnels, et les non-fumeurs. L'analyse de cette information est toujours faite en fonction d'autres variables.

**Statut pondéral**

Fait référence à l'indice de masse corporelle (IMC). L'IMC d'un individu est le rapport de son poids (en kilogrammes) sur sa taille (en mètres) élevée au carré. Les femmes enceintes sont exclues de la population considérée dans le calcul de l'indice. Les résultats sont regroupés en quatre catégories, soit : poids insuffisant, poids normal, embonpoint et obésité.

**Tentative de suicide**

Ensemble des gestes suicidaires qui ne conduisent pas à la mort. L'information récoltée porte sur deux périodes de référence, soit « au cours de la vie » et « sur une période de douze mois ».

Région 01

# **BAS-SAINT-LAURENT**

---





# 1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population		49,4	50,6			49,9	49,9 ; 50,0	50,1	50,0 ; 50,1
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000				P = 0,000			
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	14,7	14,6 ; 14,7	15,2	15,2 ; 15,3	14,1	14,1 ; 14,2
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	27,8	27,8 ; 27,8	28,5	28,5 ; 28,6	27,1	27,0 ; 27,1
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	39,6	39,6 ; 39,7	39,5	39,4 ; 39,5	39,8	39,8 ; 39,9
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	17,9	17,9 ; 17,9	16,8	16,7 ; 16,8	19,0	19,0 ; 19,0
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Personne seule	13,4	10,7	16,0	12,9	11,8 ; 14,2	10,9	9,4 ; 12,7	14,9	13,3 ; 16,7
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	35,2	33,2 ; 37,3	35,9	32,9 ; 38,7	34,6	31,7 ; 37,4
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	39,8	37,5 ; 42,0	43,2	39,9 ; 46,6	36,4	33,2 ; 39,4
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	7,1	5,9 ; 8,4	4,8*	3,3 ; 6,4	9,4	7,5 ; 11,4
Autre	6,7	6,5	6,9	5,0	3,9 ; 6,2	5,2*	3,5 ; 7,1	4,8*	3,4 ; 6,4
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>		P = 0,256				P = 'n.d.'			
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	98,8	98,2 ; 99,4	99,0	98,2 ; 99,7	98,7	97,6 ; 99,5
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,4**	0,0 ; 0,8	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	0,8**	0,3 ; 1,4	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>		P = 0,912				P = 'n.d.'			
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	99,3	98,7 ; 99,7	99,4	98,8 ; 99,9	99,1	98,1 ; 99,9
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	x	;	x	;	x	;
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	x	;	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,683				P = 0,046			
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	33,7	31,5 ; 35,9	35,3	32,0 ; 38,6	32,1	29,2 ; 35,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	25,2	23,0 ; 27,4	26,7	23,5 ; 29,9	23,7	20,9 ; 26,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	25,3	23,1 ; 27,3	24,2	21,1 ; 27,2	26,3	23,3 ; 29,3
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	15,9	14,2 ; 17,6	13,8	11,5 ; 16,3	17,9	15,6 ; 20,4
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,043			
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	19,7	17,8 ; 21,7	17,4	14,7 ; 20,4	21,9	19,2 ; 24,7
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	20,6	18,5 ; 22,7	19,1	16,1 ; 22,1	22,0	19,1 ; 24,7
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	23,5	21,2 ; 25,8	24,0	20,7 ; 27,3	23,0	19,9 ; 26,2
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	19,6	17,6 ; 21,6	21,6	18,6 ; 24,8	17,5	14,8 ; 20,2
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	16,7	14,7 ; 18,7	17,8	14,8 ; 21,0	15,6	13,2 ; 18,2
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000				P = 0,444			
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	26,3	24,0 ; 28,4	24,9	21,5 ; 28,2	27,6	24,4 ; 30,7
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	59,0	56,6 ; 61,5	59,2	55,5 ; 63,0	58,9	55,7 ; 62,3
Pauvre	9,4	8,9	9,9	11,6	10,1 ; 13,2	12,6	10,2 ; 14,9	10,7	8,7 ; 12,7
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	3,1	2,2 ; 4,1	3,4*	2,1 ; 4,9	2,8*	1,8 ; 4,0
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	56,2	54,4 ; 58,0	62,3	59,6 ; 65,0	50,2	47,7 ; 52,6
Étudiants	13,1	13,0	13,2	10,9	9,7 ; 12,0	9,4	7,7 ; 11,1	12,3	10,6 ; 13,8
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	9,8	8,5 ; 11,2	6,7	4,9 ; 8,6	13,0	11,0 ; 15,1
Retraités	19,6	18,0	21,1	23,1	22,0 ; 24,2	21,6	20,1 ; 23,1	24,5	23,0 ; 26,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	51,0	48,7 ; 53,2	36,3	33,9 ; 38,6	12,7	11,2 ; 14,3
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,001					
Hommes	56,6	33,5	9,9	46,4	42,9 ; 50,0	39,4	35,7 ; 43,0	14,2	11,8 ; 16,8
Femmes	55,5	32,8	11,7	55,3	52,2 ; 58,4	33,3	30,1 ; 36,4	11,4	9,5 ; 13,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	60,8	53,1 ; 68,4	35,0	27,3 ; 42,3	4,3**	1,3 ; 7,8
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	63,7	58,7 ; 68,4	29,9	25,5 ; 34,7	6,4*	4,0 ; 9,1
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	46,2	42,9 ; 49,8	37,5	34,0 ; 41,0	16,3	13,6 ; 19,0
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	31,9	27,0 ; 37,1	45,4	39,7 ; 50,9	22,7	18,5 ; 27,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	38,6	34,0 ; 43,2	38,3	33,8 ; 43,0	23,1	19,2 ; 27,3
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	48,5	44,6 ; 52,6	37,0	33,2 ; 40,8	14,5	11,8 ; 17,3
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	57,6	53,2 ; 62,2	35,6	31,2 ; 39,9	6,8*	4,5 ; 9,2
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	52,6	42,9 ; 61,6	32,8	23,8 ; 41,7	14,6*	8,1 ; 22,1
Autre	46,0	39,4	14,6	46,0	32,3 ; 59,6	35,0*	22,9 ; 47,6	19,0*	9,6 ; 29,7
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	35,3	31,2 ; 39,8	45,4	40,9 ; 49,6	19,3	16,1 ; 22,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	49,1	44,2 ; 54,3	38,0	32,9 ; 43,0	12,9	9,5 ; 16,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	59,8	54,9 ; 64,5	31,9	27,1 ; 36,7	8,3*	5,8 ; 11,1
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	72,3	66,8 ; 77,3	22,3	17,6 ; 27,4	5,4*	2,8 ; 8,3
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	35,9	30,2 ; 41,4	36,9	31,5 ; 42,5	27,2	21,9 ; 32,6
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	55,4	52,6 ; 58,1	35,9	33,1 ; 38,7	8,7	7,1 ; 10,3
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	26,1	20,3 ; 31,7	39,3	33,3 ; 45,6	34,6	28,7 ; 40,9
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	55,8	53,3 ; 58,2	35,5	32,9 ; 37,9	8,7	7,4 ; 10,1
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,003					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	58,0	54,7 ; 61,1	33,8	30,7 ; 37,0	8,2	6,3 ; 10,2
Étudiants	62,7	32,2	5,0	63,1	54,4 ; 72,2	x	;	x	;
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	29,7	22,9 ; 36,6	41,5	34,2 ; 49,3	28,8	22,2 ; 35,9
Retraités	40,2	39,5	20,4	36,6	32,2 ; 41,2	41,3	36,5 ; 45,9	22,1	18,3 ; 25,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	51,0	48,7 ; 53,2	36,3	33,9 ; 38,6	12,7	11,2 ; 14,3
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,003					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	47,7	42,2 ; 53,1	34,1	28,9 ; 39,2	18,2	14,0 ; 22,9
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	51,9	49,4 ; 54,5	36,9	34,2 ; 39,5	11,2	9,5 ; 12,7
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	52,2*	30,7 ; 71,1	28,4**	12,4 ; 47,7	19,5**	5,2 ; 36,7
Poids normal	62,6	29,4	8,0	57,4	53,8 ; 61,0	33,5	30,0 ; 37,1	9,1	7,2 ; 11,0
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	44,4	41,1 ; 47,7	40,2	36,8 ; 43,6	15,5	13,1 ; 17,9
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	59,6	56,1 ; 63,1	32,5	29,1 ; 35,9	8,0	6,2 ; 9,8
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	46,9	43,4 ; 50,3	39,5	36,1 ; 43,1	13,6	11,2 ; 16,0
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	22,0*	14,1 ; 30,1	36,2	26,0 ; 46,1	41,8	32,7 ; 51,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	32,4	27,4 ; 37,6	36,9	31,6 ; 42,2	30,7	25,8 ; 35,7
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	57,1	54,4 ; 59,8	36,0	33,3 ; 38,7	6,9	5,7 ; 8,3

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	46,4	43,9 ; 49,0	47,7	45,0 ; 50,2	5,9	4,8 ; 7,1
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,065		
Hommes	47,5	46,6	6,0	43,6	39,7 ; 47,3	49,8	46,0 ; 53,5	6,6	4,9 ; 8,6
Femmes	47,1	45,9	7,0	49,1	45,9 ; 52,6	45,7	42,2 ; 48,9	5,2	3,9 ; 6,6
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,167		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	54,4	46,5 ; 62,3	41,8	34,1 ; 49,6	3,7**	1,1 ; 6,9
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	44,3	39,4 ; 49,5	49,8	44,7 ; 54,6	5,9*	3,6 ; 8,4
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	44,7	41,0 ; 48,5	48,3	44,5 ; 52,1	7,0	5,2 ; 8,9
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	46,8	41,5 ; 52,3	47,9	42,6 ; 53,4	5,3*	3,1 ; 7,6
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	37,5	33,0 ; 42,2	49,2	44,4 ; 53,9	13,3	10,1 ; 16,5
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	54,8	50,9 ; 58,8	41,0	37,0 ; 44,8	4,2*	2,8 ; 5,8
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	44,0	39,6 ; 48,7	52,4	47,5 ; 56,8	3,6*	1,8 ; 5,5
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	42,1	32,9 ; 51,8	45,5	35,8 ; 54,5	12,4**	6,1 ; 20,0
Autre	44,5	46,1	9,4*	39,6*	26,6 ; 52,9	49,8	37,2 ; 62,4	10,6**	2,7 ; 19,0
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,220		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	46,9	42,4 ; 51,4	46,8	42,2 ; 51,2	6,4*	4,4 ; 8,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	48,4	43,3 ; 53,2	46,1	41,3 ; 51,0	5,5*	3,6 ; 7,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	41,6	36,7 ; 46,6	51,4	46,4 ; 56,5	7,0*	4,4 ; 9,9
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	50,4	44,4 ; 56,4	45,5	39,2 ; 51,5	4,1*	2,2 ; 6,5
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	39,4	33,4 ; 45,0	49,5	43,5 ; 55,2	11,1	7,9 ; 14,6
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	47,3	44,4 ; 50,4	48,1	44,9 ; 51,0	4,6	3,5 ; 5,9
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	26,9	21,5 ; 32,7	53,8	47,4 ; 60,0	19,3	14,6 ; 24,3
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	50,0	47,3 ; 52,7	46,5	43,8 ; 49,1	3,5	2,6 ; 4,6
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,002		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	45,0	41,7 ; 48,3	50,0	46,4 ; 53,3	5,0	3,6 ; 6,6
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	57,2	48,0 ; 66,6	40,2	31,2 ; 49,3	2,5**	0,1 ; 5,4
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	39,9	32,3 ; 47,5	44,1	36,2 ; 52,3	16,0*	10,6 ; 21,8
Retraités	51,9	42,8	5,3	47,9	43,1 ; 52,6	46,7	41,8 ; 51,5	5,4*	3,4 ; 7,4
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	53,9	50,3 ; 57,6	43,6	39,8 ; 47,1	2,5*	1,6 ; 3,6
Bon	40,5	52,6	6,9	41,8	37,6 ; 46,0	52,3	48,3 ; 56,3	5,9*	4,0 ; 8,0
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	29,2	23,2 ; 35,1	51,2	44,2 ; 57,9	19,6	14,7 ; 25,1
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	26,3	21,6 ; 31,3	56,8	51,3 ; 62,1	16,9	13,4 ; 20,8
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	52,2	49,2 ; 55,0	45,2	42,4 ; 48,2	2,6*	1,7 ; 3,6
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,005		
Oui	21,3	49,3	29,4	17,7**	3,8 ; 34,0	48,2*	30,3 ; 65,0	34,1*	19,2 ; 51,6
Non	48,1	46,1	5,8	47,3	44,7 ; 49,9	47,5	44,8 ; 50,0	5,2	4,2 ; 6,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	22,4	20,3 ; 24,6	77,6	75,4 ; 79,7
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,102			
Hommes	18,2	81,8	20,6	17,7 ; 23,8	79,4	76,2 ; 82,3
Femmes	26,0	74,0	24,1	21,2 ; 27,0	75,9	73,0 ; 78,8
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,031			
15-24 ans	24,4	75,6	28,4	21,1 ; 36,1	71,6	63,9 ; 78,9
25-44 ans	24,3	75,7	21,8	17,7 ; 26,0	78,2	74,0 ; 82,3
45-64 ans	20,6	79,4	22,9	19,9 ; 26,0	77,1	74,0 ; 80,1
65 ans et plus	18,8	81,2	16,5	12,3 ; 20,8	83,5	79,2 ; 87,7
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,005			
Personne seule	25,7	74,3	26,0	21,6 ; 30,2	74,0	69,8 ; 78,4
Couple sans enfant	17,7	82,3	17,8	14,7 ; 21,0	82,2	79,0 ; 85,3
Couple avec enfants	20,8	79,2	22,7	18,8 ; 26,8	77,3	73,2 ; 81,2
Famille monoparentale	32,2	67,8	30,1	21,3 ; 39,1	69,9	60,9 ; 78,7
Autre	29,7	70,3	30,6*	18,6 ; 43,1	69,4	56,9 ; 81,4
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	27,8	23,6 ; 31,6	72,2	68,4 ; 76,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	23,8	19,4 ; 28,2	76,2	71,8 ; 80,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	19,2	15,3 ; 23,4	80,8	76,6 ; 84,7
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	14,8	10,7 ; 19,1	85,2	80,9 ; 89,3
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	34,3	28,5 ; 39,8	65,7	60,2 ; 71,5
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	19,9	17,5 ; 22,4	80,1	77,6 ; 82,5
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	49,0	42,9 ; 55,3	51,0	44,7 ; 57,1
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	18,0	15,8 ; 20,3	82,0	79,7 ; 84,2
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Travailleurs	20,9	79,1	20,4	17,8 ; 23,1	79,6	76,9 ; 82,2
Étudiants	24,8	75,2	27,2	19,1 ; 35,6	72,8	64,4 ; 80,9
Personnes sans emploi	37,9	62,1	36,7	28,8 ; 44,5	63,3	55,5 ; 71,2
Retraités	18,2	81,8	18,4	14,5 ; 22,3	81,6	77,7 ; 85,5
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	14,1	11,6 ; 16,8	85,9	83,2 ; 88,4
Bon	26,6	73,4	22,8	19,2 ; 26,4	77,2	73,6 ; 80,8
Passable ou mauvais	48,8	51,2	56,1	48,9 ; 62,8	43,9	37,2 ; 51,1
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	12,7	10,3 ; 15,4	87,3	84,6 ; 89,7
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	26,5	23,2 ; 29,9	73,5	70,1 ; 76,8
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	65,2	54,7 ; 75,6	34,8	24,4 ; 45,3
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	84,2	70,5 ; 95,5	15,8**	4,5 ; 29,5
Non	20,6	79,4	20,6	18,5 ; 22,8	79,4	77,2 ; 81,5
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,016			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	22,1	20,0 ; 24,3	77,9	75,7 ; 80,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,0*	1,4 ; 2,7	2,2*	1,2 ; 3,2	1,9*	1,0 ; 3,0
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,175		P = 0,083		P = 0,651	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	1,3**	0,4 ; 2,3	x	;	1,6**	0,2 ; 3,4
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	3,1*	1,9 ; 4,4	3,6**	1,6 ; 5,8	2,6**	1,1 ; 4,3
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,043		P = 0,006		P = 0,063	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	4,7*	2,7 ; 6,9	6,1**	2,3 ; 10,0	3,7**	1,6 ; 6,1
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	0,8**	0,1 ; 1,6	x	;	x	;
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,7**	0,6 ; 3,1	x	;	3,0**	0,7 ; 5,6
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	3,3**	0,3 ; 7,2	x	;	x	;
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,754		P = 0,205		P = 0,749	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	1,7**	0,6 ; 2,9	1,6**	0,3 ; 3,1	1,8**	0,2 ; 4,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,7**	1,2 ; 4,5	3,4**	1,1 ; 6,1	1,9**	0,1 ; 4,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	1,8**	0,5 ; 3,3	x	;	2,7**	0,7 ; 5,3
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	2,1**	0,5 ; 3,9	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,012		P = 0,003	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	5,5**	2,7 ; 8,5	5,2**	1,8 ; 9,1	5,7**	1,8 ; 10,4
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	1,2*	0,6 ; 1,8	1,4**	0,5 ; 2,4	1,0**	0,3 ; 1,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,001	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	7,6*	4,4 ; 11,2	7,8**	3,7 ; 12,6	7,3**	2,2 ; 13,7
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,1**	0,6 ; 1,7	1,1**	0,3 ; 2,0	1,1**	0,4 ; 1,9
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,224		P = 0,032		P = 0,371	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,0*	1,1 ; 3,1	2,1**	0,9 ; 3,5	2,0**	0,6 ; 3,7
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	4,2**	1,8 ; 7,2	8,0**	1,8 ; 16,0	2,4**	0,1 ; 5,2
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,1**	0,2 ; 2,3	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,1**	0,4 ; 1,9	x	;	1,2**	0,2 ; 2,5
Bon	2,5	2,7	2,4	1,2**	0,4 ; 2,1	1,4**	0,2 ; 2,9	0,9**	0,1 ; 1,9
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	8,6*	4,9 ; 12,7	8,9**	4,1 ; 14,5	8,3**	3,0 ; 14,7
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,013	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	0,8**	0,1 ; 1,6	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,1*	1,1 ; 3,2	1,5**	0,3 ; 2,9	2,7**	1,0 ; 4,6
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	12,0*	6,6 ; 18,5	15,1**	6,3 ; 25,7	8,0**	2,2 ; 15,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	7,9*	5,1 ; 10,9	9,0*	5,0 ; 13,8	7,1**	3,4 ; 11,3
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,4**	0,1 ; 0,8	x	;	x	;

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,6**	0,2 ; 1,0	0,5**	0,0 ; 1,2	0,6**	0,1 ; 1,2
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,150		P = 0,064		P = 0,071	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	0,9**	0,2 ; 1,7	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,009		P = 0,043		P = 0,035	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,637		P = 0,798		P = 0,129	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,136		P = 0,375		P = 0,100	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,4**	0,1 ; 0,9	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,103		P = 0,333		P = 0,079	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,4**	0,1 ; 0,8	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,675		P = 0,344		P = 0,890	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	0,5**	0,0 ; 1,0	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	x	;	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,146		P = 0,832		P = 0,029	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	0,6**	0,0 ; 1,3	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,016		P = 0,001		P = 0,105	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	1,7**	0,3 ; 3,4	x	;	x	;
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,723				
Oui	10,2	10,0	10,3	11,7	10,1 ; 13,4	11,9	9,5 ; 14,6	11,4	9,1 ; 13,7	
Non	89,8	90,0	89,7	88,3	86,6 ; 89,9	88,1	85,4 ; 90,5	88,6	86,3 ; 90,9	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,868				
Oui	4,4	3,5	5,3	3,3	2,5 ; 4,2	3,2*	2,0 ; 4,5	3,4*	2,3 ; 4,5	
Non	95,6	96,5	94,7	96,7	95,8 ; 97,5	96,8	95,5 ; 98,0	96,6	95,5 ; 97,7	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	10,1	8,6 ; 11,6	10,9	8,6 ; 13,4	9,2	7,3 ; 11,4
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,000		P = 0,374	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	15,0*	9,3 ; 21,2	16,1**	8,1 ; 24,7	13,8**	5,7 ; 23,4
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	12,7	9,4 ; 16,0	17,4*	11,7 ; 23,3	7,7*	4,5 ; 11,2
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	8,5	6,4 ; 10,8	7,8*	5,0 ; 10,9	9,2*	6,2 ; 12,5
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	5,6*	3,6 ; 7,9	2,6**	0,3 ; 5,4	8,2*	4,9 ; 11,9
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,007		P = 0,104		P = 0,147	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	9,1*	6,6 ; 12,1	7,8**	3,9 ; 12,3	10,1*	6,8 ; 14,0
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	6,4*	4,5 ; 8,3	7,4*	4,3 ; 10,7	5,3*	3,1 ; 7,9
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	12,7	9,4 ; 15,7	14,2*	9,4 ; 18,8	10,8*	6,7 ; 15,3
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	13,6**	7,2 ; 21,0	14,9**	4,7 ; 28,1	12,9**	4,5 ; 22,5
Autre	14,9	16,7	13,2*	13,0**	5,2 ; 21,9	13,2**	1,9 ; 27,5	12,8**	2,5 ; 25,6
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,538		P = 0,035		P = 0,436	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	8,8*	6,2 ; 11,5	6,9**	3,5 ; 10,7	10,8*	7,1 ; 15,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	9,8*	6,7 ; 13,1	10,1*	5,6 ; 15,3	9,4*	5,3 ; 13,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	11,4	8,0 ; 15,0	16,8*	11,1 ; 22,9	6,5**	3,1 ; 10,6
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	11,5*	7,7 ; 15,1	12,4*	6,4 ; 18,8	10,8*	6,0 ; 15,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,914		P = 0,613		P = 0,539	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	9,8*	6,5 ; 13,3	9,5**	4,1 ; 15,5	10,0*	5,9 ; 14,8
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	10,0	8,2 ; 11,9	11,4	8,6 ; 14,5	8,5	6,1 ; 11,0
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,001		P = 0,026		P = 0,162	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	10,7	8,5 ; 12,8	12,5	9,4 ; 15,8	8,4*	5,7 ; 11,3
Étudiants	17,1	21,4	12,9	17,1*	9,9 ; 25,2	19,1**	7,7 ; 31,2	15,5**	6,4 ; 26,5
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	10,4*	5,8 ; 15,7	x	;	10,6*	5,7 ; 16,1
Retraités	7,5	7,0	7,9	5,4*	3,7 ; 7,3	2,9**	0,7 ; 5,4	7,5*	4,9 ; 10,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	78,1	71,0 ; 84,8	81,7	71,9 ; 90,6	74,0	63,2 ; 84,0
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	21,9*	15,2 ; 29,0	18,3*	9,4 ; 28,1	26,0*	16,0 ; 36,8
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	23,2*	16,1 ; 30,8	28,1*	18,0 ; 39,4	17,6**	7,7 ; 28,6
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	15,3*	9,0 ; 22,2	14,1**	5,1 ; 23,4	16,7**	7,7 ; 26,2
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	24,0*	16,8 ; 31,6	31,3*	20,0 ; 43,1	15,6**	7,5 ; 24,6
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	4,5**	1,9 ; 7,9	3,3**	0,2 ; 7,5	6,0**	1,5 ; 11,8
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	22,6	15,6 ; 29,8	17,0**	8,1 ; 26,5	29,1*	18,6 ; 39,9
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	2,0**	0,3 ; 4,2	x	;	x	;
Autre	12,1	8,1	17,6	8,3*	4,6 ; 12,5	x	;	x	;
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	24,0	16,6 ; 31,3	26,2*	16,3 ; 37,1	21,3*	12,0 ; 31,5
Printemps	21,2	20,7	21,9	20,6*	14,3 ; 27,5	20,3*	11,5 ; 30,3	21,0*	12,0 ; 31,9
Été	29,1	30,3	27,4	30,1	22,2 ; 38,3	31,5*	19,9 ; 43,8	28,4*	17,5 ; 39,7
Automne	23,7	24,0	23,3	25,3	17,7 ; 33,1	22,0*	12,1 ; 32,9	29,4*	18,4 ; 40,6
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	37,8	30,0 ; 46,1	28,5*	17,8 ; 39,9	48,2	36,6 ; 60,3
Endroit public	28,1	24,8	32,5	26,6	19,0 ; 34,4	22,6*	12,1 ; 33,8	31,0*	20,6 ; 42,8
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	27,6	19,4 ; 36,1	35,0**	23,4 ; 47,6	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	8,0**	3,6 ; 13,2	13,9**	6,0 ; 23,5	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	9,5**	4,4 ; 15,4	11,7**	4,1 ; 20,9	6,8**	0,8 ; 14,5
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	2,9**	0,5 ; 6,0	x	;	x	;
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	9,3**	4,1 ; 14,8	11,4**	4,0 ; 20,4	6,7**	0,5 ; 15,2
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	4,4**	1,7 ; 7,6	4,2**	0,5 ; 9,3	4,7**	0,5 ; 9,8
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	x	;	x	;	x	;
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	20,4*	13,4 ; 27,5	21,6*	11,4 ; 32,9	19,0*	10,2 ; 28,3
Chute	34,6	30,5	40,3	37,1	28,8 ; 45,3	32,6*	20,9 ; 43,8	42,5	30,7 ; 54,8
Autres	13,7	12,5	15,3	11,5*	7,0 ; 16,4	12,8**	6,0 ; 20,3	10,0**	4,1 ; 16,6
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	x	;	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	24,9	18,0 ; 32,4	19,8*	11,1 ; 29,7	30,9*	19,9 ; 41,7
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	44,3	35,8 ; 52,9	48,3	36,1 ; 60,7	39,6	28,7 ; 51,6
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	x	;	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	16,1*	9,9 ; 22,6	18,0**	8,8 ; 28,0	13,8**	6,9 ; 21,9
Autre	11,9	10,9	13,2	8,3**	3,9 ; 13,4	10,1**	2,7 ; 18,2	6,2**	1,4 ; 12,3

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	3,6*	2,0 ; 5,5	x	;	6,2*	3,4 ; 9,5
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,001		P = .		P = 0,001	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	5,5**	2,8 ; 8,5	x	;	9,8**	4,9 ; 15,3
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	x	;	x	;	x	;
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,169		P = .		P = 0,513	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	5,5**	2,4 ; 9,4	x	;	7,2**	3,1 ; 12,2
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	2,7**	0,6 ; 5,0	x	;	5,1**	1,2 ; 9,6
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,542		P = .		P = 0,728	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	4,4*	2,2 ; 6,8	x	;	7,0**	3,5 ; 11,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,597		P = .		P = 0,505	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	5,1**	1,0 ; 10,5	x	;	8,7**	1,9 ; 17,6
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	3,7**	1,7 ; 6,1	x	;	5,9**	2,6 ; 9,7
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,124		P = .		P = 0,077	
Oui	5,9	3,6*	7,3	6,2**	2,6 ; 10,5	x	;	11,2**	4,8 ; 18,5
Non	2,7*	2,2**	3,1*	2,6**	0,7 ; 4,8	x	;	4,0**	1,1 ; 7,6
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,614		P = .		P = 0,724	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	x	;	x	;	x	;
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	4,1**	2,0 ; 6,6	x	;	6,7**	3,3 ; 10,7
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,977		P = 'n.d.'		P = 0,532	
Résidence	62,7	52,8	68,6	67,8*	41,8 ; 91,3	x	;	70,2*	41,9 ; 96,2
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	x	;	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	x	;	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	26,4**	3,2 ; 51,1	x	;	28,7**	3,8 ; 53,8
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	30,7**	7,9 ; 57,5	x	;	33,3**	8,9 ; 60,6
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	53,9*	26,7 ; 80,0	x	;	50,0**	22,0 ; 77,5
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	11,9	10,4 ; 13,5	12,1	9,8 ; 14,5	11,7	9,7 ; 13,9
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,013		P = 0,114		P = 0,089	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	10,2*	5,7 ; 15,3	10,1**	4,1 ; 16,7	10,3**	3,4 ; 18,4
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	14,8	11,3 ; 18,5	16,3*	10,7 ; 22,6	13,1*	9,1 ; 17,8
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	12,8	10,4 ; 15,2	11,5	8,2 ; 15,0	14,1	10,8 ; 17,6
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	7,0*	4,5 ; 9,7	8,3*	4,2 ; 12,6	5,9*	3,0 ; 9,3
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,486		P = 0,827		P = 0,520	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	9,2	6,7 ; 11,9	8,7*	4,8 ; 13,1	9,5*	6,2 ; 13,2
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	12,2	9,7 ; 14,8	11,6*	7,9 ; 15,2	12,9	9,2 ; 16,6
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	11,8	9,0 ; 14,7	12,9*	8,8 ; 17,3	10,5*	6,9 ; 14,6
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	13,6*	7,9 ; 20,1	14,8**	2,5 ; 28,3	13,0**	6,4 ; 20,8
Autre	11,4	12,8*	10,2*	16,3**	6,6 ; 25,7	14,4**	1,8 ; 29,1	18,4**	4,3 ; 34,0
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,211		P = 0,346		P = 0,367	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	9,6	7,2 ; 12,5	9,3*	5,8 ; 13,2	10,0*	6,5 ; 14,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	13,8	10,4 ; 17,2	12,6*	8,0 ; 17,5	15,1*	10,3 ; 20,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	13,0	9,9 ; 16,5	15,0*	9,7 ; 21,0	11,1*	7,2 ; 15,6
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	12,2*	8,1 ; 16,4	12,7*	6,4 ; 19,7	11,8*	7,2 ; 17,0
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,087		P = 0,353		P = 0,124	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	9,2*	5,9 ; 12,6	9,0**	3,8 ; 14,4	9,3*	5,4 ; 13,8
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	12,9	11,0 ; 14,9	12,3	9,5 ; 15,2	13,6	11,1 ; 16,5
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,022		P = 0,004		P = 0,988	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	16,4	11,9 ; 21,1	20,3*	12,6 ; 28,2	11,9*	6,6 ; 17,8
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	11,4	9,7 ; 13,1	10,9	8,3 ; 13,4	11,9	9,7 ; 14,4
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,147		P = 0,393		P = 0,571	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	13,5	11,3 ; 15,8	13,8	10,6 ; 17,0	13,3	10,4 ; 16,6
Étudiants	9,9	9,7	10,1	9,5**	4,1 ; 15,4	8,2**	1,2 ; 16,8	10,5**	3,2 ; 19,2
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	11,0*	6,5 ; 16,1	9,5**	2,0 ; 18,7	11,8*	6,3 ; 17,9
Retraités	6,9	6,7	7,0	9,4	6,8 ; 12,0	9,4*	5,4 ; 13,8	9,3*	6,1 ; 13,0

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,100				
Oui	45,2	47,6	42,8	48,2	40,9 ; 55,5	54,0	43,1 ; 64,2	42,1	32,4 ; 52,2	
Non	54,8	52,4	57,2	51,8	44,5 ; 59,1	46,0	35,8 ; 56,9	57,9	47,8 ; 67,6	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,523				
Oui	25,4	27,6	23,1	17,3*	11,4 ; 23,7	19,3*	10,2 ; 28,6	15,1**	6,9 ; 23,9	
Non	74,6	72,4	76,9	82,7	76,3 ; 88,6	80,7	71,4 ; 89,8	84,9	76,1 ; 93,1	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,446				
Oui	17,6	15,6	19,6	22,7	17,3 ; 28,9	20,4*	12,0 ; 29,6	25,1*	17,1 ; 33,5	
Non	82,4	84,4	80,4	77,3	71,1 ; 82,7	79,6	70,4 ; 88,0	74,9	66,5 ; 82,9	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,384				
Oui	8,1	7,2	9,0	10,9*	6,8 ; 15,4	9,1**	3,4 ; 15,8	12,9*	6,9 ; 19,6	
Non	91,9	92,8	91,0	89,1	84,6 ; 93,2	90,9	84,2 ; 96,6	87,1	80,4 ; 93,1	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	3,9**	1,2 ; 6,9	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	65,2	58,2 ; 72,1	63,3	53,1 ; 73,8	67,3	57,5 ; 76,8	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	11,4*	6,8 ; 16,1	11,6**	4,9 ; 18,7	11,2**	4,5 ; 18,3	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	3,7**	1,3 ; 6,7	3,8**	0,3 ; 8,6	3,6**	0,4 ; 7,9	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	13,4*	8,4 ; 18,6	16,0**	8,5 ; 24,2	10,6**	4,6 ; 17,2	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	2,4**	0,2 ; 5,0	x	;	x	;	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	31,3	29,2 ; 33,5	29,6	26,4 ; 32,7	33,1	30,1 ; 36,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,000		P = 0,899	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	21,1	15,1 ; 27,5	11,5**	5,4 ; 18,5	31,5*	20,3 ; 43,3
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	31,7	27,2 ; 36,8	30,7	24,0 ; 38,1	32,8	26,7 ; 39,0
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	35,0	31,6 ; 38,4	35,5	30,4 ; 40,8	34,5	29,8 ; 39,2
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	31,0	26,4 ; 35,7	30,2	22,8 ; 37,4	31,8	26,2 ; 37,9
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,009		P = 0,632		P = 0,001	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	41,5	37,0 ; 46,2	31,9	24,9 ; 39,4	48,5	42,2 ; 54,4
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	29,6	26,2 ; 33,1	32,1	26,9 ; 37,4	27,0	22,7 ; 31,9
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	28,6	24,5 ; 32,6	26,8	20,9 ; 32,5	30,6	24,6 ; 36,6
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	35,1	26,2 ; 44,5	29,5**	14,2 ; 46,5	38,0	27,4 ; 49,5
Autre	34,0	32,4	35,4	34,1*	22,2 ; 46,5	34,4**	17,4 ; 53,3	33,7*	17,7 ; 51,3
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,042		P = 0,059		P = 0,343	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	30,6	26,7 ; 34,5	28,0	22,5 ; 33,4	33,5	28,0 ; 39,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	35,9	30,9 ; 40,7	36,8	29,7 ; 44,1	34,9	28,3 ; 41,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	32,1	27,6 ; 36,9	28,6	21,9 ; 35,8	35,3	29,5 ; 41,8
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	25,2	20,3 ; 30,3	22,6*	14,5 ; 30,3	27,2	20,5 ; 34,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,003	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	43,6	37,8 ; 49,4	45,2	35,5 ; 54,7	42,4	35,5 ; 49,2
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	28,5	25,9 ; 31,2	26,2	22,6 ; 30,0	30,8	27,1 ; 34,7
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	54,5	48,1 ; 61,2	55,2	45,8 ; 64,3	53,6	44,3 ; 62,9
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	27,3	24,9 ; 29,7	24,2	20,7 ; 27,6	30,2	26,9 ; 33,5
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,031		P = 0,009		P = 0,794	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	31,9	29,0 ; 35,1	30,2	25,8 ; 34,5	34,1	30,0 ; 38,5
Étudiants	20,7	14,8	26,3	22,8*	15,3 ; 30,8	11,8**	3,5 ; 21,5	31,3*	19,2 ; 43,8
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	38,1	31,1 ; 45,6	43,0*	29,7 ; 58,4	35,6	27,3 ; 44,3
Retraités	34,2	30,5	37,2	31,2	27,2 ; 35,6	31,0	24,6 ; 37,9	31,3	26,1 ; 36,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	21,7	18,9 ; 24,6	18,6	14,4 ; 22,9	24,2	20,2 ; 28,2
Bon	33,9	28,1	39,6	33,0	29,1 ; 36,8	27,7	22,3 ; 33,1	39,1	33,4 ; 44,8
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	63,6	57,1 ; 69,7	66,6	57,5 ; 75,3	60,1	51,1 ; 69,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	49,8	44,3 ; 55,5	49,6	41,6 ; 58,2	49,9	43,1 ; 57,4
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	25,7	23,3 ; 28,2	23,8	20,3 ; 27,2	27,7	24,4 ; 31,2
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,004		P = 0,005	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	35,2**	17,6 ; 56,7	x	;	32,4**	13,8 ; 55,6
Poids normal	28,3	22,9	32,1	27,6	24,5 ; 31,0	22,5	17,9 ; 27,6	31,2	27,0 ; 35,6
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	30,9	27,1 ; 34,8	31,5	26,1 ; 36,5	30,0	24,2 ; 35,9
Obésité	37,9	30,5	46,1	42,1	35,9 ; 48,4	38,0	28,9 ; 47,2	46,7	37,9 ; 55,8

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Au moins un TMS</b>		<b>P = 0,000</b>				<b>P = 0,123</b>					
Oui	30,3	25,3	35,2	31,3	29,2 ; 33,5	29,6	26,4 ; 32,7	33,1	30,1 ; 36,2		
Non	69,7	74,7	64,8	68,7	66,5 ; 70,8	70,4	67,3 ; 73,6	66,9	63,8 ; 69,9		
<b>TMS au cou</b>		<b>P = 0,000</b>				<b>P = 0,142</b>					
Oui	9,5	6,4	12,5	10,2	8,9 ; 11,6	9,2	7,3 ; 11,3	11,3	9,5 ; 13,3		
Non	90,5	93,6	87,5	89,8	88,4 ; 91,1	90,8	88,7 ; 92,7	88,7	86,7 ; 90,5		
<b>TMS au dos</b>		<b>P = 0,000</b>				<b>P = 0,761</b>					
Oui	14,5	12,2	16,7	13,9	12,2 ; 15,5	13,6	11,2 ; 16,0	14,1	11,9 ; 16,4		
Non	85,5	87,8	83,3	86,1	84,5 ; 87,8	86,4	84,0 ; 88,8	85,9	83,6 ; 88,1		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		<b>P = 0,000</b>				<b>P = 0,410</b>					
Oui	13,5	10,8	16,1	15,0	13,3 ; 16,7	14,2	11,8 ; 16,8	15,7	13,4 ; 18,0		
Non	86,5	89,2	83,9	85,0	83,3 ; 86,7	85,8	83,2 ; 88,2	84,3	82,0 ; 86,6		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		<b>P = 0,000</b>				<b>P = 0,958</b>					
Oui	14,5	11,8	17,2	15,6	13,9 ; 17,3	15,7	13,2 ; 18,3	15,6	13,3 ; 18,1		
Non	85,5	88,2	82,8	84,4	82,7 ; 86,1	84,3	81,7 ; 86,8	84,4	81,9 ; 86,7		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		<b>P = 0,000</b>				<b>P = 0,686</b>					
Oui	17,8	16,0	19,6	19,3	17,5 ; 21,2	19,7	17,0 ; 22,5	18,9	16,4 ; 21,4		
Non	82,2	84,0	80,4	80,7	78,8 ; 82,5	80,3	77,5 ; 83,0	81,1	78,6 ; 83,6		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		<b>P = 0,000</b>				<b>P = 0,019</b>					
Oui	14,2	10,6	17,8	13,2	11,6 ; 14,9	11,3	9,1 ; 13,6	15,1	12,9 ; 17,6		
Non	85,8	89,4	82,2	86,8	85,1 ; 88,4	88,7	86,4 ; 90,9	84,9	82,4 ; 87,1		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	53,6	51,2 ; 56,0	35,9	33,6 ; 38,2	10,5	9,0 ; 12,2
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	52,6	34,1	13,3	46,1	42,6 ; 49,8	39,0	35,6 ; 42,5	14,8	12,2 ; 17,7
Femmes	60,1	29,8	10,1	60,8	57,6 ; 64,1	32,8	29,6 ; 35,9	6,4	4,9 ; 7,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	60,9	53,0 ; 68,1	30,3	23,5 ; 38,0	8,8*	5,0 ; 13,4
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	65,4	60,8 ; 70,0	25,6	21,4 ; 29,8	9,0*	6,0 ; 12,4
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	47,5	44,0 ; 51,1	39,6	36,2 ; 43,2	12,9	10,5 ; 15,7
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	41,5	36,4 ; 46,8	49,6	44,3 ; 55,0	8,8*	5,9 ; 11,9
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,026					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	46,6	41,9 ; 51,5	39,2	34,8 ; 43,7	14,2	10,8 ; 17,7
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	52,0	48,0 ; 55,8	40,0	36,1 ; 43,8	8,0	5,8 ; 10,2
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	56,8	52,2 ; 61,0	32,6	28,4 ; 37,0	10,7	7,9 ; 13,6
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	52,3	43,3 ; 61,6	35,8	26,7 ; 44,2	12,0*	6,1 ; 18,6
Autre	48,0	34,3	17,7	56,6	43,5 ; 69,0	28,1*	16,6 ; 41,1	15,3**	6,6 ; 24,6
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,994					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	53,9	51,5 ; 56,3	35,5	33,3 ; 37,9	10,6	9,0 ; 12,2
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	41,4**	12,3 ; 78,9	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,492					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	53,7	51,3 ; 56,1	35,8	33,5 ; 38,1	10,5	8,9 ; 12,2
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	70,4**	27,0 ; 100,0	x	;	x	;
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	x	;	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	40,7	36,3 ; 45,1	45,6	41,2 ; 49,9	13,7	10,6 ; 17,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	52,8	47,8 ; 57,6	34,5	29,9 ; 39,3	12,7	9,5 ; 16,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	60,4	55,2 ; 65,4	32,4	27,6 ; 37,1	7,2*	4,7 ; 10,0
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	70,9	65,3 ; 76,2	23,4	18,4 ; 28,6	5,8*	3,0 ; 8,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	42,8	36,9 ; 48,7	43,4	37,4 ; 49,1	13,7	9,8 ; 18,2
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	57,3	54,3 ; 60,2	32,7	29,9 ; 35,5	10,0	8,2 ; 11,9
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	40,5	34,1 ; 46,6	38,7	32,7 ; 45,3	20,8	15,5 ; 26,6
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	56,3	53,6 ; 58,9	34,9	32,4 ; 37,5	8,8	7,2 ; 10,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	55,9	52,6 ; 59,2	32,8	29,7 ; 35,9	11,3	9,1 ; 13,7
Étudiants	62,8	27,9	9,3	69,1	60,5 ; 77,4	26,6	18,7 ; 34,5	4,3**	1,1 ; 8,5
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	45,5	37,8 ; 52,9	39,6	31,9 ; 47,1	14,9*	9,4 ; 20,9
Retraités	49,7	38,1	12,2	44,0	39,4 ; 48,5	46,5	41,8 ; 51,3	9,5	6,6 ; 12,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	53,6	51,2 ; 56,0	35,9	33,6 ; 38,2	10,5	9,0 ; 12,2
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	46,5	40,8 ; 52,1	33,6	28,3 ; 39,1	19,9	15,4 ; 24,6
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	55,7	53,1 ; 58,4	36,3	33,6 ; 38,9	8,0	6,5 ; 9,6
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	70,9	67,8 ; 74,1	23,6	20,7 ; 26,6	5,5	3,9 ; 7,2
Bon	41,4	42,6	16,0	38,0	34,0 ; 42,1	49,7	45,6 ; 53,8	12,2	9,7 ; 15,1
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	28,7	22,3 ; 34,7	45,5	39,0 ; 52,3	25,8	19,9 ; 32,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	45,7	40,2 ; 51,2	36,3	31,2 ; 41,5	18,0	13,9 ; 22,5
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	56,3	53,6 ; 59,2	35,1	32,4 ; 37,9	8,5	6,9 ; 10,2
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	42,9	37,5 ; 48,3	49,0	43,5 ; 54,4	8,1*	5,4 ; 11,1
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	55,8	53,1 ; 58,5	33,2	30,6 ; 35,8	11,0	9,3 ; 12,9
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	60,2	57,5 ; 62,9	32,2	29,7 ; 34,8	7,6	6,1 ; 9,1
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	31,3	26,5 ; 36,7	48,4	42,9 ; 53,7	20,3	16,1 ; 25,0
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	66,2	61,1 ; 71,0	27,2	22,7 ; 32,0	6,6*	4,3 ; 9,4
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	52,0	48,7 ; 55,3	35,4	32,1 ; 38,5	12,6	10,5 ; 15,0

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	16,6	15,1 ; 18,2	13,4	11,3 ; 15,7	19,7	17,8 ; 21,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	1,9**	0,5 ; 3,6	x	;	1,8**	0,2 ; 3,7
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	17,7	15,2 ; 20,4	15,0	11,3 ; 19,1	20,4	16,8 ; 24,3
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	53,7	48,4 ; 58,8	44,7	36,1 ; 52,9	60,4	53,7 ; 67,2
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,112		P = 0,363		P = 0,237	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	48,5	41,7 ; 55,2	40,6	30,5 ; 50,5	55,2	46,2 ; 64,4
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	61,1	51,9 ; 69,8	49,6*	32,9 ; 65,8	69,3	59,1 ; 79,0
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	67,1*	39,6 ; 95,2	x	;	60,1*	31,2 ; 93,8
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	30,3	26,6 ; 34,0	22,5	17,5 ; 27,8	38,2	33,1 ; 43,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	17,4	14,0 ; 21,0	14,8*	10,1 ; 20,0	20,3	15,5 ; 25,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	5,4*	3,5 ; 7,4	3,5**	1,2 ; 6,1	7,1*	4,3 ; 10,2
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	5,5*	3,0 ; 8,1	6,2**	1,9 ; 10,9	4,9**	2,1 ; 8,1
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,004		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	26,2	21,7 ; 30,7	20,2*	13,2 ; 28,0	30,6	25,0 ; 36,7
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	13,1	11,4 ; 14,9	10,4	8,1 ; 12,9	15,8	13,4 ; 18,5
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,002	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	25,5	20,5 ; 31,0	23,2*	15,9 ; 31,3	28,1	21,1 ; 35,7
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	14,4	12,9 ; 16,0	11,2	8,9 ; 13,5	17,5	15,3 ; 19,7

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	77,4	75,3 ; 79,4	18,9	17,0 ; 20,9	3,6	2,7 ; 4,7
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	66,7	63,0 ; 70,1	27,1	23,9 ; 30,6	6,2	4,5 ; 8,1
Femmes	87,9	11,3	0,7	87,7	85,7 ; 89,8	11,1	9,1 ; 13,1	1,2**	0,5 ; 1,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,009					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	83,7	77,5 ; 89,0	13,3*	8,2 ; 19,2	3,1**	0,7 ; 6,0
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	82,8	78,9 ; 86,6	15,0	11,3 ; 18,9	2,2**	0,8 ; 4,0
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	75,0	71,9 ; 78,0	20,9	18,1 ; 23,8	4,1*	2,7 ; 5,7
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	68,4	63,0 ; 73,5	26,1	21,0 ; 31,4	5,5*	3,1 ; 8,1
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,675					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	76,4	72,4 ; 80,3	19,9	16,2 ; 23,8	3,7*	2,0 ; 5,6
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	73,5	70,3 ; 76,9	22,9	19,7 ; 26,2	3,5*	2,1 ; 5,1
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	78,8	74,9 ; 82,6	17,5	13,9 ; 21,2	3,7*	2,0 ; 5,7
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	83,6	76,3 ; 90,3	12,7*	6,9 ; 19,4	3,7**	0,4 ; 7,9
Autre	75,5	19,3	5,3*	80,0	68,2 ; 89,9	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,807					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	76,1	73,7 ; 78,4	20,3	18,1 ; 22,6	3,6	2,6 ; 4,8
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	79,5	72,5 ; 86,0	15,7*	9,9 ; 22,3	4,8**	1,8 ; 8,8
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	81,6	74,9 ; 88,1	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	86,1	74,4 ; 96,6	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	67,0	62,9 ; 71,0	26,3	22,3 ; 30,3	6,6*	4,5 ; 9,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	77,9	73,7 ; 82,0	19,8	15,7 ; 23,9	2,2**	0,9 ; 3,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	83,0	79,0 ; 86,6	14,5	11,0 ; 18,4	2,5**	1,0 ; 4,4
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	88,5	84,5 ; 92,3	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,009					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	69,4	63,8 ; 74,8	26,2	21,1 ; 31,6	4,3**	1,8 ; 7,2
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	79,1	76,7 ; 81,4	17,7	15,4 ; 20,0	3,2*	2,2 ; 4,3
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	65,2	59,1 ; 70,8	28,0	22,3 ; 33,8	6,8**	3,6 ; 10,4
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	80,0	77,8 ; 82,1	17,1	15,0 ; 19,2	2,9*	2,0 ; 3,9
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,040					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	77,6	74,8 ; 80,4	18,9	16,3 ; 21,8	3,4*	2,2 ; 4,7
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	94,1	89,4 ; 97,9	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	71,3	64,0 ; 78,3	26,0	19,2 ; 33,4	2,6**	0,5 ; 5,5
Retraités	72,9	23,2	3,8	70,7	66,2 ; 75,1	24,3	20,2 ; 28,5	5,0*	3,0 ; 7,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	77,4	75,3 ; 79,4	18,9	17,0 ; 20,9	3,6	2,7 ; 4,7
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,047					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	72,0	66,4 ; 77,1	23,6	18,9 ; 28,7	4,4**	2,2 ; 7,0
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	78,9	76,5 ; 81,0	17,8	15,6 ; 20,0	3,4*	2,4 ; 4,4
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	84,4	81,7 ; 86,9	14,2	11,8 ; 16,7	1,5**	0,6 ; 2,5
Bon	75,1	21,2	3,6	71,7	67,6 ; 75,4	23,0	19,4 ; 26,9	5,2*	3,5 ; 7,2
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	65,8	59,3 ; 72,1	26,4	20,6 ; 32,6	7,8*	4,1 ; 11,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,054					
Élevé	77,2	19,2	3,6	74,6	69,3 ; 79,2	19,9	15,6 ; 24,6	5,5*	3,0 ; 8,4
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	78,6	76,3 ; 80,8	18,6	16,5 ; 20,9	2,7*	1,9 ; 3,7
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	67,3	61,9 ; 72,6	29,0	23,6 ; 34,2	3,7**	1,8 ; 5,9
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	79,5	77,3 ; 81,6	17,0	14,9 ; 19,1	3,5*	2,5 ; 4,6
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	89,6	86,3 ; 92,8	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	75,8	72,9 ; 78,5	19,7	17,2 ; 22,4	4,5*	3,2 ; 6,0

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	77,4	75,3 ; 79,4	66,7	63,0 ; 70,1	87,7	85,7 ; 89,8
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	18,9	17,0 ; 20,9	27,1	23,9 ; 30,6	11,1	9,1 ; 13,1
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	3,6	2,7 ; 4,7	6,2	4,5 ; 8,1	1,2**	0,5 ; 1,9
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,001					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	67,3	61,9 ; 72,6	55,3	45,2 ; 65,2	75,1	69,0 ; 81,0
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	29,0	23,6 ; 34,2	38,8	29,4 ; 48,6	22,5	16,6 ; 28,5
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	3,7**	1,8 ; 5,9	5,8**	1,8 ; 10,4	2,4**	0,6 ; 4,7
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	79,5	77,3 ; 81,6	68,6	64,7 ; 72,3	90,8	88,6 ; 92,9
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	17,0	14,9 ; 19,1	25,3	21,9 ; 29,0	8,3	6,3 ; 10,5
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	3,5*	2,5 ; 4,6	6,0*	4,2 ; 8,0	0,9**	0,2 ; 1,7

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	27,8	25,4 ; 30,3	15,2	13,2 ; 17,2	57,0	54,3 ; 59,7
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	19,6	16,5 ; 22,7	11,8	9,1 ; 14,5	68,6	65,1 ; 72,3
Femmes	41,7	18,2	40,1	36,4	32,6 ; 40,1	18,7	15,7 ; 21,9	44,9	41,1 ; 48,8
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,785					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	27,6	20,5 ; 34,8	13,0*	8,0 ; 18,7	59,3	51,7 ; 67,3
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	26,7	22,5 ; 31,1	16,4	12,7 ; 20,1	56,9	52,2 ; 61,6
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	29,5	25,9 ; 33,2	15,2	12,2 ; 18,4	55,2	51,4 ; 59,0
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	24,6	18,0 ; 31,6	14,8*	9,1 ; 20,8	60,6	53,3 ; 68,1
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,001					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	25,5	20,9 ; 30,2	9,8*	6,6 ; 13,1	64,7	59,5 ; 70,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	32,2	26,8 ; 37,5	13,4	9,5 ; 17,6	54,4	48,8 ; 60,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	25,5	21,2 ; 30,2	19,6	15,5 ; 23,8	54,9	49,6 ; 60,0
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	29,6	24,0 ; 35,2	19,0	14,2 ; 24,2	51,5	45,3 ; 57,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,444					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	30,8	24,6 ; 37,3	12,1*	7,6 ; 17,3	57,1	50,0 ; 64,1
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	27,2	24,6 ; 30,1	14,8	12,6 ; 17,1	57,9	54,7 ; 61,1
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,127					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	26,1	23,2 ; 29,3	16,9	14,2 ; 19,6	57,0	53,6 ; 60,3
Étudiants	28,8	16,3	54,9	30,6	21,8 ; 39,5	9,6**	4,6 ; 15,7	59,8	50,6 ; 69,3
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	35,2	26,8 ; 43,8	12,1*	6,3 ; 18,7	52,7	43,5 ; 61,5
Retraités	38,0	12,4	49,6	30,2	24,8 ; 36,3	14,8	10,3 ; 19,4	55,0	48,9 ; 60,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
1,5*	0,9 ; 2,1	47,8	45,5 ; 50,3	33,9	31,6 ; 36,2	16,8	14,9 ; 18,6	Ensemble de la population	
P = 0,000									
x	;	40,3	37,2 ; 43,9	41,8	38,3 ; 45,1	x	;	Sexe	
2,8*	1,7 ; 3,9	55,4	52,1 ; 58,7	25,9	23,0 ; 28,9	16,0	13,5 ; 18,5	Hommes	
P = 0,016									
x	;	78,8	66,6 ; 89,5	14,7**	5,5 ; 25,7	x	;	Femmes	
4,1**	0,2 ; 9,0	72,9	63,7 ; 81,8	13,4**	6,5 ; 20,7	9,5**	4,0 ; 16,0	Groupe d'âge	
P = 0,000									
2,5**	0,2 ; 5,4	75,4	68,4 ; 82,1	14,0*	8,8 ; 19,7	8,1**	4,0 ; 12,8	15-17 ans	
1,7**	0,6 ; 3,1	48,5	43,5 ; 53,5	30,1	25,3 ; 34,7	19,7	15,5 ; 24,0	18-24 ans	
1,0**	0,3 ; 1,8	40,3	36,9 ; 43,8	39,6	36,1 ; 43,0	19,2	16,3 ; 22,2	15-24 ans	
1,5**	0,4 ; 2,9	40,5	35,4 ; 45,7	44,2	38,9 ; 49,7	13,8	10,3 ; 17,4	25-44 ans	
P = 'n.d.'									
x	;	83,0	69,7 ; 94,5	9,7**	0,8 ; 21,5	x	;	45-64 ans	
x	;	75,1	62,6 ; 87,1	15,4**	5,9 ; 26,0	x	;	65 ans et plus	
P = 'n.d.'									
x	;	78,8	70,2 ; 87,1	12,7**	6,0 ; 20,0	x	;	Hommes	
x	;	38,5	31,1 ; 46,2	40,2	32,6 ; 47,6	x	;	15-17 ans	
x	;	28,3	23,6 ; 33,3	50,4	45,0 ; 55,7	x	;	18-24 ans	
x	;	37,4	29,2 ; 45,6	51,9	43,1 ; 60,4	x	;	25-44 ans	
P = 0,552									
x	;	73,5	52,7 ; 93,8	21,1**	3,0 ; 41,3	x	;	45-64 ans	
7,8**	0,3 ; 17,3	71,0	56,2 ; 84,7	11,7**	2,7 ; 22,1	9,4**	1,8 ; 18,7	65 ans et plus	
P = 0,019									
4,9**	0,2 ; 10,8	71,9	60,6 ; 82,8	15,3**	6,5 ; 25,7	7,9**	1,7 ; 15,8	Femmes	
3,8**	1,4 ; 6,6	60,0	53,0 ; 66,7	18,5*	13,3 ; 24,0	17,7*	12,3 ; 23,4	15-17 ans	
1,4**	0,3 ; 2,7	52,2	46,9 ; 57,2	28,8	24,3 ; 33,7	17,6	14,0 ; 21,5	18-24 ans	
2,7**	0,7 ; 5,0	43,0	36,1 ; 50,0	38,1	31,3 ; 45,2	16,2*	11,2 ; 21,2	25-44 ans	
P = 0,078									
1,3**	0,5 ; 2,2	44,8	40,5 ; 49,4	35,9	31,6 ; 40,3	18,0	14,8 ; 21,4	45-64 ans	
1,3**	0,3 ; 2,5	52,3	47,7 ; 57,4	29,4	25,0 ; 33,6	17,0	12,9 ; 21,0	65 ans et plus	
0,9**	0,1 ; 2,0	44,7	39,6 ; 49,6	36,9	32,1 ; 41,8	17,4	13,8 ; 21,3	Niveau de scolarité	
3,3**	0,9 ; 6,0	51,8	45,9 ; 57,9	32,8	27,0 ; 38,5	12,2*	8,4 ; 16,4	Niveau inférieur au DES	
P = 'n.d.'									
x	;	41,8	35,8 ; 48,4	39,5	33,0 ; 45,7	x	;	Diplôme d'études secondaires (DES)	
x	;	44,7	37,9 ; 52,1	35,5	28,7 ; 42,3	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
x	;	33,0	25,8 ; 40,2	49,7	41,9 ; 57,2	x	;	Diplôme d'études universitaires	
x	;	41,1	31,7 ; 50,5	47,8	38,4 ; 57,3	x	;	Hommes	
P = 0,127									
2,3**	0,8 ; 4,2	48,0	41,8 ; 54,0	32,2	26,6 ; 38,0	17,5	13,1 ; 22,3	Niveau inférieur au DES	
2,3**	0,4 ; 4,6	60,7	53,9 ; 67,7	22,7	16,9 ; 28,4	14,3*	9,3 ; 19,7	Diplôme d'études secondaires (DES)	
1,9**	0,3 ; 3,8	55,9	48,7 ; 62,5	24,7	18,9 ; 30,9	17,5	12,6 ; 22,8	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
5,6**	1,5 ; 10,3	60,5	51,9 ; 68,4	20,5*	14,1 ; 27,1	13,4*	8,2 ; 19,2	Diplôme d'études universitaires	
P = 0,022									
3,5**	1,6 ; 5,8	45,6	39,5 ; 51,7	32,9	27,4 ; 38,4	18,0	13,7 ; 22,6	Indice du niveau de revenu du ménage	
1,1**	0,5 ; 1,7	48,9	46,0 ; 51,8	34,5	31,7 ; 37,2	15,5	13,5 ; 17,7	Quintile 1 (faible)	
P = 'n.d.'									
x	;	42,9	33,5 ; 52,3	36,7	27,5 ; 46,1	x	;	Quintile 2 et suivants	
x	;	40,7	36,9 ; 44,9	43,3	39,0 ; 47,1	x	;	Hommes	
P = 0,019									
6,0**	2,7 ; 9,8	47,7	40,2 ; 55,3	29,9	23,6 ; 36,8	16,4*	11,3 ; 22,1	Femmes	
2,0**	0,9 ; 3,4	57,7	53,4 ; 61,6	25,1	21,6 ; 28,8	15,1	12,4 ; 18,2	Quintile 1 (faible)	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	36,1	33,8 ; 38,4	2,4*	1,7 ; 3,1	61,5	59,2 ; 63,9
Sexe	P = 0,000			P = 0,112					
Hommes	36,6	3,6	59,9	33,7	30,2 ; 37,1	2,4*	1,4 ; 3,6	63,9	60,4 ; 67,6
Femmes	40,5	2,3	57,1	38,6	35,6 ; 41,8	2,3*	1,3 ; 3,4	59,1	55,7 ; 62,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	12,7*	8,0 ; 18,5	3,0**	0,4 ; 6,0	84,3	78,2 ; 89,9
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	38,6	33,5 ; 43,4	2,3**	0,9 ; 4,0	59,1	54,4 ; 64,4
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	44,7	40,9 ; 48,3	2,3*	1,3 ; 3,3	53,0	49,4 ; 56,8
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	32,1	27,1 ; 37,5	2,3**	0,8 ; 4,1	65,6	60,4 ; 70,6
Hommes	P = 0,000			P = 0,035					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	7,4**	2,9 ; 12,9	x	;	x	;
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	35,5	28,0 ; 43,0	2,3**	0,2 ; 5,0	62,2	54,7 ; 69,9
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	43,5	37,9 ; 48,9	2,1**	0,7 ; 3,6	54,4	49,0 ; 60,1
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	30,6	22,5 ; 39,1	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,380					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	18,3**	9,6 ; 28,2	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	42,1	35,4 ; 48,8	2,3**	0,4 ; 4,6	55,6	48,8 ; 62,3
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	45,9	41,1 ; 51,0	2,4**	1,0 ; 4,1	51,6	46,7 ; 56,6
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	33,3	27,0 ; 39,6	1,9**	0,1 ; 4,0	64,8	58,2 ; 71,2
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	39,4*	19,6 ; 59,1	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	10,4	8,3 ; 12,6	3,3*	2,1 ; 4,6	86,3	83,8 ; 88,7
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	50,7	46,2 ; 54,8	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	83,5	78,6 ; 88,1	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	4,8**	2,3 ; 7,4	4,9*	2,6 ; 7,4	90,3	86,8 ; 93,6
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	43,1	37,3 ; 48,4	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	79,0	71,4 ; 86,3	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 1,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	35,1**	14,9 ; 55,8	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	14,4	11,2 ; 17,7	2,2**	0,9 ; 3,8	83,4	79,8 ; 86,6
Embonpoint	69,6	x	x	63,1	56,7 ; 69,3	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	88,4	82,3 ; 94,0	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	84,0	80,8 ; 87,1	9,9	7,4 ; 12,6	6,1*	4,1 ; 8,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,613					
Hommes	81,4	10,5	8,0	85,5	80,4 ; 90,1	8,4*	4,6 ; 12,5	6,1**	3,1 ; 9,7
Femmes	74,5	14,1	11,5	83,0	78,8 ; 86,8	11,1	7,9 ; 14,6	6,0*	3,5 ; 8,5
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,849					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	91,0	80,9 ; 98,9	x	;	x	;
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	86,0	79,8 ; 91,7	10,9*	5,9 ; 16,6	3,1**	0,5 ; 6,1
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	80,5	75,5 ; 85,2	11,4*	7,6 ; 15,4	8,0*	4,9 ; 11,4
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	86,3	78,9 ; 93,2	6,7**	1,6 ; 12,6	7,0**	2,3 ; 12,7
Hommes	P = 0,252			P = 0,947					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	89,8	69,9 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	93,9	85,4 ; 100,0	x	;	x	;
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	79,5	71,2 ; 87,2	11,8**	5,8 ; 18,9	8,7**	3,4 ; 14,6
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	89,3	78,6 ; 97,9	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,961					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	91,5	77,9 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	81,2	72,1 ; 88,8	14,9*	7,8 ; 23,2	3,8**	0,3 ; 8,0
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	81,3	75,1 ; 87,2	11,2*	6,2 ; 16,6	7,5**	3,8 ; 11,6
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	83,9	72,6 ; 93,8	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,294					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	86,9	80,9 ; 91,8	9,7*	5,4 ; 14,8	3,5**	0,8 ; 6,7
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	83,6	78,9 ; 88,5	10,8*	6,7 ; 14,8	5,6*	2,9 ; 8,8
Obésité	72,3	14,4	13,3	81,9	74,8 ; 88,0	8,6**	4,0 ; 14,0	9,5**	4,8 ; 14,6
Hommes	P = 0,002			P = 0,934					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	86,8	74,0 ; 97,4	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	85,1	78,3 ; 91,8	8,9**	3,5 ; 14,6	5,9**	1,9 ; 10,5
Obésité	76,0	12,2	11,8	85,2	74,2 ; 94,4	x	;	x	;
Femmes	P = 0,161			P = 0,571					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	86,9	80,1 ; 92,5	9,0**	4,4 ; 14,8	4,1**	0,7 ; 8,2
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	82,0	74,9 ; 88,8	12,8*	7,0 ; 19,3	5,2**	1,4 ; 9,7
Obésité	68,9	16,4	14,7	79,4	69,7 ; 88,3	11,3**	4,3 ; 19,6	9,3**	3,6 ; 15,3

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
14,7	13,0 ; 16,5	15,7	14,0 ; 17,5	2,2*	1,4 ; 3,0	67,3	65,2 ; 69,6	Ensemble de la population	
P = 0,001									
11,8	9,6 ; 14,3	13,7	11,3 ; 16,2	2,1**	1,0 ; 3,3	72,4	69,2 ; 75,6	Sexe	
17,5	15,0 ; 20,1	17,7	15,2 ; 20,1	2,3*	1,3 ; 3,5	62,5	59,3 ; 65,7	Hommes	
								Femmes	
P = 0,010									
12,8*	7,6 ; 18,4	10,4*	5,9 ; 15,5	5,2**	1,8 ; 8,9	71,7	64,6 ; 78,8	Groupe d'âge	
16,4	13,1 ; 20,0	13,0	10,0 ; 16,2	1,9**	0,7 ; 3,4	68,7	64,4 ; 72,9	15-24 ans	
15,3	12,7 ; 18,0	20,5	17,5 ; 23,6	1,7**	0,8 ; 2,8	62,5	58,9 ; 66,2	25-44 ans	
12,3	8,7 ; 15,8	13,6	10,3 ; 17,2	1,2**	0,1 ; 2,6	72,9	68,2 ; 77,4	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,613									
7,1**	2,0 ; 13,4	7,7**	2,7 ; 14,1	6,3**	1,4 ; 12,4	78,8	69,8 ; 86,8	Hommes	
11,5*	7,1 ; 16,5	10,1*	5,9 ; 14,5	x	;	x	;	15-24 ans	
13,9	10,2 ; 17,8	18,5	14,2 ; 22,9	1,3**	0,1 ; 2,9	66,3	61,3 ; 71,5	25-44 ans	
12,0*	6,5 ; 18,1	14,0*	8,7 ; 20,3	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,576									
18,6*	9,9 ; 28,1	13,1**	5,5 ; 21,5	x	;	x	;	Femmes	
21,5	16,3 ; 27,0	16,1*	11,3 ; 21,1	2,7**	0,7 ; 4,9	59,8	53,3 ; 66,2	15-24 ans	
16,7	12,9 ; 20,5	22,5	18,3 ; 26,9	2,1**	0,7 ; 3,7	58,8	53,8 ; 63,8	25-44 ans	
12,5*	8,4 ; 16,9	13,2*	8,9 ; 18,0	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,181									
x	;	x	;	23,9**	7,4 ; 42,0	73,1	54,0 ; 90,6	Statut pondéral	
7,6	5,7 ; 9,6	12,6	10,2 ; 15,0	3,4*	2,0 ; 5,0	76,5	73,4 ; 79,6	Poids insuffisant	
18,6	15,3 ; 21,9	17,8	14,7 ; 21,1	x	;	x	;	Poids normal	
29,6	24,0 ; 35,5	20,8	15,9 ; 26,0	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,179									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
3,3**	1,3 ; 5,7	9,9*	6,5 ; 13,4	4,3**	2,0 ; 7,1	82,5	77,9 ; 86,9	Poids insuffisant	
14,1	10,3 ; 17,9	16,5	12,6 ; 20,8	x	;	x	;	Poids normal	
26,6	18,9 ; 34,8	16,4*	9,9 ; 23,9	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,222									
x	;	x	;	23,9**	6,3 ; 44,1	72,5	51,5 ; 91,4	Femmes	
10,7	7,8 ; 13,8	14,6	11,1 ; 17,9	2,7**	1,1 ; 4,6	72,1	67,9 ; 76,3	Poids insuffisant	
26,0	20,4 ; 31,6	19,8	15,1 ; 25,1	x	;	x	;	Poids normal	
32,9	24,7 ; 41,0	25,7	18,4 ; 33,3	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
31,5	27,9 ; 35,3	21,9	18,6 ; 25,2	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	29,7*	15,1 ; 44,6	70,3	55,4 ; 84,9	Excès de poids	
5,6	4,2 ; 7,2	12,6	10,6 ; 14,6	2,4*	1,3 ; 3,6	79,4	76,9 ; 82,0	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
28,7	22,7 ; 34,5	13,6*	9,1 ; 18,2	6,1**	3,3 ; 9,6	51,5	45,0 ; 58,0	Ensemble de la population	
P = 0,308									
Sexe									
33,0	23,2 ; 43,3	7,6**	2,4 ; 13,3	x		x		Hommes	
25,9	18,4 ; 33,6	17,5*	10,9 ; 24,3	9,0**	4,5 ; 14,4	47,6	39,4 ; 56,3	Femmes	
P = 0,935									
Groupe d'âge									
36,6**	13,3 ; 59,6	x		x		31,7**	12,2 ; 55,2	15-24 ans	
30,3*	18,8 ; 42,1	15,1**	7,1 ; 24,3	x		x		25-44 ans	
27,9	19,3 ; 36,5	13,5*	7,3 ; 20,3	4,8**	1,5 ; 8,7	53,7	44,4 ; 63,3	45-64 ans	
19,9**	7,5 ; 33,5	x		8,4**	1,0 ; 17,5	x		65 ans et plus	
P = 'n.d.'									
Hommes									
x		x		x		x		15-24 ans	
28,9**	8,3 ; 51,3	x		x		65,0*	41,3 ; 86,7	25-44 ans	
29,8*	16,8 ; 43,9	10,5**	2,2 ; 21,0	x		55,8	40,3 ; 70,1	45-64 ans	
36,5**	10,8 ; 63,4	x		x		57,5*	30,6 ; 83,5	65 ans et plus	
P = 0,967									
Femmes									
x		x		x		26,4**	3,7 ; 55,2	15-24 ans	
31,1*	17,4 ; 45,2	20,1**	8,3 ; 32,2	x		x		25-44 ans	
26,5*	14,6 ; 37,9	15,9**	6,8 ; 26,0	5,6**	0,9 ; 11,1	52,1	39,3 ; 64,9	45-64 ans	
x		x		14,8**	1,8 ; 29,5	72,7	54,8 ; 89,7	65 ans et plus	
P = 0,646									
Statut pondéral									
x		x		x		x		Poids insuffisant	
36,2*	22,6 ; 50,0	14,1**	5,0 ; 24,5	9,3**	1,4 ; 19,3	40,4*	27,8 ; 54,1	Poids normal	
28,6*	19,4 ; 37,9	13,9**	7,0 ; 21,3	3,6**	0,3 ; 8,1	54,0	44,4 ; 64,2	Embonpoint	
21,7*	12,0 ; 31,7	13,4**	5,9 ; 22,2	7,0**	2,3 ; 12,8	57,9	46,3 ; 68,9	Obésité	
P = 'n.d.'									
Hommes									
x		x		x		x		Poids insuffisant	
66,7*	28,4 ; 96,7	x		x		x		Poids normal	
34,8*	20,9 ; 49,9	x		x		56,3	41,4 ; 70,8	Embonpoint	
20,6**	7,1 ; 36,1	11,2**	1,3 ; 23,8	x		x		Obésité	
P = 0,886									
Femmes									
x		x		x		x		Poids insuffisant	
29,2*	15,2 ; 43,8	17,3**	6,5 ; 29,7	11,4**	1,8 ; 23,7	42,1*	28,1 ; 57,6	Poids normal	
23,2*	11,2 ; 34,8	20,3**	8,7 ; 32,5	x		x		Embonpoint	
22,7**	8,5 ; 36,4	15,5**	3,8 ; 28,5	11,7**	3,3 ; 21,4	50,2*	34,1 ; 66,7	Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	87,2	84,2 ; 90,0	7,4*	5,2 ; 9,8	5,4*	3,5 ; 7,5
Sexe	P = 0,001			P = 0,873					
Hommes	88,9	6,9	4,2	87,8	83,2 ; 92,1	7,4*	4,0 ; 11,1	4,8**	2,0 ; 8,1
Femmes	85,7	7,5	6,8	86,7	82,6 ; 90,6	7,4*	4,3 ; 10,7	5,9*	3,1 ; 8,9
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,976					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	89,5	77,4 ; 99,1	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	90,5	85,2 ; 95,1	6,0**	2,3 ; 10,3	3,5**	0,4 ; 7,4
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	85,5	80,9 ; 89,9	8,2*	4,8 ; 12,0	6,2*	3,4 ; 9,5
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	84,4	77,0 ; 91,6	8,7**	3,3 ; 14,8	6,9**	2,0 ; 12,5
Hommes	P = 0,121			P = 0,912					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	91,8	82,8 ; 99,1	6,4**	0,0 ; 14,4	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	84,6	77,5 ; 91,5	7,8**	2,8 ; 13,4	7,7**	2,6 ; 13,3
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	84,9	72,4 ; 95,9	12,2**	1,7 ; 24,3	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,987					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	84,3	66,0 ; 98,7	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	89,7	82,3 ; 96,0	x	;	x	;
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	86,3	80,2 ; 91,8	8,6**	3,9 ; 13,8	5,1**	1,8 ; 9,0
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	84,0	73,0 ; 94,1	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,410					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	94,9	90,2 ; 98,4	x	;	x	;
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	88,0	83,3 ; 92,4	6,8**	3,2 ; 10,6	5,1**	2,4 ; 8,3
Obésité	82,0	8,7	9,2	78,0	70,8 ; 84,8	11,5*	6,3 ; 17,2	10,5**	5,2 ; 16,4
Hommes	P = 0,002			P = 0,926					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	88,3	75,9 ; 98,3	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	91,2	85,5 ; 96,2	5,5**	1,4 ; 10,3	3,4**	0,2 ; 7,1
Obésité	85,2	8,2	6,6*	81,7	70,8 ; 90,9	10,6**	3,7 ; 18,7	7,7**	0,9 ; 16,3
Femmes	P = 0,034			P = 0,078					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	97,3	92,9 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	84,6	76,8 ; 92,1	8,3**	2,3 ; 15,0	7,1**	2,5 ; 12,5
Obésité	79,1	9,2	11,8	75,0	64,7 ; 84,8	12,2**	5,2 ; 19,9	12,8**	5,2 ; 21,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	6,1*	4,1 ; 8,2	93,9	91,8 ; 95,9
Sexe	P = 0,024		P = 0,405			
Hommes	6,6	93,4	5,0**	2,4 ; 8,1	95,0	91,9 ; 97,6
Femmes	8,6	91,4	6,8*	4,0 ; 9,9	93,2	90,1 ; 96,0
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,825			
15-24 ans	11,2*	88,8	x	;	x	;
25-44 ans	8,0	92,0	7,5**	3,0 ; 12,4	92,5	87,6 ; 97,0
45-64 ans	7,5	92,5	5,9*	3,4 ; 8,8	94,1	91,2 ; 96,6
65 ans et plus	4,9	95,1	4,3**	0,2 ; 9,2	95,7	90,8 ; 99,8
Hommes	P = 0,409		P = 0,640			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	x	;	x	;
45-64 ans	7,0	93,0	6,1**	1,9 ; 10,9	93,9	89,1 ; 98,1
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,232			
15-24 ans	12,3*	87,7	x	;	x	;
25-44 ans	9,9	90,1	10,0**	3,6 ; 17,4	90,0	82,6 ; 96,4
45-64 ans	7,8	92,2	5,7**	2,7 ; 9,6	94,3	90,4 ; 97,3
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,043			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	5,5**	2,1 ; 9,9	94,5	90,1 ; 97,9
Embonpoint	6,6	93,4	3,3**	1,2 ; 5,9	96,7	94,1 ; 98,8
Obésité	11,3	88,7	10,0**	5,1 ; 15,7	90,0	84,3 ; 94,9
Hommes	P = 0,000		P = 0,165			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	x	;	x	;
Obésité	11,5	88,5	9,4**	2,6 ; 17,9	90,6	82,1 ; 97,4
Femmes	P = 0,032		P = 0,236			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	6,4**	2,0 ; 12,1	93,6	87,9 ; 98,0
Embonpoint	8,4	91,6	3,4**	0,6 ; 7,0	96,6	93,0 ; 99,4
Obésité	11,1	88,9	10,5**	3,6 ; 18,7	89,5	81,3 ; 96,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	2,8	2,6*	2,9	1,2**	0,3 ; 2,2	x	;	x	;
Jamais	94,8	94,8	94,8	97,2	95,7 ; 98,6	96,1	93,2 ; 98,5	98,0	96,4 ; 99,4
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,433					
Souvent	4,6	4,2	4,9	3,4*	2,0 ; 5,0	3,8**	1,5 ; 6,5	3,1**	1,3 ; 5,4
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	4,6*	2,8 ; 6,6	3,8**	1,4 ; 6,7	5,2*	2,7 ; 7,9
Rarement	5,1	5,5	4,9	4,6*	2,8 ; 6,5	6,2*	3,1 ; 9,7	3,4**	1,4 ; 5,8
Jamais	82,9	81,4	84,0	87,4	84,4 ; 90,2	86,1	81,4 ; 90,4	88,3	84,3 ; 92,0
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,820					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	1,3**	0,4 ; 2,5	x	;	1,3**	0,2 ; 2,7
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	5,6*	3,6 ; 7,7	x	;	6,5*	3,7 ; 9,7
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,0*	2,3 ; 5,9	3,5**	1,2 ; 6,3	4,3**	1,9 ; 7,0
Jamais	86,5	87,5	85,7	89,1	86,4 ; 91,8	90,8	86,7 ; 94,9	87,9	84,0 ; 91,5
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	1,2**	0,3 ; 2,3	x	;	1,3**	0,1 ; 2,8
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,2	96,9 ; 99,3	98,9	97,2 ; 100,0	97,7	95,8 ; 99,3
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,1	98,1 ; 99,9	98,8	97,1 ; 100,0	99,2	97,7 ; 100,0
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	0,6**	0,0 ; 1,3	x	;	0,9**	0,0 ; 2,1
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	0,9**	0,1 ; 1,9	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	0,7**	0,1 ; 1,4	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	97,8	96,5 ; 98,9	98,3	96,4 ; 99,9	97,4	95,6 ; 99,0
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,2	98,3 ; 99,9	99,3	98,0 ; 100,0	99,1	97,7 ; 100,0
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,1**	0,2 ; 2,1	x	;	1,2**	0,1 ; 2,5
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,7	96,4 ; 99,0	98,8	96,9 ; 100,0	97,0	94,9 ; 98,7



Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	99,1	98,1 ; 99,9	99,1	96,9 ; 100,0	99,1	98,0 ; 100,0
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,5	98,6 ; 100,0	99,6	98,4 ; 100,0	99,4	97,9 ; 100,0
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,9	99,7 ; 100,0	x	;	99,9	99,4 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
3,6*	2,1 ; 5,3	35,7	31,4 ; 40,0	43,4	39,0 ; 47,9	17,4	14,0 ; 20,8	Ensemble de la population	
P = 0,131									
5,6**	2,7 ; 9,0	38,2	30,8 ; 45,2	41,1	34,2 ; 48,5	15,1*	10,2 ; 20,2	Sexe	
2,2**	0,7 ; 3,9	33,9	28,6 ; 39,5	44,9	39,3 ; 50,6	19,0	14,5 ; 23,6	Hommes	
								Femmes	
P = 0,423									
x	;	35,3*	18,9 ; 51,7	48,3*	31,5 ; 64,9	x	;	Groupe d'âge	
x	;	26,6*	18,3 ; 34,8	48,7	40,0 ; 57,5	x	;	15-24 ans	
3,8**	1,5 ; 6,5	40,6	34,3 ; 46,7	40,5	34,6 ; 47,1	15,1*	10,7 ; 19,9	25-44 ans	
9,4**	3,5 ; 16,0	37,6	28,0 ; 48,0	37,9	27,6 ; 48,4	15,1*	7,6 ; 22,9	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,957									
x	;	44,4**	13,2 ; 71,9	47,4**	20,2 ; 77,4	x	;	Hommes	
x	;	35,6*	19,7 ; 51,8	43,6*	27,8 ; 60,4	x	;	15-24 ans	
4,7**	0,9 ; 9,7	40,5	30,8 ; 50,1	38,8	29,4 ; 48,9	15,9*	8,7 ; 23,4	25-44 ans	
14,5**	3,8 ; 28,1	30,8*	15,3 ; 46,6	40,8*	24,2 ; 58,3	13,9**	2,7 ; 27,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,715									
x	;	30,8**	11,5 ; 51,9	48,8*	27,1 ; 70,9	x	;	Femmes	
x	;	21,3*	12,2 ; 30,8	51,8	41,1 ; 62,6	x	;	15-24 ans	
3,1**	0,6 ; 6,3	40,6	32,5 ; 48,5	41,9	33,9 ; 50,4	14,4*	8,7 ; 20,5	25-44 ans	
x	;	43,1*	30,3 ; 57,2	35,6*	23,1 ; 48,8	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,204									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
2,1**	0,3 ; 4,4	38,0	29,9 ; 45,9	44,3	36,1 ; 52,6	15,6*	10,0 ; 22,0	Poids insuffisant	
5,0**	2,2 ; 8,2	30,7	24,3 ; 37,3	41,0	34,1 ; 47,5	23,3	17,4 ; 29,4	Poids normal	
3,6**	0,7 ; 7,4	38,9	30,4 ; 47,7	46,5	37,7 ; 55,8	11,0**	5,8 ; 16,9	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,835									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	48,3*	30,6 ; 65,7	31,1*	16,7 ; 48,0	17,4**	6,4 ; 29,7	Poids insuffisant	
7,0**	2,4 ; 12,3	31,2	22,6 ; 39,5	41,5	31,6 ; 51,6	20,3*	12,5 ; 28,8	Poids normal	
x	;	43,1*	28,3 ; 57,2	47,5	33,7 ; 62,4	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,817									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
x	;	34,2	25,1 ; 43,6	49,1	39,3 ; 59,0	x	;	Poids insuffisant	
x	;	30,2	21,4 ; 39,8	40,4	31,0 ; 50,4	x	;	Poids normal	
x	;	35,5*	25,0 ; 46,9	45,6	34,0 ; 57,0	x	;	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>									
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	50,3	45,9 ; 54,6	48,7	41,7 ; 55,7	51,5	46,0 ; 56,9
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	33,9	29,9 ; 37,9	33,8	27,1 ; 40,5	33,9	28,5 ; 39,3
Non	14,4	15,3	13,7	15,8	12,8 ; 18,8	17,5	12,3 ; 22,9	14,6	11,0 ; 18,4
		P = 0,018					P = 0,646		
<b>Diminuer les portions</b>									
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	44,7	40,4 ; 49,3	40,6	33,8 ; 47,8	47,5	41,9 ; 53,6
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	35,5	31,5 ; 39,7	34,9	28,3 ; 41,6	35,9	30,3 ; 41,3
Non	19,6	22,6	17,4	19,8	16,2 ; 23,4	24,4	18,2 ; 30,8	16,5	12,3 ; 20,9
		P = 0,000					P = 0,082		
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>									
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	43,6	39,3 ; 47,7	35,3	28,5 ; 42,5	49,4	43,8 ; 54,8
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	25,4	21,7 ; 29,4	24,3	18,7 ; 30,7	26,2	21,1 ; 31,4
Non	27,7	32,4	24,3	31,0	26,9 ; 35,0	40,4	32,8 ; 47,1	24,4	20,0 ; 29,2
		P = 0,000					P = 0,000		
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>									
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	43,8	39,3 ; 48,2	41,8	34,6 ; 49,0	45,2	39,4 ; 51,0
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	30,1	26,0 ; 34,3	30,9	24,6 ; 37,8	29,5	24,5 ; 34,9
Non	26,1	27,4	25,1	26,1	22,4 ; 29,9	27,3	21,0 ; 33,6	25,3	20,7 ; 29,9
		P = 0,014					P = 0,731		
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>									
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	67,9	63,9 ; 72,0	62,3	55,3 ; 69,2	71,9	66,8 ; 76,7
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	18,3	15,0 ; 21,7	22,0	16,2 ; 28,2	15,7	11,7 ; 20,1
Non	17,4	18,5	16,6	13,8	10,8 ; 16,9	15,7*	10,7 ; 21,4	12,4	8,9 ; 16,1
		P = 0,000					P = 0,078		
<b>Manger des aliments moins gras</b>									
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	62,4	58,0 ; 66,6	54,9	47,7 ; 62,2	67,6	62,3 ; 73,0
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	26,6	22,7 ; 30,6	33,8	27,3 ; 40,9	21,6	17,0 ; 26,4
Non	12,6	14,0	11,6	11,0	8,3 ; 13,7	11,3*	7,0 ; 16,1	10,8*	7,5 ; 14,3
		P = 0,000					P = 0,006		
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>									
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	52,0	47,6 ; 56,4	48,2	41,3 ; 55,3	54,7	49,0 ; 60,2
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	31,7	27,7 ; 36,0	34,1	27,6 ; 40,8	30,1	25,0 ; 35,4
Non	21,5	24,4	19,4	16,2	13,2 ; 19,4	17,8*	12,4 ; 23,4	15,2	11,3 ; 19,3
		P = 0,000					P = 0,373		
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>									
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	12,2	9,4 ; 15,2	14,2*	9,8 ; 19,5	10,7*	7,5 ; 14,4
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	14,3	11,2 ; 17,4	15,4*	10,2 ; 20,7	13,5	9,8 ; 17,4
Non	72,0	67,3	75,4	73,6	69,6 ; 77,4	70,4	63,8 ; 76,9	75,8	70,8 ; 80,5
		P = 0,000					P = 0,398		
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>									
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	33,4	29,6 ; 37,9	32,9	26,3 ; 39,9	33,8	28,5 ; 39,3
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	18,4	15,0 ; 21,9	25,5	19,5 ; 32,1	13,4	9,7 ; 17,2
Non	49,9	43,2	54,7	48,2	43,7 ; 52,7	41,6	34,9 ; 48,9	52,8	47,4 ; 58,3
		P = 0,000					P = 0,002		

Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,002				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	55,8	51,5 ; 60,3	52,7	45,3 ; 59,8	58,0	52,3 ; 63,5	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	16,2	12,8 ; 19,7	23,5	17,4 ; 29,9	11,1*	7,3 ; 14,8	
Non	29,6	28,8	30,2	28,0	24,2 ; 31,8	23,9	18,0 ; 30,0	30,9	25,8 ; 36,2	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	33,2	29,2 ; 37,4	23,4	17,9 ; 29,4	40,1	34,5 ; 45,8	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	15,7	12,4 ; 18,9	19,7	13,9 ; 25,7	12,9*	9,0 ; 16,8	
Non	48,5	52,0	45,9	51,0	46,6 ; 55,3	56,8	49,8 ; 63,7	47,0	41,7 ; 52,6	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,006				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	32,2	28,2 ; 36,2	32,2	25,8 ; 38,7	32,2	27,0 ; 37,5	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	24,8	20,9 ; 28,7	31,7	25,2 ; 38,1	20,0	15,4 ; 25,0	
Non	37,5	34,7	39,5	43,0	38,9 ; 47,1	36,1	29,7 ; 42,9	47,8	42,3 ; 53,4	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
59,1	56,7 ; 61,4	31,4	29,1 ; 33,6	9,5	8,0 ; 11,2	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
52,2	48,5 ; 55,8	34,8	31,3 ; 38,4	13,0	10,6 ; 15,6	Hommes
65,7	62,6 ; 68,7	28,1	25,1 ; 31,0	6,2	4,4 ; 8,1	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
63,3	50,2 ; 75,7	8,7**	1,9 ; 17,1	28,1*	16,6 ; 40,5	15-17 ans
33,3*	23,2 ; 43,2	35,8	26,6 ; 45,8	30,9	21,8 ; 40,4	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
45,8	37,8 ; 53,8	24,5	18,1 ; 31,4	29,7	22,7 ; 37,1	25-44 ans
40,4	35,5 ; 45,5	47,8	42,6 ; 52,7	11,8	8,8 ; 15,4	45-64 ans
64,6	61,0 ; 67,9	31,9	28,7 ; 35,5	3,5*	2,2 ; 5,0	65 ans et plus
92,4	89,4 ; 95,1	x	;	x	;	
		P = 0,003				Hommes
69,1	52,2 ; 84,1	x	;	x	;	15-17 ans
25,0**	13,3 ; 38,6	31,8*	19,5 ; 45,1	43,2*	29,5 ; 57,4	18-24 ans
		P = 0,001				15-24 ans
45,1	34,1 ; 55,6	17,7*	10,4 ; 26,1	37,2	27,3 ; 47,5	25-44 ans
36,1	28,9 ; 43,7	47,8	40,0 ; 55,2	16,1*	10,7 ; 22,1	45-64 ans
54,3	48,9 ; 59,7	40,4	35,1 ; 45,9	5,3*	3,0 ; 8,0	65 ans et plus
88,3	82,7 ; 93,6	x	;	x	;	
		P = 0,002				Femmes
56,0*	34,7 ; 77,8	18,4**	2,8 ; 37,1	25,6**	7,4 ; 45,7	15-17 ans
40,7*	26,0 ; 55,8	39,5*	25,1 ; 54,8	19,8**	7,9 ; 33,2	18-24 ans
		P = 0,002				15-24 ans
46,5	34,4 ; 58,7	31,5*	20,5 ; 43,0	22,0*	12,0 ; 32,9	25-44 ans
44,8	38,5 ; 51,4	47,7	40,9 ; 54,0	7,5*	4,3 ; 11,1	45-64 ans
74,5	69,9 ; 78,8	23,8	19,7 ; 28,1	1,7**	0,4 ; 3,2	65 ans et plus
95,6	92,4 ; 98,3	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	39,1	36,9 ; 41,4	45,6	42,3 ; 49,2	32,8	29,8 ; 35,9
Non	56,1	49,9	62,1	60,9	58,6 ; 63,1	54,4	50,8 ; 57,7	67,2	64,1 ; 70,2
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	8,3	7,0 ; 9,8	11,8	9,3 ; 14,5	5,0	3,8 ; 6,5
Non	89,4	85,6	93,2	91,7	90,2 ; 93,0	88,2	85,5 ; 90,7	95,0	93,5 ; 96,2
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Oui	7,3	9,1	5,5	4,6	3,4 ; 5,8	6,6*	4,5 ; 8,7	2,6*	1,5 ; 3,8
Non	92,7	90,9	94,5	95,4	94,2 ; 96,6	93,4	91,3 ; 95,5	97,4	96,2 ; 98,5
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,803					
Oui	5,1	6,3	3,9	3,0*	2,0 ; 4,0	3,1*	1,7 ; 4,8	2,9*	1,7 ; 4,3
Non	94,9	93,7	96,1	97,0	96,0 ; 98,0	96,9	95,2 ; 98,3	97,1	95,7 ; 98,3
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Oui	12,3	16,1	8,7	9,5	8,0 ; 11,1	12,0	9,7 ; 14,6	7,1	5,4 ; 9,0
Non	87,7	83,9	91,3	90,5	88,9 ; 92,0	88,0	85,4 ; 90,3	92,9	91,0 ; 94,6
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = 0,469					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	x	;	x	;	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	x	;	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,071					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	x	;	x	;	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	x	;	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,063					
Oui	0,8	1,2	0,3*	x	;	x	;	x	;
Non	99,2	98,8	99,7	x	;	x	;	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,155					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,3*	0,7 ; 2,0	1,7**	0,7 ; 3,1	0,8**	0,3 ; 1,5
Non	98,2	98,1	98,4	98,7	98,0 ; 99,3	98,3	96,9 ; 99,3	99,2	98,5 ; 99,7
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,041					
Oui	1,6	2,3	0,9	1,2**	0,6 ; 1,9	1,9**	0,7 ; 3,3	0,5**	0,1 ; 1,0
Non	98,4	97,7	99,1	98,8	98,1 ; 99,4	98,1	96,7 ; 99,3	99,5	99,0 ; 99,9
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,992					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,3**	0,1 ; 0,6	x	;	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,7	99,4 ; 99,9	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,2	16,2	8,3	8,9	7,4 ; 10,4	12,1	9,7 ; 14,5	5,8	4,1 ; 7,7
Non	87,8	83,8	91,7	91,1	89,6 ; 92,6	87,9	85,5 ; 90,3	94,2	92,3 ; 95,9
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	1,6	2,3	0,8	1,4*	0,7 ; 2,2	2,7**	1,3 ; 4,3	x	;
Non	98,4	97,7	99,2	98,6	97,8 ; 99,3	97,3	95,7 ; 98,7	x	;
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,031			
Oui	1,8	2,4	1,3	1,2**	0,6 ; 1,9	2,0**	0,8 ; 3,3	x	;
Non	98,2	97,6	98,7	98,8	98,1 ; 99,4	98,0	96,7 ; 99,2	x	;
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,383			
Oui	1,4	1,7	1,0	1,2*	0,6 ; 1,8	1,5**	0,6 ; 2,5	0,9**	0,2 ; 1,8
Non	98,6	98,3	99,0	98,8	98,2 ; 99,4	98,5	97,5 ; 99,4	99,1	98,2 ; 99,8
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,003			
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,9**	0,4 ; 1,5	1,7**	0,7 ; 2,7	x	;
Non	99,2	98,8	99,6	99,1	98,5 ; 99,6	98,3	97,3 ; 99,3	x	;
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 'n.d.'			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = .			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,293			
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	x	;	x	;	x	;
Non	99,6	99,6	99,7	x	;	x	;	x	;
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = 'n.d.'			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	9,5	8,0 ; 11,2	13,0	10,6 ; 15,6	6,2	4,4 ; 8,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	28,1*	16,6 ; 40,5	30,0**	15,2 ; 47,1	25,6**	7,4 ; 45,7
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	30,9	21,8 ; 40,4	43,2*	29,5 ; 57,4	19,8**	7,9 ; 33,2
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	11,8	8,8 ; 15,4	16,1*	10,7 ; 22,1	7,5*	4,3 ; 11,1
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	3,5*	2,2 ; 5,0	5,3*	3,0 ; 8,0	1,7**	0,4 ; 3,2
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	26,9	24,8 ; 29,1	6,5	5,3 ; 7,9	7,5	6,0 ; 9,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	29,9	26,5 ; 33,1	8,1	6,0 ; 10,3	9,9	7,4 ; 12,4
Femmes	25,4	6,8	7,4	24,1	21,1 ; 27,0	5,0	3,6 ; 6,7	5,2*	3,7 ; 6,8
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,045					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	26,3*	15,3 ; 38,7	x	;	8,9**	1,1 ; 17,8
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	41,3	31,5 ; 51,7	8,2**	2,5 ; 14,4	17,3*	9,9 ; 25,2
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	35,0	27,3 ; 43,0	5,4**	2,0 ; 9,3	13,8*	8,4 ; 19,6
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	33,0	28,4 ; 37,8	13,7	10,2 ; 17,3	12,9	9,5 ; 16,3
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	27,2	24,1 ; 30,4	4,2*	2,8 ; 5,8	3,9*	2,5 ; 5,5
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	6,7*	4,1 ; 9,6	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,348					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	19,8**	7,3 ; 35,1	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	42,5*	29,0 ; 56,7	x	;	27,9*	15,8 ; 40,7
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	32,1*	22,7 ; 42,5	x	;	19,0*	11,0 ; 27,8
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	31,9	25,4 ; 39,1	17,4*	11,3 ; 23,5	14,6*	9,1 ; 20,6
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	34,0	28,8 ; 39,4	5,7*	3,3 ; 8,5	5,9*	3,4 ; 8,9
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	10,9*	5,8 ; 16,3	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,287					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	34,4**	14,7 ; 56,1	x	;	x	;
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	40,2*	25,3 ; 54,6	11,4**	1,7 ; 21,9	7,7**	0,8 ; 16,5
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	38,0	26,3 ; 49,3	7,1**	1,0 ; 14,2	8,4**	1,8 ; 16,2
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	34,2	28,0 ; 40,7	10,0*	6,6 ; 13,9	11,0*	7,1 ; 15,1
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	20,7	16,8 ; 24,9	2,8**	1,3 ; 4,5	2,0**	0,6 ; 3,5
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	3,5**	1,1 ; 6,3	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	77,3	75,4 ; 79,2	81,0	78,2 ; 83,6	73,9	71,2 ; 76,4
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	45,4	32,0 ; 58,1	45,1*	27,6 ; 63,4	45,8*	23,1 ; 66,9
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	86,9	79,3 ; 93,4	82,9	71,1 ; 93,1	90,5	80,1 ; 98,7
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	69,9	62,4 ; 76,8	66,3	55,9 ; 76,2	73,6	62,2 ; 84,2
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	94,0	91,7 ; 95,9	95,4	92,4 ; 97,9	92,5	89,0 ; 95,5
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	81,0	78,3 ; 83,7	82,8	78,4 ; 86,6	79,3	75,4 ; 82,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	62,8	58,5 ; 66,7	71,1	65,2 ; 76,9	54,4	48,4 ; 60,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	78,8	74,7 ; 82,8	80,5	74,4 ; 85,8	77,0	71,1 ; 82,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	87,5	84,2 ; 90,4	89,5	84,8 ; 93,6	85,7	81,2 ; 89,7
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	87,8	84,3 ; 91,2	89,6	84,2 ; 94,4	86,4	81,4 ; 90,9
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	92,9	91,3 ; 94,3	90,0	87,3 ; 92,5	95,9	94,2 ; 97,4
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	6,0	4,6 ; 7,3	8,3	6,0 ; 10,7	3,5*	2,1 ; 5,1
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,2**	0,5 ; 1,9	1,7**	0,6 ; 3,1	0,6**	0,0 ; 1,4
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	49,0	47,7 ; 50,4	1,4**	0,5 ; 2,6	99,0	98,2 ; 99,7
Femmes	51,5	97,5	0,8	50,7	49,3 ; 52,0	98,4	97,2 ; 99,3	0,5**	0,0 ; 1,1
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,3**	0,0 ; 0,7	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	92,9	91,3 ; 94,3	6,0	4,6 ; 7,3	1,2**	0,5 ; 1,9
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,017					
Hommes	86,4	10,7	2,9	90,0	87,3 ; 92,5	8,3	6,0 ; 10,7	1,7**	0,6 ; 3,1
Femmes	91,6	7,4	0,9*	95,9	94,2 ; 97,4	3,5*	2,1 ; 5,1	0,6**	0,0 ; 1,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,366					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	84,5	68,0 ; 98,1	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	73,9	63,9 ; 82,5	21,2*	13,3 ; 30,3	4,9**	0,7 ; 10,0
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	76,7	68,7 ; 84,0	18,3*	11,8 ; 25,5	5,0**	1,1 ; 10,0
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	92,6	89,7 ; 95,3	6,2*	3,7 ; 9,0	1,2**	0,1 ; 2,6
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	97,1	95,7 ; 98,3	x	;	x	;
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	97,6	94,8 ; 99,9	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,518					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	58,8**	13,0 ; 92,2	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	90,6	88,0 ; 93,2	7,7	5,5 ; 10,1	1,6**	0,5 ; 3,0
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,678					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	96,3	94,7 ; 97,7	x	;	x	;
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	47,5	43,4 ; 51,3	67,3	62,4 ; 71,9
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000		...	
15-24 ans	87,9	...	93,1	85,2 ; 99,8	...	;
25-44 ans	62,4	...	64,3	56,5 ; 71,7	...	;
45-64 ans	29,9	...	30,2	24,5 ; 35,8	...	;
65 ans et plus	7,3	...	6,2**	1,5 ; 12,2	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...		P = 0,000	
15-24 ans	...	90,0	...	;	89,5	80,6 ; 96,8
25-34 ans	...	71,0	...	;	71,1	61,7 ; 80,1
35-49 ans	...	53,5	...	;	54,2	47,0 ; 61,3
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,001		P = 0,285	
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	36,6	29,2 ; 44,3	67,7	53,5 ; 80,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	55,0	47,1 ; 63,0	62,0	50,2 ; 73,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	54,9	47,1 ; 62,7	64,3	55,6 ; 73,1
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	41,3	31,1 ; 51,9	74,9	65,3 ; 83,8
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,085	
Un partenaire	43,8	64,2	44,7	40,4 ; 48,7	66,8	61,7 ; 71,6
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	72,3	56,4 ; 86,2	83,5	65,4 ; 98,2
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	85,5*	47,6 ; 100,0	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = .		P = 0,214	
Hommes	x	66,6	x	;	67,5	62,7 ; 72,2
Femmes	47,8	x	47,6	43,5 ; 51,4	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	12,2	10,3 ; 14,1	12,1	10,1 ; 14,0	75,7	73,4 ; 78,0
Sexe	P = 0,093			P = 0,305					
Hommes	14,8	14,9	70,3	13,6	10,7 ; 16,7	12,1	9,3 ; 15,0	74,3	70,8 ; 77,6
Femmes	13,2	14,7	72,1	10,6	8,0 ; 13,3	12,1	9,5 ; 14,9	77,2	74,2 ; 80,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	65,1	45,7 ; 84,9	x	;	x	;
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	35,8	25,2 ; 46,4	36,2	25,5 ; 46,9	28,0*	18,2 ; 38,4
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	43,7	34,1 ; 53,4	32,9	23,9 ; 42,1	23,4*	15,7 ; 31,9
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	11,3	8,1 ; 14,5	17,5	13,3 ; 21,8	71,2	66,6 ; 75,9
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	5,3*	3,5 ; 7,2	3,4*	2,1 ; 4,9	91,2	89,0 ; 93,5
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	x	;	x	;	96,8	93,5 ; 99,4
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,004					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	12,2*	8,1 ; 16,3	7,3*	4,0 ; 10,8	80,5	75,8 ; 85,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	16,0*	11,4 ; 21,0	11,7*	7,5 ; 16,1	72,2	66,9 ; 77,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	11,9	8,5 ; 15,6	17,2	12,9 ; 21,7	70,9	65,9 ; 76,0
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	7,3*	4,0 ; 11,1	11,1*	7,0 ; 15,6	81,6	76,1 ; 87,0
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,160					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	9,6	7,8 ; 11,5	10,4	8,5 ; 12,3	80,0	77,5 ; 82,3
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	43,0	30,6 ; 55,9	35,9*	23,5 ; 48,3	21,2*	11,8 ; 32,0
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	59,6*	24,7 ; 89,4	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	15,9	13,7 ; 18,0	16,6	13,7 ; 19,7	15,1	12,1 ; 18,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	76,8	58,4 ; 93,5	69,3*	42,1 ; 95,9	85,6	56,2 ; 100,0
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	51,9	40,5 ; 62,5	60,5	44,5 ; 74,6	44,5*	28,2 ; 60,9
	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	53,6	58,8	48,5	58,6	48,3 ; 67,6	63,1	50,1 ; 75,1	54,4	39,9 ; 68,5
25-44 ans	21,0	22,1	19,8	14,7	11,0 ; 18,4	15,3*	9,9 ; 21,2	14,0*	9,6 ; 18,9
45-64 ans	8,3	8,9	7,7	6,5*	4,5 ; 8,5	7,2*	4,3 ; 10,4	5,8*	3,2 ; 8,6
65 ans et plus	3,1*	3,9*	1,8**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,102		P = 0,373		P = 0,338	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	15,1	10,8 ; 19,6	14,9*	9,3 ; 21,1	15,3*	8,4 ; 22,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	18,9	13,9 ; 23,9	20,9*	14,2 ; 28,0	16,6*	9,7 ; 24,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	17,3	13,1 ; 21,7	17,0*	10,9 ; 23,7	17,6*	12,1 ; 23,8
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	10,5*	6,4 ; 14,9	11,8**	5,0 ; 19,9	9,4**	4,5 ; 15,0
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	12,8	10,7 ; 14,9	12,1	9,3 ; 15,2	13,6	10,6 ; 16,7
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	51,2	38,5 ; 64,4	53,4	37,4 ; 69,0	45,7*	24,1 ; 69,5
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	76,9*	45,5 ; 100,0	78,3*	38,8 ; 100,0	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,448		P = 0,993		P = 0,074	
Hommes	18,7	54,0	17,9	14,9	12,0 ; 17,9	x	;	14,9	12,0 ; 17,9
Femmes	19,2	19,2	x	16,6	13,6 ; 19,8	16,6	13,6 ; 19,8	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	6,8	5,5 ; 8,0	5,4*	3,6 ; 7,2	8,1	6,3 ; 10,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,047		P = 0,007	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	x	;	x	;	x	;
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,025		P = 0,005	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	3,4**	0,4 ; 7,4	x	;	x	;
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	10,6	7,7 ; 13,6	7,4**	3,5 ; 12,0	13,9*	9,7 ; 18,3
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	7,2	5,4 ; 9,2	6,6*	3,8 ; 9,6	7,9*	5,3 ; 10,7
	2,7	3,2*	2,2	1,2**	0,2 ; 2,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,096		P = 0,226		P = 0,396	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	5,0*	3,0 ; 7,0	3,7**	0,9 ; 6,8	6,3*	3,3 ; 9,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	6,2*	3,9 ; 8,8	3,8**	1,3 ; 6,8	8,9*	5,0 ; 13,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	7,4*	4,7 ; 10,2	7,2**	2,9 ; 12,0	7,6*	4,4 ; 11,0
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	9,9*	6,5 ; 13,4	8,4**	4,0 ; 13,6	11,1*	5,9 ; 16,2
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,459		P = 0,676		P = 0,223	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	7,1	5,6 ; 8,7	6,0*	3,8 ; 8,3	8,2	6,0 ; 10,5
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	10,4**	3,8 ; 18,3	7,6**	0,6 ; 16,8	17,5**	3,0 ; 35,6
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	x	;	x	;	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,046		P = 0,052		P = 0,040	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	8,7	6,5 ; 10,9	x	;	8,5	6,3 ; 10,7
Femmes	7,0	7,0	8,9**	5,8*	3,8 ; 8,0	5,8*	3,8 ; 8,0	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,028		P = 0,000		P = .	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	x	;	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	6,7	5,4 ; 8,1	5,2*	3,4 ; 7,1	8,2	6,3 ; 10,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%		%	
			Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)	
Ensemble de la population	23,5	76,5	28,8*	19,5 ; 38,7	71,2	61,3 ; 80,5
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,025			
15-35 ans	25,6	74,4	32,8*	22,1 ; 43,9	67,2	56,1 ; 77,9
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,070			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	50,9**	21,4 ; 77,1	49,1**	22,9 ; 78,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	31,1**	10,6 ; 53,8	68,9	46,2 ; 89,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	34,8*	17,7 ; 53,4	65,2	46,6 ; 82,3
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	x	;	x	;
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	29,0*	19,5 ; 38,9	71,0	61,1 ; 80,5
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%		%		%	
				Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)	
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	74,1	70,9 ; 77,3	15,1	12,8 ; 17,6	10,9	8,5 ; 13,4
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	73,3	59,1 ; 87,3	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	87,1	82,9 ; 91,2	5,1**	2,6 ; 8,2	7,8*	4,5 ; 11,4
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	66,5	62,3 ; 70,5	23,9	20,1 ; 28,0	9,6	6,9 ; 12,3
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	62,0	55,1 ; 69,5	23,8	17,6 ; 30,0	14,2*	9,0 ; 19,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	70,3	63,3 ; 77,3	15,3*	10,1 ; 20,8	14,4*	8,8 ; 20,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	79,3	73,8 ; 84,7	13,1*	8,9 ; 17,7	7,6**	3,9 ; 11,8
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	83,6	77,7 ; 89,1	8,4*	4,6 ; 12,4	8,0**	4,0 ; 12,6
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,150					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	74,0	70,8 ; 77,2	15,3	12,9 ; 17,8	10,7	8,4 ; 13,3
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	66,2**	13,6 ; 100,0	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 02

# SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

---



## 1

## CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes	Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
Ensemble de la population		49,4	50,6			50,2	50,2 ; 50,2	49,8	49,8 ; 49,8
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	15,5	15,5 ; 15,5	16,0	16,0 ; 16,1	15,0	14,9 ; 15,0
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	28,6	28,6 ; 28,7	29,6	29,5 ; 29,6	27,7	27,7 ; 27,7
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	38,7	38,7 ; 38,8	39,1	39,1 ; 39,1	38,4	38,3 ; 38,4
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	17,1	17,1 ; 17,1	15,3	15,3 ; 15,3	18,9	18,9 ; 19,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	13,4	10,7	16,0	12,0	11,2 ; 13,0	8,9	7,9 ; 10,1	15,1	13,9 ; 16,6
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	33,1	31,6 ; 34,6	34,0	32,0 ; 36,1	32,2	30,1 ; 34,4
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	43,5	41,6 ; 45,1	47,2	44,5 ; 49,7	39,8	37,3 ; 41,9
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	6,9	5,9 ; 8,1	5,3	3,8 ; 7,0	8,6	7,2 ; 10,1
Autre	6,7	6,5	6,9	4,5	3,5 ; 5,5	4,6*	3,2 ; 6,1	4,3	3,2 ; 5,6
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,256			P = 'n.d.'					
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	99,2	98,8 ; 99,6	99,4	99,0 ; 99,8	99,0	98,3 ; 99,6
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	x	;	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,912			P = 0,801					
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	99,6	99,4 ; 99,9	99,7	99,4 ; 99,9	99,6	99,2 ; 99,9
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	0,2**	0,1 ; 0,4	x	;	x	;
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	0,2**	0,0 ; 0,4	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,683			P = 0,530					
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	29,4	27,7 ; 31,1	29,2	26,7 ; 31,6	29,6	27,5 ; 31,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	28,2	26,4 ; 30,0	29,0	26,5 ; 31,8	27,4	24,9 ; 29,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	27,1	25,5 ; 28,8	27,5	25,0 ; 30,0	26,8	24,5 ; 29,0
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	15,3	14,0 ; 16,6	14,4	12,4 ; 16,4	16,2	14,4 ; 18,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	17,6	16,2 ; 19,1	13,8	11,6 ; 16,0	21,5	19,6 ; 23,7
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	21,4	19,8 ; 23,0	20,5	18,0 ; 22,7	22,4	20,1 ; 24,7
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	21,0	19,4 ; 22,6	22,1	19,6 ; 24,7	19,8	17,7 ; 21,8
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	18,6	17,0 ; 20,2	19,1	16,9 ; 21,6	18,0	15,8 ; 20,1
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	21,4	19,8 ; 23,1	24,5	21,9 ; 27,1	18,4	16,4 ; 20,4
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	34,8	32,9 ; 36,7	40,8	37,7 ; 43,7	28,7	26,4 ; 31,3
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	55,8	53,8 ; 57,7	50,1	47,2 ; 53,0	61,6	58,9 ; 64,0
Pauvre	9,4	8,9	9,9	7,8	6,8 ; 8,8	7,8	6,2 ; 9,5	7,7	6,6 ; 9,0
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,7	1,2 ; 2,2	1,4*	0,8 ; 2,1	2,0*	1,3 ; 2,7
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	54,7	53,3 ; 56,1	62,7	60,6 ; 64,8	46,7	44,8 ; 48,6
Étudiants	13,1	13,0	13,2	13,5	12,5 ; 14,4	13,1	11,5 ; 14,7	13,9	12,8 ; 14,9
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	9,4	8,5 ; 10,5	3,2*	2,2 ; 4,4	15,7	14,0 ; 17,5
Retraités	19,6	18,0	21,1	22,3	21,5 ; 23,2	21,0	19,8 ; 22,2	23,7	22,5 ; 25,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	57,6	55,7 ; 59,5	33,1	31,2 ; 34,9	9,4	8,3 ; 10,4
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,260					
Hommes	56,6	33,5	9,9	58,5	55,6 ; 61,4	33,0	30,3 ; 35,8	8,5	7,0 ; 10,0
Femmes	55,5	32,8	11,7	56,6	54,0 ; 59,1	33,1	30,8 ; 35,5	10,3	8,8 ; 11,8
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	61,8	55,1 ; 67,8	33,6	27,7 ; 39,7	4,6**	2,0 ; 7,6
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	68,7	65,3 ; 72,2	26,8	23,5 ; 30,1	4,5*	2,9 ; 6,3
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	55,0	52,2 ; 57,9	35,0	32,3 ; 37,7	10,0	8,2 ; 11,7
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	39,8	36,1 ; 43,6	39,2	35,3 ; 43,0	21,1	18,0 ; 24,3
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	45,5	41,9 ; 49,1	35,5	31,8 ; 39,0	19,1	16,2 ; 22,0
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	52,9	50,0 ; 55,8	36,3	33,3 ; 39,1	10,8	9,1 ; 12,7
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	65,9	62,7 ; 69,3	29,4	26,3 ; 32,6	4,6	3,3 ; 6,1
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	54,6	46,4 ; 62,9	31,7	24,0 ; 39,2	13,7*	7,6 ; 20,4
Autre	46,0	39,4	14,6	47,5	35,4 ; 59,4	41,6	30,2 ; 53,9	10,9**	4,7 ; 17,9
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	45,8	41,9 ; 49,5	38,1	34,6 ; 41,8	16,1	13,7 ; 18,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	55,8	52,2 ; 59,5	34,8	31,3 ; 38,5	9,4	7,2 ; 11,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	64,8	61,3 ; 68,4	30,0	26,5 ; 33,6	5,3	3,9 ; 6,8
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	70,2	65,6 ; 74,7	26,4	22,0 ; 30,8	3,4*	2,0 ; 5,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	43,3	38,5 ; 48,2	39,8	35,0 ; 44,5	16,9	14,0 ; 20,2
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	61,0	58,8 ; 63,2	31,6	29,5 ; 33,8	7,5	6,3 ; 8,6
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	35,8	30,1 ; 42,0	39,7	33,1 ; 46,0	24,5	20,1 ; 29,6
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	59,9	57,9 ; 61,9	32,4	30,5 ; 34,3	7,7	6,7 ; 8,8
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	64,9	62,4 ; 67,4	29,9	27,5 ; 32,2	5,2	4,1 ; 6,4
Étudiants	62,7	32,2	5,0	61,4	54,1 ; 68,0	33,2	26,8 ; 39,7	5,4**	2,4 ; 9,0
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	43,5	37,4 ; 49,7	38,4	32,5 ; 44,4	18,1	13,4 ; 23,1
Retraités	40,2	39,5	20,4	43,1	39,5 ; 46,4	39,2	35,8 ; 42,8	17,8	15,1 ; 20,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	57,6	55,7 ; 59,5	33,1	31,2 ; 34,9	9,4	8,3 ; 10,4
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	49,6	45,3 ; 54,3	38,0	33,8 ; 42,4	12,4	9,6 ; 15,2
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	59,8	57,6 ; 61,8	31,7	29,7 ; 33,8	8,5	7,4 ; 9,6
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	49,7	36,4 ; 63,8	39,0*	24,5 ; 52,5	11,3**	4,8 ; 18,9
Poids normal	62,6	29,4	8,0	62,5	59,6 ; 65,4	29,1	26,4 ; 31,8	8,4	6,8 ; 10,2
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	52,8	50,2 ; 55,5	37,2	34,5 ; 39,8	10,0	8,6 ; 11,5
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	63,6	60,9 ; 66,3	29,3	26,9 ; 31,8	7,0	5,8 ; 8,4
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	53,2	50,0 ; 56,2	38,1	34,9 ; 41,2	8,8	7,2 ; 10,4
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	27,0	19,8 ; 34,6	32,2	24,2 ; 40,3	40,8	32,8 ; 49,0
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	34,4	29,9 ; 38,9	41,6	36,9 ; 46,3	24,0	20,3 ; 27,7
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	63,3	61,3 ; 65,5	31,0	29,1 ; 33,0	5,7	4,7 ; 6,6

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	54,5	52,6 ; 56,5	40,9	39,0 ; 42,8	4,6	3,9 ; 5,4
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,007		
Hommes	47,5	46,6	6,0	52,8	49,9 ; 55,7	43,4	40,4 ; 46,1	3,8	2,9 ; 4,9
Femmes	47,1	45,9	7,0	56,3	53,6 ; 58,9	38,3	35,7 ; 41,0	5,4	4,3 ; 6,6
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,000		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	64,9	58,5 ; 70,7	34,0	28,1 ; 40,4	1,2**	0,2 ; 2,3
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	50,4	46,9 ; 54,3	45,3	41,4 ; 48,9	4,3*	2,9 ; 5,9
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	51,4	48,5 ; 54,5	43,0	40,0 ; 45,9	5,5	4,2 ; 7,0
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	59,2	55,5 ; 63,1	34,4	30,6 ; 38,1	6,4*	4,6 ; 8,4
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	44,1	40,5 ; 47,8	46,6	42,8 ; 50,3	9,3	7,1 ; 11,7
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	56,6	53,4 ; 59,7	39,4	36,3 ; 42,5	4,0*	2,7 ; 5,5
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	57,1	53,7 ; 60,6	39,7	36,4 ; 42,9	3,2*	2,2 ; 4,4
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	44,1	35,6 ; 52,3	48,8	40,4 ; 57,3	7,1**	3,6 ; 11,4
Autre	44,5	46,1	9,4*	53,5	42,3 ; 65,8	40,0	27,9 ; 51,2	6,5**	2,2 ; 11,9
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,002		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	60,3	56,8 ; 63,8	34,1	30,8 ; 37,5	5,6	4,2 ; 7,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	52,7	48,6 ; 56,6	43,2	39,4 ; 47,1	4,1*	2,7 ; 5,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	52,2	48,6 ; 56,0	43,6	39,8 ; 47,2	4,3*	2,9 ; 5,7
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	51,1	46,1 ; 55,8	44,6	39,9 ; 49,5	4,4*	2,6 ; 6,4
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	46,0	41,5 ; 50,6	45,6	40,9 ; 50,1	8,4	6,2 ; 10,8
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	56,3	54,2 ; 58,6	39,9	37,7 ; 42,1	3,8	2,9 ; 4,6
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	35,1	29,4 ; 41,3	48,7	42,6 ; 54,6	16,3	12,0 ; 21,0
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	56,3	54,2 ; 58,5	40,3	38,2 ; 42,4	3,4	2,7 ; 4,1
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	51,8	49,2 ; 54,5	44,1	41,5 ; 46,7	4,1	3,1 ; 5,2
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	61,1	54,2 ; 67,9	37,5	30,7 ; 44,4	1,4**	0,3 ; 2,7
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	51,7	45,5 ; 57,6	38,3	32,1 ; 44,4	10,1*	6,8 ; 13,7
Retraités	51,9	42,8	5,3	58,7	55,2 ; 62,2	36,2	32,8 ; 39,6	5,1	3,7 ; 6,6
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	60,1	57,4 ; 62,7	37,7	35,2 ; 40,3	2,2*	1,5 ; 2,9
Bon	40,5	52,6	6,9	48,4	44,9 ; 52,1	47,1	43,4 ; 50,6	4,5	3,2 ; 5,9
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	41,3	35,1 ; 46,9	38,5	32,9 ; 44,6	20,2	15,8 ; 25,0
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	35,8	31,4 ; 40,2	49,9	45,2 ; 54,5	14,3	11,5 ; 17,4
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	58,5	56,4 ; 60,7	39,2	37,0 ; 41,4	2,3	1,7 ; 2,9
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	21,3	49,3	29,4	17,7*	9,4 ; 28,6	58,0	43,2 ; 70,6	24,3*	14,0 ; 36,3
Non	48,1	46,1	5,8	55,3	53,5 ; 57,4	40,7	38,7 ; 42,6	4,0	3,3 ; 4,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	18,3	16,9 ; 19,9	81,7	80,1 ; 83,1
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Hommes	18,2	81,8	14,7	12,8 ; 16,9	85,3	83,1 ; 87,2
Femmes	26,0	74,0	22,0	19,7 ; 24,1	78,0	75,9 ; 80,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,245			
15-24 ans	24,4	75,6	21,0	16,4 ; 26,3	79,0	73,7 ; 83,6
25-44 ans	24,3	75,7	16,6	13,9 ; 19,6	83,4	80,4 ; 86,1
45-64 ans	20,6	79,4	17,9	15,7 ; 20,2	82,1	79,8 ; 84,3
65 ans et plus	18,8	81,2	20,1	17,1 ; 23,3	79,9	76,7 ; 82,9
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Personne seule	25,7	74,3	24,5	21,3 ; 27,7	75,5	72,3 ; 78,7
Couple sans enfant	17,7	82,3	16,8	14,4 ; 19,1	83,2	80,9 ; 85,6
Couple avec enfants	20,8	79,2	16,9	14,4 ; 19,6	83,1	80,4 ; 85,6
Famille monoparentale	32,2	67,8	28,9	21,8 ; 36,0	71,1	64,0 ; 78,2
Autre	29,7	70,3	15,2*	8,4 ; 23,2	84,8	76,8 ; 91,6
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,021			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	21,0	18,3 ; 23,9	79,0	76,1 ; 81,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	19,3	16,1 ; 22,3	80,7	77,7 ; 83,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	16,8	14,1 ; 19,9	83,2	80,1 ; 85,9
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	13,9	10,5 ; 17,3	86,1	82,7 ; 89,5
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	29,0	24,9 ; 33,3	71,0	66,7 ; 75,1
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	16,1	14,4 ; 17,7	83,9	82,3 ; 85,6
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	38,1	32,3 ; 44,7	61,9	55,3 ; 67,7
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	16,3	14,7 ; 17,9	83,7	82,1 ; 85,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,020			
Travailleurs	20,9	79,1	16,4	14,6 ; 18,3	83,6	81,7 ; 85,4
Étudiants	24,8	75,2	19,7	14,9 ; 25,7	80,3	74,3 ; 85,1
Personnes sans emploi	37,9	62,1	24,6	19,4 ; 30,4	75,4	69,6 ; 80,6
Retraités	18,2	81,8	19,0	16,3 ; 22,0	81,0	78,0 ; 83,7
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	10,8	9,2 ; 12,6	89,2	87,4 ; 90,8
Bon	26,6	73,4	23,1	20,1 ; 26,1	76,9	73,9 ; 79,9
Passable ou mauvais	48,8	51,2	48,7	42,9 ; 54,7	51,3	45,3 ; 57,1
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	12,1	10,4 ; 13,9	87,9	86,1 ; 89,6
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	22,2	19,7 ; 24,7	77,8	75,3 ; 80,3
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	58,6	50,0 ; 66,8	41,4	33,2 ; 50,0
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	80,5	68,0 ; 90,5	19,5**	9,5 ; 32,0
Non	20,6	79,4	16,8	15,4 ; 18,3	83,2	81,7 ; 84,6
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	18,0	16,5 ; 19,6	82,0	80,4 ; 83,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,0	1,4 ; 2,5	1,8*	1,1 ; 2,6	2,2*	1,4 ; 2,9
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,004		P = 0,163		P = 0,036	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	0,6**	0,0 ; 1,4	x	;	1,2**	0,0 ; 2,9
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	3,1*	1,8 ; 4,7	2,6**	0,8 ; 4,9	3,6**	1,8 ; 5,8
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,2*	1,5 ; 3,1	2,2*	1,2 ; 3,4	2,3**	1,2 ; 3,5
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	0,5**	0,1 ; 1,0	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,013		P = 0,078		P = 0,233	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	4,2*	2,6 ; 6,0	7,0**	3,5 ; 10,9	2,5**	1,1 ; 4,1
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	1,4**	0,7 ; 2,3	1,4**	0,4 ; 2,6	1,5**	0,4 ; 2,8
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,2**	0,6 ; 1,9	0,6**	0,0 ; 1,2	1,9**	0,8 ; 3,3
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	4,1**	0,7 ; 8,6	x	;	3,1**	0,4 ; 6,6
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	5,2**	0,8 ; 10,9	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,959		P = 0,484		P = 0,877	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	2,2**	1,1 ; 3,5	2,7**	0,9 ; 5,0	1,6**	0,6 ; 2,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,0*	1,1 ; 2,9	1,5**	0,5 ; 2,7	2,4**	1,1 ; 4,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	1,8**	0,9 ; 2,9	1,3**	0,3 ; 2,6	2,3**	0,9 ; 4,1
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	1,9**	0,7 ; 3,4	1,3**	0,1 ; 3,1	2,4**	0,5 ; 4,8
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,006		P = 0,197		P = 0,027	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	3,5*	2,2 ; 5,1	3,0**	0,9 ; 5,7	3,9*	2,1 ; 6,0
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	1,6*	1,1 ; 2,3	1,5**	0,7 ; 2,4	1,8*	1,0 ; 2,6
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,002		P = 0,001	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	6,0*	3,6 ; 8,9	6,1**	2,4 ; 10,6	5,9**	2,7 ; 9,8
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,6*	1,0 ; 2,1	1,4**	0,7 ; 2,2	1,8*	1,1 ; 2,5
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,002		P = 0,000		P = 0,026	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,2*	1,5 ; 2,9	1,5*	0,8 ; 2,3	3,1*	1,7 ; 4,4
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	5,1**	2,2 ; 8,6	15,8**	2,3 ; 32,2	3,0**	1,0 ; 5,4
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	0,9**	0,3 ; 1,6	1,3**	0,2 ; 2,7	0,5**	0,1 ; 1,0
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,025	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,1*	;	0,9**	0,3 ; 1,7	1,3**	0,6 ; 2,2
Bon	2,5	2,7	2,4	1,7**	;	0,8**	0,1 ; 1,6	2,7**	1,2 ; 4,4
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	8,2*	;	11,8**	5,7 ; 19,2	5,2**	2,2 ; 8,8
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	0,6*	0,3 ; 1,0	0,4**	0,0 ; 0,9	0,8**	0,3 ; 1,4
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,7*	1,7 ; 3,9	2,3**	0,9 ; 4,0	3,2*	1,7 ; 4,9
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	10,6*	6,0 ; 15,6	12,6**	5,6 ; 21,0	9,3**	3,3 ; 16,8
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	8,2*	5,8 ; 10,9	8,6*	4,6 ; 13,4	8,0*	5,1 ; 11,1
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,4**	0,2 ; 0,7	0,4**	0,1 ; 0,9	0,4**	0,1 ; 0,9

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,4**	0,2 ; 0,7	0,5**	0,1 ; 1,1	0,3**	0,1 ; 0,6
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,823		P = 0,341		P = 0,025	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	0,6**	0,0 ; 1,4	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	x	;	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,069		P = 0,094		P = 0,359	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	0,7**	0,2 ; 1,5	1,0**	0,1 ; 2,3	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,511		P = 0,558		P = 0,623	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	0,6**	0,2 ; 1,1	x	;	0,7**	0,1 ; 1,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	0,8**	0,1 ; 1,8	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,470		P = .		P = 0,428	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,4**	0,1 ; 0,8	0,6**	0,1 ; 1,4	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,015		P = 0,010		P = 0,105	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	2,1**	0,1 ; 5,1	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,3**	0,1 ; 0,5	0,3**	0,0 ; 0,6	0,3**	0,0 ; 0,6
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,008		P = 0,002		P = 0,206	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	0,4**	0,1 ; 0,8	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	2,2**	0,1 ; 5,2	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,002	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	0,3**	0,0 ; 0,6	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	5,2**	0,7 ; 11,1	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	1,9**	0,6 ; 3,7	2,9**	0,1 ; 6,9	1,3**	0,3 ; 2,6
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,664				
Oui	10,2	10,0	10,3	9,5	8,3 ; 10,8	9,8	8,0 ; 11,8	9,3	7,8 ; 10,8	
Non	89,8	90,0	89,7	90,5	89,2 ; 91,7	90,2	88,2 ; 92,0	90,7	89,2 ; 92,2	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,630				
Oui	4,4	3,5	5,3	3,8	3,1 ; 4,6	3,6*	2,6 ; 4,9	4,0	3,0 ; 5,1	
Non	95,6	96,5	94,7	96,2	95,4 ; 96,9	96,4	95,1 ; 97,4	96,0	94,9 ; 97,0	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	11,6	10,3 ; 12,8	13,5	11,6 ; 15,7	9,5	8,0 ; 11,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,081	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	18,1	13,2 ; 23,3	22,3*	15,0 ; 30,3	13,6*	7,5 ; 20,2
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	13,4	10,7 ; 16,0	16,8	12,8 ; 21,0	9,7*	6,9 ; 12,6
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	10,3	8,4 ; 12,1	10,7	8,1 ; 13,5	9,8	7,3 ; 12,4
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	5,4	3,9 ; 7,3	5,2*	2,8 ; 8,1	5,6*	3,5 ; 8,1
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,017		P = 0,016		P = 0,601	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	10,0	7,5 ; 12,6	8,7*	5,1 ; 12,7	10,7*	7,6 ; 14,0
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	8,6	6,9 ; 10,6	8,8	6,4 ; 11,3	8,5*	5,9 ; 11,2
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	13,4	11,2 ; 15,7	16,8	13,4 ; 20,4	9,4	6,7 ; 12,1
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	13,3*	7,4 ; 19,4	18,2**	6,7 ; 31,5	10,3**	4,4 ; 17,0
Autre	14,9	16,7	13,2*	18,3**	8,7 ; 28,1	20,4**	6,3 ; 35,0	16,1**	3,3 ; 30,3
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,893		P = 0,750		P = 0,506	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	11,5	9,0 ; 13,9	14,2	10,1 ; 18,3	8,8*	6,1 ; 11,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	10,9	8,5 ; 13,4	12,4*	8,7 ; 16,3	9,2*	6,2 ; 12,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	12,1	9,5 ; 14,7	15,0	11,1 ; 19,5	9,2*	6,3 ; 12,3
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	12,3	9,0 ; 15,5	11,9*	7,2 ; 16,8	12,6*	8,0 ; 17,6
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,152		P = 0,489		P = 0,392	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	9,6	7,1 ; 12,5	11,7*	6,8 ; 16,8	8,4*	5,4 ; 11,7
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	11,9	10,4 ; 13,4	13,7	11,5 ; 16,0	10,0	8,1 ; 11,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000		P = 0,006		P = 0,080	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	12,8	11,1 ; 14,5	13,8	11,4 ; 16,4	11,5	9,1 ; 14,0
Étudiants	17,1	21,4	12,9	17,1	11,9 ; 22,5	22,5*	14,3 ; 31,9	11,9**	5,8 ; 18,9
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	9,9*	5,7 ; 14,7	22,9**	4,5 ; 40,5	7,3*	4,0 ; 10,8
Retraités	7,5	7,0	7,9	6,1	4,5 ; 7,8	6,0*	3,6 ; 8,5	6,1*	4,1 ; 8,4

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	80,5	75,3 ; 85,6	75,6	67,6 ; 83,3	87,4	80,8 ; 93,0
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	19,5	14,4 ; 24,7	24,4*	16,7 ; 32,4	12,6*	7,0 ; 19,2
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	24,0	18,5 ; 29,4	27,4	19,5 ; 35,1	19,1*	11,1 ; 27,4
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	13,8*	9,6 ; 18,3	14,8*	8,7 ; 21,5	12,5*	7,4 ; 18,3
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	25,1	20,0 ; 30,7	27,1	20,5 ; 34,3	22,2*	14,7 ; 30,6
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	8,0*	4,9 ; 11,5	6,9**	2,6 ; 12,2	9,5*	5,0 ; 14,7
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	17,3	13,2 ; 21,7	16,8*	11,0 ; 23,1	18,0*	12,4 ; 24,8
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	1,1**	0,3 ; 2,1	x	;	1,5**	0,1 ; 3,3
Autre	12,1	8,1	17,6	10,7*	7,4 ; 14,2	x	;	17,3*	10,8 ; 24,4
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	23,0	18,1 ; 28,3	22,8	16,1 ; 29,9	23,4*	15,9 ; 31,1
Printemps	21,2	20,7	21,9	21,5	16,7 ; 26,8	21,3*	14,2 ; 28,7	21,8*	14,9 ; 30,1
Été	29,1	30,3	27,4	27,0	21,4 ; 32,7	25,0	17,8 ; 32,4	29,8	21,7 ; 38,1
Automne	23,7	24,0	23,3	28,5	22,7 ; 34,4	31,0	23,1 ; 38,9	25,0*	16,8 ; 33,3
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	31,5	26,3 ; 37,4	26,8	19,7 ; 35,0	38,1	30,2 ; 47,1
Endroit public	28,1	24,8	32,5	27,4	21,7 ; 32,7	24,0	16,9 ; 31,3	32,0	23,2 ; 40,7
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	31,1	25,1 ; 37,4	36,9	28,5 ; 45,4	23,1*	15,2 ; 31,4
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	10,0*	6,5 ; 14,1	12,3*	7,6 ; 17,5	6,8**	1,8 ; 13,2
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	7,1*	4,1 ; 10,9	9,3**	4,4 ; 15,1	3,9**	1,1 ; 7,6
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	2,1**	0,0 ; 4,9	x	;	x	;
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	10,0*	6,3 ; 14,1	12,1*	6,8 ; 18,1	6,9**	2,1 ; 13,0
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	5,1*	2,7 ; 7,9	7,3**	3,5 ; 11,7	2,0**	0,2 ; 4,3
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	5,4**	2,6 ; 8,5	5,5**	1,8 ; 10,0	5,3**	1,4 ; 10,2
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	21,4	16,5 ; 26,6	22,0*	15,8 ; 29,1	20,5*	13,3 ; 28,1
Chute	34,6	30,5	40,3	35,4	29,8 ; 40,9	31,8	24,3 ; 39,8	40,5	31,9 ; 48,8
Autres	13,7	12,5	15,3	x	;	10,3*	5,8 ; 15,6	18,0*	11,4 ; 25,3
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	x	;	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	29,1	23,5 ; 34,5	31,0	23,5 ; 38,7	26,4*	18,2 ; 34,6
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	38,8	32,7 ; 44,6	40,9	32,5 ; 49,3	35,6	27,4 ; 44,2
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	x	;	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	18,5	14,2 ; 23,4	17,4*	11,8 ; 23,8	20,0*	12,9 ; 27,8
Autre	11,9	10,9	13,2	11,3*	7,5 ; 15,5	9,3*	4,8 ; 14,2	14,2*	7,9 ; 21,8

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	3,4*	2,1 ; 4,9	3,1**	1,1 ; 5,7	3,6*	2,1 ; 5,6
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,271		P = 0,818		P = 0,125	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	3,2**	1,6 ; 5,0	3,4**	0,8 ; 7,0	3,0**	1,1 ; 5,2
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	3,0**	1,1 ; 5,5	x	;	3,2**	0,8 ; 6,3
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,242		P = 0,863		P = 0,234	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	4,8**	2,6 ; 7,5	x	;	5,2**	2,4 ; 8,5
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	3,0**	1,4 ; 5,0	3,2**	0,8 ; 6,3	2,7**	0,7 ; 5,3
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,508		P = 0,478		P = 0,626	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	4,4**	0,5 ; 9,9	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	2,9*	1,7 ; 4,3	2,5**	0,7 ; 4,8	3,1**	1,4 ; 5,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,002		P = 0,160	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	7,5**	3,5 ; 13,0	10,6**	2,0 ; 21,3	5,6**	1,3 ; 11,3
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	1,7**	0,8 ; 2,8	x	;	2,5**	1,0 ; 4,2
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,025		P = 0,451		P = 0,023	
Oui	5,9	3,6*	7,3	5,6*	2,9 ; 8,7	4,8**	0,5 ; 10,2	6,1**	2,7 ; 10,5
Non	2,7*	2,2**	3,1*	2,2**	0,9 ; 3,8	2,6**	0,2 ; 5,7	1,8**	0,5 ; 3,4
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,005		P = 0,039	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	8,5**	3,8 ; 14,4	10,8**	1,1 ; 22,7	7,2**	2,2 ; 13,7
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	1,8**	0,8 ; 2,9	1,2**	0,1 ; 2,7	2,3**	0,9 ; 4,0
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,952		P = 0,289		P = 0,584	
Résidence	62,7	52,8	68,6	64,0	43,3 ; 80,9	57,2**	21,4 ; 85,8	70,7	44,2 ; 92,2
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	60,6**	23,1 ; 100,0	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	16,8**	3,6 ; 32,5	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	20,5**	3,1 ; 39,6	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	36,5**	17,3 ; 57,9	x	;	41,5**	16,7 ; 66,7
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	26,2**	7,1 ; 47,2	x	;	19,2**	2,3 ; 42,8
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	16,4**	3,2 ; 32,8	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	38,3**	19,0 ; 59,5	41,6**	7,2 ; 87,0	35,9**	11,2 ; 62,2
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	30,4**	8,6 ; 51,4	x	;	25,8**	4,9 ; 50,1

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	11,0	9,9 ; 12,2	11,1	9,3 ; 13,0	10,9	9,4 ; 12,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,018		P = 0,001	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	8,9*	5,4 ; 12,6	9,8**	4,2 ; 16,0	7,9**	3,4 ; 13,0
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	10,9	8,6 ; 13,1	11,4	8,2 ; 14,8	10,3*	7,4 ; 13,7
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	14,6	12,6 ; 16,7	14,0	11,2 ; 17,2	15,2	12,4 ; 18,3
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	5,0*	3,4 ; 6,8	4,4**	2,1 ; 7,3	5,5*	3,4 ; 7,8
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,471		P = 0,172		P = 0,727	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	9,0	6,9 ; 11,3	9,3*	5,8 ; 13,2	8,8*	6,1 ; 11,7
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	10,7	8,9 ; 12,7	9,9	7,4 ; 12,5	11,7	8,9 ; 14,8
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	12,1	10,1 ; 14,3	13,2	10,1 ; 16,4	10,8	8,0 ; 13,8
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	9,2*	5,3 ; 13,6	x	;	13,8*	7,8 ; 20,5
Autre	11,4	12,8*	10,2*	12,4**	5,0 ; 21,3	13,2**	2,0 ; 27,7	11,6**	2,2 ; 22,4
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,067		P = 0,540		P = 0,076	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	8,6	6,8 ; 10,6	9,5*	6,5 ; 12,5	7,8*	5,4 ; 10,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	11,9	9,6 ; 14,5	10,9*	7,8 ; 14,6	12,8	9,4 ; 16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	11,8	9,4 ; 14,3	11,9*	8,3 ; 15,6	11,7	8,6 ; 15,1
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	13,2	10,0 ; 16,6	13,7*	8,6 ; 19,0	12,8*	8,7 ; 17,6
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,005		P = 0,002		P = 0,392	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	7,7	5,6 ; 10,1	4,7**	2,0 ; 7,9	9,6*	6,6 ; 13,0
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	11,9	10,5 ; 13,3	12,4	10,3 ; 14,6	11,3	9,5 ; 13,3
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,920		P = 0,371		P = 0,271	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	11,3*	8,0 ; 15,0	9,1*	4,9 ; 13,9	13,4*	8,7 ; 19,1
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	11,1	9,8 ; 12,4	11,5	9,5 ; 13,5	10,8	9,1 ; 12,6
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,051		P = 0,001	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	13,8	12,1 ; 15,6	13,1	10,6 ; 15,5	14,8	12,3 ; 17,7
Étudiants	9,9	9,7	10,1	7,4*	4,2 ; 10,8	6,6**	2,3 ; 11,7	8,1**	3,2 ; 13,6
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	9,5*	6,0 ; 13,4	16,4**	4,5 ; 31,8	8,0*	4,8 ; 11,4
Retraités	6,9	6,7	7,0	7,4	5,6 ; 9,1	7,7*	4,9 ; 10,5	7,1*	4,9 ; 9,2

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,244				
Oui	45,2	47,6	42,8	48,8	43,1 ; 54,9	52,1	43,0 ; 60,4	45,4	37,9 ; 53,7	
Non	54,8	52,4	57,2	51,2	45,1 ; 56,9	47,9	39,6 ; 57,0	54,6	46,3 ; 62,1	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,158				
Oui	25,4	27,6	23,1	19,9	15,2 ; 24,9	23,2*	15,7 ; 30,9	16,4*	10,5 ; 22,9	
Non	74,6	72,4	76,9	80,1	75,1 ; 84,8	76,8	69,1 ; 84,3	83,6	77,1 ; 89,5	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,073				
Oui	17,6	15,6	19,6	18,7	14,6 ; 23,1	15,0*	9,9 ; 20,9	22,6	16,3 ; 29,2	
Non	82,4	84,4	80,4	81,3	76,9 ; 85,4	85,0	79,1 ; 90,1	77,4	70,8 ; 83,7	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,195				
Oui	8,1	7,2	9,0	11,0*	7,2 ; 15,0	8,3**	3,5 ; 14,0	13,8*	8,1 ; 19,9	
Non	91,9	92,8	91,0	89,0	85,0 ; 92,8	91,7	86,0 ; 96,5	86,2	80,1 ; 91,9	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 0,760				
Cou	3,1	1,8*	4,3	2,9**	0,8 ; 5,4	x	;	4,9**	1,2 ; 9,7	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	65,3	59,8 ; 70,9	68,7	60,4 ; 76,6	61,9	54,1 ; 69,6	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	15,0	10,6 ; 19,3	17,0*	10,4 ; 23,9	13,0*	7,4 ; 18,6	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	2,6**	1,0 ; 4,7	x	;	4,1**	1,3 ; 7,6	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	12,0*	8,2 ; 15,8	10,2**	4,9 ; 16,3	13,8*	8,4 ; 19,3	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	2,2**	0,9 ; 3,7	2,1**	0,3 ; 4,2	2,2**	0,4 ; 4,6	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	32,2	30,4 ; 34,0	29,1	26,4 ; 31,7	35,4	32,9 ; 37,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,100		P = 0,001	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	23,0	18,0 ; 28,5	23,3*	15,5 ; 32,0	22,7	16,2 ; 29,9
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	30,8	27,4 ; 34,4	26,6	21,8 ; 31,7	35,2	30,4 ; 40,1
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	36,0	33,2 ; 38,8	32,6	28,6 ; 36,7	39,4	35,5 ; 43,3
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	34,4	30,9 ; 38,3	30,8	25,4 ; 36,4	37,3	32,6 ; 42,2
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,027		P = 0,562		P = 0,059	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	36,6	32,9 ; 40,3	30,9	25,1 ; 36,5	39,9	35,2 ; 44,6
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	35,5	32,6 ; 38,6	32,1	28,1 ; 36,3	39,2	34,9 ; 43,6
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	29,2	26,1 ; 32,3	27,0	22,9 ; 31,3	31,7	27,5 ; 36,3
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	32,1	24,7 ; 39,8	29,6*	16,3 ; 44,4	33,6	25,1 ; 42,5
Autre	34,0	32,4	35,4	29,7*	19,9 ; 40,3	30,3*	16,2 ; 46,3	29,0*	16,1 ; 42,8
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,192		P = 0,254		P = 0,538	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	32,5	29,6 ; 35,9	30,1	25,5 ; 35,1	35,0	30,8 ; 39,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	33,8	30,4 ; 37,5	30,2	25,4 ; 35,3	37,6	32,5 ; 42,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	32,5	29,1 ; 36,1	30,3	25,1 ; 35,8	34,9	30,0 ; 40,0
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	27,7	23,4 ; 32,4	22,5	16,1 ; 29,3	32,2	26,1 ; 38,6
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,161		P = 0,672		P = 0,302	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	35,2	31,1 ; 39,7	30,9	23,7 ; 38,9	37,8	32,9 ; 43,1
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	31,9	29,9 ; 33,9	29,2	26,4 ; 32,2	34,8	32,0 ; 37,6
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,003	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	46,3	39,9 ; 52,8	47,1	36,8 ; 57,5	45,6	38,3 ; 53,1
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	30,7	28,8 ; 32,6	27,4	24,6 ; 30,1	34,0	31,5 ; 36,6
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,099		P = 0,000	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	32,3	29,9 ; 34,8	27,3	23,9 ; 30,6	39,1	35,5 ; 42,8
Étudiants	20,7	14,8	26,3	22,4	17,2 ; 28,5	25,3*	16,5 ; 35,3	19,6*	13,1 ; 27,0
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	35,9	30,2 ; 42,0	32,6*	20,0 ; 49,1	36,6	30,5 ; 42,9
Retraités	34,2	30,5	37,2	36,0	32,7 ; 39,4	35,6	30,6 ; 40,9	36,3	32,2 ; 40,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	23,2	21,0 ; 25,5	20,1	17,0 ; 23,4	26,4	23,7 ; 29,5
Bon	33,9	28,1	39,6	38,7	35,3 ; 42,1	35,7	30,9 ; 40,4	41,6	37,0 ; 46,6
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	63,8	57,7 ; 69,6	64,9	55,9 ; 73,3	63,0	55,0 ; 71,0
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	55,1	50,5 ; 59,5	54,5	46,8 ; 62,1	55,5	49,8 ; 61,2
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	26,8	24,9 ; 28,7	24,4	21,6 ; 27,2	29,4	26,9 ; 32,2
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,040		P = 0,122	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	31,5*	19,4 ; 45,4	x	;	33,1*	19,8 ; 47,4
Poids normal	28,3	22,9	32,1	29,0	26,4 ; 31,8	23,5	19,4 ; 28,2	33,0	29,7 ; 36,6
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	32,4	29,5 ; 35,6	30,4	26,5 ; 34,5	35,8	31,1 ; 40,4
Obésité	37,9	30,5	46,1	40,2	35,4 ; 45,2	38,6	31,9 ; 45,5	42,4	35,8 ; 49,3

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,001					
Oui	30,3	25,3	35,2	32,2	30,4 ; 34,0	29,1	26,4 ; 31,7	35,4	32,9 ; 37,8		
Non	69,7	74,7	64,8	67,8	66,0 ; 69,6	70,9	68,3 ; 73,6	64,6	62,2 ; 67,1		
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	9,5	6,4	12,5	10,3	9,3 ; 11,4	6,6	5,3 ; 8,1	14,1	12,3 ; 15,8		
Non	90,5	93,6	87,5	89,7	88,6 ; 90,7	93,4	91,9 ; 94,7	85,9	84,2 ; 87,7		
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	14,5	12,2	16,7	14,3	13,0 ; 15,6	11,7	10,0 ; 13,7	16,8	14,9 ; 18,6		
Non	85,5	87,8	83,3	85,7	84,4 ; 87,0	88,3	86,3 ; 90,0	83,2	81,4 ; 85,1		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,002					
Oui	13,5	10,8	16,1	15,3	14,0 ; 16,6	13,1	11,2 ; 15,1	17,5	15,6 ; 19,4		
Non	86,5	89,2	83,9	84,7	83,4 ; 86,0	86,9	84,9 ; 88,8	82,5	80,6 ; 84,4		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,001					
Oui	14,5	11,8	17,2	15,5	14,1 ; 16,9	13,1	11,2 ; 15,1	17,8	16,1 ; 19,8		
Non	85,5	88,2	82,8	84,5	83,1 ; 85,9	86,9	84,9 ; 88,8	82,2	80,2 ; 83,9		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,253					
Oui	17,8	16,0	19,6	19,3	17,7 ; 20,8	18,4	16,3 ; 20,7	20,1	18,0 ; 22,3		
Non	82,2	84,0	80,4	80,7	79,2 ; 82,3	81,6	79,3 ; 83,7	79,9	77,7 ; 82,0		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	14,2	10,6	17,8	14,5	13,1 ; 15,8	11,1	9,4 ; 13,0	17,8	15,7 ; 19,8		
Non	85,8	89,4	82,2	85,5	84,2 ; 86,9	88,9	87,0 ; 90,6	82,2	80,2 ; 84,3		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	61,6	59,7 ; 63,6	28,6	26,8 ; 30,3	9,8	8,6 ; 11,0
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,004					
Hommes	52,6	34,1	13,3	59,0	56,2 ; 62,0	29,4	26,7 ; 32,0	11,6	9,7 ; 13,6
Femmes	60,1	29,8	10,1	64,2	61,7 ; 66,8	27,9	25,5 ; 30,0	8,0	6,6 ; 9,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	67,9	61,5 ; 74,2	23,7	18,3 ; 29,3	8,3*	4,7 ; 12,7
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	66,6	62,9 ; 70,1	23,2	20,2 ; 26,5	10,1	7,8 ; 12,7
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	58,3	55,6 ; 61,3	32,0	29,2 ; 34,6	9,7	8,0 ; 11,3
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	54,4	50,5 ; 58,1	34,9	31,4 ; 38,5	10,7	8,5 ; 12,9
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,088					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	54,6	51,0 ; 58,4	33,6	30,3 ; 37,1	11,7	9,4 ; 14,3
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	61,6	58,7 ; 64,6	28,8	25,9 ; 31,6	9,6	7,9 ; 11,4
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	64,5	61,2 ; 67,9	27,0	24,0 ; 30,0	8,5	6,5 ; 10,5
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	59,1	50,8 ; 67,2	26,9	20,0 ; 34,6	14,0*	8,4 ; 20,9
Autre	48,0	34,3	17,7	63,8	52,2 ; 74,2	24,9*	16,3 ; 34,9	11,3**	4,5 ; 19,3
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,822					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	61,7	59,8 ; 63,6	28,6	26,8 ; 30,3	9,7	8,6 ; 10,9
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	x	;	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,971					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	61,7	59,8 ; 63,7	28,5	26,8 ; 30,3	9,8	8,6 ; 11,0
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	x	;	x	;	x	;
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	x	;	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	54,1	50,5 ; 57,6	32,2	29,1 ; 35,4	13,7	11,1 ; 16,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	59,3	55,4 ; 62,9	30,0	26,5 ; 33,5	10,8	8,6 ; 13,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	63,7	60,0 ; 67,5	28,1	24,6 ; 31,6	8,2	6,0 ; 10,5
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	76,5	72,2 ; 80,7	20,3	16,5 ; 24,3	3,3**	1,6 ; 5,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	51,6	47,1 ; 56,3	31,2	27,3 ; 35,5	17,2	13,5 ; 21,0
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	64,1	61,9 ; 66,3	27,8	25,7 ; 29,7	8,1	6,9 ; 9,4
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	42,1	35,8 ; 48,4	32,2	26,8 ; 37,9	25,8	20,3 ; 31,4
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	63,7	61,7 ; 65,7	28,1	26,2 ; 30,0	8,1	7,0 ; 9,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	63,5	60,9 ; 66,0	27,7	25,2 ; 30,1	8,9	7,4 ; 10,4
Étudiants	62,8	27,9	9,3	71,0	64,1 ; 77,3	21,2	15,7 ; 27,3	7,7*	4,0 ; 12,1
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	50,2	44,5 ; 56,5	32,5	27,1 ; 37,7	17,3	12,7 ; 22,2
Retraités	49,7	38,1	12,2	56,3	52,8 ; 59,9	34,2	30,9 ; 37,6	9,5	7,7 ; 11,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	61,6	59,7 ; 63,6	28,6	26,8 ; 30,3	9,8	8,6 ; 11,0
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	53,5	49,0 ; 57,8	31,0	27,0 ; 35,0	15,5	12,4 ; 18,8
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	64,0	61,9 ; 66,1	27,9	25,9 ; 29,8	8,1	6,9 ; 9,3
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	73,3	70,9 ; 75,7	21,5	19,2 ; 23,6	5,2	4,1 ; 6,5
Bon	41,4	42,6	16,0	47,7	44,3 ; 51,2	38,8	35,5 ; 42,1	13,5	11,2 ; 16,1
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	39,5	33,7 ; 45,4	36,2	30,8 ; 41,8	24,2	19,0 ; 29,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	48,9	44,4 ; 53,4	32,2	28,0 ; 36,5	18,9	15,2 ; 22,7
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	64,7	62,6 ; 66,9	27,8	25,9 ; 29,8	7,5	6,4 ; 8,7
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	55,7	51,6 ; 59,7	35,4	31,5 ; 39,2	8,9	6,8 ; 11,1
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	62,8	60,6 ; 64,9	27,2	25,2 ; 29,2	10,0	8,6 ; 11,4
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	65,5	63,5 ; 67,6	27,0	25,1 ; 28,9	7,5	6,4 ; 8,7
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	40,6	36,0 ; 45,4	37,8	32,9 ; 42,4	21,7	17,4 ; 25,7
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	71,2	67,7 ; 74,6	23,2	20,0 ; 26,5	5,6	4,1 ; 7,3
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	59,3	56,6 ; 62,0	28,9	26,6 ; 31,4	11,8	10,0 ; 13,7

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	17,0	16,0 ; 18,1	13,2	11,8 ; 14,8	20,7	19,1 ; 22,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	1,4**	0,6 ; 2,3	0,8**	0,0 ; 1,9	2,0**	0,8 ; 3,7
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	17,3	15,4 ; 19,5	15,0	12,2 ; 17,9	19,7	16,8 ; 22,9
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	58,1	54,4 ; 61,8	47,8	41,7 ; 54,4	66,3	61,6 ; 70,8
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,045		P = 0,000	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	50,9	45,9 ; 55,8	41,1	33,5 ; 48,9	59,2	52,7 ; 65,4
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	67,0	60,7 ; 73,5	59,4	48,4 ; 70,4	73,0	64,8 ; 80,8
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	87,0	70,8 ; 99,6	x	;	94,8	85,7 ; 100,0
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	34,2	31,4 ; 37,2	24,0	20,3 ; 28,0	44,1	39,9 ; 48,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	13,1	11,1 ; 15,3	10,5	7,8 ; 13,4	16,0	12,7 ; 19,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	8,1	6,4 ; 10,0	8,7*	6,0 ; 11,5	7,4*	5,3 ; 9,9
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	7,5	5,2 ; 9,8	6,7**	3,3 ; 10,6	8,1*	5,1 ; 11,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	31,9	28,1 ; 35,7	23,7	17,4 ; 30,1	37,0	32,1 ; 41,6
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	13,6	12,4 ; 14,8	11,5	9,9 ; 13,2	15,8	14,0 ; 17,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	27,5	22,2 ; 32,5	24,2*	16,3 ; 32,3	30,6	24,1 ; 37,4
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	15,6	14,5 ; 16,9	11,9	10,5 ; 13,5	19,3	17,6 ; 21,2

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	84,6	83,3 ; 85,9	13,7	12,4 ; 15,0	1,7	1,3 ; 2,2
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	75,9	73,6 ; 78,3	21,1	18,8 ; 23,4	2,9	2,1 ; 3,9
Femmes	87,9	11,3	0,7	93,3	92,1 ; 94,3	6,2	5,2 ; 7,4	0,5**	0,2 ; 0,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,002					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	91,7	88,0 ; 95,0	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	88,1	85,4 ; 90,4	11,1	8,8 ; 13,7	0,8**	0,2 ; 1,6
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	82,6	80,4 ; 84,6	15,1	13,2 ; 17,2	2,3*	1,4 ; 3,3
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	76,4	73,3 ; 79,5	20,2	17,0 ; 23,3	3,4*	2,0 ; 5,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,072					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	83,6	80,7 ; 86,2	14,5	12,0 ; 17,3	1,9**	0,9 ; 3,1
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	79,8	77,4 ; 82,1	17,5	15,2 ; 19,8	2,7*	1,7 ; 3,8
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	88,2	86,0 ; 90,2	10,6	8,6 ; 12,7	1,2**	0,5 ; 2,0
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	87,0	81,0 ; 92,0	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	86,6	79,1 ; 92,8	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,257					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	83,1	81,5 ; 84,6	14,9	13,4 ; 16,6	1,9	1,4 ; 2,6
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	88,9	85,2 ; 92,3	10,2*	6,9 ; 13,7	0,9**	0,1 ; 1,9
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	90,4	86,4 ; 93,7	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	81,2	72,9 ; 88,7	15,2*	8,2 ; 23,0	3,6**	0,3 ; 8,0
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	78,1	75,2 ; 80,8	18,6	16,1 ; 21,6	3,2*	2,2 ; 4,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	84,0	81,1 ; 86,6	14,5	12,0 ; 17,2	1,6**	0,8 ; 2,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	89,2	86,7 ; 91,4	9,5	7,4 ; 11,8	1,3**	0,4 ; 2,4
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	89,6	86,6 ; 92,4	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,068					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	81,8	78,4 ; 84,9	15,5	12,5 ; 18,6	2,6*	1,4 ; 4,1
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	85,3	83,7 ; 86,7	13,3	11,8 ; 14,8	1,5*	1,0 ; 2,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,008					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	78,3	72,8 ; 83,2	18,2	13,5 ; 23,1	3,6**	1,4 ; 6,2
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	85,3	83,9 ; 86,7	13,1	11,8 ; 14,5	1,5*	1,1 ; 2,0
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,007					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	85,5	83,6 ; 87,3	13,0	11,3 ; 14,9	1,5*	0,9 ; 2,2
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	93,3	89,7 ; 96,2	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	83,2	78,4 ; 87,7	14,8	10,5 ; 19,4	2,1**	0,5 ; 4,2
Retraités	72,9	23,2	3,8	78,0	75,3 ; 80,7	19,0	16,4 ; 21,7	3,0*	1,9 ; 4,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	84,6	83,3 ; 85,9	13,7	12,4 ; 15,0	1,7	1,3 ; 2,2
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,017					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	80,8	77,3 ; 83,8	16,8	13,7 ; 20,0	2,4*	1,3 ; 3,8
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	85,7	84,2 ; 87,0	12,8	11,4 ; 14,2	1,5*	1,0 ; 2,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	88,1	86,5 ; 89,7	10,5	9,0 ; 12,1	1,4*	0,8 ; 2,1
Bon	75,1	21,2	3,6	81,3	78,6 ; 83,7	16,6	14,3 ; 19,2	2,1*	1,3 ; 3,0
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	74,8	69,4 ; 80,0	22,8	17,7 ; 28,1	2,4**	1,0 ; 4,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,001					
Élevé	77,2	19,2	3,6	79,1	75,4 ; 82,7	18,6	15,0 ; 22,4	2,3**	1,1 ; 3,6
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	86,0	84,6 ; 87,4	12,4	11,1 ; 13,8	1,6*	1,1 ; 2,1
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	78,8	75,5 ; 81,8	18,5	15,6 ; 21,4	2,7*	1,5 ; 4,2
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	85,8	84,3 ; 87,2	12,7	11,3 ; 14,1	1,5*	1,0 ; 2,1
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,006					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	93,0	90,7 ; 94,9	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	82,7	80,8 ; 84,5	15,1	13,4 ; 17,0	2,1*	1,4 ; 2,9

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	84,6	83,3 ; 85,9	75,9	73,6 ; 78,3	93,3	92,1 ; 94,3
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	13,7	12,4 ; 15,0	21,1	18,8 ; 23,4	6,2	5,2 ; 7,4
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	1,7	1,3 ; 2,2	2,9	2,1 ; 3,9	0,5**	0,2 ; 0,9
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	78,8	75,5 ; 81,8	66,0	59,6 ; 72,1	86,9	83,5 ; 90,0
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	18,5	15,6 ; 21,4	29,0	23,2 ; 35,0	11,8	8,9 ; 15,0
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	2,7*	1,5 ; 4,2	5,0**	2,3 ; 8,1	1,3**	0,2 ; 2,8
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	85,8	84,3 ; 87,2	77,4	74,9 ; 80,0	94,9	93,8 ; 96,0
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	12,7	11,3 ; 14,1	19,9	17,4 ; 22,5	4,8	3,7 ; 5,9
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	1,5*	1,0 ; 2,1	2,6*	1,7 ; 3,7	0,3**	0,1 ; 0,6

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	29,9	28,0 ; 31,9	16,2	14,6 ; 17,8	53,9	51,7 ; 55,9
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	21,4	18,8 ; 24,0	15,5	13,2 ; 18,0	63,1	59,9 ; 66,2
Femmes	41,7	18,2	40,1	39,3	36,3 ; 42,1	16,9	14,8 ; 19,2	43,8	40,9 ; 46,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	24,2	18,9 ; 30,1	16,9	12,2 ; 21,8	58,9	52,2 ; 65,1
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	25,8	22,6 ; 29,2	17,8	14,9 ; 20,8	56,4	52,6 ; 59,9
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	35,8	32,7 ; 38,8	15,3	13,0 ; 17,8	48,8	45,7 ; 51,9
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	32,0	26,4 ; 38,0	11,8*	8,2 ; 15,9	56,2	50,0 ; 61,8
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,011					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	27,3	23,2 ; 31,5	14,7	11,3 ; 18,3	57,9	53,4 ; 62,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	30,5	26,5 ; 34,2	12,8	10,1 ; 15,8	56,7	52,8 ; 60,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	29,5	26,1 ; 33,0	18,8	15,7 ; 22,0	51,7	47,8 ; 55,6
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	33,6	28,6 ; 38,3	19,3	15,3 ; 23,5	47,1	42,0 ; 52,2
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,916					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	30,9	25,5 ; 36,6	15,5*	10,8 ; 20,3	53,6	47,6 ; 59,3
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	30,0	27,8 ; 32,1	16,4	14,6 ; 18,2	53,6	51,1 ; 55,9
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,080					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	30,3	27,8 ; 32,7	17,2	15,2 ; 19,5	52,5	49,7 ; 55,2
Étudiants	28,8	16,3	54,9	24,7	18,5 ; 31,4	16,5*	11,3 ; 21,9	58,7	51,7 ; 65,5
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	38,0	31,1 ; 45,4	12,2*	7,5 ; 17,2	49,8	42,4 ; 56,8
Retraités	38,0	12,4	49,6	30,9	26,6 ; 35,8	13,6	10,5 ; 17,0	55,4	50,5 ; 60,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
2,6	2,0 ; 3,3	47,0	45,0 ; 48,9	35,8	33,9 ; 37,7	14,6	13,3 ; 16,0	Ensemble de la population	
P = 0,000									
1,2**	0,5 ; 2,2	38,8	35,9 ; 41,6	43,7	40,9 ; 46,6	16,3	14,4 ; 18,5	Sexe	
4,1	3,0 ; 5,2	55,5	53,0 ; 58,1	27,6	25,3 ; 30,0	12,8	11,2 ; 14,5	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
x		73,0	63,6 ; 81,8	15,2*	8,0 ; 23,1	x		Groupe d'âge	
6,3**	2,1 ; 12,1	67,7	58,8 ; 76,2	18,0*	11,4 ; 25,1	8,0**	3,4 ; 13,8	15-17 ans	
P = 0,000									
7,1*	3,9 ; 11,1	70,0	63,8 ; 76,0	16,8*	11,8 ; 21,8	6,1**	3,0 ; 9,9	15-24 ans	
1,6**	0,8 ; 2,6	47,5	43,9 ; 51,2	35,8	32,2 ; 39,3	15,1	12,5 ; 17,8	25-44 ans	
1,4**	0,7 ; 2,2	39,3	36,5 ; 42,1	42,6	39,8 ; 45,5	16,8	14,7 ; 19,1	45-64 ans	
3,1*	1,8 ; 4,6	43,2	39,2 ; 46,9	37,4	33,6 ; 41,0	16,4	13,6 ; 19,5	65 ans et plus	
P = 0,320									
x		73,8	59,8 ; 87,6	19,7**	7,6 ; 32,6	x		Hommes	
x		56,7	43,4 ; 69,4	25,3*	13,9 ; 36,8	x		15-17 ans	
P = 0,000									
5,0**	0,8 ; 10,9	63,9	54,7 ; 73,4	22,9*	14,7 ; 31,8	8,2**	3,1 ; 14,1	15-24 ans	
x		36,4	31,0 ; 42,0	45,6	40,0 ; 51,3	x		25-44 ans	
x		30,9	27,1 ; 35,0	50,7	46,3 ; 54,9	x		45-64 ans	
x		37,2	31,2 ; 43,6	43,9	37,5 ; 50,0	x		65 ans et plus	
P = 0,009									
x		72,1	59,1 ; 83,2	10,5**	3,6 ; 18,7	x		Femmes	
4,0**	0,7 ; 8,4	81,3	71,3 ; 90,6	9,0**	2,5 ; 16,4	5,6**	0,2 ; 13,8	15-17 ans	
P = 0,000									
9,5**	4,7 ; 15,1	77,0	69,2 ; 84,5	9,7*	5,0 ; 15,2	3,7**	0,6 ; 8,6	15-24 ans	
2,5**	1,0 ; 4,3	60,7	55,8 ; 65,7	24,2	19,5 ; 28,8	12,6	9,5 ; 16,0	25-44 ans	
2,6**	1,2 ; 4,3	47,9	43,9 ; 51,9	34,2	30,4 ; 38,1	15,3	12,6 ; 18,3	45-64 ans	
5,1*	2,8 ; 7,6	47,9	42,9 ; 52,8	32,1	27,4 ; 36,9	14,9	11,3 ; 18,9	65 ans et plus	
P = 0,005									
4,3*	2,8 ; 6,3	45,7	41,7 ; 49,4	33,0	29,7 ; 36,3	17,0	14,6 ; 19,7	Niveau de scolarité	
2,1**	1,0 ; 3,5	47,6	43,8 ; 51,5	35,8	32,1 ; 39,5	14,5	12,1 ; 17,3	Niveau inférieur au DES	
1,5**	0,6 ; 2,5	46,1	42,2 ; 49,9	37,4	33,9 ; 41,2	15,1	12,4 ; 18,0	Diplôme d'études secondaires (DES)	
2,2**	0,8 ; 3,8	50,0	45,0 ; 54,7	38,4	33,7 ; 43,1	9,4	6,9 ; 12,3	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
P = 0,708									
2,1**	0,1 ; 4,9	42,5	36,3 ; 47,9	37,0	32,0 ; 42,6	18,4	14,7 ; 22,6	Diplôme d'études universitaires	
x		39,8	34,4 ; 45,2	45,0	39,5 ; 50,5	x		Hommes	
x		35,2	29,7 ; 41,0	45,4	40,0 ; 51,3	x		Niveau inférieur au DES	
x		36,1	28,5 ; 43,4	51,1	43,5 ; 58,9	x		Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 0,010									
6,5*	4,0 ; 9,3	49,0	44,0 ; 53,8	29,0	25,0 ; 33,3	15,6	12,6 ; 18,8	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
3,1**	1,4 ; 5,2	56,2	51,1 ; 61,5	25,5	21,1 ; 29,9	15,1	11,6 ; 19,1	Diplôme d'études universitaires	
2,6**	1,0 ; 4,5	58,1	53,2 ; 63,1	28,5	24,1 ; 33,2	10,8	8,0 ; 13,8	Femmes	
3,6**	1,2 ; 6,5	63,4	57,0 ; 69,7	26,0	20,5 ; 31,9	7,0*	3,9 ; 10,2	Niveau inférieur au DES	
P = 0,021									
3,6*	1,9 ; 5,4	46,5	41,9 ; 51,3	31,5	27,0 ; 36,2	18,5	15,3 ; 22,0	Indice du niveau de revenu du ménage	
2,5*	1,7 ; 3,4	46,8	44,7 ; 49,0	36,8	34,8 ; 38,9	13,9	12,4 ; 15,5	Quintile 1 (faible)	
P = 0,138									
x		46,6	38,1 ; 55,6	34,0	25,6 ; 42,8	x		Quintile 2 et suivants	
1,4**	0,5 ; 2,5	37,0	33,9 ; 39,9	45,8	42,6 ; 49,0	15,9	13,7 ; 18,2	Hommes	
P = 0,001									
5,5*	2,8 ; 8,3	46,4	40,8 ; 52,0	29,8	24,9 ; 34,8	18,3	14,6 ; 22,3	Femmes	
3,8*	2,6 ; 5,0	58,1	55,1 ; 61,1	26,6	23,9 ; 29,4	11,6	9,7 ; 13,6	Quintile 1 (faible)	
P = 0,001									
								Quintile 2 et suivants	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	36,5	34,8 ; 38,4	2,0	1,6 ; 2,6	61,5	59,6 ; 63,2
Sexe	P = 0,000			P = 0,853					
Hommes	36,6	3,6	59,9	36,3	33,6 ; 39,1	2,2*	1,5 ; 3,0	61,5	58,6 ; 64,2
Femmes	40,5	2,3	57,1	36,6	34,3 ; 39,1	1,9*	1,2 ; 2,6	61,5	58,9 ; 63,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	12,6*	8,1 ; 17,7	x	;	x	;
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	34,3	30,8 ; 38,1	1,7*	0,8 ; 2,7	63,9	60,2 ; 67,4
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	47,0	44,2 ; 50,2	2,1*	1,3 ; 3,1	50,8	47,8 ; 53,6
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	37,2	33,5 ; 41,0	3,7*	2,4 ; 5,0	59,2	55,3 ; 63,0
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	11,8**	5,3 ; 19,2	x	;	x	;
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	33,7	28,5 ; 39,3	2,1**	0,8 ; 3,7	64,2	58,6 ; 69,4
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	46,5	42,3 ; 51,0	2,0**	0,9 ; 3,4	51,5	46,9 ; 55,7
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	41,3	35,3 ; 47,5	4,3**	2,1 ; 6,9	54,4	48,1 ; 60,5
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	13,4*	7,3 ; 20,3	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	35,1	30,7 ; 40,3	1,3**	0,2 ; 2,7	63,6	58,3 ; 68,1
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	47,5	43,7 ; 51,5	2,3**	1,0 ; 3,7	50,2	46,1 ; 54,0
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	34,0	29,2 ; 39,0	3,1*	1,6 ; 4,8	62,9	57,7 ; 67,6
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	15,4**	6,8 ; 25,6	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	10,4	8,6 ; 12,3	3,2	2,3 ; 4,2	86,5	84,4 ; 88,3
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	52,0	48,8 ; 55,1	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	88,4	85,1 ; 91,4	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	88,9	65,4 ; 100,0
Poids normal	4,7	6,8	88,5	6,1*	3,9 ; 8,7	5,1*	3,4 ; 7,2	88,9	85,7 ; 91,6
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	45,2	41,0 ; 49,4	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	87,0	81,9 ; 91,2	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	16,7**	6,6 ; 28,4	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	13,5	11,1 ; 16,2	1,8*	0,9 ; 2,7	84,7	81,9 ; 87,2
Embonpoint	69,6	x	x	63,2	58,5 ; 67,8	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	90,2	85,9 ; 93,9	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	80,4	77,6 ; 83,1	11,5	9,3 ; 13,8	8,2	6,5 ; 9,9
Sexe	P = 0,000			P = 0,004					
Hommes	81,4	10,5	8,0	85,8	81,7 ; 89,7	7,2*	4,3 ; 10,5	7,0*	4,4 ; 9,7
Femmes	74,5	14,1	11,5	76,4	72,6 ; 80,0	14,6	11,5 ; 17,7	9,0	6,8 ; 11,4
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,813					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	83,9	74,0 ; 92,5	9,6**	2,8 ; 18,4	6,5**	1,8 ; 12,6
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	81,9	76,8 ; 86,5	11,5*	7,6 ; 15,7	6,7*	3,7 ; 10,1
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	78,9	75,0 ; 82,8	12,3	9,1 ; 15,6	8,8	6,3 ; 11,2
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	79,0	72,3 ; 85,3	10,2*	5,8 ; 14,9	10,8*	5,9 ; 16,1
Hommes	P = 0,252			P = 0,947					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	87,8	69,3 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	90,2	82,9 ; 96,3	4,6**	0,9 ; 9,3	5,2**	0,3 ; 11,7
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	83,6	77,4 ; 89,2	8,2**	3,9 ; 13,4	8,2*	4,4 ; 12,5
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	83,1	73,2 ; 92,8	5,6**	0,2 ; 12,6	11,3**	3,2 ; 20,0
Femmes	P = 0,004			P = 0,875					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	81,2	68,1 ; 92,1	8,8**	1,1 ; 19,5	10,0**	2,7 ; 19,9
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	76,2	69,2 ; 82,6	16,1*	10,4 ; 22,6	7,7*	4,0 ; 12,2
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	75,4	69,8 ; 80,7	15,4*	11,0 ; 20,1	9,2*	6,2 ; 12,5
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	75,6	67,0 ; 84,1	14,1**	7,5 ; 21,6	10,3**	4,2 ; 17,0
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,358					
Poids insuffisant	82,3	x	x	95,8	66,9 ; 100,0	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	82,7	77,7 ; 87,3	9,6*	6,0 ; 13,6	7,7*	4,6 ; 11,0
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	81,4	77,4 ; 85,1	11,6	8,3 ; 15,1	7,0*	4,8 ; 9,4
Obésité	72,3	14,4	13,3	75,8	69,6 ; 81,6	14,0*	9,6 ; 19,2	10,2*	6,2 ; 14,4
Hommes	P = 0,002			P = 0,800					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	91,3	82,9 ; 98,0	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	86,2	80,4 ; 91,2	7,7**	3,6 ; 12,4	6,2**	3,2 ; 9,7
Obésité	76,0	12,2	11,8	82,0	73,1 ; 90,1	8,1**	3,0 ; 14,6	9,9**	3,5 ; 17,0
Femmes	P = 0,161			P = 0,203					
Poids insuffisant	78,9	x	x	95,8	66,9 ; 100,0	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	79,7	73,7 ; 85,3	11,3*	7,0 ; 16,1	9,0*	5,3 ; 13,1
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	76,2	70,1 ; 81,8	15,8*	10,9 ; 21,4	8,0*	4,9 ; 11,6
Obésité	68,9	16,4	14,7	69,1	60,5 ; 77,2	20,4*	12,7 ; 28,4	10,5*	5,8 ; 15,9

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
16,0	14,7 ; 17,4	16,8	15,4 ; 18,3	2,4	1,8 ; 3,0	64,8	62,9 ; 66,5	Ensemble de la population	
P = 0,000									
12,9	11,1 ; 14,9	14,8	12,8 ; 16,9	2,6*	1,7 ; 3,7	69,6	66,9 ; 72,2	Sexe	
19,1	17,2 ; 21,2	18,9	16,9 ; 20,9	2,2*	1,4 ; 2,9	59,9	57,2 ; 62,2	Hommes	
P = 0,000									
13,4*	9,0 ; 18,4	13,1*	8,7 ; 18,1	4,7**	2,0 ; 7,5	68,7	62,3 ; 74,7	Groupe d'âge	
16,1	13,6 ; 18,8	15,7	13,3 ; 18,0	2,3*	1,2 ; 3,4	66,0	62,7 ; 69,4	15-24 ans	
18,3	16,2 ; 20,5	20,5	18,3 ; 22,9	1,4**	0,7 ; 2,3	59,7	57,0 ; 62,4	25-44 ans	
12,9	10,4 ; 15,6	13,5	10,8 ; 16,3	2,7*	1,4 ; 4,2	70,8	67,2 ; 74,3	45-64 ans	
P = 0,018									
8,9**	3,6 ; 15,5	11,9**	5,3 ; 19,4	8,0**	2,9 ; 13,4	71,2	61,9 ; 79,9	Hommes	
11,2*	8,0 ; 15,0	13,6	10,2 ; 17,0	2,7**	1,1 ; 4,5	72,5	67,9 ; 76,8	15-24 ans	
15,9	13,0 ; 19,1	17,1	14,0 ; 20,4	0,7**	0,0 ; 1,8	66,3	62,5 ; 70,2	25-44 ans	
13,0*	9,1 ; 17,2	14,2*	9,6 ; 18,8	1,9**	0,3 ; 3,6	71,0	65,3 ; 76,7	45-64 ans	
P = 0,132									
18,3*	11,5 ; 25,8	14,4*	8,4 ; 21,2	x	;	x	;	Femmes	
21,3	17,6 ; 25,4	17,9	14,3 ; 21,8	1,8**	0,4 ; 3,5	59,0	53,9 ; 63,7	15-24 ans	
20,8	17,7 ; 24,0	24,0	20,6 ; 27,4	2,2**	1,1 ; 3,5	53,1	48,8 ; 57,0	25-44 ans	
12,9	9,6 ; 16,1	13,0	10,0 ; 16,4	3,4**	1,6 ; 5,7	70,7	66,0 ; 75,0	45-64 ans	
P = 0,028									
x	;	x	;	8,2**	1,2 ; 16,5	84,0	72,4 ; 94,0	Statut pondéral	
8,5	6,9 ; 10,4	14,4	12,4 ; 16,6	3,8*	2,6 ; 4,9	73,3	70,5 ; 75,8	Poids insuffisant	
19,3	17,0 ; 21,7	19,8	17,2 ; 22,5	0,4**	0,1 ; 0,9	60,5	57,2 ; 63,4	Poids normal	
35,1	30,3 ; 39,9	20,7	16,9 ; 24,6	x	;	x	;	Embonpoint	
P = 0,073									
x	;	x	;	x	;	x	;	Obésité	
4,4*	2,5 ; 6,9	9,5*	6,6 ; 12,8	5,2*	2,9 ; 7,7	80,9	76,8 ; 84,7	Hommes	
13,6	10,9 ; 16,5	18,8	15,2 ; 22,3	0,7**	0,2 ; 1,4	66,9	62,9 ; 71,0	Poids insuffisant	
32,5	26,0 ; 39,2	18,0	13,2 ; 23,0	x	;	x	;	Poids normal	
P = 0,000									
x	;	x	;	10,8**	1,8 ; 21,6	79,0	65,5 ; 91,7	Embonpoint	
11,5	9,2 ; 14,3	18,1	15,4 ; 21,1	2,7*	1,6 ; 3,9	67,7	63,8 ; 71,0	Obésité	
28,8	24,6 ; 33,3	21,5	17,4 ; 25,8	x	;	x	;	Femmes	
38,6	31,5 ; 45,4	24,4	18,3 ; 30,7	x	;	x	;	Poids insuffisant	
P = 0,000									
33,6	30,7 ; 36,3	22,5	19,9 ; 25,0	x	;	x	;	Poids normal	
x	;	x	;	30,2*	18,9 ; 42,7	66,3	54,4 ; 78,5	Embonpoint	
6,5	5,2 ; 8,0	14,1	12,4 ; 16,0	2,6*	1,7 ; 3,4	76,8	74,5 ; 79,0	Obésité	
P = 0,000									
Perception à l'égard de son poids									
Excès de poids									
Trop maigre									
À peu près normal(e)									

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
34,6	30,0 ; 39,5	13,5	10,2 ; 16,9	4,7*	3,0 ; 6,9	47,1	42,7 ; 52,0	Ensemble de la population	
P = 0,196									
38,2	30,1 ; 46,4	9,2*	4,9 ; 14,0	4,9**	1,8 ; 8,7	47,8	39,3 ; 55,5	Sexe	
32,3	26,8 ; 38,3	16,4	11,8 ; 20,8	4,7*	2,5 ; 7,3	46,7	40,5 ; 52,9	Hommes	
P = 0,171									
39,3*	20,2 ; 59,1	20,9**	6,6 ; 36,4	x	;	x	;	Femmes	
40,8	31,5 ; 50,1	15,7*	9,3 ; 22,4	3,7**	0,8 ; 7,3	39,8	30,7 ; 48,8	Groupe d'âge	
34,4	28,2 ; 40,6	10,5*	6,3 ; 14,8	6,3**	3,0 ; 10,2	48,8	42,6 ; 55,3	15-24 ans	
16,3*	8,9 ; 24,3	11,4**	4,1 ; 20,0	5,9**	1,6 ; 11,0	66,4	55,3 ; 76,7	25-44 ans	
P = 0,932									
49,1**	8,5 ; 84,7	x	;	x	;	48,1**	10,9 ; 88,2	45-64 ans	
44,9*	28,0 ; 61,6	12,7**	1,6 ; 25,8	x	;	x	;	65 ans et plus	
39,1	28,8 ; 49,6	7,3**	2,5 ; 12,9	6,3**	1,0 ; 13,3	47,2	36,4 ; 58,1	Hommes	
13,8**	3,2 ; 26,8	13,6**	1,1 ; 28,3	x	;	x	;	15-24 ans	
P = 0,643									
34,7**	14,1 ; 57,6	29,4**	8,6 ; 51,0	x	;	x	;	25-44 ans	
38,5	27,8 ; 49,8	17,4*	10,0 ; 25,8	x	;	x	;	45-64 ans	
30,7	23,2 ; 39,2	13,0*	6,7 ; 19,2	6,3**	2,4 ; 11,3	50,0	41,2 ; 58,5	65 ans et plus	
18,2**	8,0 ; 29,5	9,7**	1,6 ; 19,2	7,2**	1,4 ; 14,7	64,9	50,8 ; 77,6	Femmes	
P = 0,870									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
41,3	30,2 ; 52,3	13,1**	5,3 ; 21,3	x	;	x	;	Poids insuffisant	
35,6	29,1 ; 42,3	12,0*	7,4 ; 16,8	4,6**	1,8 ; 8,1	47,8	40,4 ; 54,5	Poids normal	
30,3	22,6 ; 38,6	15,3*	9,1 ; 21,6	7,0**	3,2 ; 11,5	47,4	38,6 ; 56,2	Embonpoint	
P = 0,934									
x	;	x	;	x	;	x	;	Obésité	
44,5**	14,8 ; 71,3	x	;	x	;	52,9*	26,5 ; 82,4	Hommes	
37,9	27,2 ; 49,2	8,5**	2,5 ; 15,6	5,9**	1,0 ; 12,0	47,7	36,2 ; 58,8	Poids insuffisant	
37,1*	24,3 ; 49,9	11,8**	4,1 ; 21,0	4,3**	0,2 ; 10,4	46,8	33,4 ; 60,3	Poids normal	
P = 0,808									
x	;	x	;	x	;	x	;	Embonpoint	
40,5*	28,3 ; 52,3	15,5**	6,2 ; 25,3	x	;	x	;	Obésité	
33,7	25,7 ; 42,8	14,8*	7,8 ; 21,7	3,6**	0,6 ; 7,5	47,9	38,4 ; 56,7	Femmes	
22,6*	14,1 ; 32,2	19,1*	10,3 ; 28,5	10,1**	3,8 ; 18,0	48,1	36,7 ; 60,2	Poids normal	
P = 0,808									
x	;	x	;	x	;	x	;	Embonpoint	
40,5*	28,3 ; 52,3	15,5**	6,2 ; 25,3	x	;	x	;	Obésité	
33,7	25,7 ; 42,8	14,8*	7,8 ; 21,7	3,6**	0,6 ; 7,5	47,9	38,4 ; 56,7	Femmes	
22,6*	14,1 ; 32,2	19,1*	10,3 ; 28,5	10,1**	3,8 ; 18,0	48,1	36,7 ; 60,2	Poids normal	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Une fois	Deux fois ou plus	Aucun		Une fois		Deux fois ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	89,1	86,9 ; 90,9	5,4	4,0 ; 6,9	5,5	4,1 ; 7,1
Sexe	P = 0,001			P = 0,227					
Hommes	88,9	6,9	4,2	90,8	87,5 ; 93,6	5,3*	3,0 ; 8,0	3,9*	2,2 ; 6,0
Femmes	85,7	7,5	6,8	87,8	84,9 ; 90,4	5,5*	3,9 ; 7,3	6,6*	4,4 ; 9,1
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,836					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	86,1	75,9 ; 94,4	5,7**	0,1 ; 12,7	8,1**	1,4 ; 16,9
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	90,8	87,2 ; 93,9	5,7*	3,1 ; 8,5	3,6**	1,5 ; 6,1
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	89,2	86,4 ; 91,8	5,0*	3,4 ; 7,0	5,8*	3,8 ; 8,0
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	87,7	82,2 ; 92,6	6,1**	2,8 ; 10,1	6,2**	2,4 ; 10,9
Hommes	P = 0,121			P = 0,956					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	84,7	66,6 ; 97,5	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	95,9	91,0 ; 99,5	x	;	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	90,5	86,2 ; 94,1	5,3**	2,4 ; 8,8	4,3**	1,9 ; 7,2
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	87,3	77,2 ; 95,6	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,870					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	87,1	73,1 ; 98,2	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	87,3	82,1 ; 92,1	7,3*	3,7 ; 11,1	5,4**	2,0 ; 9,6
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	88,3	84,3 ; 91,8	4,8*	2,7 ; 7,2	6,9*	3,8 ; 10,4
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	88,0	81,4 ; 94,0	7,0**	2,5 ; 12,5	5,0**	0,8 ; 10,2
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,098					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	89,8	85,6 ; 93,5	3,7**	1,6 ; 6,2	6,5**	3,3 ; 10,2
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	91,7	88,7 ; 94,2	4,9*	2,9 ; 7,3	3,5**	1,8 ; 5,5
Obésité	82,0	8,7	9,2	85,7	81,3 ; 89,7	7,6*	4,6 ; 11,2	6,6*	3,8 ; 9,8
Hommes	P = 0,002			P = 0,790					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	92,2	84,9 ; 98,1	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	92,9	88,6 ; 96,5	3,7**	0,9 ; 7,3	3,4**	1,2 ; 6,3
Obésité	85,2	8,2	6,6*	86,6	79,6 ; 92,6	8,4**	3,5 ; 14,4	5,0**	1,4 ; 9,4
Femmes	P = 0,034			P = 0,268					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	89,0	83,9 ; 93,7	3,6**	1,2 ; 6,5	7,4**	3,2 ; 12,2
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	90,4	86,3 ; 94,0	6,1*	3,3 ; 9,4	3,5**	1,0 ; 6,5
Obésité	79,1	9,2	11,8	84,8	78,6 ; 90,4	6,8**	3,4 ; 10,8	8,4**	4,0 ; 13,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	6,2	4,7 ; 7,8	93,8	92,2 ; 95,3
Sexe	P = 0,024		P = 0,204			
Hommes	6,6	93,4	5,0*	2,7 ; 7,7	95,0	92,3 ; 97,3
Femmes	8,6	91,4	7,0	5,1 ; 9,1	93,0	90,9 ; 94,9
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,503			
15-24 ans	11,2*	88,8	9,0**	2,1 ; 17,2	91,0	82,8 ; 97,9
25-44 ans	8,0	92,0	6,8*	4,2 ; 10,1	93,2	89,9 ; 95,8
45-64 ans	7,5	92,5	5,4*	3,6 ; 7,4	94,6	92,6 ; 96,4
65 ans et plus	4,9	95,1	4,6**	1,7 ; 8,2	95,4	91,8 ; 98,3
Hommes	P = 0,409		P = 0,377			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	x	;	x	;
45-64 ans	7,0	93,0	4,7**	2,1 ; 7,5	95,3	92,5 ; 97,9
65 ans et plus	6,5*	93,5	3,9**	0,2 ; 8,6	96,1	91,4 ; 99,8
Femmes	P = 0,003		P = 0,653			
15-24 ans	12,3*	87,7	7,8**	1,6 ; 15,6	92,2	84,4 ; 98,4
25-44 ans	9,9	90,1	9,1*	5,2 ; 13,6	90,9	86,4 ; 94,8
45-64 ans	7,8	92,2	6,0*	3,5 ; 9,0	94,0	91,0 ; 96,5
65 ans et plus	3,8*	96,2	5,2**	0,8 ; 10,6	94,8	89,4 ; 99,2
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,015			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	7,1*	4,1 ; 10,7	92,9	89,3 ; 95,9
Embonpoint	6,6	93,4	3,6*	2,1 ; 5,4	96,4	94,6 ; 97,9
Obésité	11,3	88,7	9,0*	5,5 ; 12,9	91,0	87,1 ; 94,5
Hommes	P = 0,000		P = 0,647			
Poids insuffisant	x	91,4*	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	7,3**	0,0 ; 16,4	92,7	83,6 ; 100,0
Embonpoint	5,1*	94,9	3,8**	1,5 ; 6,5	96,2	93,5 ; 98,5
Obésité	11,5	88,5	5,6**	1,5 ; 11,1	94,4	88,9 ; 98,5
Femmes	P = 0,032		P = 0,007			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	7,1*	4,0 ; 10,6	92,9	89,4 ; 96,0
Embonpoint	8,4	91,6	3,4**	1,4 ; 5,8	96,6	94,2 ; 98,6
Obésité	11,1	88,9	12,6*	7,1 ; 18,8	87,4	81,2 ; 92,9

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	0,8**	0,3 ; 1,5	x	;	x	;
Rarement	2,8	2,6*	2,9	2,3*	1,4 ; 3,4	3,1**	1,5 ; 5,3	1,7**	0,7 ; 2,8
Jamais	94,8	94,8	94,8	96,3	94,9 ; 97,5	94,9	92,3 ; 97,2	97,2	95,8 ; 98,5
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,187					
Souvent	4,6	4,2	4,9	3,0*	1,9 ; 4,3	3,1**	1,1 ; 5,6	2,9*	1,6 ; 4,3
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	6,6	5,0 ; 8,3	6,7*	4,5 ; 9,3	6,5*	4,4 ; 8,7
Rarement	5,1	5,5	4,9	5,0*	3,5 ; 6,7	7,0*	4,2 ; 10,2	3,5*	2,1 ; 5,2
Jamais	82,9	81,4	84,0	85,4	83,0 ; 87,8	83,1	78,9 ; 87,0	87,1	84,1 ; 90,0
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,095					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	2,0*	1,2 ; 2,9	1,2**	0,3 ; 2,1	2,7*	1,4 ; 4,1
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	5,7	4,2 ; 7,3	4,8*	2,5 ; 7,4	6,4*	4,5 ; 8,6
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,1*	2,7 ; 5,6	2,8**	1,3 ; 4,7	5,0*	2,9 ; 7,3
Jamais	86,5	87,5	85,7	88,2	86,0 ; 90,3	91,2	88,1 ; 94,2	86,0	82,9 ; 89,0
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	1,0**	0,5 ; 1,8	1,2**	0,2 ; 2,6	0,9**	0,2 ; 1,9
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,3	97,4 ; 99,0	98,8	97,4 ; 99,8	97,9	96,6 ; 99,0
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	98,8	98,0 ; 99,5	99,1	97,8 ; 99,9	98,6	97,5 ; 99,6
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	0,3**	0,0 ; 0,7	x	;	0,5**	0,0 ; 1,2
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	0,6**	0,2 ; 1,2	x	;	0,9**	0,2 ; 1,8
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	0,5**	0,1 ; 0,9	x	;	0,7**	0,1 ; 1,4
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,6	97,9 ; 99,3	99,5	98,8 ; 100,0	97,9	96,8 ; 98,9
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	0,5**	0,2 ; 1,0	x	;	0,7**	0,1 ; 1,4
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,1	98,5 ; 99,6	99,6	98,9 ; 100,0	98,7	97,7 ; 99,5
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,3**	0,5 ; 2,2	x	;	1,7**	0,6 ; 3,1
Jamais	97,3	98,6	96,3	98,2	97,2 ; 99,0	99,2	98,2 ; 100,0	97,4	95,8 ; 98,7

Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Commencer ou recommencer à fumer	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	0,5**	0,2 ; 0,9	x	;	0,8**	0,2 ; 1,5
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	0,5**	0,0 ; 1,0	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	98,4	97,4 ; 99,2	99,4	98,6 ; 99,9	97,7	96,2 ; 99,0
Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,4	98,8 ; 100,0	99,4	98,1 ; 100,0	99,5	98,7 ; 100,0
Se faire vomir	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,7	99,2 ; 100,0	x	;	99,5	98,7 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
5,3*	3,8 ; 7,1	38,5	35,0 ; 42,0	41,1	37,9 ; 44,5	15,1	12,7 ; 17,6	Ensemble de la population	
P = 0,005									
Sexe									
7,0*	4,2 ; 10,2	44,1	38,1 ; 49,7	35,8	30,8 ; 41,2	13,1	9,4 ; 17,1	Hommes	
4,1*	2,4 ; 6,2	34,4	30,4 ; 38,6	44,9	40,6 ; 49,4	16,5	13,4 ; 19,8	Femmes	
P = 0,711									
Groupe d'âge									
x	;	40,6*	26,3 ; 55,0	39,6*	26,8 ; 52,9	x	;	15-24 ans	
6,3**	3,2 ; 10,0	33,8	28,0 ; 39,5	40,1	34,0 ; 46,5	19,7	14,8 ; 24,7	25-44 ans	
4,8*	2,8 ; 7,0	39,2	34,4 ; 43,8	42,5	38,1 ; 47,0	13,5	10,4 ; 16,7	45-64 ans	
5,8**	1,9 ; 10,2	44,7	36,6 ; 53,0	39,5	31,5 ; 47,9	10,1*	5,5 ; 15,1	65 ans et plus	
P = 0,871									
Hommes									
x	;	58,7*	32,4 ; 82,6	25,8**	7,3 ; 49,2	x	;	15-24 ans	
7,7**	3,0 ; 13,6	34,0	23,9 ; 43,9	40,5	30,1 ; 51,5	17,8*	9,8 ; 26,4	25-44 ans	
6,8**	3,1 ; 11,0	44,0	36,4 ; 51,7	36,5	29,2 ; 43,9	12,7*	7,5 ; 18,3	45-64 ans	
x	;	53,3	40,4 ; 66,4	32,2*	20,2 ; 44,2	x	;	65 ans et plus	
P = 0,835									
Femmes									
x	;	28,8**	14,7 ; 46,5	48,6*	31,7 ; 64,4	x	;	15-24 ans	
5,3**	1,1 ; 10,5	33,7	26,3 ; 41,2	39,9	32,2 ; 48,2	21,1*	14,7 ; 27,6	25-44 ans	
3,3**	1,3 ; 5,7	35,6	29,9 ; 41,2	47,0	41,2 ; 53,1	14,1	10,1 ; 18,5	45-64 ans	
5,1**	0,5 ; 10,3	37,8	28,1 ; 47,9	45,2	35,0 ; 55,2	11,9**	5,8 ; 19,0	65 ans et plus	
P = 0,199									
Statut pondéral									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
6,4*	3,4 ; 10,0	39,2	32,8 ; 45,7	38,9	32,7 ; 45,1	15,4	11,1 ; 20,3	Poids normal	
5,9*	3,3 ; 8,9	41,3	36,3 ; 46,5	37,0	32,5 ; 41,9	15,7	12,0 ; 19,8	Embonpoint	
3,4**	1,3 ; 5,9	33,4	27,4 ; 39,8	48,9	42,3 ; 55,8	14,2*	9,6 ; 19,2	Obésité	
P = 0,331									
Hommes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
8,6**	2,4 ; 16,4	53,5	37,3 ; 67,4	25,7*	15,0 ; 39,1	12,2**	3,9 ; 23,3	Poids normal	
7,7**	3,3 ; 12,5	46,1	38,4 ; 53,9	34,6	27,8 ; 41,8	11,6*	6,9 ; 17,1	Embonpoint	
4,9**	1,3 ; 9,5	35,5	26,9 ; 44,9	43,9	33,7 ; 54,1	15,7*	8,2 ; 23,4	Obésité	
P = 0,441									
Femmes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
5,8**	2,4 ; 10,0	34,7	28,0 ; 41,8	43,1	35,9 ; 50,4	16,4*	11,3 ; 21,8	Poids normal	
4,1**	1,3 ; 7,4	36,3	29,8 ; 43,1	39,6	33,3 ; 46,7	20,0	14,0 ; 26,1	Embonpoint	
x	;	31,2	22,7 ; 40,2	54,4	44,9 ; 63,7	x	;	Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>									
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	47,6	44,3 ; 51,2	53,0	47,1 ; 58,5	43,6	39,6 ; 47,9
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	37,4	33,9 ; 40,7	32,7	27,4 ; 38,1	40,9	36,5 ; 44,9
Non	14,4	15,3	13,7	15,0	12,7 ; 17,4	14,3	10,6 ; 18,2	15,5	12,6 ; 18,5
		<b>P = 0,018</b>					<b>P = 0,023</b>		
<b>Diminuer les portions</b>									
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	42,5	39,1 ; 45,7	38,9	33,6 ; 44,3	45,1	40,8 ; 49,4
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	36,3	33,0 ; 39,5	37,1	31,9 ; 42,5	35,7	31,8 ; 40,0
Non	19,6	22,6	17,4	21,2	18,5 ; 24,2	24,0	18,8 ; 29,2	19,2	15,9 ; 22,7
		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,132</b>		
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>									
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	44,1	40,7 ; 47,5	37,7	32,5 ; 43,3	48,8	44,5 ; 52,8
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	25,5	22,6 ; 28,5	23,8	19,2 ; 28,7	26,8	23,2 ; 30,8
Non	27,7	32,4	24,3	30,4	27,3 ; 33,4	38,5	33,3 ; 43,8	24,4	20,9 ; 27,8
		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,000</b>		
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>									
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	44,4	41,0 ; 47,8	40,6	35,2 ; 46,3	47,1	42,8 ; 51,3
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	28,7	25,6 ; 31,7	29,5	24,5 ; 34,8	28,1	24,5 ; 32,0
Non	26,1	27,4	25,1	27,0	23,9 ; 30,0	30,0	25,0 ; 35,4	24,8	21,1 ; 28,5
		<b>P = 0,014</b>					<b>P = 0,129</b>		
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>									
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	59,8	56,5 ; 63,0	53,9	48,5 ; 59,4	64,1	60,0 ; 68,4
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	23,0	20,1 ; 25,8	28,1	23,4 ; 33,3	19,3	15,8 ; 22,7
Non	17,4	18,5	16,6	17,2	14,8 ; 19,8	18,0	14,0 ; 22,2	16,7	13,7 ; 20,1
		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,006</b>		
<b>Manger des aliments moins gras</b>									
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	61,2	57,8 ; 64,6	53,2	47,5 ; 58,9	67,0	62,9 ; 71,1
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	27,4	24,2 ; 30,4	32,9	27,6 ; 38,1	23,4	19,6 ; 27,1
Non	12,6	14,0	11,6	11,4	9,4 ; 13,7	13,9	10,3 ; 18,2	9,5	7,3 ; 12,1
		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,000</b>		
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>									
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	49,2	45,9 ; 52,5	45,1	39,6 ; 50,5	52,1	47,9 ; 56,1
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	29,6	26,6 ; 32,7	30,3	25,2 ; 35,4	29,0	25,2 ; 32,9
Non	21,5	24,4	19,4	21,3	18,6 ; 24,1	24,5	19,9 ; 29,6	18,9	15,6 ; 22,4
		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,078</b>		
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>									
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	11,2	9,0 ; 13,4	10,3*	7,2 ; 13,6	11,9	9,1 ; 14,9
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	15,6	13,2 ; 18,3	19,1	15,0 ; 23,4	13,0	10,1 ; 16,1
Non	72,0	67,3	75,4	73,2	70,2 ; 76,2	70,6	65,4 ; 75,3	75,1	71,4 ; 78,9
		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,058</b>		
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>									
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	34,7	31,6 ; 37,9	36,3	31,4 ; 41,5	33,6	29,8 ; 37,8
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	15,4	13,0 ; 17,9	17,5	13,4 ; 21,9	13,8	10,8 ; 16,9
Non	49,9	43,2	54,7	49,9	46,5 ; 53,2	46,2	40,6 ; 51,6	52,6	48,4 ; 56,8
		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,148</b>		



Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,002				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	52,8	49,6 ; 56,1	46,4	41,1 ; 52,0	57,4	53,4 ; 61,4	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	18,5	15,9 ; 21,3	23,3	18,7 ; 28,2	15,0	12,1 ; 18,0	
Non	29,6	28,8	30,2	28,7	25,6 ; 31,7	30,3	25,4 ; 35,5	27,6	23,9 ; 31,3	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,001				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	33,7	30,6 ; 37,0	26,8	21,8 ; 31,8	38,7	34,8 ; 42,9	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	13,1	10,8 ; 15,5	12,1	8,9 ; 15,6	13,8	10,6 ; 17,2	
Non	48,5	52,0	45,9	53,2	49,7 ; 56,6	61,1	55,4 ; 66,3	47,5	43,3 ; 51,8	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,057				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	33,1	29,9 ; 36,4	33,9	28,6 ; 39,4	32,5	28,6 ; 36,6	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	23,3	20,2 ; 26,3	26,7	22,0 ; 31,8	20,8	17,1 ; 24,6	
Non	37,5	34,7	39,5	43,6	40,4 ; 46,9	39,4	34,1 ; 44,6	46,7	42,7 ; 50,9	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
55,4	53,6 ; 57,2	31,3	29,5 ; 33,1	13,3	11,9 ; 14,8	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
47,5	44,7 ; 50,2	34,2	31,4 ; 37,1	18,3	15,9 ; 20,7	Hommes
63,3	60,8 ; 65,6	28,4	26,0 ; 30,8	8,3	6,7 ; 9,9	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
53,7	43,1 ; 64,4	10,7**	5,1 ; 17,6	35,5	25,4 ; 46,3	15-17 ans
25,9	18,4 ; 33,8	38,7	30,2 ; 47,3	35,4	27,1 ; 44,2	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
38,1	31,9 ; 44,6	26,4	20,8 ; 32,1	35,5	29,4 ; 41,8	25-44 ans
33,9	30,4 ; 37,5	48,4	44,7 ; 52,2	17,7	14,8 ; 20,8	45-64 ans
62,9	60,0 ; 65,7	31,1	28,4 ; 33,9	6,0	4,5 ; 7,7	65 ans et plus
95,5	93,9 ; 96,9	x	;	x	;	
		P = 0,000				Hommes
45,4*	29,9 ; 61,2	9,4**	1,3 ; 20,7	45,1*	29,5 ; 61,4	15-17 ans
23,4*	12,6 ; 35,6	31,7*	19,0 ; 44,1	44,8	32,0 ; 58,8	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
32,9	23,6 ; 42,5	22,1*	14,0 ; 31,0	44,9	35,1 ; 55,1	25-44 ans
26,9	22,3 ; 31,6	50,2	44,7 ; 55,9	22,9	18,1 ; 28,0	45-64 ans
54,2	49,8 ; 58,8	36,1	32,0 ; 40,4	9,6	7,0 ; 12,7	65 ans et plus
92,6	89,3 ; 95,4	x	;	x	;	
		P = 0,000				Femmes
62,2	48,6 ; 74,9	12,1**	5,0 ; 20,3	25,7*	14,2 ; 38,6	15-17 ans
28,6*	17,6 ; 39,9	46,3	34,8 ; 57,8	25,1*	16,3 ; 35,1	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
43,6	35,1 ; 52,1	31,0	23,4 ; 38,5	25,4	18,4 ; 33,1	25-44 ans
41,3	36,4 ; 46,1	46,5	41,4 ; 51,4	12,2*	8,7 ; 15,9	45-64 ans
71,7	67,8 ; 75,3	26,1	22,5 ; 29,9	2,3*	1,2 ; 3,5	65 ans et plus
97,8	96,3 ; 99,0	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	43,9	50,1	37,9	42,3	40,6 ; 44,2	50,2	47,5 ; 53,0	34,4	32,2 ; 36,9
Non	56,1	49,9	62,1	57,7	55,8 ; 59,4	49,8	47,0 ; 52,5	65,6	63,1 ; 67,8
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	10,6	14,4	6,8	10,1	8,9 ; 11,4	14,3	12,1 ; 16,5	6,0	4,8 ; 7,3
Non	89,4	85,6	93,2	89,9	88,6 ; 91,1	85,7	83,5 ; 87,9	94,0	92,7 ; 95,2
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,001			
Oui	7,3	9,1	5,5	7,3	6,1 ; 8,4	9,1	7,2 ; 11,0	5,5	4,2 ; 6,8
Non	92,7	90,9	94,5	92,7	91,6 ; 93,9	90,9	89,0 ; 92,8	94,5	93,2 ; 95,8
<b>Ecstasy</b>		P = 0,000				P = 0,413			
Oui	5,1	6,3	3,9	3,6	2,8 ; 4,5	4,0*	2,7 ; 5,5	3,3*	2,2 ; 4,5
Non	94,9	93,7	96,1	96,4	95,5 ; 97,2	96,0	94,5 ; 97,3	96,7	95,5 ; 97,8
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,3	16,1	8,7	13,4	12,0 ; 14,8	17,8	15,3 ; 20,1	9,1	7,7 ; 10,6
Non	87,7	83,9	91,3	86,6	85,2 ; 88,0	82,2	79,9 ; 84,7	90,9	89,4 ; 92,3
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,071				P = 0,694			
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,2**	0,1 ; 0,3	x	;	0,2**	0,0 ; 0,5
Non	99,5	99,4	99,6	99,8	99,7 ; 99,9	x	;	99,8	99,5 ; 100,0
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,000				P = 0,006			
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,7**	0,4 ; 1,1	1,2**	0,5 ; 2,0	0,2**	0,0 ; 0,4
Non	99,5	99,2	99,7	99,3	98,9 ; 99,6	98,8	98,0 ; 99,5	99,8	99,6 ; 100,0
<b>Kétamine</b>		P = 0,000				P = 0,259			
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,4**	0,1 ; 0,8	0,6**	0,0 ; 1,3	0,2**	0,0 ; 0,5
Non	99,2	98,8	99,7	99,6	99,2 ; 99,9	99,4	98,7 ; 100,0	99,8	99,5 ; 100,0
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,179				P = 0,193			
Oui	1,8	1,9	1,6	1,8*	1,2 ; 2,4	2,2*	1,2 ; 3,3	1,4**	0,7 ; 2,2
Non	98,2	98,1	98,4	98,2	97,6 ; 98,8	97,8	96,7 ; 98,8	98,6	97,8 ; 99,3
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,000				P = 0,010			
Oui	1,6	2,3	0,9	3,0	2,2 ; 3,9	4,1*	2,8 ; 5,7	1,9*	1,1 ; 2,8
Non	98,4	97,7	99,1	97,0	96,1 ; 97,8	95,9	94,3 ; 97,2	98,1	97,2 ; 98,9
<b>Drogues par injection</b>		P = 0,000				P = 0,476			
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,5**	0,3 ; 0,8	0,6**	0,2 ; 1,1	0,4**	0,1 ; 0,8
Non	99,5	99,3	99,8	99,5	99,2 ; 99,7	99,4	98,9 ; 99,8	99,6	99,2 ; 99,9

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	12,2	16,2	8,3	12,0	10,7 ; 13,5	16,8	14,7 ; 19,3	7,2	5,8 ; 8,8	
Non	87,8	83,8	91,7	88,0	86,5 ; 89,3	83,2	80,7 ; 85,3	92,8	91,2 ; 94,2	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,039				
Oui	1,6	2,3	0,8	1,8*	1,2 ; 2,5	2,5*	1,5 ; 3,6	1,2**	0,6 ; 1,9	
Non	98,4	97,7	99,2	98,2	97,5 ; 98,8	97,5	96,4 ; 98,5	98,8	98,1 ; 99,4	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,426				
Oui	1,8	2,4	1,3	1,8*	1,3 ; 2,4	2,1*	1,2 ; 3,1	1,6*	0,9 ; 2,3	
Non	98,2	97,6	98,7	98,2	97,6 ; 98,7	97,9	96,9 ; 98,8	98,4	97,7 ; 99,1	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,537				
Oui	1,4	1,7	1,0	0,9*	0,5 ; 1,4	1,1**	0,5 ; 1,8	0,7**	0,3 ; 1,4	
Non	98,6	98,3	99,0	99,1	98,6 ; 99,5	98,9	98,2 ; 99,5	99,3	98,6 ; 99,7	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,112				
Oui	0,8	1,2	0,4*	1,1*	0,7 ; 1,6	1,5**	0,8 ; 2,4	0,7**	0,3 ; 1,3	
Non	99,2	98,8	99,6	98,9	98,4 ; 99,3	98,5	97,6 ; 99,2	99,3	98,7 ; 99,7	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 0,134				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = 0,180				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,602				
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,4**	0,1 ; 0,7	x	;	0,5**	0,1 ; 1,0	
Non	99,6	99,6	99,7	99,6	99,3 ; 99,9	x	;	99,5	99,0 ; 99,9	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = 0,353				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	13,3	11,9 ; 14,8	18,3	15,9 ; 20,7	8,3	6,7 ; 9,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	35,5	25,4 ; 46,3	45,1*	29,5 ; 61,4	25,7*	14,2 ; 38,6
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	35,4	27,1 ; 44,2	44,8	32,0 ; 58,8	25,1*	16,3 ; 35,1
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	17,7	14,8 ; 20,8	22,9	18,1 ; 28,0	12,2*	8,7 ; 15,9
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	6,0	4,5 ; 7,7	9,6	7,0 ; 12,7	2,3*	1,2 ; 3,5
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	25,9	24,1 ; 27,6	8,0	6,9 ; 9,2	10,7	9,5 ; 12,2
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	28,7	25,9 ; 31,5	9,5	7,8 ; 11,5	14,4	12,2 ; 16,7
Femmes	25,4	6,8	7,4	23,0	20,8 ; 25,5	6,5	5,2 ; 8,0	7,1	5,8 ; 8,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	32,4*	23,2 ; 42,4	5,7**	1,0 ; 12,2	8,2**	3,6 ; 13,9
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	37,5	29,2 ; 45,7	12,6*	7,0 ; 18,7	24,2*	17,3 ; 31,9
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	35,2	28,7 ; 41,6	9,6*	5,8 ; 13,9	17,2	12,8 ; 22,4
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	32,7	29,1 ; 36,5	14,5	11,9 ; 17,3	19,0	15,9 ; 22,3
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	25,4	22,8 ; 28,3	5,7	4,4 ; 7,0	6,0	4,6 ; 7,6
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	4,2*	2,8 ; 5,8	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	38,5*	22,8 ; 54,4	8,0**	0,0 ; 19,5	8,0**	1,3 ; 16,3
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	35,0*	22,2 ; 48,5	10,5**	2,4 ; 20,1	31,3*	19,8 ; 43,8
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	36,5	26,5 ; 46,7	9,4**	3,7 ; 16,6	21,3*	13,8 ; 29,6
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	33,6	28,4 ; 38,9	16,1	12,1 ; 20,4	23,5	18,3 ; 28,7
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	29,0	25,1 ; 33,2	7,6	5,5 ; 9,8	9,2*	6,7 ; 11,9
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	6,8*	4,0 ; 10,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	26,1*	15,0 ; 38,3	x	;	8,4**	1,4 ; 16,2
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	40,2	29,1 ; 51,1	14,9**	6,9 ; 23,8	16,4*	9,3 ; 25,1
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	33,9	26,0 ; 41,9	9,7*	4,9 ; 15,0	12,8*	7,9 ; 18,5
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	31,7	26,8 ; 36,2	12,7	9,2 ; 16,4	14,3	10,8 ; 18,3
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	21,8	18,5 ; 25,3	3,7*	2,3 ; 5,4	2,8*	1,6 ; 4,1
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	2,2**	1,0 ; 3,7	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	80,1	78,6 ; 81,4	84,0	81,9 ; 86,1	76,1	74,1 ; 78,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	48,8	38,6 ; 59,1	49,6*	33,2 ; 65,1	48,1	33,7 ; 61,9
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	84,7	76,5 ; 91,8	80,8	68,5 ; 92,4	89,0	79,7 ; 97,0
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	69,0	62,5 ; 75,3	67,5	57,4 ; 77,3	70,6	62,0 ; 78,6
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	96,0	94,3 ; 97,6	95,6	92,8 ; 98,0	96,4	94,4 ; 98,2
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	85,8	83,9 ; 87,6	90,1	87,7 ; 92,4	81,3	78,2 ; 84,2
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	62,7	59,1 ; 66,2	70,9	65,6 ; 75,8	54,6	49,9 ; 59,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	83,8	80,8 ; 86,6	85,0	80,4 ; 89,5	82,6	78,7 ; 86,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	89,8	87,5 ; 92,0	92,7	89,2 ; 95,8	86,8	83,4 ; 89,8
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	88,6	85,8 ; 91,0	91,0	86,9 ; 94,4	86,5	82,5 ; 90,1
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	90,4	88,9 ; 91,7	88,7	86,4 ; 90,8	92,2	90,4 ; 93,8
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	8,4	7,1 ; 9,7	9,3	7,4 ; 11,4	7,3	5,6 ; 9,0
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,3*	0,7 ; 2,0	2,0**	1,0 ; 3,2	0,5**	0,1 ; 1,0
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	46,9	45,9 ; 48,0	0,8**	0,4 ; 1,3	98,2	97,2 ; 99,0
Femmes	51,5	97,5	0,8	52,5	51,5 ; 53,5	99,0	98,4 ; 99,5	0,9**	0,3 ; 1,6
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,6**	0,2 ; 0,9	x	;	0,9**	0,3 ; 1,6

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	90,4	88,9 ; 91,7	8,4	7,1 ; 9,7	1,3*	0,7 ; 2,0
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,012					
Hommes	86,4	10,7	2,9	88,7	86,4 ; 90,8	9,3	7,4 ; 11,4	2,0**	1,0 ; 3,2
Femmes	91,6	7,4	0,9*	92,2	90,4 ; 93,8	7,3	5,6 ; 9,0	0,5**	0,1 ; 1,0
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	72,2	57,9 ; 84,9	20,5**	9,7 ; 33,4	7,3**	0,0 ; 16,6
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	67,1	58,2 ; 75,3	25,6*	18,2 ; 34,0	7,3**	2,7 ; 12,9
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	68,7	61,0 ; 75,1	24,0	17,9 ; 31,0	7,3**	3,3 ; 12,0
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	90,1	87,7 ; 92,4	9,4	7,0 ; 11,8	0,6**	0,1 ; 1,1
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	95,9	94,5 ; 97,0	3,9*	2,8 ; 5,2	0,2**	0,0 ; 0,5
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	98,0	96,4 ; 99,3	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,245					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	50,3**	20,2 ; 79,5	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	89,2	86,9 ; 91,3	8,8	7,0 ; 10,8	2,0**	1,0 ; 3,2
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,051					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	93,1	91,3 ; 94,7	6,7	5,1 ; 8,4	0,3**	0,0 ; 0,6
Femmes	92,1	x	x	92,5	68,8 ; 100,0	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	44,7	41,6 ; 47,7	67,1	63,3 ; 70,6
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000	...	...	...
15-24 ans	87,9	...	85,3	75,8 ; 93,7	...	;
25-44 ans	62,4	...	60,9	55,2 ; 66,7	...	;
45-64 ans	29,9	...	29,1	24,8 ; 33,3	...	;
65 ans et plus	7,3	...	4,0**	1,5 ; 7,0	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...	...	P = 0,000	...
15-24 ans	...	90,0	...	;	93,7	89,3 ; 97,3
25-34 ans	...	71,0	...	;	70,3	63,6 ; 77,0
35-49 ans	...	53,5	...	;	53,4	47,6 ; 58,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,001	...	P = 0,617	...
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	32,4	25,9 ; 38,6	73,1	62,5 ; 82,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	49,1	43,2 ; 54,9	67,4	60,4 ; 74,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	49,5	43,6 ; 55,7	66,5	60,1 ; 72,6
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	45,5	37,3 ; 53,7	64,0	55,1 ; 72,5
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	...	P = 0,006	...
Un partenaire	43,8	64,2	41,0	37,8 ; 44,2	65,1	60,9 ; 68,9
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	73,6	62,5 ; 83,1	83,2	71,7 ; 92,0
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	79,9*	50,8 ; 100,0	90,8	57,7 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = 0,584	...	P = 0,058	...
Hommes	x	66,6	x	;	66,8	63,0 ; 70,3
Femmes	47,8	x	44,6	41,5 ; 47,7	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	89,0	55,8 ; 100,0

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	9,0	7,7 ; 10,3	12,2	10,7 ; 13,8	78,9	77,1 ; 80,6
Sexe	P = 0,093			P = 0,806					
Hommes	14,8	14,9	70,3	9,1	7,2 ; 11,1	12,6	10,4 ; 15,0	78,3	75,7 ; 80,9
Femmes	13,2	14,7	72,1	8,8	7,0 ; 10,7	11,7	9,8 ; 13,8	79,5	77,1 ; 81,8
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	53,0	37,3 ; 67,7	31,2*	18,6 ; 45,2	15,9**	6,0 ; 28,5
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	29,1	20,6 ; 37,9	43,6	34,3 ; 53,0	27,3	19,7 ; 35,5
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	36,5	28,9 ; 44,1	39,7	32,5 ; 47,8	23,7	17,5 ; 30,4
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	8,6	6,5 ; 10,8	14,6	11,7 ; 17,5	76,8	73,4 ; 80,1
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	2,5*	1,6 ; 3,5	3,9*	2,8 ; 5,2	93,6	92,1 ; 94,9
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	x	;	x	;	98,5	97,1 ; 99,6
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,046					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	11,4*	7,8 ; 15,1	9,8*	6,6 ; 13,1	78,8	74,5 ; 83,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	10,6	7,8 ; 13,3	14,0	11,0 ; 17,3	75,4	71,6 ; 79,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	7,1*	5,0 ; 9,5	13,3	10,3 ; 16,4	79,5	75,9 ; 82,9
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	6,4*	4,0 ; 9,2	10,1*	6,9 ; 13,5	83,5	79,3 ; 87,3
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	7,1	5,8 ; 8,4	8,8	7,4 ; 10,3	84,2	82,4 ; 85,8
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	28,5	21,1 ; 36,9	40,2	31,2 ; 48,7	31,3	24,2 ; 39,1
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	17,5**	3,7 ; 37,6	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	13,3	11,8 ; 14,8	13,7	11,6 ; 16,0	12,8	10,8 ; 14,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	68,9	54,0 ; 82,1	62,4*	38,9 ; 87,1	75,5	57,9 ; 88,9
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	47,5	37,9 ; 56,4	52,4	38,0 ; 65,9	42,3	30,1 ; 54,1
	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	53,6	58,8	48,5	54,2	46,1 ; 61,7	55,5	43,4 ; 67,2	52,9	42,5 ; 62,5
25-44 ans	21,0	22,1	19,8	12,7	10,3 ; 15,2	14,1	10,0 ; 18,2	11,3	8,4 ; 14,3
45-64 ans	8,3	8,9	7,7	3,7	2,7 ; 4,8	4,0*	2,7 ; 5,5	3,4*	1,9 ; 5,2
65 ans et plus	3,1*	3,9*	1,8**	0,5**	0,0 ; 1,1	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,008		P = 0,199		P = 0,006	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	16,2	12,2 ; 20,4	17,9*	12,0 ; 24,0	14,1*	9,0 ; 19,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	16,0	12,7 ; 19,3	14,1*	10,1 ; 18,4	18,1	13,2 ; 23,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	10,9	8,4 ; 13,8	12,6*	8,6 ; 17,2	9,0*	5,9 ; 12,4
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	9,2*	6,4 ; 12,4	9,2**	4,6 ; 14,4	9,1*	5,4 ; 13,1
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	10,3	8,8 ; 11,8	9,5	7,4 ; 11,6	11,2	9,2 ; 13,3
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	41,4	33,1 ; 50,1	49,1	37,7 ; 60,4	30,6*	19,1 ; 42,2
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	41,9**	19,2 ; 66,2	40,2**	15,1 ; 70,4	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,677		P = 0,017		P = 0,288	
Hommes	18,7	54,0	17,9	12,9	10,9 ; 15,0	46,0**	17,7 ; 82,5	12,6	10,6 ; 14,7
Femmes	19,2	19,2	x	13,5	11,4 ; 15,8	13,5	11,4 ; 15,8	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	6,6	5,6 ; 7,6	5,7	4,4 ; 7,2	7,6	6,1 ; 9,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	2,9**	0,9 ; 5,7	x	;	4,1**	1,0 ; 7,9
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	2,0**	0,6 ; 3,7	x	;	2,8**	0,7 ; 5,5
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	12,5	10,0 ; 15,1	11,0*	7,2 ; 14,9	14,2	10,5 ; 18,0
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	5,8	4,3 ; 7,4	5,0*	3,1 ; 7,0	6,7*	4,4 ; 9,2
	2,7	3,2*	2,2	1,4**	0,6 ; 2,3	x	;	1,9**	0,6 ; 3,4
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,012	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	2,2**	1,1 ; 3,4	1,3**	0,3 ; 2,7	3,1**	1,4 ; 5,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	7,2	5,1 ; 9,3	4,8*	2,6 ; 7,2	9,6*	6,1 ; 13,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	7,8	5,9 ; 10,0	6,3*	3,5 ; 9,3	9,4*	6,7 ; 12,5
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	10,9*	7,7 ; 14,6	14,3*	8,1 ; 20,8	8,0*	4,7 ; 11,8
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,077		P = 0,382		P = 0,072	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	6,5	5,3 ; 7,7	5,7	4,1 ; 7,5	7,2	5,5 ; 9,0
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	9,4*	5,2 ; 14,0	7,0**	2,5 ; 13,0	12,7**	5,3 ; 20,9
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	17,3**	3,5 ; 38,5	14,7**	0,0 ; 39,4	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,192		P = 0,223		P = 0,802	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	7,9	6,1 ; 9,7	x	;	7,8	6,1 ; 9,6
Femmes	7,0	7,0	8,9**	5,9	4,4 ; 7,6	6,0	4,4 ; 7,7	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,005		P = 0,103		P = 0,023	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	26,6**	7,1 ; 53,1	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	6,7	5,6 ; 7,7	5,8	4,3 ; 7,3	7,6	6,1 ; 9,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	25,2	19,1 ; 32,3	74,8	67,7 ; 80,9
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,793			
15-35 ans	25,6	74,4	25,6	19,1 ; 33,2	74,4	66,8 ; 80,9
36-49 ans	10,5*	89,5	22,2**	3,2 ; 43,8	77,8	56,2 ; 96,8
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,353			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	23,0**	7,3 ; 41,5	77,0	58,5 ; 92,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	33,8*	20,7 ; 49,9	66,2	50,1 ; 79,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	22,8*	12,2 ; 35,2	77,2	64,8 ; 87,8
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	17,2**	5,7 ; 31,3	82,8	68,7 ; 94,3
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	25,7	19,6 ; 32,9	74,3	67,1 ; 80,4
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Saguenay-Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	64,6	61,8 ; 67,2	21,8	19,7 ; 24,1	13,6	11,6 ; 15,7
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,010					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	71,9	61,2 ; 82,6	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	74,3	69,5 ; 78,7	12,1	8,8 ; 15,7	13,6	10,1 ; 17,6
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	57,2	53,8 ; 60,6	31,8	28,6 ; 35,1	11,0	8,9 ; 13,2
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	48,3	42,2 ; 54,6	34,2	28,5 ; 40,2	17,5	13,1 ; 22,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	60,8	55,4 ; 66,1	23,6	19,4 ; 28,2	15,5	11,2 ; 20,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	72,3	67,5 ; 76,8	16,3	12,8 ; 19,9	11,4*	8,1 ; 15,0
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	72,7	66,7 ; 78,4	16,6	12,0 ; 21,4	10,7*	6,5 ; 15,3
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,891					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	64,4	61,5 ; 67,0	22,1	19,9 ; 24,4	13,6	11,6 ; 15,7
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	81,1*	41,5 ; 100,0	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 03

# **CAPITALE-NATIONALE**

---





## 1

## CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes	Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
Ensemble de la population		49,4	50,6			49,0	48,9 ; 49,0	51,0	51,0 ; 51,1
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000				P = 0,000			
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	14,8	14,8 ; 14,8	15,3	15,3 ; 15,4	14,3	14,3 ; 14,4
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	32,1	32,1 ; 32,1	33,8	33,8 ; 33,9	30,4	30,4 ; 30,5
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	35,9	35,9 ; 35,9	35,7	35,7 ; 35,8	36,1	36,1 ; 36,2
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	17,2	17,2 ; 17,2	15,1	15,1 ; 15,2	19,1	19,1 ; 19,2
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Personne seule	13,4	10,7	16,0	14,8	13,5 ; 16,2	10,1	8,6 ; 11,9	19,3	17,4 ; 21,4
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	32,2	30,2 ; 34,3	35,6	32,6 ; 38,9	28,9	26,3 ; 31,8
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	38,1	35,7 ; 40,3	41,1	37,5 ; 44,4	35,1	31,9 ; 38,1
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	7,4	6,2 ; 8,8	5,5	3,9 ; 7,2	9,3	7,5 ; 11,4
Autre	6,7	6,5	6,9	7,4	6,1 ; 8,8	7,6	5,5 ; 9,9	7,3	5,4 ; 9,2
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>		P = 0,256				P = 0,251			
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	95,0	93,9 ; 96,2	94,0	92,1 ; 95,9	96,0	94,6 ; 97,4
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	1,2**	0,6 ; 1,8	1,5**	0,5 ; 2,7	0,9**	0,3 ; 1,5
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	3,8	2,8 ; 4,8	4,5*	3,0 ; 6,1	3,1*	1,9 ; 4,4
<b>Langue parlée à la maison</b>		P = 0,912				P = 0,246			
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	98,1	97,2 ; 98,9	97,9	96,4 ; 99,1	98,3	97,2 ; 99,2
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	0,6**	0,2 ; 1,0	x	;	1,0**	0,3 ; 1,9
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	1,3**	0,7 ; 2,1	x	;	0,7**	0,1 ; 1,5
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,683				P = 0,009			
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	20,1	18,2 ; 21,9	17,2	14,5 ; 19,9	22,9	20,3 ; 25,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	23,5	21,4 ; 25,7	23,8	20,5 ; 27,0	23,3	20,5 ; 26,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	28,9	26,8 ; 31,2	31,6	28,1 ; 35,3	26,3	23,6 ; 29,2
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	27,5	25,4 ; 29,6	27,4	24,3 ; 30,7	27,6	24,9 ; 30,3
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	16,4	14,7 ; 18,3	12,7	10,3 ; 15,4	19,9	17,4 ; 22,5
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	21,9	19,7 ; 24,0	21,8	18,7 ; 25,2	22,0	19,1 ; 24,8
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	21,3	19,4 ; 23,4	20,6	17,4 ; 23,8	22,0	19,4 ; 24,9
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	22,5	20,4 ; 24,6	23,0	19,8 ; 26,2	22,1	19,3 ; 24,9
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	17,9	15,8 ; 19,9	21,9	18,6 ; 25,0	14,1	11,8 ; 16,5
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000				P = 0,036			
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	34,2	31,8 ; 36,5	37,4	33,7 ; 41,1	31,1	28,2 ; 34,0
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	57,5	55,1 ; 60,0	55,0	51,2 ; 58,8	60,0	56,9 ; 63,1
Pauvre	9,4	8,9	9,9	6,8	5,6 ; 8,1	6,6	4,7 ; 8,6	7,0	5,5 ; 8,8
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,4*	0,9 ; 2,1	1,0**	0,3 ; 1,8	1,9**	1,0 ; 3,0
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	60,9	59,2 ; 62,7	67,2	64,5 ; 69,7	54,9	52,6 ; 57,2
Étudiants	13,1	13,0	13,2	11,7	10,4 ; 12,9	10,9	8,9 ; 13,0	12,4	10,8 ; 13,9
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	5,2	4,2 ; 6,3	2,2**	1,1 ; 3,4	8,1	6,4 ; 10,0
Retraités	19,6	18,0	21,1	22,2	21,1 ; 23,3	19,8	18,2 ; 21,3	24,6	23,0 ; 26,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	60,1	57,7 ; 62,6	31,8	29,5 ; 34,1	8,1	7,0 ; 9,4
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,232					
Hommes	56,6	33,5	9,9	60,2	56,7 ; 63,9	32,8	29,3 ; 36,3	7,0	5,4 ; 8,9
Femmes	55,5	32,8	11,7	60,1	56,9 ; 63,1	30,7	27,8 ; 33,9	9,2	7,5 ; 11,0
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,006					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	69,7	62,5 ; 76,8	x	;	x	;
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	67,8	63,4 ; 72,2	28,2	24,1 ; 32,4	4,0*	2,3 ; 5,8
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	57,7	53,6 ; 61,6	32,3	28,7 ; 36,3	10,0	7,7 ; 12,5
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	41,7	37,0 ; 46,8	40,1	35,4 ; 45,0	18,2	14,3 ; 22,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	50,0	45,4 ; 54,3	35,0	30,9 ; 39,4	15,1	11,9 ; 18,3
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	58,9	54,8 ; 63,0	31,4	27,6 ; 35,5	9,8	7,4 ; 12,3
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	68,1	63,9 ; 72,5	28,1	23,9 ; 32,1	3,8*	2,2 ; 5,8
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	55,9	46,7 ; 64,9	36,5	27,5 ; 45,9	7,6**	3,3 ; 12,5
Autre	46,0	39,4	14,6	50,6	39,9 ; 61,8	38,6	27,8 ; 49,5	10,7**	5,0 ; 17,4
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	44,9	39,4 ; 50,5	36,1	30,9 ; 41,4	19,0	15,1 ; 23,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	55,8	50,5 ; 61,1	35,9	30,8 ; 41,1	8,3*	5,7 ; 11,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	61,4	56,9 ; 66,1	33,5	29,0 ; 37,8	5,1*	3,3 ; 7,0
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	73,0	68,4 ; 77,0	23,6	19,6 ; 27,8	3,4*	1,9 ; 5,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	40,6	34,9 ; 46,6	43,7	37,8 ; 49,4	15,7	12,0 ; 19,7
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	64,6	61,9 ; 67,2	29,2	26,6 ; 31,7	6,3	5,1 ; 7,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	33,7	25,6 ; 42,6	38,2	30,0 ; 46,5	28,1	20,8 ; 35,9
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	62,7	60,2 ; 65,1	31,1	28,8 ; 33,5	6,2	5,1 ; 7,4
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,014					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	64,6	61,6 ; 67,7	29,8	26,9 ; 32,8	5,5	4,2 ; 7,0
Étudiants	62,7	32,2	5,0	71,7	63,5 ; 79,6	x	;	x	;
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	39,4	28,9 ; 50,4	34,7	24,2 ; 44,9	25,9*	16,9 ; 35,1
Retraités	40,2	39,5	20,4	46,2	42,0 ; 50,6	38,5	34,3 ; 42,8	15,3	12,0 ; 18,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	60,1	57,7 ; 62,6	31,8	29,5 ; 34,1	8,1	7,0 ; 9,4
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	49,9	44,0 ; 55,6	38,8	33,1 ; 44,4	11,3*	8,3 ; 14,9
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	62,5	59,8 ; 65,0	30,1	27,6 ; 32,7	7,4	6,1 ; 8,8
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	49,6*	32,4 ; 67,2	32,8**	15,6 ; 49,9	17,6**	5,1 ; 32,3
Poids normal	62,6	29,4	8,0	67,2	64,0 ; 70,5	26,6	23,5 ; 29,7	6,2	4,7 ; 7,8
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	52,5	48,7 ; 56,1	37,4	33,9 ; 40,9	10,0	8,1 ; 12,0
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	67,8	64,2 ; 71,2	27,0	23,8 ; 30,3	5,2	3,8 ; 6,8
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	55,1	51,7 ; 58,6	35,9	32,5 ; 39,2	9,0	7,1 ; 11,0
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	34,3	24,5 ; 43,6	40,1	30,7 ; 49,8	25,6	17,9 ; 34,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	40,2	34,5 ; 45,6	39,2	33,6 ; 44,8	20,7	16,6 ; 25,0
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	64,9	62,3 ; 67,5	30,1	27,5 ; 32,6	5,0	3,9 ; 6,2

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	48,7	46,2 ; 51,0	45,9	43,4 ; 48,4	5,5	4,5 ; 6,5
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,058		
Hommes	47,5	46,6	6,0	51,4	47,6 ; 55,2	43,8	40,1 ; 47,6	4,7*	3,4 ; 6,3
Femmes	47,1	45,9	7,0	46,0	42,7 ; 49,2	47,8	44,6 ; 51,2	6,1	4,7 ; 7,6
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,079		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	56,7	49,1 ; 64,4	40,7	32,9 ; 48,4	2,6**	0,5 ; 5,2
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	47,6	43,1 ; 52,2	48,0	43,3 ; 52,5	4,4*	2,7 ; 6,3
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	45,5	41,4 ; 49,2	47,5	43,7 ; 51,4	7,1	5,2 ; 9,1
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	50,5	45,2 ; 55,4	43,0	38,1 ; 48,0	6,6*	4,2 ; 9,3
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,008		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	41,6	37,2 ; 45,7	48,1	43,7 ; 52,5	10,3	7,8 ; 13,2
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	51,9	47,8 ; 56,0	43,4	39,0 ; 47,5	4,8*	3,0 ; 6,7
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	50,8	46,1 ; 55,3	45,2	40,7 ; 49,8	4,0*	2,3 ; 5,9
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	39,0	29,7 ; 48,1	53,7	44,5 ; 62,8	7,3**	3,3 ; 12,0
Autre	44,5	46,1	9,4*	48,1	37,4 ; 58,9	47,1	36,4 ; 58,5	4,8**	0,9 ; 9,4
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,052		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	55,4	49,7 ; 60,8	38,2	32,9 ; 43,9	6,4*	4,0 ; 9,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	48,1	42,7 ; 53,1	47,4	42,3 ; 52,8	4,6*	2,8 ; 6,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	44,4	39,4 ; 49,2	49,6	44,8 ; 54,4	6,0*	4,1 ; 8,2
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	48,8	44,1 ; 53,4	46,1	41,3 ; 50,8	5,1*	3,1 ; 7,2
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	40,1	34,1 ; 46,1	47,7	41,7 ; 53,5	12,2	8,8 ; 16,2
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	50,4	47,6 ; 53,1	45,5	42,7 ; 48,3	4,1	3,1 ; 5,2
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	27,7*	19,5 ; 36,3	53,4	44,6 ; 62,1	18,9*	13,0 ; 26,0
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	50,5	47,9 ; 53,1	45,3	42,7 ; 47,9	4,2	3,3 ; 5,2
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,007		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	47,7	44,6 ; 50,8	47,2	43,9 ; 50,4	5,1	3,8 ; 6,5
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	55,1	45,8 ; 63,9	42,3	33,2 ; 51,4	2,6**	0,2 ; 5,4
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	37,4	25,7 ; 48,3	48,1	37,8 ; 59,7	14,5**	7,4 ; 22,5
Retraités	51,9	42,8	5,3	50,4	45,9 ; 55,2	43,8	39,1 ; 48,2	5,8*	3,8 ; 8,0
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	54,8	51,5 ; 58,1	42,1	39,0 ; 45,3	3,1*	2,0 ; 4,2
Bon	40,5	52,6	6,9	41,3	37,0 ; 45,3	51,8	47,7 ; 56,3	6,9*	4,9 ; 9,0
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	31,6	23,7 ; 39,0	51,1	43,0 ; 59,2	17,3*	11,9 ; 23,5
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	30,1	24,8 ; 35,6	53,8	48,0 ; 59,4	16,0	12,3 ; 20,2
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	53,0	50,2 ; 55,8	43,9	41,2 ; 46,7	3,0	2,2 ; 4,0
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	21,3	49,3	29,4	12,2**	3,6 ; 22,0	51,2	36,7 ; 65,4	36,6*	23,0 ; 52,0
Non	48,1	46,1	5,8	49,8	47,3 ; 52,3	45,7	43,2 ; 48,2	4,5	3,6 ; 5,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	18,4	16,6 ; 20,4	81,6	79,6 ; 83,4
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Hommes	18,2	81,8	14,0	11,4 ; 16,7	86,0	83,3 ; 88,6
Femmes	26,0	74,0	22,7	20,1 ; 25,4	77,3	74,6 ; 79,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,347			
15-24 ans	24,4	75,6	21,5	15,2 ; 27,9	78,5	72,1 ; 84,8
25-44 ans	24,3	75,7	16,9	13,6 ; 20,3	83,1	79,7 ; 86,4
45-64 ans	20,6	79,4	17,5	14,8 ; 20,3	82,5	79,7 ; 85,2
65 ans et plus	18,8	81,2	20,6	16,8 ; 24,9	79,4	75,1 ; 83,2
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,001			
Personne seule	25,7	74,3	23,0	19,6 ; 26,9	77,0	73,1 ; 80,4
Couple sans enfant	17,7	82,3	15,2	12,3 ; 18,3	84,8	81,7 ; 87,7
Couple avec enfants	20,8	79,2	15,8	12,5 ; 19,3	84,2	80,7 ; 87,5
Famille monoparentale	32,2	67,8	28,9	20,9 ; 37,4	71,1	62,6 ; 79,1
Autre	29,7	70,3	23,5*	14,8 ; 33,2	76,5	66,8 ; 85,2
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	24,1	19,6 ; 29,1	75,9	70,9 ; 80,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	22,1	18,0 ; 26,6	77,9	73,4 ; 82,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	16,9	13,7 ; 20,3	83,1	79,7 ; 86,3
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	13,2	10,3 ; 16,3	86,8	83,7 ; 89,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	29,3	24,2 ; 35,0	70,7	65,0 ; 75,8
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	16,1	14,1 ; 18,2	83,9	81,8 ; 85,9
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	37,6	30,0 ; 46,2	62,4	53,8 ; 70,0
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	16,6	14,8 ; 18,7	83,4	81,3 ; 85,2
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,002			
Travailleurs	20,9	79,1	16,8	14,5 ; 19,2	83,2	80,8 ; 85,5
Étudiants	24,8	75,2	22,5*	15,2 ; 30,2	77,5	69,8 ; 84,8
Personnes sans emploi	37,9	62,1	34,3	24,4 ; 45,3	65,7	54,7 ; 75,6
Retraités	18,2	81,8	17,2	14,0 ; 20,8	82,8	79,2 ; 86,0
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	12,3	10,1 ; 14,4	87,7	85,6 ; 89,9
Bon	26,6	73,4	22,7	19,1 ; 26,6	77,3	73,4 ; 80,9
Passable ou mauvais	48,8	51,2	48,1	40,1 ; 56,9	51,9	43,1 ; 59,9
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	11,4	9,1 ; 13,7	88,6	86,3 ; 90,9
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	21,7	18,7 ; 24,7	78,3	75,3 ; 81,3
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	54,4	44,6 ; 64,2	45,6	35,8 ; 55,4
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	73,9	60,7 ; 86,8	26,1*	13,2 ; 39,3
Non	20,6	79,4	16,7	14,7 ; 18,6	83,3	81,4 ; 85,3
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,001			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	18,1	16,3 ; 20,1	81,9	79,9 ; 83,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,6	1,9 ; 3,4	2,6*	1,6 ; 3,8	2,6*	1,6 ; 3,7
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,727		P = 0,535		P = 0,260	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	2,4**	0,3 ; 5,0	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,4**	1,2 ; 3,8	2,3**	0,4 ; 4,6	2,5**	0,9 ; 4,3
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	3,1*	1,9 ; 4,6	3,0**	1,1 ; 5,3	3,3**	1,7 ; 5,2
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,9**	0,6 ; 3,5	3,8**	0,8 ; 7,3	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,103		P = 0,706		P = 0,037	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	3,5*	2,0 ; 5,2	3,2**	0,6 ; 6,2	3,6*	1,9 ; 5,7
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	2,0**	1,0 ; 3,3	2,4**	0,8 ; 4,4	1,6**	0,3 ; 3,2
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,7**	0,6 ; 3,0	2,1**	0,4 ; 4,2	x	;
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	5,6**	1,8 ; 10,5	x	;	7,4**	1,9 ; 14,3
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	4,1**	0,4 ; 8,9	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,989		P = 0,550		P = 0,366	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	2,4**	0,9 ; 4,1	4,3**	1,1 ; 8,2	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,8**	1,3 ; 4,7	x	;	4,0**	1,6 ; 7,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	2,6*	1,3 ; 4,0	2,8**	0,9 ; 5,1	2,4**	0,7 ; 4,6
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	2,5**	1,1 ; 4,1	2,2**	0,2 ; 4,6	2,9**	1,0 ; 5,1
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,037		P = 0,007	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	5,8*	3,4 ; 8,8	6,3**	1,7 ; 12,2	5,6**	2,7 ; 9,2
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	2,0*	1,3 ; 2,8	2,2*	1,2 ; 3,4	1,9**	0,9 ; 3,0
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,002		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	10,0**	5,4 ; 15,9	10,4**	2,4 ; 20,3	9,7**	3,9 ; 16,8
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,8*	1,2 ; 2,5	1,9*	1,0 ; 3,0	1,7*	0,9 ; 2,6
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,269		P = 0,934		P = 0,141	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,6*	1,7 ; 3,6	2,7**	1,4 ; 4,3	2,4**	1,2 ; 3,8
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	3,6**	0,9 ; 6,8	x	;	4,5**	0,2 ; 9,8
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	5,0**	0,8 ; 10,5	x	;	6,3**	1,0 ; 13,0
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,5**	0,5 ; 2,6	2,3**	0,4 ; 4,7	1,0**	0,0 ; 2,0
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,0**	0,5 ; 1,6	1,0**	0,2 ; 2,0	1,0**	0,3 ; 1,7
Bon	2,5	2,7	2,4	3,3*	1,9 ; 4,8	2,4**	0,8 ; 4,5	4,2**	1,9 ; 6,8
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	12,0*	6,9 ; 17,8	17,2**	7,4 ; 28,2	8,2**	2,9 ; 14,6
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	0,6**	0,2 ; 1,2	x	;	0,9**	0,1 ; 1,8
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,9*	1,8 ; 4,1	3,3**	1,5 ; 5,4	2,6**	1,2 ; 4,2
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	17,7*	10,5 ; 26,1	19,4**	7,4 ; 32,6	16,3**	7,4 ; 27,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	10,4*	7,3 ; 14,1	11,6**	5,7 ; 18,5	9,7*	5,7 ; 14,0
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,8**	0,4 ; 1,4	1,1**	0,3 ; 2,0	0,5**	0,0 ; 1,1

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,4**	0,1 ; 0,7	x	;	0,5**	0,0 ; 1,0
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,114		P = 0,050		P = 0,278	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	0,8**	0,1 ; 1,8	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	x	;	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,223		P = 0,723		P = 0,109	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,147		P = 0,490		P = 0,013	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,558		P = .		P = 0,910	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,4**	0,1 ; 0,8	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,069		P = 0,259		P = 0,056	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,3**	0,0 ; 0,6	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,038		P = .		P = 0,019	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	x	;	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,051		P = 0,036		P = 0,013	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	0,5**	0,0 ; 1,1	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,126		P = .	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	1,6**	0,3 ; 3,3	x	;	2,0**	0,2 ; 4,3
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,712				
Oui	10,2	10,0	10,3	9,4	8,1 ; 10,8	9,1	7,2 ; 11,3	9,6	7,8 ; 11,6	
Non	89,8	90,0	89,7	90,6	89,2 ; 91,9	90,9	88,7 ; 92,8	90,4	88,4 ; 92,2	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,057				
Oui	4,4	3,5	5,3	3,9	3,1 ; 4,9	3,0*	1,8 ; 4,4	4,8	3,5 ; 6,2	
Non	95,6	96,5	94,7	96,1	95,1 ; 96,9	97,0	95,6 ; 98,2	95,2	93,8 ; 96,5	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	11,7	10,1 ; 13,4	13,6	11,1 ; 16,4	9,8	7,8 ; 11,9
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,018		P = 0,002	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	20,1*	13,8 ; 26,8	20,8*	11,7 ; 30,4	19,4*	11,3 ; 28,7
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	11,9	8,9 ; 15,1	16,5*	11,2 ; 22,1	7,0*	4,1 ; 10,4
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	9,7	7,5 ; 12,2	9,5*	6,0 ; 13,3	10,0*	6,7 ; 13,5
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	8,2*	5,5 ; 10,9	9,9*	5,4 ; 14,8	6,9*	3,7 ; 10,1
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,681		P = 0,761		P = 0,674	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	9,9	7,2 ; 12,7	14,6*	8,6 ; 20,7	7,5*	4,8 ; 10,6
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	10,8	8,2 ; 13,5	11,2*	7,6 ; 15,4	10,4*	6,8 ; 14,1
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	11,8	8,8 ; 15,2	14,0*	9,4 ; 19,1	9,3*	5,3 ; 13,2
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	13,4*	7,1 ; 20,4	13,7**	3,9 ; 25,5	13,3**	5,0 ; 22,4
Autre	14,9	16,7	13,2*	14,6**	7,3 ; 23,1	17,3**	5,3 ; 30,9	11,9**	3,8 ; 21,9
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,202		P = 0,190		P = 0,773	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	8,0*	5,0 ; 11,1	7,6**	3,0 ; 12,9	8,4*	4,5 ; 12,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	13,1	9,3 ; 17,2	17,0*	10,8 ; 23,8	9,2*	5,0 ; 14,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	13,0	9,7 ; 16,7	15,0*	9,9 ; 20,4	10,7*	6,9 ; 15,2
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	12,2	9,2 ; 15,6	13,3*	8,7 ; 18,5	11,2*	7,1 ; 15,4
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,143		P = 0,323		P = 0,528	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	9,2*	5,6 ; 13,3	10,0**	3,2 ; 18,1	8,6*	4,6 ; 13,0
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	12,5	10,6 ; 14,6	14,8	11,8 ; 18,0	10,2	7,9 ; 12,7
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,001		P = 0,112		P = 0,007	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	11,3	9,1 ; 13,5	13,6	10,3 ; 17,1	8,5	6,0 ; 11,0
Étudiants	17,1	21,4	12,9	21,3*	14,1 ; 29,0	22,0**	10,7 ; 33,9	20,7*	11,7 ; 31,4
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	8,9**	2,8 ; 15,9	x	;	8,1**	1,9 ; 15,9
Retraités	7,5	7,0	7,9	8,8	6,3 ; 11,3	9,5*	5,5 ; 13,7	8,2*	5,1 ; 11,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Fréquence des blessures</b>										
Une fois	79,1	79,4	78,8	73,2	66,2 ; 79,8	71,1	60,7 ; 80,6	76,1	66,4 ; 85,3	
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	26,8	20,2 ; 33,8	28,9*	19,4 ; 39,3	23,9*	14,7 ; 33,6	
<b>Activité pratiquée</b>										
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	26,5	19,3 ; 33,9	31,8*	21,1 ; 42,9	19,5*	10,4 ; 29,3	
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	18,9*	12,7 ; 25,5	19,1*	10,3 ; 28,6	18,7*	10,8 ; 27,2	
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	19,2	13,1 ; 25,6	23,0*	13,8 ; 33,1	14,1**	7,1 ; 22,3	
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	7,0**	3,3 ; 11,0	x	;	10,8**	4,6 ; 18,0	
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	18,1*	12,5 ; 24,2	15,7*	8,5 ; 24,0	21,1*	12,3 ; 31,0	
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	3,0**	0,7 ; 6,0	x	;	x	;	
Autre	12,1	8,1	17,6	7,3*	3,7 ; 11,3	3,6**	0,2 ; 7,7	x	;	
<b>Saison de la blessure</b>										
Hiver	26,0	25,0	27,4	31,5	24,4 ; 39,0	32,1*	21,9 ; 42,6	30,6*	20,3 ; 41,8	
Printemps	21,2	20,7	21,9	16,9*	11,3 ; 23,1	16,8*	9,3 ; 25,7	16,9**	8,3 ; 26,4	
Été	29,1	30,3	27,4	26,6	19,2 ; 33,9	24,5*	14,8 ; 34,7	29,7*	19,0 ; 40,5	
Automne	23,7	24,0	23,3	25,0	17,8 ; 32,0	26,6*	16,9 ; 37,0	22,8*	13,1 ; 33,3	
<b>Lieu de la blessure</b>										
Résidence	39,7	32,0	49,8	39,7	32,1 ; 47,5	32,6*	22,3 ; 43,9	48,5	37,7 ; 60,0	
Endroit public	28,1	24,8	32,5	22,2	15,7 ; 29,0	16,3**	7,7 ; 25,7	29,6*	19,8 ; 39,8	
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	35,5	27,6 ; 43,3	47,0	35,5 ; 58,2	x	;	
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	2,6**	0,6 ; 5,2	4,2**	0,6 ; 8,6	x	;	
<b>Cause de la blessure</b>										
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	5,0**	1,8 ; 8,9	7,5**	2,1 ; 13,9	x	;	
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	5,5**	1,8 ; 10,1	6,1**	0,9 ; 12,6	x	;	
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	5,6**	2,4 ; 9,4	4,7**	0,8 ; 9,5	7,0**	1,8 ; 13,5	
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	3,3**	0,9 ; 6,2	x	;	x	;	
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;	
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	2,7**	0,3 ; 5,7	x	;	x	;	
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	24,3	17,6 ; 31,0	25,7*	16,0 ; 35,6	22,5*	13,0 ; 32,4	
Chute	34,6	30,5	40,3	42,6	34,7 ; 50,2	41,4	30,3 ; 52,7	44,2	33,1 ; 55,9	
Autres	13,7	12,5	15,3	x	;	8,9**	3,4 ; 15,4	13,7**	5,5 ; 22,8	
<b>Partie du corps atteinte</b>										
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	2,4**	0,6 ; 4,6	x	;	x	;	
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	30,3	23,3 ; 37,6	31,1*	20,8 ; 40,8	29,2*	19,4 ; 40,3	
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	36,7	29,2 ; 44,4	37,6	27,0 ; 48,2	35,5	24,0 ; 46,2	
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	8,8**	4,2 ; 13,8	x	;	x	;	
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	13,5*	8,6 ; 18,9	9,8**	4,5 ; 16,1	18,3*	9,5 ; 28,1	
Autre	11,9	10,9	13,2	8,3**	4,2 ; 13,0	10,9**	4,7 ; 18,6	4,8**	1,1 ; 9,5	

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute, population de 65 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	4,4*	2,5 ; 6,4	3,8**	1,0 ; 7,1	4,8**	2,2 ; 7,6
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,916		P = 0,994		P = 0,919	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	4,6**	2,0 ; 7,5	4,0**	0,5 ; 8,3	5,2**	1,5 ; 9,8
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	4,9**	1,6 ; 8,7	x	;	5,5**	1,3 ; 10,4
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,244		P = 0,621		P = 0,346	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	6,2**	2,9 ; 9,9	x	;	6,4**	2,6 ; 10,7
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	3,7**	1,3 ; 6,3	3,6**	0,4 ; 7,4	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,050		P = .		P = 0,281	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	5,2*	2,9 ; 7,7	4,8**	1,2 ; 8,8	5,6**	2,6 ; 9,0
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,008		P = 0,451		P = 0,006	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	11,4**	4,0 ; 19,7	x	;	14,6**	4,4 ; 26,9
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	3,2**	1,4 ; 5,3	3,6**	0,5 ; 7,2	2,9**	0,7 ; 5,5
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,088		P = 0,017	
Oui	5,9	3,6*	7,3	9,7**	4,5 ; 15,1	8,1**	0,6 ; 16,7	11,0**	4,1 ; 19,0
Non	2,7*	2,2**	3,1*	2,2**	0,6 ; 4,0	x	;	2,3**	0,2 ; 4,9
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,482		P = 0,007	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	11,3**	4,5 ; 19,1	x	;	14,1**	4,7 ; 24,5
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	3,0**	1,2 ; 5,0	3,8**	0,6 ; 7,6	2,3**	0,1 ; 4,9
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,546		P = .		P = 0,744	
Résidence	62,7	52,8	68,6	58,5*	36,2 ; 80,0	x	;	76,2*	47,6 ; 98,9
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	x	;	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	x	;	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	40,6**	16,5 ; 67,5	x	;	67,1*	35,8 ; 94,1
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	24,9**	4,5 ; 49,0	x	;	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	49,8*	24,7 ; 74,4	x	;	63,1*	31,1 ; 91,8
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	12,6	10,9 ; 14,3	14,3	11,6 ; 17,0	10,9	8,9 ; 13,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,019		P = 0,022		P = 0,097	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	11,6*	6,5 ; 17,1	11,2**	4,1 ; 19,3	12,0**	5,1 ; 19,8
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	15,1	11,9 ; 18,6	20,2	14,5 ; 26,1	9,7*	6,3 ; 13,4
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	13,5	10,7 ; 16,3	12,9*	8,8 ; 16,9	14,0	10,6 ; 18,0
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	6,8*	4,3 ; 9,5	7,6**	3,6 ; 12,0	6,1**	3,0 ; 9,5
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,164		P = 0,398		P = 0,336	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	10,5	8,0 ; 13,2	11,4*	6,6 ; 17,0	10,0*	7,1 ; 13,3
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	11,4	8,8 ; 14,2	12,5*	8,8 ; 16,5	10,1*	6,6 ; 13,8
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	14,2	11,0 ; 17,6	15,3*	10,9 ; 20,4	13,0*	8,6 ; 17,8
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	15,8*	9,5 ; 22,6	22,7**	9,9 ; 36,8	11,9**	5,4 ; 19,4
Autre	11,4	12,8*	10,2*	7,3**	1,8 ; 13,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,029		P = 0,113		P = 0,439	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	8,6*	5,5 ; 12,1	7,7**	3,1 ; 13,0	9,3*	4,8 ; 14,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	16,1	12,2 ; 20,3	18,7*	12,2 ; 25,8	13,6*	9,0 ; 18,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	13,6	10,6 ; 17,1	15,5*	10,8 ; 21,0	11,5*	7,6 ; 15,8
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	11,4	8,6 ; 14,5	13,7*	9,1 ; 18,8	9,3*	6,0 ; 13,1
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,859		P = 0,759		P = 0,650	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	12,0*	8,0 ; 16,6	12,4**	4,1 ; 21,8	11,7*	7,5 ; 16,9
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	12,4	10,5 ; 14,4	14,1	11,4 ; 17,1	10,6	8,5 ; 13,0
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,875		P = 0,960		P = 0,915	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	12,2*	6,3 ; 18,8	14,2**	3,9 ; 26,7	10,5**	3,9 ; 17,8
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	12,7	10,9 ; 14,5	14,5	11,6 ; 17,4	10,9	8,8 ; 13,2
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,045		P = 0,225		P = 0,364	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	14,6	12,3 ; 17,0	16,4	12,8 ; 20,1	12,4	9,6 ; 15,4
Étudiants	9,9	9,7	10,1	10,6**	5,1 ; 16,7	10,1**	2,1 ; 20,0	11,1**	3,6 ; 19,2
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	12,6**	6,0 ; 20,6	x	;	10,9**	3,9 ; 19,5
Retraités	6,9	6,7	7,0	8,1*	5,6 ; 10,7	9,2*	5,1 ; 13,5	7,2*	4,1 ; 10,6

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
Travail rémunéré		P = 0,091				P = 0,518				
Oui	45,2	47,6	42,8	40,3	33,2 ; 47,9	42,3	32,2 ; 52,8	37,8	28,2 ; 47,8	
Non	54,8	52,4	57,2	59,7	52,1 ; 66,8	57,7	47,2 ; 67,8	62,2	52,2 ; 71,8	
Sport ou exercice physique		P = 0,081				P = 0,845				
Oui	25,4	27,6	23,1	28,2	21,4 ; 34,9	27,7*	18,4 ; 36,9	29,0*	18,9 ; 38,8	
Non	74,6	72,4	76,9	71,8	65,1 ; 78,6	72,3	63,1 ; 81,6	71,0	61,2 ; 81,1	
Tâches ménagères, autre travail ou études		P = 0,037				P = 0,443				
Oui	17,6	15,6	19,6	19,7	14,3 ; 25,4	21,5*	13,5 ; 30,4	17,4*	10,6 ; 25,1	
Non	82,4	84,4	80,4	80,3	74,6 ; 85,7	78,5	69,6 ; 86,5	82,6	74,9 ; 89,4	
Loisir ou passe-temps		P = 0,172				P = 0,354				
Oui	8,1	7,2	9,0	7,8**	4,2 ; 12,3	5,9**	1,0 ; 12,3	10,3**	4,5 ; 17,2	
Non	91,9	92,8	91,0	92,2	87,7 ; 95,8	94,1	87,7 ; 99,0	89,7	82,8 ; 95,5	
Partie du corps atteinte		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	5,0**	2,2 ; 8,1	x	;	8,4**	3,1 ; 14,6	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	53,4	45,5 ; 60,8	50,6	39,6 ; 61,5	56,8	46,3 ; 66,8	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	20,9	15,1 ; 26,7	20,1*	11,8 ; 28,6	22,0*	13,7 ; 31,0	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	3,6**	0,8 ; 6,9	x	;	x	;	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	14,2*	9,2 ; 19,7	19,1*	11,1 ; 27,9	8,1**	3,2 ; 13,8	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	3,0**	0,5 ; 6,0	x	;	x	;	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	28,4	26,2 ; 30,5	25,3	22,4 ; 28,6	31,3	28,3 ; 34,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,019		P = 0,030	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	16,8*	11,3 ; 22,8	12,7**	5,6 ; 20,8	21,1*	12,5 ; 30,1
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	27,7	23,6 ; 31,9	24,8	18,8 ; 31,0	30,7	25,4 ; 36,3
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	32,8	29,3 ; 36,3	29,1	23,9 ; 34,5	36,3	31,5 ; 41,5
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	30,4	25,7 ; 35,4	30,7	23,3 ; 38,6	30,2	24,5 ; 36,6
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,460		P = 0,577		P = 0,223	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	33,0	28,8 ; 37,3	25,1	18,4 ; 32,0	37,0	32,0 ; 42,2
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	27,6	24,1 ; 31,4	26,3	21,4 ; 31,8	29,2	24,0 ; 34,8
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	26,9	23,0 ; 30,9	21,7	16,4 ; 27,4	32,7	26,8 ; 38,7
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	27,1	19,7 ; 34,7	25,4**	12,6 ; 40,1	28,0*	18,5 ; 37,7
Autre	34,0	32,4	35,4	27,1*	18,0 ; 36,2	30,5*	16,0 ; 45,2	23,6**	12,9 ; 36,0
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,020		P = 0,042		P = 0,504	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	29,7	24,9 ; 35,0	27,8	20,4 ; 35,9	31,1	25,0 ; 37,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	31,0	26,3 ; 35,8	28,3	21,3 ; 35,8	33,8	27,3 ; 40,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	31,1	26,8 ; 35,5	29,0	23,1 ; 35,2	33,5	27,6 ; 39,8
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	23,1	19,5 ; 26,9	17,8	12,9 ; 23,5	28,2	22,9 ; 33,5
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,021		P = 0,014		P = 0,667	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	33,9	28,7 ; 39,8	36,2	26,2 ; 46,5	32,6	26,6 ; 39,2
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	27,2	24,8 ; 29,7	23,4	20,2 ; 26,9	31,0	27,6 ; 34,5
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,002	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	45,8	36,9 ; 54,3	46,1	32,8 ; 60,3	45,5	35,3 ; 56,2
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	26,9	24,7 ; 29,2	23,7	20,7 ; 27,1	30,0	26,9 ; 33,2
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,075		P = 0,010	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	29,2	26,5 ; 32,2	25,9	22,0 ; 29,9	33,2	29,0 ; 37,3
Étudiants	20,7	14,8	26,3	14,8*	8,6 ; 21,8	12,0**	3,4 ; 22,3	17,2**	8,8 ; 26,2
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	40,7	30,5 ; 51,7	38,0**	14,5 ; 65,9	41,4	30,1 ; 53,2
Retraités	34,2	30,5	37,2	30,7	26,6 ; 35,0	29,9	23,1 ; 36,7	31,4	26,3 ; 37,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	22,2	19,5 ; 24,9	20,0	16,1 ; 24,2	24,3	20,6 ; 28,0
Bon	33,9	28,1	39,6	32,3	28,3 ; 36,6	30,4	24,5 ; 36,5	34,3	28,8 ; 40,3
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	58,0	50,2 ; 66,5	47,5	34,9 ; 61,4	65,7	55,9 ; 75,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	52,2	46,6 ; 58,1	48,4	38,0 ; 59,0	54,5	47,6 ; 61,4
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	22,9	20,8 ; 25,2	21,3	18,1 ; 24,8	24,7	21,5 ; 27,9
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,460		P = 0,891		P = 0,071	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	32,5*	17,0 ; 49,3	x	;	37,0*	18,4 ; 54,3
Poids normal	28,3	22,9	32,1	27,2	23,9 ; 30,5	25,2	20,1 ; 30,6	28,5	24,6 ; 32,7
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	28,3	24,5 ; 32,4	25,9	21,2 ; 31,3	32,2	25,9 ; 38,3
Obésité	37,9	30,5	46,1	32,5	26,7 ; 39,1	25,1*	16,3 ; 34,2	40,9	33,1 ; 50,4

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000					P = 0,007		
Oui	30,3	25,3	35,2	28,4	26,2 ; 30,5	25,3	22,4 ; 28,6	31,3	28,3 ; 34,3
Non	69,7	74,7	64,8	71,6	69,5 ; 73,8	74,7	71,4 ; 77,6	68,7	65,7 ; 71,7
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	9,5	6,4	12,5	9,0	7,7 ; 10,3	6,4	4,7 ; 8,3	11,5	9,5 ; 13,4
Non	90,5	93,6	87,5	91,0	89,7 ; 92,3	93,6	91,7 ; 95,3	88,5	86,6 ; 90,5
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000					P = 0,238		
Oui	14,5	12,2	16,7	13,2	11,6 ; 14,8	12,2	9,8 ; 14,6	14,1	12,0 ; 16,4
Non	85,5	87,8	83,3	86,8	85,2 ; 88,4	87,8	85,4 ; 90,2	85,9	83,6 ; 88,0
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000					P = 0,395		
Oui	13,5	10,8	16,1	13,3	11,7 ; 14,9	12,6	10,2 ; 15,2	14,0	11,9 ; 16,2
Non	86,5	89,2	83,9	86,7	85,1 ; 88,3	87,4	84,8 ; 89,8	86,0	83,8 ; 88,1
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000					P = 0,016		
Oui	14,5	11,8	17,2	13,3	11,8 ; 14,9	11,3	9,1 ; 13,7	15,2	13,0 ; 17,6
Non	85,5	88,2	82,8	86,7	85,1 ; 88,2	88,7	86,3 ; 90,9	84,8	82,4 ; 87,0
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000					P = 0,929		
Oui	17,8	16,0	19,6	16,8	15,0 ; 18,5	16,7	13,9 ; 19,4	16,9	14,5 ; 19,3
Non	82,2	84,0	80,4	83,2	81,5 ; 85,0	83,3	80,6 ; 86,1	83,1	80,7 ; 85,5
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	14,2	10,6	17,8	12,9	11,3 ; 14,5	9,4	7,5 ; 11,7	16,2	13,9 ; 18,8
Non	85,8	89,4	82,2	87,1	85,5 ; 88,7	90,6	88,3 ; 92,5	83,8	81,2 ; 86,1

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	62,0	59,5 ; 64,4	29,3	26,9 ; 31,6	8,8	7,5 ; 10,2
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,003					
Hommes	52,6	34,1	13,3	57,9	54,1 ; 61,8	31,7	28,1 ; 35,3	10,4	8,3 ; 12,7
Femmes	60,1	29,8	10,1	65,8	62,7 ; 68,9	27,0	24,2 ; 29,8	7,2	5,7 ; 8,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	72,3	65,0 ; 79,3	21,4	15,1 ; 27,9	6,3**	2,6 ; 10,5
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	66,4	62,2 ; 70,6	26,6	22,7 ; 30,7	7,0*	4,7 ; 9,5
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	58,4	54,3 ; 62,5	31,3	27,6 ; 35,3	10,2	8,0 ; 12,6
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	51,4	46,5 ; 56,4	37,2	32,3 ; 42,3	11,4	8,1 ; 15,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,087					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	56,5	52,2 ; 60,9	32,6	28,3 ; 36,9	10,9	8,1 ; 13,8
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	62,5	58,5 ; 66,6	28,2	24,5 ; 32,0	9,2	6,7 ; 11,7
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	65,7	61,3 ; 70,2	28,1	23,9 ; 32,3	6,2*	4,1 ; 8,6
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	56,8	47,9 ; 65,9	35,1	26,2 ; 43,5	8,0**	3,4 ; 13,6
Autre	48,0	34,3	17,7	56,4	46,0 ; 66,5	31,1*	22,1 ; 41,1	12,5**	5,7 ; 20,1
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,231					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	63,0	60,6 ; 65,6	28,9	26,5 ; 31,3	8,1	6,9 ; 9,5
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	47,6**	18,1 ; 76,1	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	41,4*	27,4 ; 56,0	42,2*	28,7 ; 56,3	16,4**	7,5 ; 26,8
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,814					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	62,2	59,7 ; 64,7	29,4	27,0 ; 31,7	8,4	7,1 ; 9,7
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	42,6**	8,0 ; 86,2	x	;	x	;
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	54,8*	23,9 ; 82,0	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	49,8	44,3 ; 55,3	38,8	33,6 ; 44,1	11,4	8,2 ; 15,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	58,7	53,4 ; 64,0	30,7	25,6 ; 35,6	10,6	7,8 ; 13,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	67,3	62,9 ; 71,7	25,4	21,2 ; 29,5	7,3*	4,9 ; 9,9
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	68,4	64,2 ; 72,6	24,9	20,8 ; 28,9	6,8*	4,4 ; 9,2
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	48,7	42,8 ; 54,8	36,0	30,3 ; 41,6	15,3	11,2 ; 19,9
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	65,5	62,7 ; 68,3	27,3	24,7 ; 30,0	7,2	5,8 ; 8,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	40,6	32,5 ; 49,2	37,1	28,9 ; 45,7	22,3*	15,6 ; 29,8
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	64,2	61,7 ; 66,8	28,4	25,9 ; 30,8	7,4	6,1 ; 8,8
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	63,9	60,8 ; 67,0	27,5	24,5 ; 30,5	8,6	6,9 ; 10,5
Étudiants	62,8	27,9	9,3	73,9	66,1 ; 81,6	22,4*	15,2 ; 29,6	3,6**	0,6 ; 7,5
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	40,3	30,3 ; 51,4	37,6	27,3 ; 48,5	22,1*	13,4 ; 31,0
Retraités	49,7	38,1	12,2	55,6	50,9 ; 60,3	35,8	31,1 ; 40,3	8,6	6,1 ; 11,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	62,0	59,5 ; 64,4	29,3	26,9 ; 31,6	8,8	7,5 ; 10,2
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	48,2	42,4 ; 54,3	36,5	31,1 ; 41,8	15,3	11,2 ; 19,4
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	65,2	62,5 ; 67,7	27,6	25,2 ; 30,2	7,2	5,9 ; 8,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	73,9	71,0 ; 76,7	21,7	19,1 ; 24,5	4,5	3,2 ; 5,9
Bon	41,4	42,6	16,0	46,4	42,1 ; 51,0	41,1	36,6 ; 45,4	12,5	9,5 ; 15,6
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	34,5	27,0 ; 42,2	39,5	31,5 ; 47,3	26,0	19,5 ; 33,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	52,2	46,5 ; 58,0	30,6	25,2 ; 35,8	17,2	13,2 ; 21,6
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	64,8	62,1 ; 67,4	28,5	25,9 ; 31,2	6,7	5,4 ; 8,1
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	47,2	40,8 ; 53,5	44,9	38,7 ; 51,6	7,9*	4,7 ; 11,2
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	63,9	61,3 ; 66,5	27,2	24,8 ; 29,7	8,9	7,5 ; 10,4
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	65,2	62,6 ; 67,9	28,1	25,6 ; 30,5	6,7	5,5 ; 8,1
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	45,8	39,6 ; 52,1	35,1	29,2 ; 41,0	19,1	14,5 ; 24,1
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,014					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	69,2	64,9 ; 73,5	24,0	19,9 ; 27,8	6,8*	4,6 ; 9,3
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	61,5	58,3 ; 64,7	28,7	25,7 ; 31,7	9,9	8,1 ; 11,8

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	11,6	10,4 ; 12,8	7,5	5,9 ; 9,0	15,5	13,7 ; 17,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	12,0	9,7 ; 14,5	6,8*	4,0 ; 9,9	16,8	13,1 ; 21,0
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	42,4	37,5 ; 47,4	32,1	24,8 ; 39,6	50,1	43,5 ; 56,9
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,046		P = 0,565		P = 0,158	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	37,4	31,2 ; 43,7	29,8	21,1 ; 39,2	44,0	35,4 ; 53,0
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	48,9	40,2 ; 57,7	34,7*	20,7 ; 49,2	57,4	46,4 ; 68,7
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	56,5*	35,0 ; 78,9	x	;	58,6*	33,0 ; 86,4
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	32,6	28,5 ; 37,2	20,2*	14,4 ; 27,1	41,2	35,6 ; 47,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	12,0	9,0 ; 15,2	9,2*	4,9 ; 13,8	14,8*	10,6 ; 19,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	4,7*	3,1 ; 6,5	3,4**	1,3 ; 5,7	6,3*	3,7 ; 9,3
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	3,1*	1,7 ; 4,7	2,8**	1,0 ; 4,9	3,4**	1,2 ; 6,0
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,004		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	26,5	22,4 ; 31,1	13,6*	8,2 ; 19,6	34,2	28,8 ; 40,6
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	8,4	7,1 ; 9,9	6,4	4,7 ; 8,3	10,5	8,5 ; 12,6
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,025		P = 0,005	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	19,9	14,1 ; 26,4	14,7**	6,2 ; 24,9	24,1*	16,4 ; 32,6
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	10,5	9,2 ; 11,7	6,6	5,1 ; 8,2	14,2	12,3 ; 16,3

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	84,0	82,3 ; 85,8	14,1	12,6 ; 15,7	1,9*	1,2 ; 2,6
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	75,0	72,1 ; 78,2	21,7	18,8 ; 24,6	3,3*	2,0 ; 4,7
Femmes	87,9	11,3	0,7	92,5	90,8 ; 94,1	6,9	5,4 ; 8,6	0,5**	0,1 ; 1,0
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,117					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	88,9	84,0 ; 93,8	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	89,2	86,2 ; 92,0	9,0	6,5 ; 11,7	1,8**	0,5 ; 3,2
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	82,4	79,4 ; 85,3	15,9	13,1 ; 18,9	1,7**	0,7 ; 2,9
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	72,7	68,5 ; 76,7	24,0	20,0 ; 28,1	3,3**	1,5 ; 5,3
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,378					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	84,3	80,9 ; 87,5	14,0	11,0 ; 17,1	1,7**	0,6 ; 3,0
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	80,4	77,0 ; 83,6	18,3	15,2 ; 21,4	1,4**	0,5 ; 2,5
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	87,1	83,8 ; 90,1	11,4	8,5 ; 14,4	1,6**	0,5 ; 2,8
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	89,6	84,0 ; 94,6	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	80,5	71,8 ; 88,5	14,6*	7,5 ; 22,4	5,0**	0,5 ; 10,3
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,844					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	82,0	80,0 ; 84,2	15,9	13,8 ; 17,8	2,1*	1,3 ; 3,0
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	91,1	86,8 ; 94,8	x	;	x	;
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	87,8	82,0 ; 93,0	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	89,9	80,7 ; 98,0	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,049					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	77,0	72,2 ; 81,2	19,8	15,8 ; 24,2	3,2**	1,3 ; 5,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	83,5	79,7 ; 87,4	14,3	10,5 ; 18,0	2,2**	0,9 ; 3,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	86,1	83,0 ; 89,2	12,4	9,5 ; 15,4	1,5**	0,3 ; 2,8
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	87,3	84,2 ; 90,1	11,7	8,9 ; 14,7	1,1**	0,2 ; 2,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,060					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	82,7	78,1 ; 87,0	13,6	9,8 ; 17,6	3,7**	1,3 ; 6,6
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	84,4	82,6 ; 86,4	14,2	12,3 ; 16,0	1,4*	0,8 ; 2,1
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	74,2	66,3 ; 81,4	19,3*	12,6 ; 26,3	6,5**	2,4 ; 11,5
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	84,9	83,1 ; 86,6	13,7	12,0 ; 15,4	1,5*	0,9 ; 2,2
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,277					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	86,1	83,9 ; 88,3	12,2	10,0 ; 14,2	1,8*	0,9 ; 2,8
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	88,5	82,7 ; 93,7	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	83,3	74,8 ; 91,3	x	;	x	;
Retraités	72,9	23,2	3,8	76,0	72,2 ; 79,6	21,3	17,9 ; 24,8	2,7**	1,3 ; 4,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	84,0	82,3 ; 85,8	14,1	12,6 ; 15,7	1,9*	1,2 ; 2,6
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,003					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	83,3	78,9 ; 87,3	12,3*	8,7 ; 15,9	4,5**	2,1 ; 7,2
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	84,2	82,4 ; 86,1	14,5	12,7 ; 16,3	1,3*	0,7 ; 1,9
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,146					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	86,2	84,0 ; 88,4	12,6	10,5 ; 14,8	1,2**	0,5 ; 2,1
Bon	75,1	21,2	3,6	80,8	77,4 ; 84,1	16,7	13,5 ; 20,0	2,5**	1,2 ; 3,9
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	79,9	73,6 ; 86,4	15,8*	10,0 ; 21,5	4,2**	0,7 ; 8,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,248					
Élevé	77,2	19,2	3,6	84,8	80,9 ; 88,5	12,3	9,0 ; 16,0	2,9**	1,0 ; 5,0
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	84,4	82,5 ; 86,4	14,0	12,1 ; 15,9	1,6*	0,9 ; 2,4
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,002					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	75,9	70,2 ; 81,3	20,9	15,6 ; 26,3	3,2**	1,3 ; 5,5
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	85,0	83,3 ; 86,9	13,3	11,6 ; 15,0	1,7*	1,0 ; 2,5
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,084					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	93,7	91,5 ; 95,6	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	81,0	78,5 ; 83,6	16,6	14,3 ; 19,0	2,4*	1,4 ; 3,5

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	84,0	82,3 ; 85,8	75,0	72,1 ; 78,2	92,5	90,8 ; 94,1
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	14,1	12,6 ; 15,7	21,7	18,8 ; 24,6	6,9	5,4 ; 8,6
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	1,9*	1,2 ; 2,6	3,3*	2,0 ; 4,7	0,5**	0,1 ; 1,0
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,001					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	75,9	70,2 ; 81,3	57,2	45,3 ; 69,4	84,5	78,5 ; 89,9
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	20,9	15,6 ; 26,3	37,1*	25,2 ; 49,2	13,5*	8,3 ; 19,1
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	3,2**	1,3 ; 5,5	5,7**	1,0 ; 11,8	2,0**	0,2 ; 4,3
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,002					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	85,0	83,3 ; 86,9	76,5	73,4 ; 79,7	94,0	92,2 ; 95,5
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	13,3	11,6 ; 15,0	20,5	17,5 ; 23,5	x	;
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	1,7*	1,0 ; 2,5	3,1*	1,8 ; 4,6	x	;

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	31,7	29,3 ; 34,2	18,7	16,6 ; 20,8	49,6	47,1 ; 52,2
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	23,3	20,1 ; 26,9	18,8	15,8 ; 21,9	57,9	54,1 ; 61,8
Femmes	41,7	18,2	40,1	40,4	36,8 ; 44,0	18,5	15,9 ; 21,4	41,1	37,4 ; 44,7
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,004					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	27,7	20,6 ; 35,2	18,5*	12,7 ; 24,7	53,8	45,9 ; 61,4
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	26,4	22,3 ; 30,4	21,3	17,9 ; 25,0	52,3	47,8 ; 56,6
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	38,4	34,4 ; 42,5	16,9	13,7 ; 20,2	44,7	40,5 ; 49,0
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	33,4	27,3 ; 39,5	15,7*	11,1 ; 20,7	50,9	44,5 ; 57,6
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,032					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	28,5	21,8 ; 35,3	12,0*	7,4 ; 16,9	59,6	52,1 ; 66,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	32,5	27,5 ; 37,4	20,4	15,8 ; 25,4	47,1	41,4 ; 52,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	29,5	25,3 ; 34,1	20,7	16,7 ; 24,8	49,8	44,9 ; 54,4
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	34,9	30,6 ; 39,3	18,8	15,2 ; 22,6	46,3	41,5 ; 51,0
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,900					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	30,1	23,2 ; 36,7	19,7*	14,2 ; 26,1	50,2	42,9 ; 57,5
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	31,7	29,2 ; 34,4	18,7	16,4 ; 21,1	49,6	46,7 ; 52,5
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,349					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	30,3	27,2 ; 33,2	20,1	17,6 ; 23,0	49,6	46,4 ; 52,8
Étudiants	28,8	16,3	54,9	30,2	21,6 ; 38,2	16,5*	10,6 ; 23,1	53,3	44,0 ; 62,2
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	31,0*	20,0 ; 42,4	19,5*	10,0 ; 30,1	49,5	37,1 ; 61,7
Retraités	38,0	12,4	49,6	37,3	32,1 ; 42,7	14,8	10,7 ; 18,9	48,0	42,3 ; 53,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région								
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité		
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	
2,0*	1,4 ; 2,7	50,5	48,1 ; 53,0	33,2	30,9 ; 35,4	14,3	12,6 ; 16,1	Ensemble de la population
P = 0,000								
0,8**	0,1 ; 1,6	42,3	38,5 ; 45,9	41,7	38,2 ; 45,5	15,2	12,5 ; 18,0	Sexe
3,3*	2,2 ; 4,4	58,5	55,3 ; 61,6	24,7	22,1 ; 27,6	13,4	11,3 ; 15,6	Hommes
P = 0,444								
x	;	79,9	67,0 ; 91,8	12,5**	3,0 ; 23,4	x	;	Groupe d'âge
3,8**	0,6 ; 7,7	66,0	56,8 ; 74,8	22,4*	14,5 ; 31,1	7,8**	3,0 ; 13,6	15-17 ans
P = 0,000								
3,7**	1,0 ; 6,9	70,2	63,0 ; 77,4	19,4	13,3 ; 25,7	6,7**	2,9 ; 11,3	15-24 ans
2,2**	1,0 ; 3,5	51,4	47,2 ; 56,0	32,9	28,4 ; 37,0	13,4	10,2 ; 16,8	25-44 ans
1,0**	0,3 ; 1,8	46,0	42,0 ; 50,1	35,1	31,2 ; 39,2	17,9	14,8 ; 20,9	45-64 ans
2,6**	1,1 ; 4,2	40,9	35,8 ; 45,8	41,5	36,7 ; 46,7	15,0	11,5 ; 18,7	65 ans et plus
P = 'n.d.'								
x	;	72,1	49,3 ; 93,4	x	;	x	;	Hommes
x	;	58,2	44,1 ; 71,3	28,5*	17,6 ; 41,3	x	;	15-17 ans
P = 'n.d.'								
x	;	61,6	49,8 ; 72,8	26,3*	16,9 ; 36,5	x	;	15-24 ans
x	;	40,2	33,5 ; 47,0	43,7	36,7 ; 50,4	x	;	25-44 ans
x	;	37,8	31,9 ; 43,7	43,5	37,5 ; 49,7	x	;	45-64 ans
x	;	38,0	30,9 ; 45,9	48,9	41,3 ; 56,6	x	;	65 ans et plus
P = 0,678								
x	;	85,6	69,7 ; 99,0	x	;	x	;	Femmes
x	;	75,6	63,5 ; 87,7	15,0**	5,0 ; 26,2	x	;	15-17 ans
P = 0,000								
3,7**	0,4 ; 7,9	79,2	69,9 ; 87,9	12,2**	5,1 ; 20,7	4,9**	0,2 ; 10,5	15-24 ans
4,8**	2,2 ; 7,5	64,4	58,5 ; 70,2	20,5	15,7 ; 25,6	10,3*	6,8 ; 14,1	25-44 ans
1,7**	0,5 ; 3,1	53,7	48,3 ; 58,9	27,2	22,5 ; 32,0	17,4	13,5 ; 21,5	45-64 ans
3,9**	1,6 ; 6,7	43,1	36,4 ; 49,5	36,0	29,9 ; 42,5	17,0	12,3 ; 22,2	65 ans et plus
P = 0,443								
2,3**	0,7 ; 4,1	45,6	40,1 ; 51,2	33,8	28,7 ; 39,2	18,3	14,0 ; 22,7	Niveau de scolarité
2,2**	0,7 ; 4,0	49,0	44,0 ; 54,3	33,1	27,9 ; 38,2	15,7	12,0 ; 19,5	Niveau inférieur au DES
1,7**	0,6 ; 3,1	52,8	48,1 ; 57,6	32,9	28,4 ; 37,5	12,5	9,5 ; 15,8	Diplôme d'études secondaires (DES)
2,0**	0,9 ; 3,2	52,5	47,9 ; 57,3	33,5	29,0 ; 38,2	12,0	9,0 ; 15,2	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>
P = 'n.d.'								
x	;	39,7	30,8 ; 49,4	41,5	32,1 ; 50,9	x	;	Diplôme d'études universitaires
x	;	42,6	34,6 ; 51,0	37,9	30,0 ; 45,9	x	;	Hommes
x	;	41,8	35,0 ; 48,8	44,1	37,1 ; 51,0	x	;	Niveau inférieur au DES
x	;	44,8	37,8 ; 52,0	42,7	35,6 ; 49,8	x	;	Diplôme d'études secondaires (DES)
P = 0,054								
2,5**	0,6 ; 4,8	49,9	42,7 ; 56,4	28,3	22,5 ; 34,5	19,3	13,9 ; 24,8	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>
3,4**	1,0 ; 6,2	55,4	48,1 ; 62,9	28,2	21,6 ; 35,2	12,9*	8,5 ; 17,8	Diplôme d'études universitaires
3,4**	1,1 ; 6,2	66,0	60,1 ; 72,4	19,6	14,6 ; 25,0	11,0*	7,4 ; 15,3	Indice du niveau de revenu du ménage
3,6**	1,5 ; 6,0	60,2	54,4 ; 66,4	24,2	18,8 ; 29,8	11,9*	7,8 ; 16,0	Quintile 1 (faible)
P = 0,242								
1,8**	0,5 ; 3,3	47,4	41,0 ; 53,4	32,4	26,7 ; 38,6	18,4	13,7 ; 23,5	Quintile 2 et suivants
1,9*	1,2 ; 2,7	50,8	48,0 ; 53,6	33,7	31,2 ; 36,5	13,5	11,6 ; 15,5	Femmes
P = 'n.d.'								
x	;	38,8	28,5 ; 50,1	41,5	30,6 ; 52,6	x	;	Hommes
x	;	42,1	37,9 ; 46,1	42,3	38,2 ; 46,5	x	;	Quintile 1 (faible)
P = 0,156								
2,4**	0,6 ; 4,6	52,8	45,0 ; 59,8	26,8	20,6 ; 33,2	18,0	13,1 ; 23,4	Quintile 2 et suivants
3,2*	1,9 ; 4,5	60,1	56,3 ; 63,9	24,7	21,5 ; 28,2	12,0	9,6 ; 14,5	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	38,1	35,8 ; 40,5	2,2*	1,5 ; 3,0	59,6	57,3 ; 61,9
Sexe	P = 0,000			P = 0,369					
Hommes	36,6	3,6	59,9	37,7	34,2 ; 41,2	2,8*	1,5 ; 4,2	59,5	56,0 ; 63,1
Femmes	40,5	2,3	57,1	38,5	35,4 ; 41,6	1,7*	0,9 ; 2,6	59,8	56,6 ; 62,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	16,9*	11,3 ; 23,1	4,2**	1,0 ; 8,0	78,8	72,1 ; 85,3
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	38,0	33,6 ; 42,4	1,3**	0,3 ; 2,6	60,7	56,3 ; 65,0
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	46,4	42,4 ; 50,2	2,1*	1,1 ; 3,3	51,5	47,6 ; 55,4
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	39,3	34,4 ; 44,4	2,6**	1,1 ; 4,3	58,1	53,1 ; 63,0
Hommes	P = 0,000			P = 0,153					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	14,7**	6,8 ; 23,7	7,8**	1,6 ; 15,3	77,5	67,6 ; 87,0
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	40,6	34,2 ; 47,5	x	;	x	;
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	45,2	39,0 ; 51,0	2,6**	0,8 ; 4,7	52,2	46,2 ; 58,4
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	36,6	29,3 ; 44,2	2,5**	0,5 ; 5,0	60,9	53,3 ; 68,1
Femmes	P = 0,000			P = 0,127					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	19,2*	10,9 ; 28,2	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	34,9	29,2 ; 40,9	1,9**	0,3 ; 3,9	63,2	57,1 ; 69,0
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	47,5	42,2 ; 52,7	1,6**	0,5 ; 2,9	50,9	45,8 ; 56,2
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	41,3	34,8 ; 47,9	2,6**	0,6 ; 5,3	56,0	49,3 ; 62,5
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	30,5**	14,1 ; 47,4	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	10,2	8,1 ; 12,3	2,9*	1,7 ; 4,2	86,9	84,6 ; 89,3
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	60,1	55,8 ; 64,4	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	90,2	86,0 ; 93,9	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	6,1*	3,4 ; 9,2	4,8**	2,2 ; 7,6	89,1	85,2 ; 92,9
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	52,2	46,3 ; 58,2	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	88,7	81,0 ; 94,9	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	24,1**	8,9 ; 42,0	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	13,1	10,2 ; 16,2	1,6**	0,6 ; 2,7	85,3	82,1 ; 88,3
Embonpoint	69,6	x	x	73,4	67,4 ; 79,1	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	92,0	87,1 ; 96,5	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	81,2	78,0 ; 84,4	11,6	9,0 ; 14,3	7,2	5,1 ; 9,2
Sexe	P = 0,000			P = 0,809					
Hommes	81,4	10,5	8,0	81,9	76,6 ; 87,1	10,7*	6,2 ; 15,3	7,4*	3,8 ; 11,2
Femmes	74,5	14,1	11,5	80,7	76,8 ; 84,5	12,4	9,0 ; 16,0	6,9*	4,6 ; 9,5
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,842					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	90,9	81,9 ; 98,5	x	;	x	;
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	77,4	71,0 ; 83,6	14,9*	9,5 ; 20,8	7,7**	3,8 ; 12,0
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	81,3	76,1 ; 86,0	11,1*	7,2 ; 15,4	7,6*	4,5 ; 11,1
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	81,3	73,4 ; 88,4	10,8**	5,1 ; 17,4	8,0**	3,2 ; 13,4
Hommes	P = 0,252			P = 0,763					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	98,7	92,8 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	74,8	63,7 ; 86,1	15,1**	6,0 ; 25,1	10,1**	2,7 ; 18,6
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	82,7	74,8 ; 90,5	11,0**	4,6 ; 18,1	6,3**	1,7 ; 11,6
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	86,4	74,4 ; 96,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,960					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	86,8	73,4 ; 98,3	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	79,7	72,3 ; 86,4	14,6*	8,5 ; 21,5	5,6**	2,0 ; 9,9
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	80,2	73,3 ; 86,2	11,2*	6,2 ; 16,6	8,6*	4,5 ; 13,4
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	77,8	67,1 ; 87,4	14,5**	6,0 ; 24,1	7,6**	1,7 ; 14,5
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,065					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	86,2	81,0 ; 90,8	8,9*	5,2 ; 13,4	4,9**	2,2 ; 8,1
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	81,8	76,7 ; 86,4	11,1*	7,3 ; 15,3	7,1*	4,1 ; 10,2
Obésité	72,3	14,4	13,3	73,6	65,7 ; 81,3	16,5*	9,9 ; 23,5	9,8**	4,6 ; 16,0
Hommes	P = 0,002			P = 0,552					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	87,5	77,7 ; 96,4	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	86,0	78,9 ; 92,4	7,0**	2,2 ; 12,6	7,0**	2,7 ; 12,1
Obésité	76,0	12,2	11,8	70,4	57,4 ; 83,2	18,9**	7,5 ; 30,9	10,7**	2,1 ; 20,8
Femmes	P = 0,161			P = 0,282					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	85,6	79,2 ; 91,2	9,2**	4,5 ; 14,8	5,2**	2,0 ; 9,1
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	77,5	70,2 ; 84,4	15,4*	9,4 ; 21,9	7,1**	3,1 ; 11,6
Obésité	68,9	16,4	14,7	77,0	67,5 ; 85,2	14,1*	7,4 ; 21,8	8,9**	3,2 ; 15,9

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
18,3	16,4 ; 20,3	18,5	16,5 ; 20,4	3,0*	2,0 ; 4,0	60,2	57,8 ; 62,7	Ensemble de la population	
P = 0,000									
15,3	12,5 ; 18,1	17,1	14,2 ; 20,0	4,9*	3,0 ; 6,8	62,8	59,0 ; 66,5	Sexe	
21,2	18,6 ; 24,1	19,8	17,3 ; 22,4	1,2**	0,5 ; 1,9	57,8	54,6 ; 61,0	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
13,4*	7,7 ; 19,3	17,7*	12,0 ; 23,6	8,2**	3,7 ; 13,4	60,7	53,3 ; 68,8	Groupe d'âge	
18,6	15,3 ; 22,1	19,1	15,6 ; 22,7	3,4**	1,7 ; 5,5	58,9	54,4 ; 63,1	15-24 ans	
21,6	18,1 ; 25,0	19,6	16,3 ; 22,7	1,2**	0,4 ; 2,2	57,7	53,8 ; 61,5	25-44 ans	
15,0	11,4 ; 18,7	15,5	12,0 ; 19,1	1,3**	0,3 ; 2,6	68,2	63,8 ; 73,0	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,008									
9,1**	2,6 ; 16,7	12,1**	5,1 ; 20,0	16,3**	7,4 ; 26,4	62,5	51,0 ; 73,9	Hommes	
15,1*	10,4 ; 20,3	19,1	13,6 ; 24,7	4,6**	1,5 ; 8,2	61,2	54,0 ; 68,0	15-24 ans	
19,1	14,2 ; 24,2	17,2	12,6 ; 21,9	1,4**	0,1 ; 3,1	62,3	56,7 ; 68,1	25-44 ans	
12,6*	7,4 ; 18,3	17,3*	11,2 ; 23,8	1,9**	0,0 ; 4,5	68,2	60,4 ; 75,6	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,541									
17,8*	9,3 ; 27,2	23,4*	14,0 ; 33,0	x	;	x	;	Femmes	
22,4	17,6 ; 27,3	19,2	14,7 ; 23,9	2,1**	0,6 ; 4,1	56,3	50,6 ; 62,0	15-24 ans	
23,8	19,3 ; 28,8	21,8	17,3 ; 26,5	1,0**	0,0 ; 2,4	53,4	47,7 ; 58,6	25-44 ans	
16,8	12,0 ; 21,9	14,1*	9,6 ; 18,7	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,064									
x	;	x	;	x	;	78,1	62,3 ; 93,0	Statut pondéral	
8,6	6,8 ; 10,6	17,0	14,4 ; 19,7	4,6*	3,0 ; 6,6	69,7	66,4 ; 72,9	Poids insuffisant	
24,3	20,5 ; 28,0	21,4	17,9 ; 25,1	1,0**	0,1 ; 2,3	53,3	48,9 ; 57,7	Poids normal	
41,9	34,6 ; 48,4	19,4	14,4 ; 24,7	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,008									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
4,8*	2,6 ; 7,3	13,3*	9,2 ; 17,5	9,2*	5,3 ; 13,4	72,7	67,1 ; 78,0	Poids insuffisant	
16,9	12,6 ; 21,4	20,9	16,0 ; 26,1	1,6**	0,1 ; 3,7	60,5	54,6 ; 66,7	Poids normal	
40,9	30,6 ; 50,9	18,5*	11,7 ; 26,2	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,198									
x	;	x	;	x	;	75,9	58,6 ; 93,0	Femmes	
11,3	8,5 ; 14,5	19,7	16,2 ; 23,2	1,4**	0,5 ; 2,5	67,5	63,2 ; 71,6	Poids insuffisant	
36,4	29,9 ; 43,0	22,2	17,0 ; 27,5	x	;	x	;	Poids normal	
42,9	34,1 ; 51,9	20,5*	12,8 ; 28,3	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
39,2	35,1 ; 43,2	21,4	18,1 ; 24,7	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	31,2**	12,5 ; 50,3	63,7	44,9 ; 83,1	Excès de poids	
5,8	4,3 ; 7,3	17,4	14,9 ; 19,7	3,4*	2,1 ; 4,8	73,5	70,6 ; 76,3	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
33,3	27,7 ; 39,1	13,0*	9,1 ; 17,3	5,4**	2,7 ; 8,3	48,3	42,4 ; 54,2	Ensemble de la population	
P = 0,322									
40,4	30,4 ; 50,5	10,0**	3,7 ; 17,7	3,9**	0,4 ; 8,4	45,8	35,9 ; 56,6	Sexe	
28,6	22,2 ; 35,4	15,0*	10,0 ; 20,6	6,3**	2,7 ; 10,7	50,0	42,7 ; 57,5	Hommes	
P = 0,765									
26,6**	8,7 ; 49,0	x	;	x	;	54,1*	29,2 ; 76,5	Groupe d'âge	
47,4	36,0 ; 58,2	12,1**	5,7 ; 19,6	6,6**	1,6 ; 12,8	33,8	24,2 ; 44,0	15-24 ans	
29,7	21,6 ; 38,3	16,2*	9,3 ; 23,5	2,8**	0,2 ; 6,0	51,3	41,7 ; 60,2	25-44 ans	
15,7**	5,8 ; 27,0	5,5**	0,2 ; 12,0	8,9**	1,3 ; 17,7	69,9	57,0 ; 82,0	45-64 ans	
P = 'n.d.'									
x	;	x	;	x	;	72,3*	23,7 ; 100,0	Hommes	
62,4	43,4 ; 79,7	x	;	x	;	23,8**	10,0 ; 40,6	15-24 ans	
33,9*	20,1 ; 49,1	13,6**	3,2 ; 25,7	x	;	51,6	36,4 ; 67,1	25-44 ans	
x	;	x	;	x	;	68,6	46,1 ; 91,1	45-64 ans	
P = 0,945									
26,2**	4,6 ; 53,4	x	;	x	;	46,8**	17,9 ; 75,6	Femmes	
37,0*	24,6 ; 49,4	15,3**	7,0 ; 25,4	7,0**	0,4 ; 15,1	40,8*	28,1 ; 53,8	15-24 ans	
26,6*	17,0 ; 37,2	18,2*	10,1 ; 27,7	x	;	x	;	25-44 ans	
17,9**	4,8 ; 32,8	x	;	x	;	70,6	54,2 ; 85,8	45-64 ans	
P = 0,889									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
35,1*	23,2 ; 47,3	12,2**	4,3 ; 21,6	x	;	x	;	Poids insuffisant	
29,5	21,3 ; 38,0	13,0*	7,1 ; 19,2	5,7**	1,7 ; 10,6	51,9	42,5 ; 61,2	Poids normal	
37,2	26,6 ; 48,4	14,4**	7,1 ; 23,0	6,4**	1,0 ; 13,1	42,0	31,1 ; 52,6	Embonpoint	
P = 'n.d.'									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
35,9**	12,8 ; 63,2	x	;	x	;	52,2*	26,6 ; 79,2	Poids insuffisant	
34,3*	19,7 ; 48,3	6,8**	1,0 ; 14,0	x	;	x	;	Poids normal	
49,0*	32,2 ; 65,8	x	;	x	;	37,0*	21,4 ; 53,8	Embonpoint	
P = 0,821									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
34,9*	21,6 ; 48,9	12,3**	3,6 ; 22,2	x	;	x	;	Poids insuffisant	
25,8*	16,0 ; 36,9	17,7**	8,1 ; 27,4	x	;	x	;	Poids normal	
25,3*	13,9 ; 37,8	15,7**	6,9 ; 26,4	11,8**	1,5 ; 23,3	47,1	33,0 ; 60,8	Embonpoint	
P = 0,821									
x	;	x	;	x	;	x	;	Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	87,3	84,4 ; 90,1	7,6*	5,4 ; 10,1	5,1*	3,3 ; 6,9
Sexe	P = 0,001			P = 0,268					
Hommes	88,9	6,9	4,2	84,6	79,1 ; 89,6	9,5*	5,4 ; 14,2	5,8**	2,9 ; 9,3
Femmes	85,7	7,5	6,8	89,3	86,0 ; 92,3	6,1*	3,8 ; 8,8	4,5*	2,5 ; 6,9
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,926					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	88,1	78,0 ; 97,4	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	89,0	84,0 ; 93,4	7,6**	3,7 ; 12,0	3,5**	1,0 ; 6,6
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	84,0	79,0 ; 88,7	9,7*	5,7 ; 13,9	6,4*	3,5 ; 9,6
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	92,3	86,8 ; 97,0	x	;	x	;
Hommes	P = 0,121			P = 0,982					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	80,1	56,3 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	85,0	75,5 ; 92,8	10,6**	3,4 ; 19,0	4,4**	0,6 ; 9,5
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	82,4	73,3 ; 91,3	11,6**	4,2 ; 19,9	6,1**	1,3 ; 11,6
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	93,9	85,2 ; 100,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,991					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	92,3	81,9 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	92,4	86,8 ; 97,3	x	;	x	;
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	85,2	79,1 ; 90,5	8,2**	3,9 ; 13,0	6,6**	3,2 ; 10,6
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	91,2	83,6 ; 97,7	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,016					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	92,0	87,9 ; 95,7	5,1**	2,0 ; 8,4	3,0**	0,8 ; 5,6
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	87,7	83,1 ; 91,8	6,3**	3,2 ; 10,0	6,0**	2,9 ; 9,5
Obésité	82,0	8,7	9,2	79,1	71,2 ; 86,7	14,2*	7,3 ; 21,2	6,7**	2,7 ; 11,1
Hommes	P = 0,002			P = 0,763					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	93,7	85,8 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	85,4	78,0 ; 92,3	7,0**	2,1 ; 13,3	7,6**	2,7 ; 13,3
Obésité	85,2	8,2	6,6*	75,6	62,9 ; 88,1	18,6**	7,4 ; 30,6	5,8**	0,3 ; 12,2
Femmes	P = 0,034			P = 0,545					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	91,3	86,3 ; 95,7	5,5**	1,9 ; 9,5	3,3**	0,4 ; 6,9
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	90,1	84,7 ; 94,9	5,6**	1,9 ; 9,8	4,2**	0,9 ; 8,3
Obésité	79,1	9,2	11,8	82,8	73,0 ; 91,4	9,5**	2,8 ; 17,6	7,6**	2,1 ; 14,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	5,1*	3,3 ; 6,9	94,9	93,1 ; 96,7
Sexe	P = 0,024		P = 0,528			
Hommes	6,6	93,4	4,3**	1,8 ; 7,3	95,7	92,7 ; 98,2
Femmes	8,6	91,4	5,6*	3,1 ; 8,3	94,4	91,7 ; 96,9
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,707			
15-24 ans	11,2*	88,8	x	;	x	;
25-44 ans	8,0	92,0	6,3**	2,7 ; 10,4	93,7	89,6 ; 97,3
45-64 ans	7,5	92,5	4,4*	2,3 ; 6,9	95,6	93,1 ; 97,7
65 ans et plus	4,9	95,1	x	;	x	;
Hommes	P = 0,409		P = 0,769			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	x	;	x	;
45-64 ans	7,0	93,0	3,2**	0,4 ; 6,4	96,8	93,6 ; 99,6
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,407			
15-24 ans	12,3*	87,7	x	;	x	;
25-44 ans	9,9	90,1	7,5**	2,2 ; 13,5	92,5	86,5 ; 97,8
45-64 ans	7,8	92,2	5,4**	2,1 ; 9,2	94,6	90,8 ; 97,9
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,881			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	5,6**	2,2 ; 9,5	94,4	90,5 ; 97,8
Embonpoint	6,6	93,4	4,5**	1,9 ; 7,5	95,5	92,5 ; 98,1
Obésité	11,3	88,7	5,1**	1,9 ; 9,1	94,9	90,9 ; 98,1
Hommes	P = 0,000		P = 0,612			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	5,5**	1,8 ; 10,0	94,5	90,0 ; 98,2
Obésité	11,5	88,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,032		P = 0,612			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	6,6**	2,4 ; 11,5	93,4	88,5 ; 97,6
Embonpoint	8,4	91,6	3,5**	0,2 ; 8,3	96,5	91,7 ; 99,8
Obésité	11,1	88,9	7,1**	1,5 ; 14,1	92,9	85,9 ; 98,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	0,8**	0,2 ; 1,6	x	;	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	0,5**	0,0 ; 1,1	x	;	x	;
Rarement	2,8	2,6*	2,9	1,8**	0,6 ; 3,1	x	;	2,9**	1,0 ; 5,2
Jamais	94,8	94,8	94,8	97,0	95,5 ; 98,4	98,5	96,8 ; 99,8	95,8	93,4 ; 98,0
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,743					
Souvent	4,6	4,2	4,9	3,3*	1,9 ; 4,9	3,0**	0,9 ; 5,7	3,6**	1,6 ; 5,8
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	7,0*	4,8 ; 9,4	8,1*	4,2 ; 12,4	6,1*	3,4 ; 8,9
Rarement	5,1	5,5	4,9	3,9*	2,3 ; 5,8	4,6**	1,9 ; 8,0	3,4**	1,5 ; 5,6
Jamais	82,9	81,4	84,0	85,8	82,8 ; 88,9	84,2	78,7 ; 89,3	86,9	83,0 ; 90,7
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,488					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	1,3**	0,5 ; 2,2	x	;	1,5**	0,5 ; 2,8
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	5,1*	3,5 ; 6,9	x	;	6,8*	4,3 ; 9,6
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,7*	2,9 ; 6,7	4,2**	1,8 ; 7,0	5,1*	2,7 ; 7,8
Jamais	86,5	87,5	85,7	88,9	86,3 ; 91,3	92,0	88,3 ; 95,2	86,6	82,9 ; 89,8
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	99,3	98,7 ; 99,8	99,3	98,2 ; 100,0	99,3	98,4 ; 100,0
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,9	99,7 ; 100,0	x	;	99,9	99,6 ; 100,0
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	99,1	98,1 ; 99,9	99,4	98,3 ; 100,0	98,9	97,2 ; 100,0
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,3	98,4 ; 100,0	x	;	98,8	97,3 ; 99,9
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	x	;	x	;	x	;
Jamais	97,3	98,6	96,3	99,0	98,2 ; 99,7	99,6	98,5 ; 100,0	98,6	97,4 ; 99,6



Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	99,3	98,6 ; 99,9	x	;	98,9	97,6 ; 99,8
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,6	99,0 ; 100,0	x	;	99,3	98,3 ; 100,0
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	x	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
4,3*	2,7 ; 6,0	36,9	33,0 ; 41,2	40,3	36,2 ; 44,3	18,6	15,3 ; 22,1	Ensemble de la population	
P = 0,448									
Sexe									
3,7**	1,3 ; 6,5	40,7	34,0 ; 47,2	38,2	31,7 ; 44,6	17,4*	12,2 ; 23,0	Hommes	
4,7*	2,7 ; 7,0	34,0	29,0 ; 39,2	41,8	36,2 ; 47,0	19,5	15,1 ; 24,2	Femmes	
P = 0,677									
Groupe d'âge									
x	;	38,2*	24,0 ; 52,7	42,0*	28,2 ; 57,0	x	;	15-24 ans	
5,1**	1,8 ; 8,6	32,9	26,2 ; 40,0	37,4	30,1 ; 44,4	24,6	18,3 ; 31,3	25-44 ans	
2,9**	1,2 ; 5,0	37,6	31,4 ; 44,2	41,7	35,2 ; 47,9	17,7	12,8 ; 22,9	45-64 ans	
8,5**	3,3 ; 14,6	43,3	33,4 ; 52,4	41,4	31,9 ; 51,3	6,8**	1,7 ; 12,9	65 ans et plus	
P = 0,991									
Hommes									
x	;	37,9**	13,1 ; 65,0	37,8**	12,8 ; 65,6	x	;	15-24 ans	
x	;	38,1	26,9 ; 50,0	34,7*	22,7 ; 46,5	x	;	25-44 ans	
x	;	43,0	32,8 ; 53,3	40,2	30,0 ; 50,6	x	;	45-64 ans	
x	;	43,2*	28,1 ; 58,8	42,4*	26,4 ; 59,1	x	;	65 ans et plus	
P = 0,503									
Femmes									
x	;	38,4*	21,9 ; 56,2	44,3*	26,9 ; 61,4	x	;	15-24 ans	
7,2**	2,3 ; 12,9	28,5	20,7 ; 37,0	39,7	30,9 ; 49,1	24,6*	16,7 ; 33,0	25-44 ans	
2,8**	0,7 ; 5,3	33,5	25,9 ; 41,5	42,9	34,6 ; 51,1	20,8*	14,0 ; 28,0	45-64 ans	
x	;	43,3	30,4 ; 56,3	40,7	28,8 ; 53,2	x	;	65 ans et plus	
P = 0,877									
Statut pondéral									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
5,6**	2,4 ; 9,4	38,5	31,7 ; 45,5	38,3	31,5 ; 45,1	17,6*	12,2 ; 23,7	Poids normal	
2,4**	0,7 ; 4,6	40,4	33,8 ; 47,3	38,8	32,5 ; 45,3	18,4	13,3 ; 24,1	Embonpoint	
5,4**	2,0 ; 9,4	29,5	22,1 ; 37,5	43,4	34,1 ; 52,0	21,8*	14,0 ; 29,8	Obésité	
P = 0,661									
Hommes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
9,1**	1,1 ; 19,0	38,7*	25,3 ; 52,7	39,0*	25,8 ; 53,2	13,2**	3,1 ; 24,0	Poids normal	
x	;	48,5	38,7 ; 58,6	33,3	24,4 ; 42,7	x	;	Embonpoint	
x	;	29,3*	18,1 ; 41,1	45,8	31,8 ; 59,2	x	;	Obésité	
P = 0,945									
Femmes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
4,1**	0,9 ; 8,0	38,5	30,1 ; 46,7	38,0	29,9 ; 46,5	19,4*	13,0 ; 26,9	Poids normal	
4,1**	0,8 ; 8,2	31,7	23,4 ; 40,5	44,6	35,6 ; 53,7	19,5*	12,1 ; 27,0	Embonpoint	
6,9**	1,8 ; 13,2	29,7*	19,6 ; 40,8	40,8	28,6 ; 52,7	22,6*	12,2 ; 33,4	Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>									
		P = 0,018				P = 0,154			
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	50,4	46,5 ; 54,8	52,8	46,1 ; 59,7	48,7	43,5 ; 53,9
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	37,3	33,1 ; 41,1	33,0	26,5 ; 39,4	40,4	35,2 ; 45,6
Non	14,4	15,3	13,7	12,3	9,7 ; 15,1	14,2*	9,9 ; 19,3	10,9	7,9 ; 14,1
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,788			
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	40,8	36,7 ; 44,8	41,5	34,3 ; 48,1	40,3	35,2 ; 45,4
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	41,0	37,0 ; 45,2	41,6	35,0 ; 48,5	40,6	35,4 ; 45,7
Non	19,6	22,6	17,4	18,2	15,1 ; 21,4	16,9	12,6 ; 21,7	19,1	14,9 ; 23,4
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,065			
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	42,9	38,9 ; 47,1	37,4	30,6 ; 44,3	47,0	41,8 ; 52,1
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	32,6	28,5 ; 36,5	34,7	28,4 ; 41,1	31,0	26,1 ; 35,9
Non	27,7	32,4	24,3	24,5	21,1 ; 27,9	27,9	22,4 ; 33,6	22,0	17,8 ; 26,4
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,109			
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	46,0	42,0 ; 50,0	42,1	35,4 ; 48,8	48,9	44,0 ; 54,0
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	29,6	25,9 ; 33,6	29,2	22,9 ; 35,7	29,9	25,2 ; 34,7
Non	26,1	27,4	25,1	24,4	21,0 ; 27,7	28,6	23,0 ; 34,6	21,2	17,4 ; 25,1
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,053			
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	65,5	61,5 ; 69,4	60,6	54,1 ; 67,0	69,1	64,2 ; 73,6
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	19,0	15,8 ; 22,3	23,0	17,4 ; 28,8	16,1	12,6 ; 20,0
Non	17,4	18,5	16,6	15,5	12,8 ; 18,4	16,5	11,9 ; 21,3	14,8	11,3 ; 18,5
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,011			
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	66,0	62,0 ; 69,6	59,3	52,7 ; 65,6	71,0	66,1 ; 75,6
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	22,6	19,2 ; 26,1	28,0	21,9 ; 34,2	18,6	14,9 ; 22,6
Non	12,6	14,0	11,6	11,4	8,9 ; 14,0	12,6*	8,5 ; 17,3	10,4	7,2 ; 13,8
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,280			
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	52,1	48,2 ; 56,2	48,5	42,0 ; 55,0	54,9	49,7 ; 60,0
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	26,5	23,2 ; 30,0	29,2	23,1 ; 35,2	24,5	20,2 ; 29,1
Non	21,5	24,4	19,4	21,3	18,0 ; 24,5	22,3	17,1 ; 27,8	20,6	16,4 ; 25,0
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,024			
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	12,1	9,5 ; 14,8	12,2*	7,9 ; 16,7	12,1	8,7 ; 15,8
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	21,6	18,2 ; 25,1	27,1	21,2 ; 33,2	17,5	13,8 ; 21,5
Non	72,0	67,3	75,4	66,2	62,5 ; 70,3	60,7	54,4 ; 66,9	70,4	65,6 ; 75,1
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,011			
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	38,3	34,5 ; 42,4	44,7	38,4 ; 51,4	33,6	28,7 ; 38,7
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	11,3	8,7 ; 14,0	12,3*	7,8 ; 17,1	10,6	7,5 ; 13,9
Non	49,9	43,2	54,7	50,4	46,5 ; 54,3	43,0	36,6 ; 49,7	55,9	50,6 ; 60,8

Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>									
		P = 0,000				P = 0,404			
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	51,7	47,5 ; 55,8	49,9	43,2 ; 56,6	53,0	47,6 ; 58,1
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	16,9	13,8 ; 20,2	19,4	13,9 ; 25,1	15,0	11,2 ; 19,1
Non	29,6	28,8	30,2	31,4	27,7 ; 35,4	30,8	24,7 ; 37,1	32,0	27,2 ; 37,0
<b>Cuisiner davantage</b>									
		P = 0,000				P = 0,624			
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	34,6	30,8 ; 38,6	32,4	26,3 ; 38,9	36,2	31,3 ; 41,1
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	16,1	13,1 ; 19,4	16,7	11,9 ; 22,3	15,6	11,6 ; 19,8
Non	48,5	52,0	45,9	49,4	45,3 ; 53,5	50,9	44,0 ; 58,0	48,2	43,0 ; 53,4
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>									
		P = 0,002				P = 0,236			
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	35,4	31,5 ; 39,2	36,6	29,9 ; 42,9	34,5	29,6 ; 39,7
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	24,5	21,0 ; 28,1	27,2	21,1 ; 33,4	22,4	18,2 ; 26,9
Non	37,5	34,7	39,5	40,1	36,2 ; 44,1	36,2	30,0 ; 42,7	43,1	37,9 ; 48,3

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.  
 2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.  
 \* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.  
 \*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.  
 Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
50,0	47,7 ; 52,3	38,1	35,8 ; 40,6	11,9	10,3 ; 13,6	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
44,7	41,1 ; 48,4	40,0	36,3 ; 43,7	15,3	12,5 ; 18,2	Hommes
55,2	52,2 ; 58,3	36,2	33,3 ; 39,2	8,6	6,7 ; 10,7	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
64,9	50,3 ; 78,3	12,5**	3,5 ; 22,9	22,6**	10,6 ; 36,3	15-17 ans
24,6*	16,9 ; 32,6	38,4	29,1 ; 47,7	37,0	27,8 ; 46,5	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
37,5	29,9 ; 44,7	30,1	23,1 ; 37,6	32,4	25,1 ; 40,2	25-44 ans
33,4	29,2 ; 37,7	51,4	46,8 ; 55,8	15,2	12,0 ; 18,7	45-64 ans
52,6	48,6 ; 56,6	42,2	38,2 ; 46,3	5,2*	3,6 ; 7,0	65 ans et plus
91,4	88,3 ; 94,2	x	;	x	;	
		P = 0,000				Hommes
54,5*	29,0 ; 78,0	22,8**	4,7 ; 44,1	22,7**	4,5 ; 44,3	15-17 ans
25,9*	14,5 ; 38,2	33,0*	20,3 ; 46,6	41,1	27,3 ; 54,5	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
33,3*	22,4 ; 44,3	30,3*	19,9 ; 41,2	36,3	24,9 ; 47,6	25-44 ans
29,6	23,5 ; 36,1	51,7	44,9 ; 58,3	18,7	13,4 ; 24,7	45-64 ans
48,8	42,6 ; 54,5	43,0	37,0 ; 49,4	8,2*	5,3 ; 11,6	65 ans et plus
85,2	79,0 ; 90,7	x	;	x	;	
		P = 0,037				Femmes
72,1	51,7 ; 89,3	x	;	x	;	15-17 ans
23,0*	12,0 ; 34,4	45,1	31,8 ; 59,0	31,9*	19,2 ; 46,0	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
41,8	30,5 ; 52,5	29,9*	20,6 ; 40,6	28,4*	18,5 ; 39,0	25-44 ans
37,5	31,8 ; 43,4	51,0	45,3 ; 56,8	11,5*	7,9 ; 15,5	45-64 ans
56,2	50,9 ; 61,5	41,4	36,3 ; 46,8	2,4**	0,8 ; 4,3	65 ans et plus
96,2	93,7 ; 98,3	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	47,9	45,8 ; 50,3	53,4	49,8 ; 57,0	42,7	39,7 ; 45,8
Non	56,1	49,9	62,1	52,1	49,7 ; 54,2	46,6	43,0 ; 50,2	57,3	54,2 ; 60,3
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	10,0	8,6 ; 11,5	13,7	11,2 ; 16,4	6,4	4,9 ; 8,1
Non	89,4	85,6	93,2	90,0	88,5 ; 91,4	86,3	83,6 ; 88,8	93,6	91,9 ; 95,1
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	7,3	9,1	5,5	7,4	6,1 ; 8,9	10,1	7,9 ; 12,6	4,8*	3,4 ; 6,4
Non	92,7	90,9	94,5	92,6	91,1 ; 93,9	89,9	87,4 ; 92,1	95,2	93,6 ; 96,6
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,005					
Oui	5,1	6,3	3,9	5,1	3,9 ; 6,3	6,9	4,8 ; 9,0	3,3*	2,1 ; 4,7
Non	94,9	93,7	96,1	94,9	93,7 ; 96,1	93,1	91,0 ; 95,2	96,7	95,3 ; 97,9
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	12,3	16,1	8,7	13,7	12,0 ; 15,5	18,4	15,5 ; 21,5	9,1	7,3 ; 11,0
Non	87,7	83,9	91,3	86,3	84,5 ; 88,0	81,6	78,5 ; 84,5	90,9	89,0 ; 92,7
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = 0,449					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,2**	0,1 ; 0,5	x	;	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	99,8	99,5 ; 99,9	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,852					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,5**	0,2 ; 1,0	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,5	99,0 ; 99,8	99,4	98,7 ; 99,9	x	;
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,075					
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,8**	0,3 ; 1,4	1,4**	0,4 ; 2,5	x	;
Non	99,2	98,8	99,7	99,2	98,6 ; 99,7	98,6	97,5 ; 99,6	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,638					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,7*	1,1 ; 2,4	1,9**	0,9 ; 3,0	1,6**	0,8 ; 2,4
Non	98,2	98,1	98,4	98,3	97,6 ; 98,9	98,1	97,0 ; 99,1	98,4	97,6 ; 99,2
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,171					
Oui	1,6	2,3	0,9	1,4*	0,8 ; 2,1	1,9**	0,8 ; 3,0	1,0**	0,3 ; 1,6
Non	98,4	97,7	99,1	98,6	97,9 ; 99,2	98,1	97,0 ; 99,2	99,0	98,4 ; 99,7
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,199					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,4**	0,1 ; 0,8	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,6	99,2 ; 99,9	99,4	98,7 ; 99,9	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	12,2	16,2	8,3	11,0	9,4 ; 12,5	14,3	11,6 ; 17,0	7,7	6,0 ; 9,7	
Non	87,8	83,8	91,7	89,0	87,5 ; 90,6	85,7	83,0 ; 88,4	92,3	90,3 ; 94	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,439				
Oui	1,6	2,3	0,8	1,3**	0,7 ; 2	1,6**	0,6 ; 2,9	1,0**	0,3 ; 1,9	
Non	98,4	97,7	99,2	98,7	98,0 ; 99,3	98,4	97,1 ; 99,4	99,0	98,1 ; 99,7	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,040				
Oui	1,8	2,4	1,3	1,9*	1,1 ; 2,7	2,7**	1,4 ; 4,4	1,1**	0,4 ; 1,9	
Non	98,2	97,6	98,7	98,1	97,3 ; 98,9	97,3	95,6 ; 98,6	98,9	98,1 ; 99,6	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,092				
Oui	1,4	1,7	1,0	1,5*	0,8 ; 2,4	2,3**	1,0 ; 3,8	0,8**	0,1 ; 1,7	
Non	98,6	98,3	99,0	98,5	97,6 ; 99,2	97,7	96,2 ; 99,0	99,2	98,3 ; 99,9	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,146				
Oui	0,8	1,2	0,4*	1,2**	0,6 ; 1,9	1,7**	0,6 ; 3,0	x	;	
Non	99,2	98,8	99,6	98,8	98,1 ; 99,4	98,3	97,0 ; 99,4	x	;	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = .				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = .				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = 0,975				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,041				
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	x	;	x	;	x	;	
Non	99,6	99,6	99,7	x	;	x	;	x	;	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	11,9	10,3 ; 13,6	15,3	12,5 ; 18,2	8,6	6,7 ; 10,7
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	22,6**	10,6 ; 36,3	22,7**	4,5 ; 44,3	22,5**	6,9 ; 40,6
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	37,0	27,8 ; 46,5	41,1	27,3 ; 54,5	31,9*	19,2 ; 46,0
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	15,2	12,0 ; 18,7	18,7	13,4 ; 24,7	11,5*	7,9 ; 15,5
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	5,2*	3,6 ; 7,0	8,2*	5,3 ; 11,6	2,4**	0,8 ; 4,3
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	31,4	29,1 ; 33,7	7,3	6,0 ; 8,6	11,3	9,7 ; 13,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	31,4	27,7 ; 34,9	8,0	5,9 ; 10,2	15,9	13,2 ; 18,9
Femmes	25,4	6,8	7,4	31,5	28,5 ; 34,6	6,5	5,0 ; 8,1	6,8	5,2 ; 8,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,001					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	28,4*	15,3 ; 43,2	x	;	x	;
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	41,9	32,5 ; 51,2	9,9**	4,8 ; 16,1	23,6*	16,2 ; 32,0
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	37,6	30,0 ; 45,2	7,4*	3,6 ; 11,7	17,5*	12,0 ; 23,7
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	35,1	30,7 ; 39,4	13,3	10,3 ; 16,4	18,2	14,6 ; 21,9
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	35,6	31,9 ; 39,3	4,7*	3,1 ; 6,3	7,1*	5,2 ; 9,2
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	7,6*	4,9 ; 10,6	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,244					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	33,2**	11,4 ; 57,0	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	39,9*	26,8 ; 53,0	8,8**	1,8 ; 16,9	25,4*	14,4 ; 37,7
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	38,1	27,0 ; 49,5	7,8**	2,3 ; 14,0	20,7*	12,0 ; 30,2
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	32,2	25,9 ; 38,4	13,9*	9,2 ; 18,8	24,2	18,0 ; 30,2
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	34,7	29,1 ; 40,7	4,9**	2,5 ; 7,7	11,5*	7,9 ; 15,6
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	12,6*	7,5 ; 18,7	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,091					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	25,1**	8,5 ; 44,1	x	;	x	;
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	44,5	30,7 ; 57,7	11,2**	3,8 ; 20,7	21,3*	11,0 ; 33,5
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	37,1	26,5 ; 48,0	6,9**	2,2 ; 12,9	14,2*	7,2 ; 22,7
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	38,3	32,6 ; 44,5	12,6	8,7 ; 16,4	11,6*	8,0 ; 15,6
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	36,4	31,3 ; 41,6	4,4*	2,5 ; 6,6	3,0**	1,4 ; 4,8
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	3,8**	1,7 ; 6,3	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	79,0	77,3 ; 80,6	85,1	82,6 ; 87,3	73,2	70,8 ; 75,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	50,4	35,4 ; 66,4	61,4*	37,1 ; 85,8	42,7*	21,9 ; 64,3
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	84,0	76,7 ; 91,0	88,1	78,6 ; 95,9	79,0	66,5 ; 90,4
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	73,4	66,5 ; 80,5	81,2	71,4 ; 89,8	65,3	54,6 ; 77,0
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	95,1	93,0 ; 97,0	93,9	90,1 ; 97,2	96,5	94,4 ; 98,1
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	82,4	79,7 ; 84,9	89,8	86,2 ; 93,1	75,4	71,2 ; 79,2
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	54,5	49,1 ; 59,9	62,7	53,4 ; 71,1	48,7	41,7 ; 55,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	79,5	75,4 ; 83,2	88,8	83,8 ; 93,3	70,3	64,2 ; 76,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	87,0	84,0 ; 89,9	89,9	85,7 ; 93,7	83,7	79,2 ; 87,8
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	87,1	84,5 ; 89,5	89,4	85,4 ; 93,1	84,9	81,1 ; 88,2
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	88,8	86,8 ; 90,6	85,3	82,2 ; 88,1	92,6	90,3 ; 94,5
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	8,5	7,0 ; 10,2	10,4	7,8 ; 13,1	6,5	4,8 ; 8,6
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	2,7*	1,7 ; 3,9	4,3*	2,6 ; 6,4	0,9**	0,1 ; 1,9
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	47,0	45,6 ; 48,4	1,7**	0,7 ; 2,7	97,2	95,7 ; 98,5
Femmes	51,5	97,5	0,8	52,4	51,1 ; 53,7	98,1	97,0 ; 99,1	1,6**	0,7 ; 2,7
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,7**	0,2 ; 1,2	x	;	1,2**	0,3 ; 2,4

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	88,8	86,8 ; 90,6	8,5	7,0 ; 10,2	2,7*	1,7 ; 3,9
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,007					
Hommes	86,4	10,7	2,9	85,3	82,2 ; 88,1	10,4	7,8 ; 13,1	4,3*	2,6 ; 6,4
Femmes	91,6	7,4	0,9*	92,6	90,3 ; 94,5	6,5	4,8 ; 8,6	0,9**	0,1 ; 1,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,085					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	61,5	40,7 ; 82,1	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	75,1	65,1 ; 83,9	16,2*	8,9 ; 24,9	8,6**	2,9 ; 15,3
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	72,2	63,9 ; 80,0	20,6*	13,4 ; 28,2	7,2**	2,7 ; 12,6
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	87,4	84,1 ; 90,6	9,1	6,5 ; 11,8	3,5**	1,7 ; 5,7
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	94,0	92,0 ; 95,7	x	;	x	;
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	98,3	95,9 ; 100,0	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,451					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	58,6*	25,6 ; 88,3	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	85,9	82,8 ; 88,8	10,2	7,7 ; 13,0	3,8*	2,1 ; 5,8
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,009					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	93,6	91,5 ; 95,3	6,1*	4,4 ; 8,1	0,4**	0,0 ; 0,8
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	50,9	47,2 ; 54,7	71,2	66,6 ; 75,8
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000		...	
15-24 ans	87,9	...	92,8	85,0 ; 99,2	...	;
25-44 ans	62,4	...	67,1	60,2 ; 74,3	...	;
45-64 ans	29,9	...	28,1	22,6 ; 34,5	...	;
65 ans et plus	7,3	...	9,5**	2,9 ; 16,9	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...		P = 0,000	
15-24 ans	...	90,0	...	;	94,2	87,9 ; 99,5
25-34 ans	...	71,0	...	;	72,5	64,9 ; 80,0
35-49 ans	...	53,5	...	;	59,3	51,7 ; 66,9
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,097		P = 0,656	
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	44,6	31,8 ; 56,4	67,0	46,0 ; 85,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	47,9	39,6 ; 56,3	65,8	54,1 ; 77,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	58,5	51,7 ; 65,5	72,7	64,3 ; 80,3
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	47,8	40,2 ; 55,7	73,4	66,0 ; 80,9
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,080	
Un partenaire	43,8	64,2	46,1	42,0 ; 50,2	69,4	64,2 ; 74,3
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	80,4	70,9 ; 89,1	85,4	72,8 ; 96,7
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	80,7	54,9 ; 100,0	88,8*	39,2 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = 0,327		P = 0,336	
Hommes	x	66,6	x	;	71,0	66,2 ; 75,5
Femmes	47,8	x	50,9	47,2 ; 54,7	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	85,0*	36,6 ; 100,0

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	13,5	11,5 ; 15,5	15,1	13,0 ; 17,1	71,4	69,1 ; 73,9
Sexe	P = 0,093			P = 0,214					
Hommes	14,8	14,9	70,3	14,2	11,4 ; 17,0	16,5	13,5 ; 19,6	69,3	65,6 ; 72,8
Femmes	13,2	14,7	72,1	12,7	10,1 ; 15,6	13,4	10,9 ; 16,3	73,8	70,6 ; 77,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,003					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	70,7	50,2 ; 89,9	x	;	x	;
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	33,9	23,7 ; 44,3	31,2	22,3 ; 40,5	34,8	25,3 ; 44,5
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	41,9	32,4 ; 51,2	29,4	21,6 ; 37,4	28,7	21,0 ; 37,4
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	13,0	9,9 ; 16,2	22,3	18,3 ; 26,1	64,7	60,2 ; 69,2
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	6,4*	4,4 ; 8,6	5,3*	3,5 ; 7,3	88,3	85,4 ; 91,0
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	x	;	x	;	96,4	92,8 ; 99,2
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,042					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	18,7*	11,8 ; 26,5	7,3**	3,2 ; 11,4	74,0	66,3 ; 81,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	13,5*	9,2 ; 17,9	12,7*	8,6 ; 17,1	73,8	68,4 ; 79,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	11,6	8,3 ; 15,2	18,7	14,5 ; 23,2	69,7	64,7 ; 74,4
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	13,4	10,1 ; 16,8	16,6	12,9 ; 20,5	70,0	65,5 ; 74,4
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	10,1	8,2 ; 12,0	11,8	9,8 ; 13,8	78,1	75,7 ; 80,7
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	37,1	26,8 ; 47,2	41,8	32,3 ; 52,3	21,0*	13,3 ; 29,8
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	51,2*	30,0 ; 72,8	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	18,2	16,0 ; 20,4	19,8	16,7 ; 22,9	16,5	13,5 ; 19,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	69,0	48,7 ; 89,2	70,0*	40,5 ; 98,5	68,0*	35,9 ; 97,1
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	39,0	29,2 ; 49,1	45,3*	30,4 ; 59,7	30,4*	17,1 ; 45,3
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	45,5	36,0 ; 54,8	50,2	36,9 ; 63,3	39,7*	26,4 ; 53,3
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	21,2	17,5 ; 25,0	22,2	16,3 ; 28,7	20,2	15,5 ; 25,1
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	8,6	6,2 ; 11,1	9,2*	6,0 ; 12,7	7,9*	4,4 ; 11,7
	3,1*	3,9*	1,8**	3,0**	0,5 ; 6,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,898		P = 0,914		P = 0,380	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	17,7*	10,5 ; 25,3	22,0**	11,0 ; 34,2	13,7**	4,8 ; 23,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	16,8	12,2 ; 21,8	20,2*	13,1 ; 27,5	12,6*	6,8 ; 18,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	18,8	14,8 ; 23,0	20,4*	14,6 ; 26,6	16,8*	11,1 ; 22,7
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	19,1	15,4 ; 23,0	18,0*	12,5 ; 24,0	20,2	15,0 ; 25,9
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	14,3	12,0 ; 16,4	14,4	11,3 ; 17,5	14,1	11,1 ; 17,2
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	49,6	39,3 ; 60,2	51,5	37,2 ; 65,2	46,3*	32,0 ; 61,4
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	48,1*	27,9 ; 71,0	50,2*	26,8 ; 76,2	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,187		P = 0,028		P = 0,100	
Hommes	18,7	54,0	17,9	16,8	13,8 ; 19,9	55,3**	22,3 ; 89,9	16,1	13,2 ; 19,2
Femmes	19,2	19,2	x	19,2	16,0 ; 22,3	19,2	16,0 ; 22,3	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	43,7**	5,1 ; 89,2	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	10,2	8,8 ; 11,9	7,9	5,9 ; 10,2	12,5	10,5 ; 14,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,026		P = 0,001	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	9,3**	4,0 ; 15,4	x	;	16,8**	6,5 ; 29,4
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,015		P = 0,001	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	7,4**	3,1 ; 12,3	x	;	12,7**	4,7 ; 22,9
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	15,5	12,3 ; 19,0	11,8*	7,5 ; 16,6	19,4	14,9 ; 24,4
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	9,9	7,7 ; 12,4	8,2*	5,2 ; 11,6	11,6	8,5 ; 14,9
	2,7	3,2*	2,2	2,0**	0,6 ; 3,8	x	;	1,9**	0,3 ; 4,0
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,049		P = 0,005	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	4,9*	2,4 ; 7,6	x	;	6,9**	3,3 ; 10,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	8,5*	5,8 ; 11,7	7,6**	3,6 ; 12,4	9,4*	5,6 ; 13,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	10,4	7,7 ; 13,6	7,4*	4,0 ; 11,3	13,8*	9,4 ; 18,8
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	14,8	11,7 ; 18,1	11,8*	7,4 ; 16,6	17,6	13,1 ; 22,5
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,003		P = 0,000	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	9,3	7,6 ; 11,1	6,7*	4,5 ; 9,1	12,0	9,5 ; 14,6
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	20,4*	12,9 ; 29,0	10,6**	3,8 ; 18,9	37,9*	22,9 ; 53,7
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	35,6**	14,0 ; 56,7	30,6**	8,2 ; 53,9	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,000		P = 0,211		P = 0,000	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	13,3	10,8 ; 16,1	x	;	13,2	10,7 ; 16,1
Femmes	7,0	7,0	8,9**	8,2	5,9 ; 10,6	8,0	5,8 ; 10,5	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	71,5*	28,1 ; 97,7	x	;	86,2*	44,7 ; 100,0
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,001		P = 0,001		P = 0,058	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	x	;	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	10,0	8,6 ; 11,7	7,5	5,5 ; 9,8	12,5	10,5 ; 14,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%		%	
			Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)	
Ensemble de la population	23,5	76,5	19,9*	12,7 ; 27,6	80,1	72,4 ; 87,3
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,498			
15-35 ans	25,6	74,4	21,0*	12,8 ; 30,0	79,0	70,0 ; 87,2
36-49 ans	10,5*	89,5	14,4**	0,8 ; 30,7	85,6	69,3 ; 99,2
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,179			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	26,6**	7,1 ; 48,5	73,4	51,5 ; 92,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	23,4**	10,1 ; 37,8	76,6	62,2 ; 89,9
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	6,9**	0,6 ; 14,6	93,1	85,4 ; 99,4
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	20,6*	13,2 ; 28,5	79,4	71,5 ; 86,8
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%		%		%	
				Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)	
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	73,0	69,8 ; 76,0	15,3	13,0 ; 17,8	11,6	9,5 ; 14,0
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,082					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	56,6	43,2 ; 70,5	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	82,6	78,1 ; 87,0	9,6*	6,4 ; 13,3	7,7*	4,9 ; 10,8
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	69,4	64,7 ; 73,7	22,0	18,2 ; 26,1	8,6	6,2 ; 11,4
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	62,1	52,3 ; 71,3	25,1*	17,3 ; 33,7	12,8*	7,1 ; 19,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	64,5	57,2 ; 71,5	13,8*	9,2 ; 18,9	21,8	15,6 ; 28,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	75,2	69,0 ; 80,9	16,2	11,4 ; 21,3	8,6*	4,7 ; 12,9
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	81,8	77,0 ; 86,3	11,6*	7,7 ; 15,6	6,6*	4,0 ; 9,7
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,850					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	73,3	69,9 ; 76,2	15,4	13,0 ; 18,1	11,3	9,1 ; 13,7
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	76,8*	36,1 ; 100,0	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	68,0	45,5 ; 88,3	14,4**	1,0 ; 31,8	17,6**	1,9 ; 37,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 04

# MAURICIE et CENTRE-DU-QUÉBEC

---



# 1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes	Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
Ensemble de la population		49,4	50,6			49,7	49,7 ; 49,7	50,3	50,3 ; 50,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	14,7	14,7 ; 14,7	15,7	15,6 ; 15,7	13,8	13,7 ; 13,8
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	29,3	29,2 ; 29,3	30,3	30,3 ; 30,3	28,3	28,2 ; 28,3
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	37,8	37,8 ; 37,8	37,5	37,5 ; 37,6	38,0	38,0 ; 38,0
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	18,3	18,3 ; 18,3	16,5	16,5 ; 16,6	20,0	20,0 ; 20,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,005					
Personne seule	13,4	10,7	16,0	15,4	14,5 ; 16,8	13,0	11,5 ; 14,8	17,8	16,4 ; 19,7
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	33,5	31,9 ; 35,1	35,0	32,8 ; 37,4	31,9	29,6 ; 34,3
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	38,2	36,0 ; 39,9	40,3	37,1 ; 43,0	36,1	33,3 ; 38,4
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	8,0	6,8 ; 9,1	7,0	5,3 ; 8,8	8,9	7,4 ; 10,6
Autre	6,7	6,5	6,9	5,0	3,9 ; 6,0	4,7*	3,3 ; 6,2	5,2	3,8 ; 6,6
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,256			P = 'n.d.'					
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	97,9	97,3 ; 98,5	98,3	97,4 ; 99,1	97,6	96,6 ; 98,5
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,2**	0,0 ; 0,5	x	;	0,4**	0,0 ; 0,9
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	1,8*	1,3 ; 2,5	x	;	2,0*	1,2 ; 2,9
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,912			P = 0,699					
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	99,1	98,6 ; 99,5	99,2	98,6 ; 99,8	98,9	98,2 ; 99,6
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	0,4**	0,1 ; 0,7	0,4**	0,0 ; 1,0	x	;
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	0,6**	0,3 ; 0,9	0,4**	0,0 ; 0,8	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,683			P = 0,076					
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	30,3	28,6 ; 32,0	28,6	26,0 ; 31,3	32,0	29,6 ; 34,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	28,2	26,3 ; 30,2	30,6	27,7 ; 33,5	25,9	23,3 ; 28,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	27,4	25,6 ; 29,3	27,5	24,7 ; 30,4	27,3	24,8 ; 29,8
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	14,1	12,7 ; 15,6	13,3	11,2 ; 15,6	14,9	12,9 ; 16,8
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	20,5	18,8 ; 22,2	17,4	15,0 ; 19,8	23,5	21,3 ; 25,8
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	23,8	22,0 ; 25,7	21,4	18,8 ; 24,2	26,2	23,7 ; 29,0
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	19,9	18,1 ; 21,6	19,4	16,7 ; 22,1	20,3	17,9 ; 22,7
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	18,0	16,3 ; 19,7	19,6	17,1 ; 22,1	16,4	14,3 ; 18,6
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	17,9	16,1 ; 19,6	22,2	19,5 ; 25,0	13,6	11,6 ; 15,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,014					
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	29,0	27,0 ; 31,0	32,1	29,1 ; 35,2	25,9	23,4 ; 28,4
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	59,0	56,8 ; 61,0	56,7	53,5 ; 59,8	61,2	58,5 ; 64,0
Pauvre	9,4	8,9	9,9	10,5	9,2 ; 11,7	9,8	8,0 ; 11,6	11,2	9,4 ; 12,9
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,6	1,1 ; 2,1	1,5*	0,8 ; 2,3	1,7*	1,1 ; 2,4
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	57,7	56,0 ; 59,3	65,6	63,2 ; 68,0	49,9	47,6 ; 52,1
Étudiants	13,1	13,0	13,2	11,0	9,9 ; 12,2	10,4	8,7 ; 12,2	11,7	10,3 ; 13,0
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	8,7	7,7 ; 9,8	3,7*	2,5 ; 4,9	13,7	11,9 ; 15,6
Retraités	19,6	18,0	21,1	22,6	21,7 ; 23,5	20,4	19,2 ; 21,7	24,8	23,4 ; 26,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	54,1	52,1 ; 56,1	34,2	32,3 ; 36,3	11,7	10,5 ; 12,9
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,209					
Hommes	56,6	33,5	9,9	53,2	50,0 ; 56,2	35,9	32,7 ; 38,9	11,0	9,2 ; 12,8
Femmes	55,5	32,8	11,7	55,0	52,2 ; 57,8	32,7	30,1 ; 35,4	12,3	10,7 ; 14,0
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	60,4	53,7 ; 67,4	35,4	28,7 ; 41,9	4,2**	1,7 ; 7,1
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	66,7	62,6 ; 70,7	26,7	22,9 ; 30,6	6,5*	4,5 ; 8,7
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	52,0	48,7 ; 55,0	35,6	32,4 ; 38,7	12,4	10,4 ; 14,6
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	32,1	28,3 ; 36,0	43,1	39,0 ; 47,0	24,8	21,5 ; 28,5
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	40,9	37,0 ; 44,8	39,8	36,1 ; 43,6	19,3	16,4 ; 22,2
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	50,0	46,7 ; 53,3	36,4	33,2 ; 39,6	13,6	11,2 ; 15,9
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	64,2	60,5 ; 68,2	30,1	26,3 ; 33,7	5,7*	3,9 ; 7,6
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	60,6	52,5 ; 68,7	30,0	21,9 ; 37,7	9,4*	5,3 ; 14,2
Autre	46,0	39,4	14,6	36,2	25,6 ; 46,8	43,5	32,0 ; 54,8	20,3*	12,1 ; 29,4
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	39,2	35,5 ; 42,8	40,8	37,1 ; 44,5	20,0	17,4 ; 22,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	55,6	51,6 ; 59,5	34,8	31,1 ; 38,5	9,5	7,5 ; 11,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	61,3	57,2 ; 65,4	30,2	26,5 ; 34,4	8,4	6,1 ; 10,8
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	69,6	64,5 ; 74,7	26,5	21,5 ; 31,7	4,0*	2,0 ; 6,0
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	38,1	33,3 ; 42,7	39,4	34,9 ; 43,9	22,6	19,2 ; 26,2
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	58,9	56,4 ; 61,2	32,5	30,1 ; 34,9	8,7	7,3 ; 9,9
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	35,8	29,6 ; 41,6	37,0	31,0 ; 43,1	27,2	22,3 ; 32,5
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	56,9	54,7 ; 59,1	33,7	31,6 ; 36,0	9,4	8,2 ; 10,6
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	61,3	58,5 ; 63,9	31,5	29,0 ; 34,3	7,2	5,8 ; 8,8
Étudiants	62,7	32,2	5,0	62,4	54,5 ; 69,7	34,3	27,3 ; 41,8	3,3**	1,3 ; 5,7
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	42,4	35,6 ; 49,2	34,3	27,6 ; 41,0	23,2	18,1 ; 28,8
Retraités	40,2	39,5	20,4	36,4	32,9 ; 40,2	40,9	37,2 ; 44,6	22,8	19,8 ; 26,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	54,1	52,1 ; 56,1	34,2	32,3 ; 36,3	11,7	10,5 ; 12,9
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	47,3	43,0 ; 51,7	36,7	32,4 ; 40,9	16,0	12,9 ; 19,2
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	56,3	53,9 ; 58,8	33,4	31,1 ; 35,8	10,3	9,1 ; 11,6
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	55,5	40,0 ; 71,0	33,3*	18,1 ; 48,7	11,2**	2,8 ; 22,7
Poids normal	62,6	29,4	8,0	61,6	58,4 ; 64,7	30,3	27,5 ; 33,4	8,1	6,6 ; 9,8
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	47,2	44,2 ; 50,1	38,3	35,4 ; 41,3	14,6	12,7 ; 16,5
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	62,1	59,1 ; 65,0	29,5	26,9 ; 32,3	8,4	6,9 ; 10,0
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	48,7	45,6 ; 52,1	38,1	34,8 ; 41,3	13,2	11,3 ; 15,3
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	27,5*	19,7 ; 36,0	46,4	37,7 ; 55,5	26,0	18,4 ; 33,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	34,7	30,2 ; 39,3	42,8	37,9 ; 47,5	22,5	18,8 ; 26,4
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	59,5	57,2 ; 61,9	32,1	29,9 ; 34,5	8,4	7,1 ; 9,7

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	51,1	48,9 ; 53,1	43,6	41,5 ; 45,8	5,3	4,4 ; 6,3
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,114		
Hommes	47,5	46,6	6,0	49,5	46,3 ; 52,7	44,4	41,3 ; 47,7	6,1	4,6 ; 7,7
Femmes	47,1	45,9	7,0	52,7	49,7 ; 55,4	42,8	40,0 ; 45,8	4,5	3,6 ; 5,6
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,032		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	57,6	51,1 ; 64,4	38,9	32,2 ; 45,1	3,5**	1,3 ; 6,5
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	48,7	44,4 ; 52,8	44,3	40,1 ; 48,5	7,0*	4,9 ; 9,4
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	48,8	45,7 ; 51,9	46,4	43,2 ; 49,7	4,8	3,6 ; 6,0
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	54,7	50,4 ; 58,8	40,2	36,2 ; 44,4	5,2*	3,5 ; 7,0
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	39,3	35,3 ; 43,0	50,5	46,6 ; 54,5	10,3	8,1 ; 12,7
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	54,7	51,1 ; 58,1	40,9	37,4 ; 44,2	4,4*	3,1 ; 6,0
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	52,9	49,1 ; 56,7	43,1	39,2 ; 47,0	4,0*	2,4 ; 5,9
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	48,3	40,6 ; 56,5	47,3	39,0 ; 55,1	4,3**	1,7 ; 7,6
Autre	44,5	46,1	9,4*	54,6	43,7 ; 65,5	37,0	26,5 ; 47,9	8,4**	2,8 ; 15,1
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,290		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	53,0	49,3 ; 56,7	42,4	38,4 ; 46,1	4,6	3,4 ; 6,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	53,4	49,2 ; 57,2	42,0	38,2 ; 46,1	4,6*	3,2 ; 6,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	47,3	43,0 ; 51,7	46,2	42,0 ; 50,5	6,5*	4,3 ; 8,8
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	49,7	43,8 ; 55,5	44,5	38,8 ; 50,2	5,8*	3,3 ; 8,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	43,5	38,8 ; 48,4	47,3	42,4 ; 51,8	9,2	6,8 ; 11,8
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	53,1	50,5 ; 55,5	42,6	40,1 ; 45,1	4,4	3,4 ; 5,4
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	37,8	31,9 ; 44,0	47,3	41,2 ; 53,3	14,9	11,0 ; 19,2
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	52,8	50,6 ; 55,0	43,2	41,0 ; 45,5	4,0	3,1 ; 4,9
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,004		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	48,4	45,4 ; 51,2	46,4	43,4 ; 49,3	5,3	4,1 ; 6,6
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	59,1	51,2 ; 66,8	37,5	29,5 ; 44,9	3,4**	0,7 ; 6,9
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	47,6	40,3 ; 54,4	42,0	35,1 ; 49,1	10,3*	6,5 ; 14,7
Retraités	51,9	42,8	5,3	55,8	52,0 ; 59,7	39,6	35,8 ; 43,3	4,6*	3,2 ; 6,3
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	58,3	55,3 ; 61,2	39	36,1 ; 42,0	2,7*	1,8 ; 3,7
Bon	40,5	52,6	6,9	44,2	40,7 ; 47,9	48,6	45,0 ; 52,2	7,2	5,5 ; 9,2
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	37,6	32,2 ; 43,3	50,4	44,5 ; 56,3	12,0*	8,4 ; 15,7
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	29,3	24,9 ; 34,0	55,2	50,2 ; 60,0	15,5	12,2 ; 19,1
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	56,7	54,2 ; 59,0	40,9	38,6 ; 43,3	2,5	1,8 ; 3,3
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	21,3	49,3	29,4	22,7**	8,8 ; 37,7	41,4*	27,8 ; 57,7	35,9*	20,7 ; 51,2
Non	48,1	46,1	5,8	51,7	49,5 ; 53,8	43,6	41,5 ; 45,7	4,7	3,9 ; 5,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	20,3	18,6 ; 22,1	79,7	77,9 ; 81,4
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Hommes	18,2	81,8	15,7	13,5 ; 18,2	84,3	81,8 ; 86,5
Femmes	26,0	74,0	24,8	22,3 ; 27,3	75,2	72,7 ; 77,7
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,131			
15-24 ans	24,4	75,6	22,9	17,3 ; 29,0	77,1	71,0 ; 82,7
25-44 ans	24,3	75,7	22,5	19,0 ; 26,1	77,5	73,9 ; 81,0
45-64 ans	20,6	79,4	18,9	16,7 ; 21,5	81,1	78,5 ; 83,3
65 ans et plus	18,8	81,2	17,4	14,3 ; 20,6	82,6	79,4 ; 85,7
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,019			
Personne seule	25,7	74,3	22,5	19,4 ; 25,9	77,5	74,1 ; 80,6
Couple sans enfant	17,7	82,3	17,2	14,6 ; 19,9	82,8	80,1 ; 85,4
Couple avec enfants	20,8	79,2	19,3	16,3 ; 22,5	80,7	77,5 ; 83,7
Famille monoparentale	32,2	67,8	26,4	19,3 ; 33,5	73,6	66,5 ; 80,7
Autre	29,7	70,3	28,5*	17,7 ; 39,4	71,5	60,6 ; 82,3
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,207			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	21,9	18,8 ; 25,1	78,1	74,9 ; 81,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	20,0	17,0 ; 23,6	80,0	76,4 ; 83,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	21,2	17,5 ; 24,9	78,8	75,1 ; 82,5
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	15,8	11,6 ; 20,0	84,2	80,0 ; 88,4
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	29,7	25,4 ; 34,2	70,3	65,8 ; 74,6
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	17,9	15,9 ; 19,8	82,1	80,2 ; 84,1
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	40,1	34,3 ; 46,3	59,9	53,7 ; 65,7
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	17,6	15,9 ; 19,4	82,4	80,6 ; 84,1
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,005			
Travailleurs	20,9	79,1	20,0	17,8 ; 22,4	80,0	77,6 ; 82,2
Étudiants	24,8	75,2	23,7	17,0 ; 31,1	76,3	68,9 ; 83,0
Personnes sans emploi	37,9	62,1	27,8	21,9 ; 34,3	72,2	65,7 ; 78,1
Retraités	18,2	81,8	15,7	13,0 ; 18,5	84,3	81,5 ; 87,0
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	12,9	11,0 ; 15,0	87,1	85,0 ; 89,0
Bon	26,6	73,4	25,4	22,1 ; 28,9	74,6	71,1 ; 77,9
Passable ou mauvais	48,8	51,2	40,7	35,1 ; 46,8	59,3	53,2 ; 64,9
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	11,6	9,7 ; 13,6	88,4	86,4 ; 90,3
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	25,6	22,6 ; 28,5	74,4	71,5 ; 77,4
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	61,5	52,3 ; 70,5	38,5	29,5 ; 47,7
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	54,2	38,3 ; 70,4	45,8*	29,6 ; 61,7
Non	20,6	79,4	19,5	17,8 ; 21,3	80,5	78,7 ; 82,2
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,051			
Oui	83,8	16,2**	60,2**	24,7 ; 98,8	39,8**	1,2 ; 75,3
Non	21,8	78,2	20,1	18,4 ; 21,9	79,9	78,1 ; 81,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	1,7	1,2 ; 2,2	2,1*	1,2 ; 3,0	1,3*	0,8 ; 1,8
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,629		P = 0,968		P = 0,058	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	1,4**	0,0 ; 3,4	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,1*	1,1 ; 3,3	1,9**	0,5 ; 4,0	2,2**	1,0 ; 3,7
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	1,8*	1,0 ; 2,6	2,3**	1,1 ; 3,7	1,3**	0,5 ; 2,2
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,0**	0,2 ; 1,9	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,300		P = 0,409		P = 0,131	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	2,9*	1,8 ; 4,2	3,5**	1,6 ; 6,0	2,5**	1,1 ; 4,0
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	1,3**	0,5 ; 2,2	1,8**	0,5 ; 3,3	0,7**	0,0 ; 1,7
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,5**	0,6 ; 2,6	1,5**	0,1 ; 3,4	1,5**	0,6 ; 2,6
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	1,0**	0,0 ; 2,4	x	;	x	;
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	2,8**	0,0 ; 6,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,281		P = 0,132		P = 0,999	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	2,4**	1,3 ; 3,7	3,7**	1,6 ; 6,3	1,2**	0,4 ; 2,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	1,2**	0,6 ; 2,0	1,1**	0,2 ; 2,3	1,3**	0,5 ; 2,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	1,7**	0,7 ; 2,9	2,1**	0,4 ; 4,3	1,3**	0,4 ; 2,5
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	1,1**	0,2 ; 2,3	x	;	1,3**	0,0 ; 3,1
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,028		P = 0,039		P = 0,285	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	2,7*	1,6 ; 4,0	4,2**	1,8 ; 7,2	1,7**	0,7 ; 2,9
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	1,4*	0,8 ; 2,0	1,6**	0,6 ; 2,7	1,1**	0,5 ; 1,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,138	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	5,9*	3,3 ; 9,1	9,9**	4,5 ; 16,5	2,3**	0,8 ; 4,1
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,1*	0,7 ; 1,6	1,1**	0,5 ; 1,9	1,1*	0,7 ; 1,7
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,553		P = 0,142		P = 0,543	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	1,8*	1,1 ; 2,6	1,9**	0,8 ; 3,2	1,6*	0,8 ; 2,5
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	1,2**	0,1 ; 2,8	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	2,6**	1,1 ; 4,4	7,4**	1,2 ; 15,6	1,5**	0,2 ; 3,0
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,3**	0,5 ; 2,3	2,2**	0,6 ; 4,3	0,6**	0,0 ; 1,4
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,010		P = 0,016	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	0,7*	0,4 ; 1,1	0,8**	0,2 ; 1,5	0,6**	0,2 ; 1,1
Bon	2,5	2,7	2,4	2,5*	1,5 ; 3,7	2,8**	1,2 ; 4,8	2,2**	1,0 ; 3,5
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	3,7**	1,6 ; 6,5	5,8**	1,6 ; 11,4	1,8**	0,5 ; 3,6
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	0,7**	0,2 ; 1,4	1,1**	0,2 ; 2,4	0,4**	0,1 ; 0,8
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	1,6*	1,0 ; 2,4	1,5**	0,6 ; 2,6	1,7**	0,9 ; 2,7
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	11,4*	6,0 ; 17,9	14,0**	5,9 ; 23,7	7,9**	2,1 ; 15,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	4,5*	3,0 ; 6,5	6,8**	3,3 ; 10,9	3,2*	1,7 ; 4,9
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	1,0*	0,5 ; 1,5	1,2**	0,5 ; 2,1	0,7**	0,3 ; 1,2

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,3**	0,1 ; 0,5	x	;	0,5**	0,2 ; 0,9
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,257		P = 0,229		P = 0,386	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	0,1**	0,0 ; 0,3	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	0,7**	0,0 ; 1,6	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,198		P = 0,382		P = 0,387	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	0,7**	0,2 ; 1,3	x	;	0,9**	0,1 ; 1,8
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,291		P = 0,064		P = 0,567	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;	0,9**	0,1 ; 2,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	0,2**	0,0 ; 0,4	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,007		P = 0,000		P = 0,039	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	1,1**	0,3 ; 2,0	x	;	1,5**	0,2 ; 2,9
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,1**	0,0 ; 0,2	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000		P = .		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	1,7**	0,4 ; 3,3	x	;	3,2**	0,8 ; 6,1
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,1**	0,0 ; 0,3	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,015		P = 0,110		P = 0,079	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	1,5**	0,4 ; 2,8	x	;	2,2**	0,5 ; 4,4
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,028		P = 0,064		P = 0,084	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	0,4**	0,1 ; 0,9	x	;	0,8**	0,1 ; 1,6
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	1,3**	0,0 ; 3,0	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,051		P = 0,002		P = 0,215	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	0,8**	0,2 ; 1,6	x	;	1,0**	0,1 ; 2,0
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	0,1**	0,0 ; 0,3	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,265				
Oui	10,2	10,0	10,3	10,6	9,3 ; 12,1	11,4	9,3 ; 13,6	9,8	8,2 ; 11,7	
Non	89,8	90,0	89,7	89,4	87,9 ; 90,7	88,6	86,4 ; 90,7	90,2	88,3 ; 91,8	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,211				
Oui	4,4	3,5	5,3	3,8	3,0 ; 4,6	3,3*	2,2 ; 4,5	4,3	3,2 ; 5,5	
Non	95,6	96,5	94,7	96,2	95,4 ; 97,0	96,7	95,5 ; 97,8	95,7	94,5 ; 96,8	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	10,8	9,5 ; 12,2	12,3	10,1 ; 14,5	9,4	7,8 ; 11,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,424	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	17,0*	11,6 ; 22,3	25,6*	16,4 ; 34,8	7,2**	3,0 ; 12,2
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	12,4	9,8 ; 15,4	13,2*	9,3 ; 17,6	11,6*	8,0 ; 15,3
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	9,2	7,3 ; 11,2	9,5*	6,6 ; 12,5	9,0	6,6 ; 11,7
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	6,7*	4,7 ; 8,9	4,1**	1,9 ; 6,6	8,8*	5,7 ; 12,3
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,012		P = 0,004		P = 0,825	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	9,0	6,9 ; 11,3	8,7*	5,2 ; 12,6	9,1*	6,5 ; 12,1
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	8,0	6,1 ; 10,0	6,7*	4,2 ; 9,5	9,4*	6,6 ; 12,5
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	13,0	10,5 ; 15,8	16,9	12,7 ; 21,6	8,8*	6,0 ; 11,7
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	15,6*	9,3 ; 22,0	19,4**	8,2 ; 31,2	12,6*	6,3 ; 18,9
Autre	14,9	16,7	13,2*	15,2**	6,1 ; 24,7	20,2**	5,2 ; 36,5	10,9**	1,3 ; 22,6
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,424		P = 0,303		P = 0,848	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	10,9	8,5 ; 13,5	13,0*	8,8 ; 17,4	9,1*	6,4 ; 11,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	11,9	9,2 ; 14,7	12,9*	8,8 ; 17,1	10,7*	7,2 ; 14,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	11,4	8,6 ; 14,3	13,8*	9,6 ; 18,6	8,9*	5,8 ; 12,5
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	8,2*	5,5 ; 11,3	6,5**	2,4 ; 11,8	9,6*	5,9 ; 13,8
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,834		P = 0,450		P = 0,192	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	10,3*	7,0 ; 13,8	14,3*	7,5 ; 21,1	7,4*	4,7 ; 10,5
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	10,7	9,2 ; 12,3	11,4	9,1 ; 13,9	10,1	8,0 ; 12,1
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,042		P = 0,001		P = 0,464	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	11,2	9,4 ; 13,1	12,9	10,2 ; 15,8	8,9	6,6 ; 11,5
Étudiants	17,1	21,4	12,9	15,4*	9,7 ; 21,3	24,8*	13,6 ; 36,5	7,1**	3,1 ; 11,4
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	11,5*	7,2 ; 16,5	12,0**	2,8 ; 24,2	11,4*	6,6 ; 16,8
Retraités	7,5	7,0	7,9	7,8	5,8 ; 10,0	4,1**	2,0 ; 6,7	10,8*	7,6 ; 14,3

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	79,6	73,4 ; 85,7	75,0	64,9 ; 84,2	85,6	78,5 ; 91,9
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	20,4	14,3 ; 26,6	25,0*	15,8 ; 35,1	14,4*	8,1 ; 21,5
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	20,6*	14,2 ; 27,2	28,5*	18,3 ; 38,4	10,3**	5,2 ; 15,8
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	16,1*	10,5 ; 21,8	14,5**	7,1 ; 22,7	18,1*	10,0 ; 26,5
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	22,8	17,4 ; 28,9	26,8*	18,7 ; 35,6	17,6*	10,0 ; 25,6
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	6,0*	3,6 ; 8,7	2,7**	0,3 ; 6,1	10,2*	6,0 ; 15,3
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	18,0	13,3 ; 23,1	16,4*	9,9 ; 23,8	20,0*	13,1 ; 27,9
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	2,4**	0,8 ; 4,5	x	;	3,6**	0,8 ; 7,1
Autre	12,1	8,1	17,6	14,2*	9,7 ; 19,0	x	;	20,1*	12,8 ; 28,5
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	23,1	17,7 ; 28,8	20,4*	12,7 ; 28,2	26,6	18,6 ; 35,5
Printemps	21,2	20,7	21,9	22,4	16,9 ; 28,2	25,6*	17,0 ; 35,0	18,4*	11,5 ; 26,0
Été	29,1	30,3	27,4	34,5	27,1 ; 41,7	33,6*	23,4 ; 44,3	35,7	26,1 ; 44,9
Automne	23,7	24,0	23,3	19,9	14,7 ; 25,6	20,4*	12,8 ; 28,5	19,2*	12,0 ; 27,1
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	41,6	34,8 ; 48,8	31,5	22,9 ; 40,8	54,1	44,3 ; 63,9
Endroit public	28,1	24,8	32,5	27,9	21,6 ; 34,8	26,8*	16,9 ; 36,8	29,4	20,8 ; 38,8
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	21,1*	14,6 ; 28,2	26,4*	16,7 ; 36,6	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	9,3*	5,4 ; 14,1	15,4*	8,5 ; 23,2	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	12,3*	7,1 ; 18,1	15,4**	7,3 ; 24,4	8,4**	2,2 ; 15,7
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	4,5**	0,9 ; 8,6	7,9**	1,6 ; 15,0	x	;
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	6,2**	3,2 ; 9,8	8,7**	3,9 ; 14,8	3,0**	0,5 ; 6,8
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	5,5*	3,0 ; 8,4	8,1**	3,9 ; 13,0	2,2**	0,0 ; 5,4
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	4,0**	1,8 ; 6,6	3,9**	1,0 ; 7,2	4,2**	0,9 ; 8,4
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	23,1	17,1 ; 29,0	21,4*	13,7 ; 29,7	25,4*	16,7 ; 34,0
Chute	34,6	30,5	40,3	31,4	25,3 ; 38,1	23,1*	15,0 ; 32,2	42,2	33,6 ; 51,4
Autres	13,7	12,5	15,3	x	;	x	;	14,5*	8,8 ; 21,3
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	1,8**	0,3 ; 3,5	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	28,3	22,3 ; 34,8	31,6	22,6 ; 41,4	24,1*	16,2 ; 32,6
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	32,9	26,5 ; 39,4	29,1*	19,9 ; 38,4	37,8	28,4 ; 46,8
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	2,0**	0,1 ; 4,7	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	23,7	17,6 ; 30,1	21,4*	13,2 ; 30,5	26,7*	18,4 ; 35,3
Autre	11,9	10,9	13,2	11,3*	7,0 ; 16,1	14,8*	7,7 ; 22,9	6,8**	2,8 ; 11,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	3,7*	2,3 ; 5,3	1,6**	0,3 ; 3,2	5,4*	3,1 ; 8,0
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,331		P = 0,148		P = 0,419	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	4,3*	2,4 ; 6,6	2,2**	0,3 ; 4,8	6,3**	3,0 ; 10,3
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	3,1**	0,9 ; 5,6	x	;	4,9**	1,3 ; 9,3
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,610		P = 0,948		P = 0,832	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	4,3**	2,1 ; 7,0	x	;	5,2**	2,3 ; 8,6
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	3,5**	1,7 ; 5,7	1,6**	0,1 ; 3,6	5,8**	2,1 ; 10,2
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,131		P = 0,097		P = 0,533	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	7,5**	1,8 ; 14,5	x	;	8,1**	0,4 ; 18,0
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	3,5*	1,9 ; 5,3	1,2**	0,0 ; 2,9	5,4*	2,9 ; 8,5
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,337		P = 0,405		P = 0,386	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	2,7**	0,6 ; 5,2	x	;	3,8**	0,7 ; 7,9
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	4,3*	2,4 ; 6,4	2,0**	0,3 ; 4,1	6,2**	3,2 ; 9,8
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,028		P = 0,230		P = 0,130	
Oui	5,9	3,6*	7,3	5,7**	2,4 ; 9,5	x	;	6,9**	2,5 ; 12,1
Non	2,7*	2,2**	3,1*	2,0**	0,8 ; 3,4	x	;	2,9**	0,9 ; 5,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,241		P = 0,018	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	9,9**	4,1 ; 17,1	x	;	11,8**	4,4 ; 21,6
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	2,7**	1,3 ; 4,2	1,4**	0,1 ; 3,2	3,8**	1,6 ; 6,5
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,198		P = .		P = 0,144	
Résidence	62,7	52,8	68,6	48,7*	29,7 ; 68,4	44,5**	10,8 ; 83,0	50,7*	27,4 ; 77,0
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	73,8*	41,4 ; 98,8	x	;	81,9*	47,3 ; 100,0
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	27,2**	9,0 ; 47,6	x	;	22,9**	4,7 ; 44,7
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	27,9**	11,0 ; 46,9	x	;	27,7**	7,2 ; 50,0
Été	29,3*	28,8**	29,5*	23,4**	4,8 ; 43,9	x	;	23,7**	3,1 ; 47,4
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	21,5**	5,2 ; 40,5	x	;	25,7**	5,9 ; 49,2
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	20,9**	5,5 ; 40,1	x	;	20,6**	4,3 ; 41,5
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	15,4**	3,3 ; 31,8	x	;	13,6**	0,7 ; 32,5
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	42,7*	21,0 ; 64,4	x	;	41,2**	16,1 ; 66,1
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	9,2**	0,3 ; 21,9	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	10,1	8,8 ; 11,5	11,3	9,2 ; 13,3	9,0	7,5 ; 10,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,073		P = 0,026	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	9,0*	4,9 ; 13,3	10,3**	4,2 ; 16,4	7,7**	2,1 ; 14,3
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	11,1	8,5 ; 13,9	13,1*	8,9 ; 17,5	8,9*	6,0 ; 12,3
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	12,7	10,8 ; 14,9	13,0	9,8 ; 16,6	12,4	9,7 ; 15,1
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	4,2*	2,7 ; 5,9	4,8**	2,4 ; 7,5	3,7**	1,8 ; 5,9
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,215		P = 0,519		P = 0,543	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	10,8	8,5 ; 13,3	11,8*	7,7 ; 16,1	10,0	7,1 ; 13,0
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	8,7	6,9 ; 10,7	9,2	6,4 ; 12,2	8,1*	5,7 ; 10,8
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	10,2	7,9 ; 12,7	12,2**	8,4 ; 16,1	8,0*	5,3 ; 10,9
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	15,4*	9,0 ; 21,9	16,6**	5,9 ; 28,1	14,5**	7,0 ; 22,8
Autre	11,4	12,8*	10,2*	8,6**	2,2 ; 15,3	10,1**	1,4 ; 21,3	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,257		P = 0,250		P = 0,437	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	8,8	6,5 ; 11,2	10,6*	6,8 ; 14,6	7,2*	4,5 ; 10,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	12,3	9,6 ; 15,1	14,4*	10,2 ; 18,9	9,8*	6,7 ; 13,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	9,7	7,2 ; 12,3	8,8*	5,3 ; 12,5	10,6*	7,3 ; 14,5
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	10,0*	7,0 ; 13,1	10,9*	6,4 ; 16,5	9,2*	5,4 ; 13,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,862		P = 0,979		P = 0,932	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	9,7	7,1 ; 12,4	10,7*	6,0 ; 16,2	8,9*	6,2 ; 11,8
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	10,0	8,4 ; 11,5	10,8	8,4 ; 13,2	9,1	7,2 ; 11,1
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,426		P = 0,605		P = 0,086	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	11,7*	8,0 ; 15,6	10,0**	5,0 ; 16,0	13,1*	7,6 ; 19,1
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	10,1	8,6 ; 11,5	11,7	9,4 ; 14,1	8,5	6,9 ; 10,1
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,131		P = 0,548		P = 0,366	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	11,7	9,8 ; 13,7	12,4	9,7 ; 15,3	10,6	8,3 ; 13,1
Étudiants	9,9	9,7	10,1	8,8**	4,1 ; 13,9	9,0**	1,9 ; 17,0	8,6**	2,7 ; 16,0
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	8,0*	4,6 ; 11,8	12,6**	3,3 ; 24,9	6,7**	3,3 ; 10,6
Retraités	6,9	6,7	7,0	7,9	5,9 ; 9,9	8,6*	5,5 ; 12,1	7,3*	4,8 ; 10,1

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,916				
Oui	45,2	47,6	42,8	45,1	38,5 ; 52,3	45,4	35,3 ; 55,8	44,6	35,4 ; 54,4	
Non	54,8	52,4	57,2	54,9	47,7 ; 61,5	54,6	44,2 ; 64,7	55,4	45,6 ; 64,6	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,855				
Oui	25,4	27,6	23,1	18,0*	12,3 ; 23,8	18,5*	10,6 ; 27,2	17,4*	9,8 ; 25,3	
Non	74,6	72,4	76,9	82,0	76,2 ; 87,7	81,5	72,8 ; 89,4	82,6	74,7 ; 90,2	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,558				
Oui	17,6	15,6	19,6	19,9	14,6 ; 25,7	21,3*	13,7 ; 30,1	18,2*	11,7 ; 25,7	
Non	82,4	84,4	80,4	80,1	74,3 ; 85,4	78,7	69,9 ; 86,3	81,8	74,3 ; 88,3	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,831				
Oui	8,1	7,2	9,0	9,8*	5,5 ; 14,5	10,3**	4,1 ; 17,4	9,2**	3,6 ; 15,8	
Non	91,9	92,8	91,0	90,2	85,5 ; 94,5	89,7	82,6 ; 95,9	90,8	84,2 ; 96,4	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	3,2**	0,6 ; 6,1	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	61,7	54,8 ; 68,6	54,0	43,6 ; 63,9	71,2	62,5 ; 80,0	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	14,3*	9,4 ; 19,6	17,3*	9,8 ; 25,5	10,6**	4,7 ; 17,4	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	4,4**	1,4 ; 8,4	x	;	3,6**	0,5 ; 7,7	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	13,0*	8,9 ; 17,6	17,4*	11,0 ; 25,0	7,5**	3,3 ; 12,3	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	3,3**	0,8 ; 6,2	4,1**	0,1 ; 8,7	x	;	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	29,7	27,7 ; 31,6	24,7	22,0 ; 27,6	34,6	31,8 ; 37,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,031		P = 0,064	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	20,6	15,4 ; 26,3	16,5*	9,1 ; 24,6	25,1*	17,5 ; 33,1
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	28,9	25,0 ; 32,8	23,2	18,2 ; 28,6	35,0	29,6 ; 40,7
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	33,6	30,4 ; 36,6	29,4	24,9 ; 33,7	37,6	33,4 ; 41,8
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	30,2	26,2 ; 34,0	24,6	19,3 ; 30,1	34,8	29,3 ; 40,4
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,045		P = 0,194		P = 0,442	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	32,2	28,5 ; 35,8	28,3	22,5 ; 34,0	35,0	30,2 ; 39,7
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	32,1	28,8 ; 35,5	28,4	24,0 ; 33,1	36,0	31,1 ; 40,9
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	25,7	22,3 ; 29,1	20,8	16,3 ; 25,6	31,1	26,1 ; 36,0
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	30,9	23,7 ; 38,2	21,8**	10,9 ; 34,0	37,8	28,6 ; 46,9
Autre	34,0	32,4	35,4	33,6*	24,2 ; 44,1	27,1**	12,9 ; 43,2	39,2*	25,8 ; 53,2
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,373		P = 0,089		P = 0,663	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	28,6	25,3 ; 31,9	24,5	19,8 ; 29,5	32,4	27,7 ; 37,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	32,1	28,3 ; 35,8	29,4	24,1 ; 34,5	35,2	29,9 ; 40,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	29,9	26,1 ; 34,1	22,9	17,8 ; 28,1	36,8	31,2 ; 42,8
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	27,4	22,5 ; 32,4	19,2*	13,0 ; 26,2	34,7	27,7 ; 42,1
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,003		P = 0,013		P = 0,245	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	35,4	31,2 ; 39,7	32,4	25,1 ; 39,5	37,5	32,3 ; 42,7
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	28,3	26,2 ; 30,6	23,0	20,1 ; 26,1	34,0	30,7 ; 37,2
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,004	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	41,8	36,1 ; 47,7	39,0	30,2 ; 48,3	44,3	36,8 ; 52,1
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	28,1	25,9 ; 30,1	23,0	20,1 ; 25,9	33,2	30,2 ; 36,1
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,010		P = 0,033		P = 0,369	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	29,4	26,7 ; 32,1	26,1	22,7 ; 29,7	33,7	29,9 ; 37,7
Étudiants	20,7	14,8	26,3	22,5	16,4 ; 29,1	11,2**	3,9 ; 19,9	32,4*	23,3 ; 42,3
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	38,0	31,5 ; 44,8	26,9**	14,3 ; 42,9	41,1	33,6 ; 48,9
Retraités	34,2	30,5	37,2	30,7	27,3 ; 34,3	27,0	22,2 ; 32,1	33,7	28,6 ; 38,6
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	21,8	19,4 ; 24,2	16,0	12,9 ; 19,5	27,2	23,6 ; 30,8
Bon	33,9	28,1	39,6	33,7	30,2 ; 37,1	29,8	25,1 ; 34,5	37,8	32,9 ; 42,7
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	54,4	48,9 ; 59,8	49,7	40,6 ; 58,7	58,4	50,8 ; 66,0
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	48,3	43,3 ; 53,1	46,2	37,7 ; 55,1	49,6	43,8 ; 55,8
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	24,7	22,7 ; 26,8	20,6	17,9 ; 23,5	29,3	26,3 ; 32,3
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,024		P = 0,327		P = 0,028	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	33,6*	17,3 ; 49,6	x	;	32,8**	15,5 ; 49,9
Poids normal	28,3	22,9	32,1	27,6	24,6 ; 30,5	22,5	17,7 ; 27,3	31,3	27,5 ; 35,1
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	28,8	25,7 ; 31,9	23,8	19,9 ; 28,1	36,8	31,7 ; 42,1
Obésité	37,9	30,5	46,1	36,6	32,1 ; 41,4	29,9	24,2 ; 36,2	44,0	37,4 ; 51,0

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	30,3	25,3	35,2	29,7	27,7 ; 31,6	24,7	22,0 ; 27,6	34,6	31,8 ; 37,3		
Non	69,7	74,7	64,8	70,3	68,4 ; 72,3	75,3	72,4 ; 78,0	65,4	62,7 ; 68,2		
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	9,5	6,4	12,5	9,6	8,4 ; 10,8	7,0	5,5 ; 8,7	12,1	10,3 ; 14,0		
Non	90,5	93,6	87,5	90,4	89,2 ; 91,6	93,0	91,3 ; 94,5	87,9	86,0 ; 89,7		
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,034					
Oui	14,5	12,2	16,7	13,3	11,9 ; 14,8	11,7	9,9 ; 13,8	14,8	12,8 ; 16,8		
Non	85,5	87,8	83,3	86,7	85,2 ; 88,1	88,3	86,2 ; 90,1	85,2	83,2 ; 87,2		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,002					
Oui	13,5	10,8	16,1	13,2	11,7 ; 14,5	10,8	8,9 ; 12,9	15,4	13,5 ; 17,5		
Non	86,5	89,2	83,9	86,8	85,5 ; 88,3	89,2	87,1 ; 91,1	84,6	82,5 ; 86,5		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,006					
Oui	14,5	11,8	17,2	14,5	13,1 ; 15,9	12,4	10,4 ; 14,5	16,6	14,6 ; 18,5		
Non	85,5	88,2	82,8	85,5	84,1 ; 86,9	87,6	85,5 ; 89,6	83,4	81,5 ; 85,4		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,322					
Oui	17,8	16,0	19,6	17,7	16,1 ; 19,2	16,8	14,6 ; 19,3	18,5	16,2 ; 20,7		
Non	82,2	84,0	80,4	82,3	80,8 ; 83,9	83,2	80,7 ; 85,4	81,5	79,3 ; 83,8		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	14,2	10,6	17,8	13,3	11,9 ; 14,8	9,2	7,4 ; 11,1	17,4	15,2 ; 19,6		
Non	85,8	89,4	82,2	86,7	85,2 ; 88,1	90,8	88,9 ; 92,6	82,6	80,4 ; 84,8		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	56,3	54,2 ; 58,4	33,4	31,5 ; 35,5	10,3	9,0 ; 11,5
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	52,6	34,1	13,3	52,0	48,9 ; 55,3	35,2	32,2 ; 38,3	12,8	10,8 ; 14,8
Femmes	60,1	29,8	10,1	60,4	57,7 ; 63,1	31,7	29,3 ; 34,4	7,8	6,3 ; 9,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	65,3	58,7 ; 71,9	27,3	20,9 ; 33,6	7,4*	4,3 ; 11,1
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	60,6	56,6 ; 64,6	28,0	24,1 ; 31,8	11,5	8,7 ; 14,1
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	53,6	50,3 ; 56,8	35,6	32,5 ; 38,7	10,8	8,9 ; 12,8
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	47,3	43,1 ; 51,6	43,2	39,3 ; 47,2	9,5	7,2 ; 11,9
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,004					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	47,8	44,0 ; 51,6	39,1	35,4 ; 43,0	13,1	10,4 ; 16,0
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	58,3	54,9 ; 61,6	33,3	30,1 ; 36,5	8,5	6,7 ; 10,5
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	60,1	56,2 ; 64,1	30,9	27,0 ; 34,6	9,1	6,8 ; 11,4
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	52,3	44,1 ; 60,8	35,1	27,2 ; 43,4	12,6*	7,3 ; 18,7
Autre	48,0	34,3	17,7	48,1	37,5 ; 59,3	35,6*	25,1 ; 46,4	16,2*	8,6 ; 24,1
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,583					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	56,5	54,4 ; 58,7	33,4	31,3 ; 35,4	10,1	8,9 ; 11,4
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	50,4*	31,7 ; 67,1	36,1*	21,0 ; 53,4	13,5**	2,5 ; 27,0
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,942					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	56,3	54,2 ; 58,4	33,6	31,6 ; 35,6	10,1	8,8 ; 11,4
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	65,7**	6,8 ; 100,0	x	;	x	;
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	60,0**	23,0 ; 88,8	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	46,6	42,6 ; 50,5	39,4	35,7 ; 43,1	14,0	11,5 ; 16,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	54,9	50,7 ; 58,8	36,4	32,6 ; 40,2	8,7	6,7 ; 11,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	59,8	55,8 ; 64,0	30,1	26,4 ; 34,0	10,1	7,6 ; 12,5
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	73,5	68,0 ; 78,2	21,7	17,1 ; 26,6	4,8*	2,7 ; 7,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	43,4	38,6 ; 48,1	41,1	36,5 ; 45,6	15,6	12,3 ; 19,1
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	60,2	57,7 ; 62,6	31,2	28,9 ; 33,5	8,6	7,3 ; 10,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	42,3	36,5 ; 48,4	39,4	33,4 ; 45,3	18,3	13,9 ; 22,8
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	58,3	56,1 ; 60,6	32,6	30,5 ; 34,9	9,0	7,7 ; 10,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	57,2	54,5 ; 60,1	31,9	29,3 ; 34,6	10,9	9,1 ; 12,7
Étudiants	62,8	27,9	9,3	68,5	61,2 ; 75,9	26,9	19,8 ; 34,3	4,6**	1,9 ; 7,8
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	49,9	42,8 ; 56,9	37,5	30,7 ; 44,4	12,6*	8,2 ; 17,4
Retraités	49,7	38,1	12,2	50,7	46,9 ; 54,4	39,6	36,0 ; 43,1	9,7	7,6 ; 12,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	56,3	54,2 ; 58,4	33,4	31,5 ; 35,5	10,3	9,0 ; 11,5
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	44,4	40,2 ; 48,8	37,1	32,9 ; 41,3	18,5	15,2 ; 22,1
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	60,1	57,6 ; 62,5	32,4	30,1 ; 34,7	7,6	6,3 ; 8,8
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	69,5	66,8 ; 72,2	24,7	22,3 ; 27,3	5,8	4,5 ; 7,2
Bon	41,4	42,6	16,0	43,9	40,2 ; 47,5	43,1	39,4 ; 47,0	12,9	10,6 ; 15,5
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	31,2	25,9 ; 36,5	45,5	39,6 ; 51,4	23,3	18,4 ; 28,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	46,9	41,7 ; 51,8	37,4	32,7 ; 42,2	15,8	12,5 ; 19,3
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	59,1	56,7 ; 61,5	32,2	29,8 ; 34,4	8,7	7,5 ; 10,1
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,004					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	51,9	47,1 ; 56,6	40,1	35,6 ; 44,7	8,0*	5,6 ; 10,7
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	57,1	54,9 ; 59,4	32,2	29,9 ; 34,5	10,7	9,3 ; 12,1
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	62,5	60,1 ; 64,8	30,1	27,9 ; 32,4	7,4	6,1 ; 8,7
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	36,3	32,0 ; 40,5	44,2	40,0 ; 48,6	19,4	16,2 ; 22,9
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	64,5	60,4 ; 68,7	30,0	26,1 ; 34,1	5,5*	3,7 ; 7,4
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	54,2	51,4 ; 57,0	33,0	30,3 ; 35,6	12,8	11,1 ; 14,8

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	16,2	15,0 ; 17,5	13,8	12,1 ; 15,6	18,6	16,8 ; 20,4
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	1,5**	0,6 ; 2,7	1,9**	0,4 ; 3,8	1,2**	0,2 ; 2,3
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	18,9	16,5 ; 21,4	16,0	12,9 ; 19,4	21,7	18,2 ; 25,1
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	48,0	44,2 ; 52,2	44,1	38,0 ; 49,9	51,1	45,9 ; 56,5
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,690		P = 0,001	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	44,1	39,0 ; 49,3	44,8	37,4 ; 52,6	43,5	36,2 ; 50,8
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	50,2	43,2 ; 57,2	40,9	30,1 ; 52,2	56,4	46,9 ; 65,3
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	75,0	60,0 ; 87,7	56,1**	13,1 ; 88,2	83,0	68,2 ; 94,6
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	31,7	28,5 ; 34,9	26,5	22,0 ; 31,4	36,2	32,0 ; 40,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	14,0	11,6 ; 16,4	11,8	8,6 ; 15,2	16,7	13,1 ; 20,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	7,4	5,6 ; 9,3	7,9*	5,1 ; 11,1	6,9*	4,5 ; 9,5
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	3,7*	2,0 ; 5,6	3,2**	0,8 ; 6,1	4,0**	1,7 ; 6,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	28,5	24,7 ; 32,5	23,1	17,3 ; 30,1	32,2	27,4 ; 36,9
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	12,8	11,4 ; 14,1	11,8	9,9 ; 13,7	13,8	11,8 ; 15,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,004		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	29,4	24,4 ; 35,0	22,8*	15,0 ; 31,4	35,2	28,3 ; 42,6
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	14,1	12,8 ; 15,3	12,4	10,8 ; 14,3	15,7	13,8 ; 17,4

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,1	74,3 ; 77,7	20,7	19,1 ; 22,4	3,2	2,5 ; 4,0
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	65,7	62,8 ; 68,5	29,1	26,3 ; 31,9	5,3	3,9 ; 6,7
Femmes	87,9	11,3	0,7	86,1	84,1 ; 88,0	12,6	10,7 ; 14,5	1,3*	0,8 ; 1,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,216					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	81,8	76,4 ; 86,9	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	80,4	77,1 ; 83,5	16,7	13,5 ; 19,8	3,0**	1,6 ; 4,6
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	73,6	70,8 ; 76,3	22,7	20,2 ; 25,5	3,7*	2,5 ; 4,9
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	69,3	65,5 ; 73,0	26,1	22,5 ; 29,9	4,6*	3,1 ; 6,2
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,021					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	77,9	74,6 ; 81,1	17,6	14,6 ; 20,6	4,5*	3,0 ; 6,1
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	71,2	68,1 ; 74,4	25,2	22,3 ; 28,4	3,5*	2,3 ; 4,9
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	78,7	75,3 ; 82,0	18,5	15,3 ; 21,7	2,8*	1,5 ; 4,1
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	80,2	73,0 ; 86,9	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	73,6	63,3 ; 82,5	20,0*	12,3 ; 29,3	6,4**	1,4 ; 12,9
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,401					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	73,7	71,6 ; 75,8	22,9	20,9 ; 24,9	3,4	2,6 ; 4,2
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	83,5	78,3 ; 88,6	14,2*	9,7 ; 19,1	2,3**	0,3 ; 4,9
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	83,0	77,6 ; 87,6	14,3*	9,8 ; 19,3	2,7**	0,8 ; 5,2
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	76,5	64,8 ; 88,1	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	70,3	66,9 ; 73,6	24,1	20,9 ; 27,2	5,6*	3,9 ; 7,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	76,6	73,1 ; 80,0	21,1	17,7 ; 24,5	2,3*	1,2 ; 3,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	76,2	72,6 ; 79,7	21,5	18,1 ; 25,0	2,3**	1,1 ; 3,7
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	87,6	83,8 ; 91,3	11,2*	7,7 ; 15,0	1,2**	0,1 ; 2,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	71,5	67,2 ; 75,6	22,3	18,5 ; 26,5	6,2*	4,1 ; 8,4
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	77,5	75,5 ; 79,4	20,2	18,3 ; 22,3	2,3*	1,5 ; 3,1
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	67,6	61,8 ; 73,4	25,7	20,3 ; 31,4	6,6*	3,9 ; 9,8
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	77,1	75,2 ; 78,9	20,1	18,4 ; 21,9	2,7	2,0 ; 3,5
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,252					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	75,9	73,5 ; 78,2	21,1	18,8 ; 23,4	3,0*	2,0 ; 4,0
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	84,1	78,4 ; 89,6	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	77,3	71,1 ; 83,5	16,3*	11,2 ; 21,8	6,3**	3,0 ; 10,5
Retraités	72,9	23,2	3,8	71,9	68,4 ; 75,2	24,2	21,0 ; 27,5	3,9*	2,6 ; 5,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,1	74,3 ; 77,7	20,7	19,1 ; 22,4	3,2	2,5 ; 4,0
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	71,3	67,4 ; 75,3	22,6	18,8 ; 26,2	6,1*	3,9 ; 8,5
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	77,6	75,6 ; 79,6	20,1	18,1 ; 22,1	2,3	1,6 ; 2,9
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	81,4	79,1 ; 83,5	17,4	15,3 ; 19,6	1,2*	0,7 ; 1,8
Bon	75,1	21,2	3,6	71,5	68,0 ; 74,9	23,2	20,2 ; 26,6	5,2*	3,7 ; 6,9
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	64,6	59,0 ; 70,3	28,6	23,4 ; 33,9	6,8*	3,8 ; 10,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	77,2	19,2	3,6	71,8	67,3 ; 75,9	22,2	18,4 ; 26,6	6,0*	3,9 ; 8,4
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	77,4	75,4 ; 79,3	20,3	18,4 ; 22,2	2,4	1,7 ; 3,0
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	68,5	64,1 ; 72,8	25,4	21,5 ; 29,5	6,1*	3,8 ; 8,8
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	77,5	75,5 ; 79,3	19,8	18,0 ; 21,7	2,7	2,0 ; 3,4
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	88,9	86,0 ; 91,3	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	72,8	70,5 ; 75,3	23,4	21,1 ; 25,8	3,7	2,8 ; 4,8

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	76,1	74,3 ; 77,7	65,7	62,8 ; 68,5	86,1	84,1 ; 88,0
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	20,7	19,1 ; 22,4	29,1	26,3 ; 31,9	12,6	10,7 ; 14,5
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	3,2	2,5 ; 4,0	5,3	3,9 ; 6,7	1,3*	0,8 ; 1,9
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	68,5	64,1 ; 72,8	56,4	48,8 ; 63,7	77,2	72,3 ; 82,3
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	25,4	21,5 ; 29,5	33,9	27,4 ; 41,3	19,3	14,5 ; 24,1
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	6,1*	3,8 ; 8,8	9,7**	4,9 ; 15,3	3,6**	1,7 ; 5,6
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	77,5	75,5 ; 79,3	67,2	64,0 ; 70,2	88,2	86,0 ; 90,1
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	19,8	18,0 ; 21,7	28,3	25,3 ; 31,3	11,1	9,2 ; 13,2
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	2,7	2,0 ; 3,4	4,6	3,2 ; 5,9	0,8**	0,3 ; 1,4

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	29,5	27,4 ; 31,6	16,9	15,2 ; 18,8	53,6	51,3 ; 55,9
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	21,3	18,5 ; 24,2	14,2	11,8 ; 16,8	64,5	61,0 ; 67,7
Femmes	41,7	18,2	40,1	37,9	34,8 ; 41,1	19,8	17,2 ; 22,4	42,3	39,1 ; 45,5
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,002					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	26,0	20,3 ; 32,3	15,6*	10,6 ; 20,7	58,5	51,3 ; 65,0
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	24,5	21,1 ; 28,1	19,3	16,2 ; 22,8	56,1	52,1 ; 60,2
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	33,9	30,6 ; 37,5	16,7	14,3 ; 19,7	49,3	45,8 ; 52,9
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	35,5	30,1 ; 41,0	12,3	8,8 ; 16,1	52,2	46,8 ; 58,0
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,226					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	29,3	25,0 ; 33,6	13,5	10,1 ; 17,0	57,2	52,4 ; 61,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	29,2	25,3 ; 33,4	17,5	14,3 ; 20,9	53,3	48,8 ; 57,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	27,6	23,8 ; 31,8	18,7	15,3 ; 22,1	53,7	49,3 ; 58,0
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	33,3	27,9 ; 38,8	18,0	13,4 ; 23,0	48,7	42,8 ; 54,6
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,485					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	30,6	25,1 ; 36,4	19,1	14,5 ; 24,1	50,3	44,5 ; 56,1
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	29,4	27,0 ; 31,7	16,7	14,7 ; 18,8	53,9	51,3 ; 56,5
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,368					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	28,6	25,9 ; 31,2	17,1	15,0 ; 19,5	54,3	51,5 ; 57,2
Étudiants	28,8	16,3	54,9	26,2	19,2 ; 33,3	18,6*	12,6 ; 24,7	55,2	47,3 ; 63,0
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	34,1	25,5 ; 42,2	19,2*	13,3 ; 25,8	46,8	38,3 ; 55,6
Retraités	38,0	12,4	49,6	33,6	29,0 ; 38,4	14,2	10,9 ; 17,9	52,2	47,4 ; 57,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
2,3*	1,6 ; 3,0	46,2	44,2 ; 48,3	33,9	32,0 ; 35,7	17,6	16,1 ; 19,2	Ensemble de la population	
P = 0,000									
0,9**	0,3 ; 1,7	39,1	36,3 ; 42,0	41,5	38,5 ; 44,4	18,5	16,0 ; 21,0	Sexe	
3,7*	2,5 ; 4,9	53,5	50,7 ; 56,2	26,2	23,9 ; 28,6	16,7	14,7 ; 18,7	Hommes	
P = 0,000									
8,1**	2,2 ; 15,4	77,3	67,6 ; 86,4	10,4**	3,3 ; 18,7	4,3**	0,9 ; 8,3	Groupe d'âge	
4,5**	1,3 ; 8,1	68,7	60,0 ; 76,4	19,1*	13,1 ; 26,0	7,8**	3,3 ; 13,4	15-17 ans	
P = 0,000									
6,1**	3,0 ; 9,7	72,6	66,5 ; 78,3	15,2*	10,3 ; 20,2	6,2**	3,2 ; 9,6	18-24 ans	
2,2*	1,1 ; 3,4	48,6	44,4 ; 52,9	31,3	27,4 ; 35,1	17,9	14,6 ; 21,3	15-24 ans	
1,5**	0,7 ; 2,4	37,9	34,9 ; 41,1	39,9	36,8 ; 43,0	20,7	18,1 ; 23,4	25-44 ans	
1,1**	0,4 ; 2,0	39,0	35,0 ; 43,0	40,3	36,2 ; 44,3	19,6	16,5 ; 23,0	45-64 ans	
P = 0,021									
x	;	75,5	60,5 ; 89,9	12,2**	1,0 ; 24,8	x	;	65 ans et plus	
x	;	70,2	58,1 ; 81,2	19,8*	11,4 ; 29,7	x	;	Hommes	
P = 0,000									
3,8**	0,1 ; 8,8	72,5	63,4 ; 81,6	16,5*	9,6 ; 24,0	7,2**	2,4 ; 13,1	15-17 ans	
x	;	40,4	34,4 ; 46,7	39,7	33,5 ; 45,9	x	;	18-24 ans	
0,5**	0,0 ; 1,2	27,9	23,6 ; 32,2	49,2	44,5 ; 54,1	22,3	18,4 ; 26,5	25-44 ans	
x	;	30,6	25,0 ; 36,5	50,8	44,1 ; 56,9	x	;	45-64 ans	
P = 0,025									
x	;	79,1	66,3 ; 90,9	8,6**	1,0 ; 18,7	x	;	65 ans et plus	
9,4**	2,4 ; 17,7	66,7	55,2 ; 77,5	18,2**	9,4 ; 28,2	5,7**	1,0 ; 11,7	Femmes	
P = 0,000									
8,8**	3,4 ; 14,7	72,7	64,9 ; 80,2	13,6*	7,5 ; 20,4	5,0**	1,8 ; 9,2	15-17 ans	
4,5**	2,3 ; 6,9	57,7	52,0 ; 63,5	21,9	17,6 ; 26,7	15,9	11,6 ; 20,4	18-24 ans	
2,4**	0,9 ; 4,2	47,7	43,4 ; 52,2	30,6	26,6 ; 34,8	19,2	15,9 ; 22,7	25-44 ans	
1,6**	0,4 ; 3,0	45,8	40,3 ; 51,4	31,8	26,7 ; 37,3	20,8	16,5 ; 25,3	45-64 ans	
P = 0,013									
2,9**	1,5 ; 4,6	44,8	41,1 ; 48,7	33,4	30,0 ; 36,8	18,9	16,2 ; 21,7	65 ans et plus	
1,1**	0,5 ; 2,0	43,9	40,0 ; 47,8	33,3	29,6 ; 36,8	21,7	18,2 ; 25,3	Niveau de scolarité	
2,8**	1,4 ; 4,4	49,8	45,7 ; 53,9	33,5	29,8 ; 37,5	13,8	11,2 ; 16,6	Niveau inférieur au DES	
2,2**	0,8 ; 4,1	46,7	41,2 ; 52,6	37,3	31,9 ; 42,9	13,7	9,9 ; 17,8	Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 0,431									
2,3**	0,3 ; 4,9	39,9	34,0 ; 45,6	41,0	35,6 ; 46,9	16,8	12,8 ; 21,1	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
x	;	34,8	29,4 ; 40,7	40,4	34,6 ; 46,1	x	;	Diplôme d'études universitaires	
x	;	43,4	37,1 ; 49,3	41,4	35,7 ; 47,6	x	;	Hommes	
x	;	37,3	28,6 ; 46,2	46,5	37,3 ; 55,5	x	;	Niveau inférieur au DES	
P = 0,082									
3,4**	1,4 ; 5,8	49,2	44,2 ; 54,2	26,6	22,3 ; 30,9	20,8	17,2 ; 24,6	Diplôme d'études secondaires (DES)	
1,9**	0,6 ; 3,5	54,7	49,2 ; 60,4	24,7	20,0 ; 29,6	18,7	14,2 ; 23,5	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
5,7**	2,8 ; 8,8	56,5	50,5 ; 62,4	25,3	20,5 ; 30,5	12,5	9,2 ; 16,4	Diplôme d'études universitaires	
3,5**	0,9 ; 6,9	55,2	47,6 ; 62,6	29,1	22,7 ; 36,1	12,2*	7,7 ; 17,0	Indice du niveau de revenu du ménage	
P = 0,001									
2,3*	1,2 ; 3,5	42,8	38,3 ; 47,6	30,2	25,9 ; 34,4	24,7	21,0 ; 28,9	Quintile 1 (faible)	
2,4*	1,6 ; 3,3	46,7	44,3 ; 49,1	34,5	32,3 ; 36,9	16,4	14,6 ; 18,2	Quintile 2 et suivants	
P = 0,765									
x	;	41,7	33,6 ; 49,6	36,8	29,1 ; 44,7	x	;	Hommes	
0,9**	0,2 ; 1,8	38,2	34,7 ; 41,6	42,1	38,6 ; 45,6	18,8	16,0 ; 21,6	Quintile 1 (faible)	
P = 0,000									
3,4**	1,7 ; 5,1	43,6	37,9 ; 49,4	25,5	20,9 ; 30,5	27,5	22,8 ; 32,5	Quintile 2 et suivants	
4,0*	2,5 ; 5,6	56,0	52,6 ; 59,3	26,3	23,3 ; 29,3	13,7	11,4 ; 16,1	Femmes	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	39,0	37,0 ; 40,9	2,4	1,7 ; 3,1	58,7	56,6 ; 60,6
Sexe	P = 0,000			P = 0,005					
Hommes	36,6	3,6	59,9	37,5	34,6 ; 40,5	3,4*	2,2 ; 4,7	59,1	56,1 ; 62,2
Femmes	40,5	2,3	57,1	40,4	37,8 ; 43,1	1,4*	0,8 ; 2,0	58,2	55,5 ; 60,8
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	14,6*	10,3 ; 19,3	3,4**	1,2 ; 6,3	82,0	77,0 ; 86,8
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	39,1	34,8 ; 43,3	4,0*	2,2 ; 5,9	56,9	52,7 ; 61,1
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	48,6	45,4 ; 51,8	1,2*	0,6 ; 1,8	50,3	47,1 ; 53,5
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	38,2	34,2 ; 42,2	1,5**	0,7 ; 2,5	60,3	56,3 ; 64,4
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	10,2**	4,4 ; 16,3	6,2**	2,0 ; 11,8	83,6	76,2 ; 90,5
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	36,3	30,1 ; 42,3	5,8**	2,8 ; 9,2	57,9	52,0 ; 64,3
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	50,2	45,5 ; 55,0	1,5**	0,6 ; 2,5	48,3	43,5 ; 53,2
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	36,9	30,7 ; 43,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	19,7*	13,3 ; 26,9	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	42,1	36,4 ; 47,8	1,9**	0,5 ; 3,6	55,9	50,4 ; 61,6
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	46,9	42,6 ; 51,4	0,9**	0,2 ; 1,7	52,2	47,8 ; 56,5
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	39,3	34,1 ; 44,5	2,4**	1,0 ; 4,0	58,4	52,8 ; 63,8
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	26,3**	12,7 ; 41,2	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	9,1	7,4 ; 10,9	3,4*	2,2 ; 4,7	87,5	85,3 ; 89,5
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	54,6	51,0 ; 58,1	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	92,7	90,0 ; 95,0	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	39,3*	x	;	76,0*	34,8 ; 97,2	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	4,3*	2,3 ; 6,6	6,2*	3,6 ; 9,1	89,5	86,0 ; 92,7
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	46,7	41,9 ; 51,4	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	90,4	86,1 ; 94,3	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	13,8**	5,0 ; 24,7	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	12,6	10,1 ; 15,3	1,3**	0,6 ; 2,3	86,0	83,2 ; 88,6
Embonpoint	69,6	x	x	67,3	61,7 ; 72,4	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	95,3	92,4 ; 97,5	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	76,9	73,6 ; 80,1	14,9	12,2 ; 17,6	8,2	6,1 ; 10,4
Sexe	P = 0,000			P = 0,161					
Hommes	81,4	10,5	8,0	79,9	74,3 ; 85,1	11,6*	7,4 ; 16,2	8,5*	5,1 ; 12,6
Femmes	74,5	14,1	11,5	74,7	70,5 ; 78,7	17,4	13,8 ; 21,2	7,9*	5,4 ; 10,5
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,453					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	73,9	60,2 ; 87,7	13,2**	3,7 ; 24,6	12,8**	2,4 ; 25,0
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	75,4	69,1 ; 81,9	18,9*	13,2 ; 24,5	5,7**	2,9 ; 9,1
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	76,3	71,6 ; 80,8	14,5	11,1 ; 18,3	9,2*	6,1 ; 12,5
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	84,4	78,9 ; 89,8	8,4*	4,8 ; 12,6	7,1**	3,3 ; 11,5
Hommes	P = 0,252			P = 0,841					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	72,1*	49,2 ; 94,4	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	76,5	66,2 ; 86,8	17,0**	7,9 ; 26,6	6,5**	1,9 ; 12,7
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	82,3	75,1 ; 88,9	8,2**	3,7 ; 13,6	9,5**	4,5 ; 14,9
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	88,0	80,2 ; 94,9	7,1**	1,8 ; 13,8	4,9**	0,4 ; 10,3
Femmes	P = 0,004			P = 0,805					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	75,6	59,3 ; 92,0	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	74,4	66,3 ; 81,6	20,5*	13,3 ; 28,0	5,1**	1,9 ; 9,1
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	72,2	66,3 ; 78,1	18,7	13,8 ; 24,2	9,0*	5,0 ; 13,1
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	81,9	73,5 ; 89,3	9,4**	4,3 ; 15,5	8,7**	3,1 ; 15,0
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,753					
Poids insuffisant	82,3	x	x	69,2**	11,2 ; 100,0	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	78,0	71,3 ; 84,3	15,7*	10,6 ; 21,5	6,3**	2,5 ; 10,8
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	78,1	73,4 ; 82,8	13,6*	9,8 ; 17,8	8,3*	5,1 ; 11,7
Obésité	72,3	14,4	13,3	74,7	68,8 ; 80,3	15,6*	10,7 ; 20,9	9,7*	5,9 ; 13,8
Hommes	P = 0,002			P = 0,723					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	81,1	65,7 ; 95,2	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	85,1	78,1 ; 91,1	8,0**	3,4 ; 13,3	6,9**	3,0 ; 12,3
Obésité	76,0	12,2	11,8	72,0	62,4 ; 81,2	15,6**	7,5 ; 23,8	12,4**	6,0 ; 19,7
Femmes	P = 0,161			P = 0,692					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	76,8	69,3 ; 83,8	16,6*	10,8 ; 23,1	6,6**	2,4 ; 11,3
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	71,3	64,3 ; 78,3	19,1*	13,4 ; 25,5	9,6**	5,2 ; 14,6
Obésité	68,9	16,4	14,7	77,4	70,6 ; 83,8	15,5*	9,8 ; 21,7	7,1**	3,4 ; 11,1

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
19,0	17,4 ; 20,7	16,3	14,6 ; 17,9	2,4	1,8 ; 3,1	62,3	60,3 ; 64,3	Ensemble de la population	
P = 0,000									
15,9	13,6 ; 18,2	14,8	12,5 ; 17,1	4,0*	2,7 ; 5,4	65,3	62,3 ; 68,4	Sexe	
22,0	19,7 ; 24,3	17,8	15,6 ; 20,0	0,9*	0,5 ; 1,4	59,3	56,5 ; 62,0	Hommes	
P = 0,000									
14,2*	9,6 ; 19,4	10,8*	6,8 ; 15,3	6,8*	3,6 ; 10,3	68,2	61,9 ; 74,3	Groupe d'âge	
19,5	16,2 ; 22,9	18,8	15,5 ; 22,4	3,2**	1,6 ; 4,9	58,5	54,3 ; 62,6	15-24 ans	
21,4	18,7 ; 24,1	18,2	15,8 ; 20,7	0,7**	0,3 ; 1,2	59,7	56,5 ; 62,7	25-44 ans	
17,0	14,0 ; 20,1	12,5	9,9 ; 15,2	1,2**	0,5 ; 2,2	69,3	65,4 ; 72,9	45-64 ans	
P = 0,004									
10,6**	4,4 ; 17,9	11,8**	5,2 ; 19,1	12,0**	6,1 ; 18,6	65,7	56,0 ; 75,5	Hommes	
17,4	12,6 ; 22,6	17,0	12,6 ; 21,9	5,3**	2,3 ; 8,6	60,3	54,1 ; 66,4	15-24 ans	
17,0	13,3 ; 20,6	15,5	12,1 ; 19,0	0,6**	0,1 ; 1,3	67,0	62,4 ; 71,4	25-44 ans	
15,9	11,4 ; 20,5	11,8*	8,1 ; 15,8	1,3**	0,0 ; 3,2	71,0	65,4 ; 76,2	45-64 ans	
P = 0,002									
18,3*	12,0 ; 25,6	9,8*	5,3 ; 15,0	x	;	x	;	Femmes	
21,7	17,2 ; 26,6	20,8	16,0 ; 25,7	0,9**	0,2 ; 1,8	56,6	50,7 ; 62,5	15-24 ans	
25,7	21,9 ; 29,7	20,9	17,4 ; 24,7	0,8**	0,1 ; 1,5	52,6	48,3 ; 57,0	25-44 ans	
17,8	13,7 ; 22,3	13,0	9,5 ; 16,8	1,1**	0,3 ; 2,2	68,0	62,8 ; 73,0	45-64 ans	
P = 0,000									
x	;	6,5**	0,6 ; 14,3	8,2**	2,3 ; 16,4	x	;	Statut pondéral	
7,0	5,4 ; 8,8	14,9	12,6 ; 17,3	4,0*	2,6 ; 5,4	74,1	71,3 ; 76,9	Poids insuffisant	
26,8	23,5 ; 30,1	16,9	14,3 ; 19,5	0,9**	0,2 ; 1,8	55,3	51,8 ; 58,9	Poids normal	
39,3	34,5 ; 44,3	21,3	17,0 ; 25,7	x	;	x	;	Embonpoint	
P = 0,008									
x	;	x	;	x	;	84,0	50,3 ; 100,0	Obésité	
3,7**	1,5 ; 6,4	10,3*	7,1 ; 13,9	8,4*	5,2 ; 11,7	77,6	72,9 ; 82,2	Hommes	
18,8	14,9 ; 22,7	16,6	13,1 ; 20,2	1,5**	0,4 ; 3,0	63,1	58,7 ; 67,8	Poids insuffisant	
36,6	30,1 ; 43,1	21,1	14,9 ; 27,8	x	;	x	;	Poids normal	
P = 0,000									
x	;	x	;	8,3**	1,6 ; 17,2	85,6	73,4 ; 94,9	Embonpoint	
9,4	7,3 ; 11,9	18,2	15,1 ; 21,4	0,7**	0,3 ; 1,3	71,6	67,9 ; 75,1	Obésité	
39,7	34,1 ; 45,2	17,5	13,6 ; 21,8	x	;	x	;	Femmes	
42,3	35,4 ; 49,3	21,6	16,0 ; 27,0	x	;	x	;	Poids insuffisant	
P = 0,000									
37,6	34,5 ; 40,6	20,8	18,1 ; 23,7	x	;	x	;	Poids normal	
x	;	x	;	34,2*	20,4 ; 49,6	64,8	49,4 ; 78,8	Embonpoint	
7,7	6,1 ; 9,3	14,0	12,1 ; 16,0	2,7*	1,8 ; 3,7	75,5	73,1 ; 78,0	Obésité	
P = 0,000									
Perception à l'égard de son poids									
Excès de poids									
Trop maigre									
À peu près normal(e)									

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
26,1	21,8 ; 30,4	16,1	12,4 ; 20,0	6,6*	4,2 ; 9,1	51,3	46,4 ; 56,3	Ensemble de la population	
P = 0,780									
23,2*	15,8 ; 30,6	16,3*	10,0 ; 23,6	6,7**	2,8 ; 11,2	53,8	45,9 ; 62,6	Sexe	
28,1	22,9 ; 33,6	15,9	11,6 ; 20,4	6,5*	3,6 ; 9,5	49,5	43,5 ; 55,5	Hommes	
P = 0,547									
40,0*	22,5 ; 59,9	18,3**	3,1 ; 35,6	x		x		Femmes	
29,5	21,4 ; 38,3	15,9*	9,1 ; 23,0	5,8**	2,1 ; 10,3	48,8	39,4 ; 58,3	Groupe d'âge	
24,7	18,4 ; 31,2	16,5*	11,3 ; 22,1	8,0**	3,7 ; 12,3	50,8	43,6 ; 58,1	15-24 ans	
13,4*	6,9 ; 20,2	13,6**	6,4 ; 21,3	3,9**	0,9 ; 7,7	69,1	59,5 ; 79,0	25-44 ans	
P = 0,960									
x		x		x		25,0**	2,2 ; 60,4	45-64 ans	
23,1**	10,3 ; 37,8	15,4**	4,3 ; 28,5	x		x		65 ans et plus	
22,4*	11,8 ; 33,3	15,3**	6,9 ; 25,8	10,3**	2,5 ; 18,6	52,0	39,7 ; 65,1	Hommes	
14,6**	4,7 ; 25,8	11,1**	0,4 ; 23,6	6,6**	0,0 ; 15,0	67,8	52,1 ; 83,0	15-24 ans	
P = 0,688									
40,7*	20,8 ; 61,7	10,6**	1,3 ; 23,7	x		x		25-44 ans	
34,7	24,1 ; 45,8	16,3**	7,9 ; 25,4	8,4**	2,5 ; 14,9	40,7	29,1 ; 52,1	45-64 ans	
26,2	18,7 ; 34,4	17,3*	10,8 ; 24,4	6,6**	2,0 ; 11,9	50,0	41,1 ; 58,9	65 ans et plus	
12,6**	4,7 ; 21,8	15,2**	5,6 ; 26,2	x		x		Femmes	
P = 0,030									
x		x		x		x		Statut pondéral	
42,4*	29,1 ; 55,4	9,3**	3,8 ; 16,3	9,9**	2,5 ; 18,3	38,5*	26,5 ; 50,8	Poids insuffisant	
23,5	17,3 ; 29,6	16,8*	11,3 ; 23,1	4,6**	1,8 ; 7,6	55,1	47,8 ; 62,6	Poids normal	
22,1	16,2 ; 28,7	18,8*	12,3 ; 25,7	7,3**	3,3 ; 11,9	51,8	44,4 ; 59,8	Embonpoint	
P = 0,721									
x		x		x		x		Obésité	
65,2*	24,3 ; 90,5	x		x		26,5**	2,3 ; 63,8	Hommes	
21,6*	12,0 ; 31,7	14,8**	6,2 ; 25,0	4,7**	0,5 ; 10,2	58,9	47,4 ; 70,9	Poids insuffisant	
15,1**	7,3 ; 23,7	21,6**	9,9 ; 33,2	9,3**	2,1 ; 17,9	54,0	41,6 ; 66,5	Poids normal	
P = 0,475									
x		x		x		x		Embonpoint	
35,6*	22,6 ; 49,1	11,4**	4,4 ; 20,5	11,0**	2,2 ; 20,9	42,0	29,0 ; 55,7	Obésité	
25,0	17,2 ; 33,3	18,3*	11,5 ; 25,7	4,5**	0,9 ; 8,7	52,3	42,8 ; 61,7	Femmes	
28,3*	19,5 ; 38,0	16,3*	8,7 ; 24,5	5,5**	1,5 ; 10,6	49,9	39,9 ; 59,7	Poids insuffisant	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	87,3	84,7 ; 89,8	6,5	4,6 ; 8,4	6,2*	4,5 ; 8,1
Sexe	P = 0,001			P = 0,952					
Hommes	88,9	6,9	4,2	86,9	82,1 ; 91,1	6,8*	3,7 ; 10,3	6,3*	3,4 ; 9,5
Femmes	85,7	7,5	6,8	87,7	84,6 ; 90,6	6,2*	4,1 ; 8,4	6,1*	4,0 ; 8,4
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,098					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	75,2	61,5 ; 87,7	9,7**	1,7 ; 20,2	15,1**	4,9 ; 26,4
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	91,1	86,9 ; 94,8	5,6**	2,7 ; 8,9	3,2**	1,1 ; 6,1
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	87,9	84,3 ; 91,2	6,2*	3,6 ; 9,0	5,9*	3,7 ; 8,5
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	86,1	80,1 ; 91,1	6,7**	3,1 ; 11,4	7,2**	3,2 ; 11,8
Hommes	P = 0,121			P = 0,790					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	66,7*	41,3 ; 90,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	89,7	81,8 ; 96,2	5,8**	1,2 ; 11,9	4,5**	0,3 ; 10,2
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	89,3	83,4 ; 94,3	5,1**	1,6 ; 9,8	5,6**	2,0 ; 9,8
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	89,8	82,0 ; 96,1	5,0**	0,3 ; 11,3	5,3**	0,8 ; 11,1
Femmes	P = 0,017			P = 0,413					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	82,8	68,4 ; 94,9	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	92,4	88,0 ; 96,1	5,5**	2,1 ; 9,5	2,1**	0,4 ; 4,5
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	87,0	82,3 ; 91,4	6,9**	3,5 ; 10,6	6,1**	3,3 ; 9,5
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	83,5	74,9 ; 90,9	8,0**	2,9 ; 14,7	8,5**	2,7 ; 15,3
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,491					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	90,0	84,9 ; 94,7	6,1**	2,4 ; 10,6	3,9**	1,3 ; 6,8
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	87,2	82,8 ; 91,3	7,1*	4,2 ; 10,3	5,8**	2,7 ; 9,1
Obésité	82,0	8,7	9,2	86,0	81,4 ; 90,1	5,6*	3,1 ; 8,7	8,4*	5,2 ; 12,1
Hommes	P = 0,002			P = 0,886					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	82,5	68,2 ; 95,1	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	87,7	81,3 ; 93,7	5,9**	1,9 ; 10,5	6,4**	2,0 ; 11,9
Obésité	85,2	8,2	6,6*	87,9	81,2 ; 93,7	5,4**	1,7 ; 10,4	6,8**	2,3 ; 11,8
Femmes	P = 0,034			P = 0,105					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	92,8	88,7 ; 96,6	3,9**	1,0 ; 7,3	3,3**	1,1 ; 6,1
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	86,6	80,9 ; 91,9	8,2*	4,4 ; 12,9	5,1**	1,6 ; 9,5
Obésité	79,1	9,2	11,8	84,2	77,9 ; 89,6	5,8**	2,5 ; 9,9	10,0*	5,1 ; 15,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	5,2	3,7 ; 6,8	94,8	93,2 ; 96,3
Sexe	P = 0,024		P = 0,226			
Hommes	6,6	93,4	4,2*	2,4 ; 6,3	95,8	93,7 ; 97,6
Femmes	8,6	91,4	6,0*	3,8 ; 8,3	94,0	91,7 ; 96,2
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,538			
15-24 ans	11,2*	88,8	3,8**	0,0 ; 9,4	96,2	90,6 ; 100,0
25-44 ans	8,0	92,0	4,8**	2,1 ; 8,1	95,2	91,9 ; 97,9
45-64 ans	7,5	92,5	4,8*	2,9 ; 7,0	95,2	93,0 ; 97,1
65 ans et plus	4,9	95,1	8,2**	3,8 ; 13,0	91,8	87,0 ; 96,2
Hommes	P = 0,409		P = 0,107			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	x	;	x	;
45-64 ans	7,0	93,0	6,6**	3,1 ; 11,0	93,4	89,0 ; 96,9
65 ans et plus	6,5*	93,5	6,9**	1,5 ; 13,6	93,1	86,4 ; 98,5
Femmes	P = 0,003		P = 0,359			
15-24 ans	12,3*	87,7	x	;	x	;
25-44 ans	9,9	90,1	8,2**	3,5 ; 14,0	91,8	86,0 ; 96,5
45-64 ans	7,8	92,2	3,6**	1,4 ; 6,2	96,4	93,8 ; 98,6
65 ans et plus	3,8*	96,2	9,1**	2,9 ; 16,3	90,9	83,7 ; 97,1
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,405			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	4,3**	1,7 ; 7,6	95,7	92,4 ; 98,3
Embonpoint	6,6	93,4	4,5**	2,4 ; 7,1	95,5	92,9 ; 97,6
Obésité	11,3	88,7	7,0*	4,2 ; 10,3	93,0	89,7 ; 95,8
Hommes	P = 0,000		P = 0,143			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	3,5**	0,9 ; 6,8	96,5	93,2 ; 99,1
Obésité	11,5	88,5	5,6**	2,3 ; 9,6	94,4	90,4 ; 97,7
Femmes	P = 0,032		P = 0,531			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	4,9**	1,7 ; 8,9	95,1	91,1 ; 98,3
Embonpoint	8,4	91,6	5,5**	2,1 ; 9,7	94,5	90,3 ; 97,9
Obésité	11,1	88,9	8,4**	3,8 ; 13,7	91,6	86,3 ; 96,2

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 0,609					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	0,4**	0,1 ; 0,9	0,7**	0,0 ; 1,6	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	0,9**	0,3 ; 1,7	1,3**	0,2 ; 3,0	x	;
Rarement	2,8	2,6*	2,9	2,4*	1,3 ; 3,6	3,1**	1,2 ; 5,4	1,8**	0,7 ; 3,1
Jamais	94,8	94,8	94,8	96,3	94,9 ; 97,6	94,9	92,2 ; 97,4	97,2	95,8 ; 98,5
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,313					
Souvent	4,6	4,2	4,9	2,7*	1,6 ; 3,9	3,2**	1,5 ; 5,1	2,3**	1,1 ; 3,9
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	6,9	5,0 ; 8,9	7,2*	4,3 ; 10,5	6,7*	4,3 ; 9,2
Rarement	5,1	5,5	4,9	3,9*	2,7 ; 5,4	2,5**	0,8 ; 4,6	5,1*	3,4 ; 7,1
Jamais	82,9	81,4	84,0	86,5	83,9 ; 88,9	87,2	83,2 ; 90,9	85,9	82,7 ; 89,1
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,656					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	1,9**	1,0 ; 3,0	x	;	2,7**	1,2 ; 4,4
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	7,6	5,6 ; 9,7	x	;	7,3*	5,0 ; 9,7
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,2*	2,8 ; 5,7	4,3**	1,8 ; 7,1	4,2*	2,5 ; 6,1
Jamais	86,5	87,5	85,7	86,3	83,7 ; 88,7	86,9	82,6 ; 91,0	85,8	82,5 ; 88,9
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	1,2**	0,4 ; 2,3
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	0,5**	0,0 ; 1,0	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,3	97,3 ; 99,2	99,3	97,7 ; 100,0	97,7	96,2 ; 98,9
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	0,5**	0,1 ; 1,1	x	;	0,9**	0,1 ; 1,8
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,0	98,3 ; 99,6	99,6	99,0 ; 100,0	98,6	97,4 ; 99,5
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	0,7**	0,2 ; 1,3	x	;	1,2**	0,3 ; 2,3
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,4	97,4 ; 99,3	99,7	99,1 ; 100,0	97,4	95,7 ; 98,8
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,4	98,8 ; 99,9	99,6	98,9 ; 100,0	99,2	98,2 ; 100,0
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,9**	1,0 ; 3,0	x	;	3,2**	1,6 ; 5,0
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,4	96,3 ; 98,5	99,6	99,0 ; 100,0	95,8	93,9 ; 97,7

Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Commencer ou recommencer à fumer	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	0,4**	0,1 ; 0,9	x	;	0,6**	0,0 ; 1,4
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	99,0	98,1 ; 99,7	98,7	97,1 ; 100,0	99,1	98,3 ; 99,8
Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;	1,0**	0,2 ; 2,1
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	98,9	98,1 ; 99,7	99,5	98,2 ; 100,0	98,5	97,3 ; 99,6
Se faire vomir	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	x	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
4,3	3,1 ; 5,7	35,2	31,8 ; 38,7	43,3	39,6 ; 47,0	17,2	14,6 ; 20,1	Ensemble de la population	
P = 0,001									
5,3*	3,3 ; 7,9	41,9	36,2 ; 47,6	39,5	33,5 ; 45,6	13,2	9,2 ; 17,6	Sexe	
3,5*	2,0 ; 5,1	30,1	26,2 ; 34,2	46,1	41,6 ; 50,5	20,3	16,6 ; 24,1	Hommes	
								Femmes	
P = 0,144									
x	;	37,5*	24,9 ; 50,3	34,7*	21,9 ; 48,1	x	;	Groupe d'âge	
5,0**	2,4 ; 8,1	31,4	25,2 ; 37,3	46,1	38,9 ; 53,0	17,5	12,9 ; 22,6	15-24 ans	
4,2*	2,3 ; 6,2	35,7	30,8 ; 40,7	42,8	37,3 ; 48,1	17,3	13,5 ; 21,3	25-44 ans	
6,1**	2,5 ; 10,2	40,8	33,4 ; 48,4	44,6	36,8 ; 52,4	8,4*	4,4 ; 12,8	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,388									
x	;	44,3*	21,8 ; 66,8	28,5**	8,8 ; 50,3	x	;	Hommes	
7,7**	3,1 ; 13,4	41,4	31,0 ; 51,1	42,5	32,3 ; 53,2	8,3**	3,5 ; 13,8	15-24 ans	
4,9**	1,8 ; 8,5	39,7	31,4 ; 48,6	40,5	31,2 ; 48,9	14,9*	9,1 ; 21,6	25-44 ans	
5,1**	0,2 ; 11,5	48,0	35,3 ; 60,0	38,4*	26,2 ; 50,8	8,5**	3,8 ; 14,2	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,307									
x	;	31,5*	18,0 ; 46,7	40,2*	24,0 ; 57,1	x	;	Femmes	
2,8**	0,1 ; 6,0	22,7*	15,9 ; 30,3	49,1	40,2 ; 57,7	25,3*	18,0 ; 33,1	15-24 ans	
3,7**	1,5 ; 6,1	33,0	26,8 ; 39,4	44,4	37,8 ; 51,1	18,9	13,9 ; 24,3	25-44 ans	
6,8**	1,8 ; 12,9	35,9	26,5 ; 45,5	48,9	39,4 ; 59,1	8,3**	2,7 ; 14,7	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,813									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
3,3**	1,2 ; 5,9	40,0	33,1 ; 46,9	39,2	32,3 ; 46,5	17,6*	12,1 ; 23,5	Poids insuffisant	
3,7*	2,0 ; 5,7	34,2	29,3 ; 39,5	43,8	38,1 ; 49,5	18,3	14,1 ; 22,7	Poids normal	
6,1*	3,3 ; 9,2	33,0	27,0 ; 39,1	46,4	40,2 ; 52,8	14,5*	10,1 ; 19,4	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,614									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
5,9**	0,3 ; 14,1	46,7*	30,4 ; 61,9	28,0*	14,7 ; 43,8	19,3**	6,2 ; 34,7	Poids insuffisant	
4,8**	2,0 ; 8,2	42,0	34,0 ; 50,5	40,5	31,9 ; 49,3	12,7*	7,8 ; 18,5	Poids normal	
5,5**	1,6 ; 10,2	39,2	30,0 ; 49,1	44,4	34,9 ; 54,2	10,9**	5,1 ; 17,7	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,646									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
2,3**	0,4 ; 4,7	37,5	30,3 ; 45,1	43,3	35,5 ; 51,2	16,9*	11,3 ; 23,2	Poids insuffisant	
2,7**	0,7 ; 5,3	26,4	20,4 ; 32,8	47,0	39,1 ; 54,6	23,8	17,2 ; 30,8	Poids normal	
6,6**	2,6 ; 11,2	26,7	18,9 ; 34,8	48,5	40,3 ; 56,7	18,2*	11,7 ; 25,7	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,144				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	47,6	44,1 ; 51,2	44,1	38,4 ; 50,3	50,2	45,8 ; 54,5	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	36,1	32,6 ; 39,7	36,9	31,4 ; 42,3	35,5	31,5 ; 39,7	
Non	14,4	15,3	13,7	16,3	14,0 ; 19,0	18,9	14,6 ; 23,5	14,4	11,5 ; 17,5	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,661				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	44,7	41,2 ; 48,0	42,9	37,2 ; 48,6	46,0	41,5 ; 50,4	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	33,6	30,2 ; 36,9	34,3	28,8 ; 39,7	33,1	29,1 ; 37,3	
Non	19,6	22,6	17,4	21,7	18,9 ; 24,6	22,8	18,5 ; 27,8	20,8	17,4 ; 24,5	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,030				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	40,0	36,6 ; 43,4	35,3	29,9 ; 41,1	43,5	39,0 ; 47,7	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	30,0	26,5 ; 33,4	30,1	24,7 ; 35,6	30,0	26,0 ; 34,2	
Non	27,7	32,4	24,3	30,0	26,9 ; 33,3	34,7	29,3 ; 40,3	26,4	22,8 ; 30,2	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,156				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	47,5	44,0 ; 51,0	45,7	39,7 ; 51,6	48,9	44,6 ; 53,4	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	29,6	26,3 ; 32,8	28,0	22,9 ; 33,6	30,7	26,8 ; 34,8	
Non	26,1	27,4	25,1	22,9	20,2 ; 25,9	26,2	21,6 ; 31,6	20,4	17,1 ; 24,0	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	64,5	61,1 ; 67,9	56,6	50,8 ; 62,2	70,3	66,4 ; 74,4	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	18,3	15,5 ; 21,2	24,3	19,1 ; 29,5	13,8	11,0 ; 16,8	
Non	17,4	18,5	16,6	17,2	14,7 ; 19,8	19,1	15,2 ; 23,7	15,8	12,6 ; 18,8	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	65,4	62,1 ; 68,7	54,5	48,9 ; 60,3	73,5	69,7 ; 77,5	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	22,2	19,2 ; 25,4	29,3	23,9 ; 34,9	16,9	13,7 ; 20,3	
Non	12,6	14,0	11,6	12,4	10,0 ; 14,6	16,2	12,0 ; 20,3	9,6	7,0 ; 11,9	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,116				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	51,7	48,2 ; 55,0	50,0	44,3 ; 56,1	52,9	48,4 ; 57,0	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	26,9	23,9 ; 30,1	25,0	19,8 ; 30,1	28,4	24,6 ; 32,6	
Non	21,5	24,4	19,4	21,4	18,7 ; 24,2	25,0	20,1 ; 30,1	18,7	15,5 ; 22,1	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,600				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	12,9	10,5 ; 15,4	14,1*	9,8 ; 18,5	12,0	9,3 ; 14,9	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	15,1	12,4 ; 17,8	15,7	11,8 ; 20,3	14,6	11,3 ; 18,1	
Non	72,0	67,3	75,4	72,1	68,8 ; 75,3	70,2	64,5 ; 75,4	73,5	69,4 ; 77,4	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,002				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	32,8	29,5 ; 36,1	35,3	29,2 ; 41,0	31,0	27,1 ; 34,9	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	17,5	14,7 ; 20,5	22,1	17,2 ; 27,2	14,1	11,0 ; 17,5	
Non	49,9	43,2	54,7	49,6	46,1 ; 53,3	42,6	36,7 ; 48,6	54,9	50,5 ; 59,2	



Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	57,1	53,5 ; 60,6	50,3	44,5 ; 56,1	62,1	57,7 ; 66,2		
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	16,1	13,5 ; 18,9	22,4	17,3 ; 27,5	11,4	8,8 ; 14,3		
Non	29,6	28,8	30,2	26,8	24,0 ; 30,1	27,3	22,5 ; 32,7	26,5	22,8 ; 30,4		
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	36,3	33,0 ; 39,7	22,8	18,4 ; 27,7	46,5	42,0 ; 51,1		
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	16,2	13,5 ; 19,0	20,5	15,6 ; 25,4	12,9	10,1 ; 15,9		
Non	48,5	52,0	45,9	47,5	44,0 ; 51,1	56,7	50,9 ; 62,6	40,6	36,0 ; 45,0		
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,199					
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	34,5	31,4 ; 37,8	31,3	25,9 ; 36,8	36,9	32,6 ; 41,2		
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	24,7	21,7 ; 27,7	27,5	22,2 ; 32,9	22,6	19,1 ; 26,5		
Non	37,5	34,7	39,5	40,8	37,6 ; 44,2	41,1	35,6 ; 47,0	40,5	36,4 ; 44,7		

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
58,8	56,6 ; 60,7	29,6	27,8 ; 31,5	11,6	10,2 ; 13,1	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
51,7	48,7 ; 54,5	32,1	29,3 ; 35,1	16,1	13,8 ; 18,6	Hommes
65,7	62,9 ; 68,2	27,1	24,9 ; 29,8	7,2	5,6 ; 8,8	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
64,4	54,3 ; 74,4	9,9**	4,4 ; 16,5	25,6*	16,2 ; 35,2	15-17 ans
34,3	25,0 ; 42,7	32,9	24,7 ; 41,6	32,7	24,4 ; 41,8	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
47,7	40,5 ; 54,5	22,7	17,6 ; 28,4	29,6	23,5 ; 36,1	25-44 ans
38,2	34,3 ; 42,2	44,5	40,6 ; 48,7	17,2	14,1 ; 20,5	45-64 ans
63,3	60,3 ; 66,2	31,9	29,1 ; 34,9	4,8	3,5 ; 6,1	65 ans et plus
95,2	93,3 ; 96,9	4,0*	2,4 ; 5,8	0,8**	0,1 ; 1,7	
		P = 0,000				Hommes
60,2	44,3 ; 76,5	x	;	x	;	15-17 ans
32,2*	19,2 ; 45,2	27,1*	15,6 ; 39,2	40,7*	28,3 ; 53,8	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
44,0	33,9 ; 54,1	17,4*	10,5 ; 24,8	38,6	29,1 ; 48,5	25-44 ans
33,0	27,2 ; 38,8	43,7	38,0 ; 50,2	23,3	18,3 ; 28,6	45-64 ans
53,1	48,4 ; 57,9	40,2	35,5 ; 44,9	6,7*	4,5 ; 9,2	65 ans et plus
94,3	91,1 ; 97,1	x	;	x	;	
		P = 0,000				Femmes
68,6	54,4 ; 81,4	15,8**	6,1 ; 27,4	15,6**	6,3 ; 26,7	15-17 ans
36,9*	24,0 ; 48,5	39,9	28,9 ; 52,8	23,2*	12,8 ; 34,1	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
51,8	41,5 ; 60,6	28,5	21,4 ; 37,1	19,6*	12,4 ; 27,1	25-44 ans
43,8	38,4 ; 49,5	45,4	39,5 ; 51,0	10,9*	7,4 ; 14,4	45-64 ans
73,0	69,1 ; 76,6	24,1	20,5 ; 27,9	3,0*	1,6 ; 4,4	65 ans et plus
95,9	93,5 ; 98,0	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	43,9	50,1	37,9	39,5	37,7 ; 41,6	46,8	44,0 ; 50,0	32,5	30,0 ; 35,1
Non	56,1	49,9	62,1	60,5	58,4 ; 62,3	53,2	50,0 ; 56,0	67,5	64,9 ; 70,0
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	10,6	14,4	6,8	9,9	8,6 ; 11,3	14,2	12,0 ; 16,5	5,7	4,3 ; 7,3
Non	89,4	85,6	93,2	90,1	88,7 ; 91,4	85,8	83,5 ; 88,0	94,3	92,7 ; 95,7
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,012			
Oui	7,3	9,1	5,5	7,2	6,0 ; 8,4	8,7	6,9 ; 10,7	5,7	4,4 ; 7,2
Non	92,7	90,9	94,5	92,8	91,6 ; 94,0	91,3	89,3 ; 93,1	94,3	92,8 ; 95,6
<b>Ecstasy</b>		P = 0,000				P = 0,011			
Oui	5,1	6,3	3,9	4,2	3,3 ; 5,3	5,4	3,9 ; 7,1	3,1*	2,0 ; 4,2
Non	94,9	93,7	96,1	95,8	94,7 ; 96,7	94,6	92,9 ; 96,1	96,9	95,8 ; 98,0
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,3	16,1	8,7	12,7	11,3 ; 14,2	17,3	14,9 ; 19,9	8,3	6,7 ; 9,8
Non	87,7	83,9	91,3	87,3	85,8 ; 88,7	82,7	80,1 ; 85,1	91,7	90,2 ; 93,3
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,071				P = 0,059			
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,2**	0,1 ; 0,3	0,3**	0,1 ; 0,6	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	99,8	99,7 ; 99,9	99,7	99,4 ; 99,9	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,000				P = 0,042			
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,5**	0,3 ; 0,9	0,9**	0,4 ; 1,4	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,5	99,1 ; 99,7	99,1	98,6 ; 99,6	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,000				P = 0,114			
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,7**	0,3 ; 1,2	1,1**	0,3 ; 2,0	0,3**	0,0 ; 0,7
Non	99,2	98,8	99,7	99,3	98,8 ; 99,7	98,9	98,0 ; 99,7	99,7	99,3 ; 100,0
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,179				P = 0,228			
Oui	1,8	1,9	1,6	1,6*	1,1 ; 2,2	1,9*	1,2 ; 2,8	1,3*	0,7 ; 2,0
Non	98,2	98,1	98,4	98,4	97,8 ; 98,9	98,1	97,2 ; 98,8	98,7	98,0 ; 99,3
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,000				P = 0,035			
Oui	1,6	2,3	0,9	1,7*	1,1 ; 2,3	2,4*	1,5 ; 3,5	0,9**	0,3 ; 1,6
Non	98,4	97,7	99,1	98,3	97,7 ; 98,9	97,6	96,5 ; 98,5	99,1	98,4 ; 99,7
<b>Drogues par injection</b>		P = 0,000				P = 0,063			
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,5**	0,2 ; 0,8	0,8**	0,3 ; 1,4	0,2**	0,0 ; 0,4
Non	99,5	99,3	99,8	99,5	99,2 ; 99,8	99,2	98,6 ; 99,7	99,8	99,6 ; 100,0

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,2	16,2	8,3	10,8	9,4 ; 12,3	15,3	12,9 ; 17,6	6,5	5,0 ; 7,9
Non	87,8	83,8	91,7	89,2	87,7 ; 90,6	84,7	82,4 ; 87,1	93,5	92,1 ; 95
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,213			
Oui	1,6	2,3	0,8	1,1**	0,6 ; 1,7	1,6**	0,8 ; 2,5	0,6**	0,1 ; 1,4
Non	98,4	97,7	99,2	98,9	98,3 ; 99,4	98,4	97,5 ; 99,2	99,4	98,6 ; 99,9
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,079			
Oui	1,8	2,4	1,3	1,4*	0,9 ; 2,1	2,1*	1,1 ; 3,2	0,8**	0,2 ; 1,6
Non	98,2	97,6	98,7	98,6	97,9 ; 99,1	97,9	96,8 ; 98,9	99,2	98,4 ; 99,8
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,181			
Oui	1,4	1,7	1,0	1,1**	0,5 ; 1,7	1,5**	0,6 ; 2,6	0,6**	0,1 ; 1,3
Non	98,6	98,3	99,0	98,9	98,3 ; 99,5	98,5	97,4 ; 99,4	99,4	98,7 ; 99,9
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,409			
Oui	0,8	1,2	0,4*	1,0**	0,5 ; 1,5	1,3**	0,4 ; 2,3	0,7**	0,1 ; 1,4
Non	99,2	98,8	99,6	99,0	98,5 ; 99,5	98,7	97,7 ; 99,6	99,3	98,6 ; 99,9
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = .			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = .			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,484			
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,3**	0,1 ; 0,6	0,4**	0,0 ; 0,9	x	;
Non	99,6	99,6	99,7	99,7	99,4 ; 99,9	99,6	99,1 ; 100,0	x	;
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = .			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	11,6	10,2 ; 13,1	16,1	13,8 ; 18,6	7,2	5,6 ; 8,8
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	25,6*	16,2 ; 35,2	35,9*	19,3 ; 52,0	15,6**	6,3 ; 26,7
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	32,7	24,4 ; 41,8	40,7*	28,3 ; 53,8	23,2*	12,8 ; 34,1
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	17,2	14,1 ; 20,5	23,3	18,3 ; 28,6	10,9*	7,4 ; 14,4
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	4,8	3,5 ; 6,1	6,7*	4,5 ; 9,2	3,0*	1,6 ; 4,4
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	0,8**	0,1 ; 1,7	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	22,8	21,1 ; 24,6	8,3	7,1 ; 9,6	10,2	8,9 ; 11,5
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	24,4	21,7 ; 27,1	9,7	7,6 ; 11,8	14,2	12,0 ; 16,6
Femmes	25,4	6,8	7,4	21,2	19,0 ; 23,7	6,9	5,5 ; 8,5	6,2	4,7 ; 7,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	25,7*	16,5 ; 35,5	6,3**	2,0 ; 11,6	3,5**	0,4 ; 7,9
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	26,5	19,7 ; 34,5	16,1*	9,8 ; 23,1	23,1*	15,5 ; 30,8
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	26,1	20,7 ; 32,4	11,8*	7,7 ; 16,4	14,4*	9,6 ; 19,3
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	29,1	25,3 ; 33,2	13,8	10,9 ; 16,9	18,8	15,6 ; 22,0
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	24,7	22,1 ; 27,6	6,0	4,4 ; 7,7	6,1	4,6 ; 7,7
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	4,0*	2,5 ; 5,9	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,002					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	29,8*	14,9 ; 45,5	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	24,7*	15,0 ; 35,3	16,9**	6,8 ; 28,0	26,1*	15,2 ; 37,6
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	26,9	18,7 ; 35,4	12,3**	5,8 ; 19,4	16,9*	9,9 ; 24,9
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	28,9	23,2 ; 34,9	14,1*	9,9 ; 18,7	24,0	18,9 ; 29,5
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	27,6	23,5 ; 32,4	8,7*	5,8 ; 11,7	10,6	7,9 ; 13,7
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	4,8**	2,1 ; 8,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	21,6**	10,1 ; 34,8	6,8**	0,9 ; 14,7	x	;
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	28,5*	18,8 ; 40,2	15,1**	7,7 ; 24,0	19,4**	8,6 ; 29,5
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	25,3*	18,0 ; 34,1	11,2*	6,3 ; 17,1	11,7**	5,6 ; 18,0
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	29,4	24,3 ; 34,8	13,5	9,5 ; 17,7	13,3*	9,4 ; 17,5
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	22,0	18,4 ; 25,7	3,4*	1,9 ; 5,0	1,7**	0,8 ; 2,8
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	3,4**	1,6 ; 5,5	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8

## SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	77,1	75,5 ; 78,5	82,0	79,8 ; 84,2	72,3	70,1 ; 74,4
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	47,0	36,3 ; 56,9	46,0*	29,4 ; 62,0	48,0	32,5 ; 62,6
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	84,6	77,7 ; 91,1	85,0	74,7 ; 93,8	84,1	73,6 ; 93,6
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	67,8	61,2 ; 74,2	68,4	58,6 ; 77,4	67,1	58,3 ; 76,3
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	93,8	92,0 ; 95,4	93,2	90,5 ; 95,6	94,5	92,0 ; 96,7
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	82,9	80,6 ; 85,0	87,7	84,7 ; 90,4	78,2	74,7 ; 81,2
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	59,4	55,7 ; 62,9	67,0	61,3 ; 72,1	52,8	47,5 ; 57,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	82,0	79,2 ; 84,9	87,7	84,1 ; 91,0	75,4	70,8 ; 79,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	86,6	84,1 ; 89,0	88,0	84,1 ; 91,4	85,3	81,5 ; 88,7
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	86,2	82,6 ; 89,3	87,2	81,7 ; 91,9	85,3	80,4 ; 89,6
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	90,7	89,0 ; 92,1	88,7	86,3 ; 90,9	92,8	90,9 ; 94,5
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	8,3	6,9 ; 9,7	9,8	7,8 ; 12,1	6,6	4,9 ; 8,4
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,1**	0,6 ; 1,7	1,5**	0,7 ; 2,5	0,6**	0,1 ; 1,3
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	47,1	45,9 ; 48,3	1,4**	0,6 ; 2,4	97,8	96,6 ; 99,0
Femmes	51,5	97,5	0,8	52,1	50,9 ; 53,3	98,0	96,8 ; 98,9	1,1**	0,4 ; 2,0
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,8**	0,3 ; 1,4	0,6**	0,1 ; 1,4	1,0**	0,2 ; 2,0

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	90,7	89,0 ; 92,1	8,3	6,9 ; 9,7	1,1**	0,6 ; 1,7
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,028					
Hommes	86,4	10,7	2,9	88,7	86,3 ; 90,9	9,8	7,8 ; 12,1	1,5**	0,7 ; 2,5
Femmes	91,6	7,4	0,9*	92,8	90,9 ; 94,5	6,6	4,9 ; 8,4	0,6**	0,1 ; 1,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,021					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	78,8	64,6 ; 91,6	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	75,1	66,8 ; 83,4	18,4*	11,4 ; 25,9	6,5**	1,9 ; 12,0
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	76,3	69,3 ; 83,5	18,5*	12,4 ; 25,1	5,2**	1,8 ; 9,3
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	89,4	86,7 ; 91,9	9,8	7,4 ; 12,6	0,8**	0,2 ; 1,4
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	94,8	93,2 ; 96,2	4,9	3,6 ; 6,5	0,3**	0,0 ; 0,7
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	97,3	95,2 ; 99,0	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,204					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	45,6**	11,7 ; 82,4	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	89,9	87,6 ; 92,0	8,6	6,8 ; 10,8	1,4**	0,6 ; 2,4
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,518					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	93,8	92,0 ; 95,3	5,8	4,3 ; 7,5	0,4**	0,0 ; 1,0
Femmes	92,1	x	x	94,3	71,7 ; 100,0	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	48,9	45,7 ; 52,2	67,3	63,0 ; 71,2
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000		...	...
15-24 ans	87,9	...	94,6	89,1 ; 99,0	...	;
25-44 ans	62,4	...	66,1	59,9 ; 72,2	...	;
45-64 ans	29,9	...	30,3	25,7 ; 35,2	...	;
65 ans et plus	7,3	...	9,8**	4,8 ; 15,7	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...		P = 0,000	
15-24 ans	...	90,0	...	;	86,7	78,0 ; 93,5
25-34 ans	...	71,0	...	;	72,2	64,1 ; 79,7
35-49 ans	...	53,5	...	;	55,4	49,3 ; 61,5
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,001		P = 0,132	
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	37,3	29,9 ; 44,7	76,6	66,3 ; 85,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	50,9	44,9 ; 57,0	60,9	51,4 ; 69,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	57,8	51,4 ; 63,9	66,2	59,0 ; 73,4
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	44,0	34,2 ; 54,1	71,7	62,1 ; 80,4
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,781	
Un partenaire	43,8	64,2	44,7	41,2 ; 48,1	66,7	62,2 ; 70,8
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	82,9	74,9 ; 90,0	73,4	57,9 ; 87,7
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	94,7	82,5 ; 100,0	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = 0,023		P = 0,449	
Hommes	x	66,6	x	;	67,6	63,2 ; 71,6
Femmes	47,8	x	48,6	45,5 ; 51,9	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	89,3*	42,3 ; 100,0	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	12,2	10,6 ; 14,0	10,6	9,1 ; 12,2	77,2	75,2 ; 79,2
Sexe	P = 0,093			P = 0,343					
Hommes	14,8	14,9	70,3	13,0	10,8 ; 15,6	11,2	9,2 ; 13,5	75,7	72,9 ; 78,6
Femmes	13,2	14,7	72,1	11,3	9,1 ; 13,7	9,9	7,8 ; 12,1	78,8	75,9 ; 81,5
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	52,8	36,7 ; 68,5	31,9*	17,6 ; 46,8	15,3**	4,9 ; 27,5
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	40,8	31,2 ; 50,4	23,7*	15,8 ; 32,5	35,5	26,6 ; 44,6
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	44,5	36,3 ; 52,4	26,2	19,3 ; 33,6	29,2	22,6 ; 37,0
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	10,6	8,0 ; 13,4	14,9	11,9 ; 18,0	74,5	70,7 ; 78,2
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	5,5	4,1 ; 7,2	3,9*	2,8 ; 5,2	90,5	88,5 ; 92,3
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	2,2**	0,2 ; 5,0	0,9**	0,1 ; 2,1	96,9	94,0 ; 99,0
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,126					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	13,9	9,8 ; 18,1	8,0*	5,3 ; 10,9	78,0	73,7 ; 82,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	13,0	9,6 ; 16,5	9,9	7,3 ; 12,9	77,1	73,0 ; 81,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	11,3	8,4 ; 14,5	13,9	10,6 ; 17,1	74,9	70,8 ; 78,9
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	10,2*	6,6 ; 14,6	8,8*	5,5 ; 12,6	81,0	75,4 ; 85,6
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	9,3	7,6 ; 11,0	7,8	6,4 ; 9,3	82,9	80,9 ; 84,9
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	38,8	29,8 ; 47,8	38,1	29,7 ; 47,0	23,1*	15,9 ; 30,7
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	52,2**	23,4 ; 77,7	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	15,4	13,7 ; 17,2	16,6	14,1 ; 19,3	14,0	11,7 ; 16,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	62,4	46,8 ; 77,4	67,7	43,8 ; 89,3	57,5*	35,7 ; 76,8
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	45,9	36,0 ; 54,7	55,7	41,1 ; 69,2	34,2*	21,8 ; 47,3
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	51,0	43,1 ; 58,8	59,1	47,2 ; 70,3	42,0	30,7 ; 52,5
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	15,7	12,7 ; 18,9	15,8	11,7 ; 20,4	15,5	11,1 ; 20,1
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	6,6	5,0 ; 8,3	7,2*	5,0 ; 9,6	6,0*	3,8 ; 8,6
	3,1*	3,9*	1,8**	2,3**	0,4 ; 5,2	3,0**	0,2 ; 7,5	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,675		P = 0,578		P = 0,954	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	15,5	11,5 ; 19,6	17,0*	11,1 ; 23,2	13,9*	8,7 ; 19,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	15,2	12,0 ; 19,2	15,4*	10,7 ; 20,6	15,0*	10,0 ; 20,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	16,6	13,1 ; 20,3	19,2	13,8 ; 24,5	14,0*	9,5 ; 19,2
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	12,9*	9,0 ; 17,6	13,2*	7,3 ; 20,1	12,6*	7,0 ; 18,8
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	11,4	9,7 ; 13,2	11,6	9,3 ; 14,3	11,2	9,0 ; 13,8
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	52,3	43,4 ; 61,1	53,7	41,7 ; 65,3	50,0	35,9 ; 65,2
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	57,2*	30,8 ; 84,6	62,8*	29,3 ; 91,3	42,4**	1,3 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,173		P = 0,009		P = 0,592	
Hommes	18,7	54,0	17,9	14,5	12,1 ; 17,1	57,3**	17,7 ; 88,7	13,8	11,5 ; 16,4
Femmes	19,2	19,2	x	15,7	13,3 ; 18,5	15,7	13,3 ; 18,5	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	41,4**	3,3 ; 78,2	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	6,5	5,5 ; 7,7	5,5	4,1 ; 7,1	7,5	6,0 ; 9,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,005		P = 0,000	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	6,7**	2,1 ; 12,0	x	;	11,4**	2,4 ; 22,1
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,003		P = 0,000	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	4,9**	1,7 ; 8,7	2,7**	0,2 ; 6,3	7,5**	1,5 ; 14,9
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	11,6	9,0 ; 14,4	9,2*	5,5 ; 13,2	14,2	10,3 ; 18,2
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	5,2	4,0 ; 6,7	5,3*	3,4 ; 7,5	5,1*	3,5 ; 7,1
	2,7	3,2*	2,2	1,4**	0,5 ; 2,5	x	;	2,0**	0,6 ; 3,9
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,495		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	3,0*	1,8 ; 4,3	3,7**	1,7 ; 5,9	2,4**	1,1 ; 4,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	5,8*	3,9 ; 7,9	5,8**	2,9 ; 9,2	5,8*	3,5 ; 8,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	8,7	6,3 ; 11,2	6,0**	3,1 ; 9,1	11,3*	7,6 ; 15,5
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	10,0*	7,0 ; 13,5	7,1**	3,1 ; 11,9	12,5*	8,3 ; 17,4
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,006		P = 0,010	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	6,1	4,9 ; 7,5	5,0*	3,4 ; 6,8	7,3	5,5 ; 9,3
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	15,3*	9,0 ; 21,9	12,2**	5,3 ; 20,2	20,5**	9,0 ; 32,0
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	19,7**	4,1 ; 43,1	19,8**	2,3 ; 47,4	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,088		P = 0,036		P = 0,521	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	8,4	6,6 ; 10,5	12,6**	0,0 ; 35,2	8,4	6,5 ; 10,4
Femmes	7,0	7,0	8,9**	5,6*	4,1 ; 7,5	5,6*	4,1 ; 7,5	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,021		P = 0,141		P = 0,006	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	26,0**	3,0 ; 58,1	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	6,5	5,5 ; 7,7	5,4	4,0 ; 7,1	7,6	6,0 ; 9,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	24,1*	16,7 ; 31,8	75,9	68,2 ; 83,3
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,461			
15-35 ans	25,6	74,4	25,4*	17,3 ; 33,7	74,6	66,3 ; 82,7
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,437			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	21,0**	5,2 ; 40,3	79,0	59,7 ; 94,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	17,4**	6,7 ; 32,0	82,6	68,0 ; 93,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	32,3*	18,2 ; 46,2	67,7	53,8 ; 81,8
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	18,0**	2,7 ; 37,2	82,0	62,8 ; 97,3
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = 1,000			
Né au Canada	24,8	75,2	24,3*	16,6 ; 32,0	75,7	68,0 ; 83,4
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	67,0	64,1 ; 69,9	19,0	16,7 ; 21,4	14,0	11,7 ; 16,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,170					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	61,1	48,8 ; 74,3	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	75,7	70,6 ; 80,4	12,4	8,8 ; 16,2	11,9*	8,1 ; 15,9
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	62,4	58,5 ; 66,1	25,8	22,4 ; 29,3	11,8	9,1 ; 14,6
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	53,3	47,0 ; 60,1	28,0	22,6 ; 34,0	18,7*	12,8 ; 24,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	66,3	60,6 ; 72,2	17,0	12,6 ; 21,7	16,7	12,0 ; 21,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	71,6	66,1 ; 76,6	17,8	13,5 ; 22,6	10,6*	6,8 ; 14,9
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	76,8	69,8 ; 83,4	13,2*	8,6 ; 18,2	10,0**	5,0 ; 16,0
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,659					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	67,2	64,3 ; 70,2	18,9	16,6 ; 21,4	13,9	11,5 ; 16,2
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	65,7*	40,8 ; 87,5	22,4**	4,7 ; 45,0	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 05

**ESTRIE**

---





## 1

## CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population		49,4	50,6			49,7	49,6 ; 49,7	50,3	50,3 ; 50,4
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000				P = 0,000			
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	16,0	16,0 ; 16,1	16,5	16,5 ; 16,6	15,5	15,5 ; 15,6
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	30,7	30,7 ; 30,8	32,0	31,9 ; 32,0	29,5	29,5 ; 29,6
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	36,2	36,2 ; 36,2	36,1	36,1 ; 36,2	36,2	36,2 ; 36,3
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	17,0	17,0 ; 17,1	15,4	15,3 ; 15,4	18,7	18,7 ; 18,7
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Personne seule	13,4	10,7	16,0	14,8	13,5 ; 16,1	11,3	9,7 ; 13,3	18,1	16,3 ; 20,2
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	33,2	31,2 ; 35,3	33,7	30,7 ; 36,7	32,8	30,0 ; 35,6
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	38,8	36,5 ; 41,1	44,0	40,4 ; 47,5	33,7	30,5 ; 36,6
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	7,7	6,4 ; 9,2	5,4*	3,7 ; 7,3	10,0	7,9 ; 12,3
Autre	6,7	6,5	6,9	5,5	4,2 ; 6,8	5,6*	3,7 ; 7,7	5,4	3,8 ; 7,1
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>		P = 0,256				P = 0,756			
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	95,2	94,0 ; 96,4	94,8	92,9 ; 96,6	95,7	94,1 ; 97,1
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,7**	0,3 ; 1,2	0,8**	0,1 ; 1,6	0,7**	0,2 ; 1,4
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	4,0	3,0 ; 5,2	4,4*	2,8 ; 6,2	3,6*	2,3 ; 5,0
<b>Langue parlée à la maison</b>		P = 0,912				P = 0,603			
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	92,6	91,4 ; 94,0	92,2	90,0 ; 94,2	93,1	91,4 ; 94,7
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	5,7	4,7 ; 6,9	5,8	4,2 ; 7,6	5,7	4,2 ; 7,2
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	1,6*	0,9 ; 2,4	1,9**	0,8 ; 3,4	1,3**	0,5 ; 2,2
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,683				P = 0,246			
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	28,1	25,9 ; 30,3	29,8	26,2 ; 33,2	26,5	23,8 ; 29,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	26,8	24,5 ; 29,0	25,3	21,9 ; 28,8	28,2	25,1 ; 31,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	26,4	24,3 ; 28,8	27,2	24,1 ; 30,7	25,7	22,9 ; 28,6
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	18,7	17,0 ; 20,4	17,7	15,2 ; 20,3	19,6	17,2 ; 22,3
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,002			
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	19,6	17,7 ; 21,5	16,0	13,3 ; 19,0	23,0	20,4 ; 25,7
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	21,7	19,4 ; 23,9	21,0	17,6 ; 24,3	22,4	19,5 ; 25,4
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	20,8	18,8 ; 22,9	21,1	18,1 ; 24,4	20,6	17,9 ; 23,4
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	17,9	15,8 ; 19,9	18,6	15,5 ; 21,8	17,2	14,5 ; 20,0
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	20,1	18,0 ; 22,1	23,3	20,2 ; 26,7	16,9	14,4 ; 19,5
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000				P = 0,828			
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	30,3	27,9 ; 32,7	30,2	26,6 ; 33,9	30,5	27,4 ; 33,7
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	56,3	53,9 ; 58,8	57,3	53,5 ; 61,0	55,4	52,1 ; 58,7
Pauvre	9,4	8,9	9,9	11,1	9,6 ; 12,8	10,4	8,1 ; 12,9	11,8	9,7 ; 14,2
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	2,2*	1,5 ; 3,1	2,1**	1,1 ; 3,3	2,3**	1,2 ; 3,7
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	59,5	57,6 ; 61,5	65,7	62,7 ; 68,7	53,5	50,8 ; 56,1
Étudiants	13,1	13,0	13,2	12,3	10,9 ; 13,8	11,0	8,7 ; 13,3	13,6	11,9 ; 15,4
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	7,4	6,2 ; 8,7	4,0*	2,6 ; 5,5	10,8	8,8 ; 12,8
Retraités	19,6	18,0	21,1	20,7	19,7 ; 21,7	19,3	17,8 ; 20,8	22,0	20,7 ; 23,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	54,0	51,6 ; 56,6	34,1	31,8 ; 36,4	11,8	10,4 ; 13,3
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,358					
Hommes	56,6	33,5	9,9	53,5	49,7 ; 57,3	35,5	31,8 ; 39,3	11,0	8,9 ; 13,1
Femmes	55,5	32,8	11,7	54,6	51,4 ; 57,8	32,7	29,7 ; 35,8	12,7	10,6 ; 14,8
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	62,3	54,5 ; 70,2	35,1	27,4 ; 42,7	2,5**	0,5 ; 4,9
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	64,5	60,1 ; 68,9	29,3	25,3 ; 33,5	6,2*	4,0 ; 8,6
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	49,4	45,5 ; 53,4	34,8	31,0 ; 38,4	15,9	13,1 ; 18,7
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	35,9	30,8 ; 41,0	40,9	35,5 ; 46,2	23,2	18,7 ; 28,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	45,9	41,1 ; 50,4	36,6	32,2 ; 41,1	17,5	14,3 ; 21,0
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	49,6	45,6 ; 53,7	35,4	31,4 ; 39,2	15,0	12,1 ; 17,8
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	62,2	57,8 ; 67,0	31,3	26,8 ; 35,4	6,5*	4,3 ; 8,9
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	49,3	39,9 ; 59,2	41,8	31,9 ; 51,2	8,9**	3,7 ; 14,8
Autre	46,0	39,4	14,6	53,8	39,9 ; 68,1	30,8*	18,1 ; 44,0	15,4**	6,0 ; 25,4
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	35,5	30,6 ; 40,4	39,2	34,3 ; 44,1	25,4	21,5 ; 29,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	54,9	49,7 ; 60,2	35,1	30,3 ; 40,1	10,0	7,2 ; 13,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	62,5	57,7 ; 67,2	32,4	27,7 ; 36,9	5,0*	3,0 ; 7,2
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	68,5	63,5 ; 73,4	27,5	22,6 ; 32,4	4,0*	2,2 ; 6,2
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	39,0	33,3 ; 44,8	35,4	30,1 ; 40,7	25,6	20,8 ; 30,5
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	58,5	55,6 ; 61,4	32,8	30,0 ; 35,6	8,7	7,2 ; 10,2
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	33,8	26,6 ; 40,8	38,1	31,2 ; 45,3	28,1	22,6 ; 34,2
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	57,4	54,8 ; 60,0	33,7	31,2 ; 36,1	9,0	7,5 ; 10,5
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	61,1	57,9 ; 64,3	31,7	28,8 ; 34,8	7,2	5,6 ; 8,9
Étudiants	62,7	32,2	5,0	60,1	51,2 ; 69,1	x	;	x	;
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	36,0	27,6 ; 44,7	28,3	20,1 ; 36,7	35,8	27,7 ; 44,6
Retraités	40,2	39,5	20,4	37,1	32,6 ; 41,8	40,6	36,1 ; 45,3	22,2	18,1 ; 26,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	54,0	51,6 ; 56,6	34,1	31,8 ; 36,4	11,8	10,4 ; 13,3
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	48,3	43,0 ; 53,9	32,8	27,7 ; 37,9	18,9	15,0 ; 23,1
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	55,9	53,2 ; 58,7	34,5	31,8 ; 37,2	9,6	8,1 ; 11,2
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	42,6*	27,5 ; 59,3	42,3*	25,7 ; 57,8	15,2**	5,4 ; 27,2
Poids normal	62,6	29,4	8,0	62,4	58,8 ; 66,1	29,1	25,7 ; 32,6	8,5	6,6 ; 10,4
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	46,7	43,2 ; 50,3	38,0	34,5 ; 41,3	15,3	13,0 ; 17,7
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	63,9	60,3 ; 67,7	28,6	25,0 ; 32,1	7,5	5,7 ; 9,3
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	49,0	45,5 ; 52,7	38,5	35,0 ; 42,1	12,4	10,3 ; 14,7
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	27,1	18,5 ; 36,1	40,0	30,5 ; 50,1	32,9	23,7 ; 42,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	34,7	29,8 ; 39,9	38,3	33,2 ; 43,5	27,0	22,4 ; 31,6
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	59,8	57,1 ; 62,6	33,1	30,4 ; 35,7	7,1	5,8 ; 8,4

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	47,0	44,4 ; 49,4	46,3	43,8 ; 48,8	6,7	5,6 ; 8,1
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,577		
Hommes	47,5	46,6	6,0	47,8	43,8 ; 51,5	46,1	42,4 ; 50,1	6,1	4,5 ; 8,1
Femmes	47,1	45,9	7,0	46,2	42,8 ; 49,5	46,5	43,2 ; 50,0	7,3	5,6 ; 9,2
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,070		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	53,4	45,1 ; 61,4	43,2	35,3 ; 51,1	3,4**	0,8 ; 6,5
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	44,6	39,9 ; 49,0	47,9	43,5 ; 52,5	7,5*	5,2 ; 10,1
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	44,1	40,3 ; 48,1	47,6	43,7 ; 51,8	8,3	6,1 ; 10,6
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	51,5	46,2 ; 57,0	43,3	37,9 ; 48,7	5,2*	3,0 ; 7,6
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,006		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	38,3	33,9 ; 42,9	51,0	46,4 ; 55,6	10,7	7,9 ; 13,5
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	50,5	46,1 ; 54,4	45,0	41,1 ; 49,4	4,6*	2,8 ; 6,5
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	48,3	43,7 ; 52,9	46,1	41,5 ; 50,7	5,6*	3,5 ; 7,8
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	38,1	27,9 ; 47,9	50,9	41,5 ; 61,6	11,0**	5,1 ; 17,8
Autre	44,5	46,1	9,4*	46,4	32,6 ; 60,3	41,8*	28,1 ; 55,4	11,7**	3,2 ; 21,5
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,470		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	50,1	45,1 ; 54,9	42,1	37,4 ; 47,1	7,9*	5,3 ; 10,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	46,3	41,1 ; 51,7	46,7	41,5 ; 52,1	7,0*	4,7 ; 9,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	46,4	41,3 ; 51,2	47,9	43,0 ; 53,1	5,7*	3,6 ; 8,2
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	43,9	38,7 ; 49,2	49,9	44,6 ; 55,1	6,2*	3,7 ; 8,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	41,3	35,9 ; 47,0	45,1	39,3 ; 50,7	13,6	9,7 ; 17,8
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	47,6	44,8 ; 50,6	47,0	44,0 ; 50,0	5,4	4,0 ; 6,8
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	32,2	25,4 ; 39,0	47,9	40,8 ; 55,1	19,8	14,4 ; 25,7
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	49,1	46,3 ; 51,8	46,1	43,3 ; 48,8	4,8	3,7 ; 6
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	45,8	42,3 ; 49,1	48,2	44,7 ; 51,6	6,0	4,6 ; 7,7
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	56,3	47,2 ; 65,2	40,2	31,2 ; 49,1	3,6**	0,6 ; 7,5
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	34,9	26,1 ; 43,8	43,1	34,3 ; 52,8	21,9*	13,8 ; 30,3
Retraités	51,9	42,8	5,3	49,1	44,3 ; 54,0	45,4	40,9 ; 50,0	5,4*	3,2 ; 8,0
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	55,1	51,5 ; 58,6	41,6	37,9 ; 45,3	3,3*	2,2 ; 4,6
Bon	40,5	52,6	6,9	39,5	35,2 ; 43,6	52,6	48,3 ; 56,9	7,9*	5,6 ; 10,6
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	30,6	24,6 ; 36,9	50,2	43,4 ; 57,7	19,2*	13,7 ; 25,4
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	24,1	19,5 ; 29	56,2	50,5 ; 61,6	19,6	15,2 ; 24,2
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	52,9	50,0 ; 55,8	44,0	41,1 ; 46,8	3,1	2,2 ; 4,2
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	21,3	49,3	29,4	10,1**	1,5 ; 20,2	58,9	42,2 ; 75,1	31*	16,1 ; 46,2
Non	48,1	46,1	5,8	48,1	45,5 ; 50,6	45,9	43,2 ; 48,5	6,0	4,9 ; 7,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	21,4	19,5 ; 23,5	78,6	76,5 ; 80,5
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Hommes	18,2	81,8	17,2	14,4 ; 20,1	82,8	79,9 ; 85,6
Femmes	26,0	74,0	25,5	22,8 ; 28,5	74,5	71,5 ; 77,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,036			
15-24 ans	24,4	75,6	14,6*	9,5 ; 20,1	85,4	79,9 ; 90,5
25-44 ans	24,3	75,7	24,1	20,2 ; 27,8	75,9	72,2 ; 79,8
45-64 ans	20,6	79,4	21,8	18,5 ; 24,9	78,2	75,1 ; 81,5
65 ans et plus	18,8	81,2	22,6	18,1 ; 27,6	77,4	72,4 ; 81,9
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,002			
Personne seule	25,7	74,3	24,8	21,0 ; 28,9	75,2	71,1 ; 79,0
Couple sans enfant	17,7	82,3	20,3	17,1 ; 23,7	79,7	76,3 ; 82,9
Couple avec enfants	20,8	79,2	17,2	13,9 ; 20,6	82,8	79,4 ; 86,1
Famille monoparentale	32,2	67,8	30,4	21,7 ; 39,6	69,6	60,4 ; 78,3
Autre	29,7	70,3	32,1*	18,6 ; 46,0	67,9	54,0 ; 81,4
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	30,0	25,5 ; 34,7	70,0	65,3 ; 74,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	20,9	16,9 ; 25,1	79,1	74,9 ; 83,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	18,1	14,6 ; 21,8	81,9	78,2 ; 85,4
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	15,3	11,7 ; 19,4	84,7	80,6 ; 88,3
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	32,4	27,5 ; 38,0	67,6	62,0 ; 72,5
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	18,8	16,6 ; 21,2	81,2	78,8 ; 83,4
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	43,5	36,5 ; 50,8	56,5	49,2 ; 63,5
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	18,0	16,0 ; 20,1	82,0	79,9 ; 84,0
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Travailleurs	20,9	79,1	19,6	17,1 ; 22,2	80,4	77,8 ; 82,9
Étudiants	24,8	75,2	15,3*	9,2 ; 22,2	84,7	77,8 ; 90,8
Personnes sans emploi	37,9	62,1	42,7	33,6 ; 51,9	57,3	48,1 ; 66,4
Retraités	18,2	81,8	22,8	18,7 ; 27,0	77,2	73,0 ; 81,3
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	13,7	11,4 ; 16,2	86,3	83,8 ; 88,6
Bon	26,6	73,4	24,0	20,5 ; 27,7	76,0	72,3 ; 79,5
Passable ou mauvais	48,8	51,2	51,0	44,2 ; 57,8	49,0	42,2 ; 55,8
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	11,0	8,6 ; 13,5	89,0	86,5 ; 91,4
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	25,8	22,8 ; 28,9	74,2	71,1 ; 77,2
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	63,1	52,6 ; 72,6	36,9	27,4 ; 47,4
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	69,7	53,6 ; 86,3	30,3**	13,7 ; 46,4
Non	20,6	79,4	19,9	17,9 ; 22,0	80,1	78,0 ; 82,1
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,004			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	21,0	19,0 ; 23,1	79,0	76,9 ; 81,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,2*	1,5 ; 3,0	2,1*	1,1 ; 3,2	2,3*	1,5 ; 3,3
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,045		P = 0,848		P = 0,058	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	3,3*	1,8 ; 4,9	2,5**	0,6 ; 4,8	4,1**	1,8 ; 6,7
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,5*	1,4 ; 3,8	2,1**	0,7 ; 4,0	2,9**	1,4 ; 4,6
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,026		P = 0,090	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	3,3*	1,8 ; 5,1	2,7**	0,6 ; 5,5	3,7**	1,6 ; 6,2
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	2,2**	1,0 ; 3,5	1,9**	0,4 ; 3,7	2,5**	0,8 ; 4,7
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,0**	0,2 ; 1,9	x	;	x	;
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	7,5**	2,6 ; 13,8	x	;	5,9**	1,0 ; 12,3
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,624		P = 0,576		P = 0,045	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	2,0**	0,9 ; 3,3	1,9**	0,3 ; 3,8	2,1**	0,6 ; 3,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	1,8**	0,5 ; 3,4	3,3**	0,6 ; 6,6	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	3,0*	1,5 ; 4,6	x	;	4,6**	2,0 ; 7,5
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	1,9**	0,5 ; 3,4	x	;	2,3**	0,4 ; 4,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,007		P = 0,021		P = 0,230	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	4,4**	2,1 ; 7,2	5,7**	1,2 ; 11,4	3,6**	1,3 ; 6,4
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	1,8*	1,2 ; 2,6	1,5**	0,7 ; 2,5	2,1*	1,1 ; 3,3
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,022		P = 0,013	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	5,8**	2,7 ; 9,5	6,0**	1,0 ; 12,5	5,6**	1,8 ; 10,2
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,6*	1,0 ; 2,3	1,5**	0,6 ; 2,5	1,8*	0,9 ; 2,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,001		P = 0,409		P = 0,000	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,3*	1,4 ; 3,3	2,1**	0,9 ; 3,5	2,5*	1,3 ; 4,0
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	7,3**	2,7 ; 12,5	x	;	7,9**	2,4 ; 14,6
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,0**	0,2 ; 2,0	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,021		P = 0,111	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,2**	0,6 ; 2,0	1,0**	0,1 ; 2,2	1,4**	0,5 ; 2,6
Bon	2,5	2,7	2,4	2,5**	1,3 ; 4,0	2,1**	0,4 ; 4,3	3,0**	1,2 ; 5,2
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	5,9**	2,9 ; 9,7	7,2**	2,2 ; 13,6	4,7**	1,3 ; 8,8
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,002	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	0,5**	0,0 ; 0,9	x	;	0,7**	0,0 ; 1,6
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,7*	1,6 ; 4,1	2,6**	0,9 ; 4,6	2,9**	1,3 ; 4,6
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	10,1**	4,9 ; 16,4	11,4**	2,9 ; 21,9	9,0**	2,4 ; 17,0
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,001	
Élevé	7,7	9,0	6,8	7,2*	4,8 ; 10,0	7,9**	3,5 ; 13,1	6,7*	3,9 ; 9,9
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,8**	0,3 ; 1,4	0,9**	0,1 ; 1,8	0,8**	0,1 ; 1,7

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,7**	0,3 ; 1,3	x	;	1,1**	0,3 ; 2,0
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,619		P = 0,000		P = 0,296	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	1,2**	0,2 ; 2,5	x	;	2,6**	0,4 ; 5,1
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	x	;	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,300		P = 0,388		P = 0,235	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,016		P = 0,003		P = 0,392	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	2,0**	0,5 ; 3,9	x	;	2,7**	0,4 ; 5,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,334		P = 0,724		P = 0,339	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	1,4**	0,1 ; 2,9	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,055		P = .		P = 0,328	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	2,6**	0,1 ; 5,6	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,5**	0,1 ; 0,9	x	;	0,9**	0,1 ; 1,9
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,013		P = .		P = 0,015	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	3,9**	0,9 ; 7,6	x	;	7,2**	1,7 ; 13,7
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,077		P = 0,916		P = 0,029	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	0,9**	0,1 ; 1,9	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,596		P = 0,001	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	2,3**	0,7 ; 4,4	x	;	3,7**	0,9 ; 7,0
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,681				
Oui	10,2	10,0	10,3	12,0	10,5 ; 13,7	11,7	9,3 ; 14,3	12,3	10,4 ; 14,7	
Non	89,8	90,0	89,7	88,0	86,3 ; 89,5	88,3	85,7 ; 90,7	87,7	85,3 ; 89,6	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,041				
Oui	4,4	3,5	5,3	4,8	3,7 ; 6,0	3,6*	2,3 ; 5,1	5,9*	4,1 ; 7,8	
Non	95,6	96,5	94,7	95,2	94,0 ; 96,3	96,4	94,9 ; 97,7	94,1	92,2 ; 95,9	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	11,6	10,0 ; 13,3	14,4	11,9 ; 17,4	8,7	6,9 ; 10,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,382		P = 0,863		P = 0,513	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	13,0*	8,1 ; 18,7	15,7**	7,8 ; 25,2	10,1**	4,7 ; 16,3
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	12,2	9,4 ; 15,2	15,0*	10,5 ; 20,0	9,2*	5,8 ; 12,7
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	11,9	9,2 ; 14,8	14,5*	10,2 ; 19,1	9,3*	6,0 ; 12,8
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	8,5*	5,7 ; 11,5	11,8*	6,6 ; 17,5	5,8*	3,0 ; 9,1
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,385		P = 0,402		P = 0,875	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	10,5	7,7 ; 13,4	12,3*	7,5 ; 17,9	9,4*	6,2 ; 12,8
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	10,4	8,0 ; 13,0	12,3*	8,7 ; 16,4	8,4*	5,3 ; 11,9
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	13,6	10,4 ; 16,9	17,4	12,8 ; 22,8	8,6*	4,9 ; 12,5
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	13,2**	6,7 ; 20,2	15,1**	2,5 ; 29,3	12,2**	4,7 ; 21,1
Autre	14,9	16,7	13,2*	9,0**	2,9 ; 16,3	x	;	9,1**	0,8 ; 19,0
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,608		P = 0,843		P = 0,620	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	11,5	8,7 ; 14,8	13,8*	9,2 ; 19,0	9,0*	5,5 ; 13,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	13,1	9,5 ; 16,8	16,1*	10,1 ; 22,8	10,5*	6,5 ; 14,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	10,2	7,3 ; 13,3	13,2*	8,6 ; 18,5	7,0*	3,8 ; 10,5
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	11,5*	8,2 ; 15,3	15,3*	9,4 ; 21,6	8,2*	4,3 ; 12,4
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,341		P = 0,571		P = 0,795	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	9,8*	6,6 ; 13,3	12,5*	6,5 ; 19,4	8,0*	4,7 ; 11,5
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	11,7	9,9 ; 13,6	14,7	11,9 ; 18,0	8,5	6,4 ; 10,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,451		P = 0,629		P = 0,750	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	12,0	9,9 ; 14,2	14,6	11,4 ; 18,1	8,9*	6,2 ; 11,8
Étudiants	17,1	21,4	12,9	12,9*	7,3 ; 19,6	16,9**	6,1 ; 30,1	9,7**	3,8 ; 16,6
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	13,3*	7,2 ; 19,9	19,8**	5,9 ; 37,0	11,0**	4,4 ; 17,9
Retraités	7,5	7,0	7,9	9,1	6,6 ; 11,8	11,3*	7,0 ; 16,2	7,1*	4,2 ; 10,4

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	74,7	67,7 ; 81,0	69,5	59,9 ; 78,3	83,2	73,9 ; 91,6
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	25,3	19,0 ; 32,3	30,5*	21,7 ; 40,1	16,8**	8,4 ; 26,1
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	21,0*	14,5 ; 27,7	22,6*	13,9 ; 31,8	18,5*	9,2 ; 28,3
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	9,8*	5,3 ; 14,5	9,9**	4,1 ; 17,0	9,6**	3,3 ; 17,1
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	21,8	15,6 ; 28,5	27,5*	18,3 ; 37,1	12,5**	5,9 ; 20,4
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	7,6*	3,9 ; 11,6	x	;	x	;
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	25,6	19,3 ; 31,9	26,4*	18,2 ; 34,8	24,3*	14,8 ; 35,3
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	2,7**	0,4 ; 5,4	x	;	x	;
Autre	12,1	8,1	17,6	11,6*	7,3 ; 16,7	7,9**	2,8 ; 14,0	17,6*	9,8 ; 26,2
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	23,2	17,4 ; 29,9	24,8*	16,9 ; 33,4	20,6*	11,5 ; 30,0
Printemps	21,2	20,7	21,9	22,7	16,3 ; 28,9	18,0*	10,8 ; 25,6	30,6*	19,7 ; 41,9
Été	29,1	30,3	27,4	27,6	20,7 ; 34,6	31,8*	22,2 ; 41,3	20,6*	11,7 ; 30,5
Automne	23,7	24,0	23,3	26,4	20,2 ; 33,4	25,3*	16,6 ; 35,0	28,2*	19,0 ; 38,6
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	45,8	38,3 ; 53,5	44,2	34,0 ; 54,3	48,4	37,0 ; 60,1
Endroit public	28,1	24,8	32,5	27,3	20,3 ; 34,4	22,4*	13,6 ; 31,4	34,7*	24,3 ; 46,0
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	18,0*	11,9 ; 24,7	19,6*	11,1 ; 29,5	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	8,9*	4,6 ; 13,4	13,8*	6,9 ; 21,0	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	9,7*	5,0 ; 15,0	9,5**	3,1 ; 16,6	9,9**	3,5 ; 17,8
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	5,2**	1,9 ; 9,3	7,0**	1,9 ; 13,2	x	;
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	4,2**	1,7 ; 7,2	3,6**	0,5 ; 7,1	5,3**	0,6 ; 11,3
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	5,7**	2,1 ; 9,7	5,1**	1,2 ; 10,0	x	;
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	3,3**	0,7 ; 6,3	x	;	x	;
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	21,0	15,3 ; 27,4	23,5*	15,4 ; 32,5	16,8*	9,6 ; 25,8
Chute	34,6	30,5	40,3	34,3	27,2 ; 41,3	32,2*	23,1 ; 41,8	37,7	26,9 ; 49,0
Autres	13,7	12,5	15,3	x	;	16,5*	9,3 ; 24,1	17,2**	8,8 ; 26,5
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	2,4**	0,5 ; 4,9	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	25,4	18,6 ; 32,0	26,0*	17,3 ; 34,9	24,6*	13,7 ; 35,3
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	38,8	31,3 ; 46,5	32,4*	22,8 ; 42,3	49,1	37,7 ; 60,9
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	2,8**	0,6 ; 5,6	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	18,2*	12,4 ; 24,2	22,2*	13,7 ; 30,8	11,6**	5,1 ; 19,5
Autre	11,9	10,9	13,2	12,4*	7,7 ; 17,5	15,5*	8,5 ; 23,3	7,2**	2,3 ; 12,9

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	4,8*	2,6 ; 7,3	6,3**	2,4 ; 10,9	3,7**	1,5 ; 6,2
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,544		P = 0,448		P = 0,076	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	4,9**	2,0 ; 8,4	7,8**	2,2 ; 14,7	x	;
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	3,7**	0,6 ; 7,3	x	;	x	;
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,930		P = 0,787		P = 0,404	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	5,1**	2,2 ; 8,5	x	;	4,9**	1,6 ; 8,9
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	4,9**	1,9 ; 8,6	6,5**	1,8 ; 12,4	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,484		P = 0,244		P = 0,678	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	4,4**	2,1 ; 7,0	5,8**	1,7 ; 10,5	3,3**	0,9 ; 6,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,080		P = 0,097		P = 0,666	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	9,1**	2,0 ; 16,9	14,3**	1,3 ; 28,6	x	;
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	3,3**	1,4 ; 5,5	3,7**	0,4 ; 7,8	3,1**	0,9 ; 5,7
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,052		P = 0,371		P = 0,040	
Oui	5,9	3,6*	7,3	8,2**	3,2 ; 14,1	x	;	7,4**	1,9 ; 14,0
Non	2,7*	2,2**	3,1*	3,0**	1,0 ; 5,4	4,4**	0,6 ; 9,1	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,068		P = 0,063		P = 0,441	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	9,6**	2,6 ; 17,8	x	;	x	;
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	3,5**	1,4 ; 6,1	4,2**	0,6 ; 8,8	2,9**	0,6 ; 6,1
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,003		P = .		P = 0,029	
Résidence	62,7	52,8	68,6	69,3	48,5 ; 88,6	65,8*	35,6 ; 93,6	75,2*	43,0 ; 100,0
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	22,7**	4,6 ; 46,2	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	x	;	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	x	;	x	;	x	;
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	50,8*	24,9 ; 75,1	62,9**	22,2 ; 94,7	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	57,6*	31,9 ; 83,7	61,1**	23,2 ; 99,9	52,4**	16,2 ; 95,5
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	11,8	10,2 ; 13,4	12,3	9,7 ; 15,1	11,3	9,3 ; 13,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,172		P = 0,001	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	13,0*	7,6 ; 19,0	16,3**	7,4 ; 26,7	9,5**	3,8 ; 16,1
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	11,7	8,8 ; 14,6	13,5*	8,9 ; 18,4	9,8*	6,3 ; 13,7
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	14,6	12,0 ; 17,4	12,2	8,6 ; 16,3	17,0	12,9 ; 20,9
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	4,6*	2,5 ; 6,7	5,3**	1,9 ; 9,3	3,9**	1,6 ; 6,7
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,819		P = 0,512		P = 0,910	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	9,7	7,0 ; 12,3	9,3*	5,2 ; 14,1	9,9*	6,7 ; 13,2
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	11,2	8,6 ; 14,1	9,7*	5,9 ; 13,9	12,8	9,2 ; 16,6
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	12,2	9,2 ; 15,4	13,3*	9,0 ; 18,3	10,7*	6,7 ; 14,9
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	13,3*	7,3 ; 20,1	17,8**	5,4 ; 32,6	10,9**	4,2 ; 19,3
Autre	11,4	12,8*	10,2*	11,4**	4,4 ; 19,6	11,2**	1,4 ; 23,9	11,6**	1,1 ; 24,2
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,393		P = 0,538		P = 0,471	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	10,0*	7,2 ; 13,3	9,3**	5,0 ; 14,5	10,7*	6,8 ; 14,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	11,5	8,2 ; 14,9	13,9*	8,6 ; 20,0	9,4*	5,6 ; 13,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	12,5	9,3 ; 16,0	13,1*	8,1 ; 18,6	11,8*	7,9 ; 16,2
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	14,2	10,4 ; 18,2	14,2*	8,1 ; 20,4	14,2*	9,3 ; 19,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,405		P = 0,975		P = 0,216	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	10,3*	6,7 ; 13,9	12,2**	5,5 ; 19,4	9,0*	5,3 ; 13,1
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	12,1	10,2 ; 14,1	12,1	9,2 ; 15,2	12,1	9,6 ; 14,7
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,119		P = 0,431		P = 0,149	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	15,4*	10,7 ; 20,7	15,7**	8,0 ; 24,7	15,2*	9,0 ; 22,1
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	11,6	9,8 ; 13,3	12,4	9,6 ; 15,4	10,8	8,6 ; 13,0
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,012		P = 0,332		P = 0,042	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	14,0	11,7 ; 16,3	13,8	10,5 ; 17,1	14,3	11,3 ; 17,4
Étudiants	9,9	9,7	10,1	12,0**	6,3 ; 18,2	14,5**	4,3 ; 26,8	10,1**	3,9 ; 17,6
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	10,0**	4,6 ; 16,0	x	;	9,3**	3,6 ; 15,6
Retraités	6,9	6,7	7,0	6,2*	4,1 ; 8,6	6,4**	3,0 ; 10,3	6,0*	3,2 ; 9,1

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,941				
Oui	45,2	47,6	42,8	45,3	37,3 ; 52,9	45,0	33,3 ; 56,6	45,6	34,6 ; 55,3	
Non	54,8	52,4	57,2	54,7	47,1 ; 62,7	55,0	43,4 ; 66,7	54,4	44,7 ; 65,4	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,027				
Oui	25,4	27,6	23,1	27,7	20,6 ; 35,3	35,2*	23,5 ; 47,2	19,3*	11,6 ; 28,3	
Non	74,6	72,4	76,9	72,3	64,7 ; 79,4	64,8	52,8 ; 76,5	80,7	71,7 ; 88,4	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,415				
Oui	17,6	15,6	19,6	15,1*	10,2 ; 20,8	13,0**	6,3 ; 21,2	17,4*	10,0 ; 25,9	
Non	82,4	84,4	80,4	84,9	79,2 ; 89,8	87,0	78,8 ; 93,7	82,6	74,1 ; 90,0	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,301				
Oui	8,1	7,2	9,0	7,5*	4,0 ; 11,5	5,5**	1,3 ; 10,8	9,7**	4,2 ; 16,4	
Non	91,9	92,8	91,0	92,5	88,5 ; 96,0	94,5	89,2 ; 98,7	90,3	83,6 ; 95,8	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 0,963				
Cou	3,1	1,8*	4,3	3,3**	0,9 ; 6,1	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	57,3	49,6 ; 64,9	58,4	47,2 ; 69,8	56,2	46,1 ; 66,2	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	17,0*	11,6 ; 23,5	14,0**	6,6 ; 23,5	20,3*	12,3 ; 29,1	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	5,5**	1,7 ; 9,9	x	;	5,7**	1,1 ; 11,5	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	13,4*	8,3 ; 18,8	16,3**	8,0 ; 25,2	10,3**	4,8 ; 17,0	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	3,4**	0,8 ; 6,5	x	;	x	;	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	32,5	30,2 ; 34,8	28,6	25,3 ; 32,2	36,3	33,2 ; 39,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,014		P = 0,066	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	26,0	19,2 ; 33,2	21,1*	11,0 ; 31,8	31,1	21,9 ; 41,1
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	27,8	23,8 ; 31,9	23,3	17,4 ; 29,3	32,7	27,0 ; 38,2
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	38,9	35,0 ; 42,8	35,8	30,3 ; 41,4	42,0	36,8 ; 47,1
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	33,5	28,7 ; 38,4	31,1	23,2 ; 38,7	35,4	28,8 ; 42,1
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,343		P = 0,787		P = 0,196	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	31,8	27,7 ; 36,1	24,7	18,4 ; 31,2	36,2	30,9 ; 41,6
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	33,1	29,3 ; 37,2	28,2	22,7 ; 33,7	38,0	32,5 ; 43,9
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	29,8	25,8 ; 33,9	29,1	23,5 ; 34,9	30,7	24,7 ; 36,5
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	33,5	24,8 ; 43,1	25,0**	12,7 ; 40,7	38,2*	26,5 ; 50,7
Autre	34,0	32,4	35,4	40,2*	27,5 ; 52,6	34,3**	15,4 ; 54,3	46,2*	28,9 ; 63,8
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,144		P = 0,060		P = 0,640	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	35,9	31,5 ; 40,5	33,1	26,6 ; 40,0	39,1	32,8 ; 45,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	33,2	28,5 ; 38,1	32,0	24,8 ; 39,6	34,3	28,0 ; 40,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	31,6	27,2 ; 36,3	25,6	19,4 ; 32,2	38,0	31,3 ; 44,4
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	27,9	23,0 ; 33,1	20,8*	14,6 ; 27,9	34,3	27,0 ; 41,5
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,000		P = 0,020		P = 0,011	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	42,2	37,0 ; 47,7	39,2	29,4 ; 49,1	44,2	37,9 ; 50,8
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	31,3	28,6 ; 34,0	28,0	24,3 ; 32,0	34,8	31,0 ; 38,2
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,001	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	49,2	42,1 ; 56,3	47,7	36,3 ; 59,1	50,4	41,3 ; 59,7
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	30,1	27,7 ; 32,5	26,2	22,7 ; 30,1	33,9	30,5 ; 37,3
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,007		P = 0,013		P = 0,297	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	32,3	29,3 ; 35,4	28,3	24,1 ; 32,6	37,2	32,7 ; 41,8
Étudiants	20,7	14,8	26,3	23,1*	16,2 ; 30,8	16,3**	5,9 ; 28,6	28,6*	19,0 ; 38,9
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	42,0	33,1 ; 50,9	52,5*	32,7 ; 70,6	38,1	28,4 ; 48,1
Retraités	34,2	30,5	37,2	35,6	31,2 ; 40,4	31,9	25,2 ; 38,7	38,8	32,7 ; 45,3
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	23,4	20,4 ; 26,4	18,3	14,1 ; 22,5	28,2	24,2 ; 32,4
Bon	33,9	28,1	39,6	35,7	31,7 ; 40,1	34,9	28,5 ; 41,4	36,6	31,2 ; 42,3
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	65,9	59,3 ; 72,2	61,3	50,8 ; 71,0	69,8	61,3 ; 78,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	57,3	51,9 ; 62,5	56,2	46,5 ; 65,4	58,0	51,4 ; 64,5
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	25,8	23,2 ; 28,4	23,0	19,5 ; 26,8	28,7	25,1 ; 32,2
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,007		P = 0,818		P = 0,000	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	26,4*	15,0 ; 40,9	x	;	27,1**	13,6 ; 43,8
Poids normal	28,3	22,9	32,1	29,3	25,8 ; 32,9	27,3	21,5 ; 32,9	30,8	26,6 ; 35,2
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	33,6	29,8 ; 37,7	29,5	24,5 ; 35,2	39,9	33,5 ; 46,1
Obésité	37,9	30,5	46,1	40,8	34,6 ; 46,6	31,5	23,5 ; 40,4	52,1	42,7 ; 61,0

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,001					
Oui	30,3	25,3	35,2	32,5	30,2 ; 34,8	28,6	25,3 ; 32,2	36,3	33,2 ; 39,3		
Non	69,7	74,7	64,8	67,5	65,2 ; 69,8	71,4	67,8 ; 74,7	63,7	60,7 ; 66,8		
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	9,5	6,4	12,5	11,0	9,5 ; 12,6	7,3	5,5 ; 9,3	14,6	12,2 ; 17,0		
Non	90,5	93,6	87,5	89,0	87,4 ; 90,5	92,7	90,7 ; 94,5	85,4	83,0 ; 87,8		
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,007					
Oui	14,5	12,2	16,7	17,3	15,4 ; 19,2	14,6	11,9 ; 17,5	20,0	17,2 ; 22,6		
Non	85,5	87,8	83,3	82,7	80,8 ; 84,6	85,4	82,5 ; 88,1	80,0	77,4 ; 82,8		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,107					
Oui	13,5	10,8	16,1	14,4	12,9 ; 16,0	13,0	10,6 ; 15,4	15,8	13,6 ; 18,1		
Non	86,5	89,2	83,9	85,6	84,0 ; 87,1	87,0	84,6 ; 89,4	84,2	81,9 ; 86,4		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,002					
Oui	14,5	11,8	17,2	16,5	14,6 ; 18,4	13,6	11,0 ; 16,3	19,4	16,8 ; 21,9		
Non	85,5	88,2	82,8	83,5	81,6 ; 85,4	86,4	83,7 ; 89,0	80,6	78,1 ; 83,2		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,007					
Oui	17,8	16,0	19,6	19,7	17,8 ; 21,7	16,9	14,2 ; 20,0	22,4	19,7 ; 25,1		
Non	82,2	84,0	80,4	80,3	78,3 ; 82,2	83,1	80,0 ; 85,8	77,6	74,9 ; 80,3		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,043					
Oui	14,2	10,6	17,8	15,3	13,6 ; 17,2	13,5	11,0 ; 16,3	17,2	14,8 ; 19,7		
Non	85,8	89,4	82,2	84,7	82,8 ; 86,4	86,5	83,7 ; 89,0	82,8	80,3 ; 85,2		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	54,8	52,3 ; 57,2	33,6	31,3 ; 35,9	11,6	10,0 ; 13,2
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Hommes	52,6	34,1	13,3	50,3	46,5 ; 54,1	35,7	32,1 ; 39,4	14,0	11,5 ; 16,8
Femmes	60,1	29,8	10,1	59,2	56,0 ; 62,5	31,6	28,5 ; 34,7	9,2	7,3 ; 11,0
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,043					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	61,1	53,0 ; 69,1	29,0	21,4 ; 36,8	9,9*	5,1 ; 15,2
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	58,7	54,2 ; 63,0	31,1	27,0 ; 35,3	10,2	7,5 ; 13,2
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	52,5	48,6 ; 56,6	35,1	31,3 ; 38,8	12,4	9,9 ; 15,2
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	46,3	40,9 ; 51,3	39,8	34,9 ; 44,9	14,0	10,4 ; 17,8
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,142					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	48,3	43,8 ; 53,0	37,6	33,3 ; 42,1	14,2	10,9 ; 17,7
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	53,3	49,0 ; 57,3	34,9	31,2 ; 38,8	11,8	9,1 ; 14,7
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	59,5	55,0 ; 64,0	31,4	27,3 ; 35,7	9,1	6,5 ; 11,9
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	59,9	49,4 ; 70,3	28,5*	19,5 ; 38,0	11,6**	5,6 ; 18,6
Autre	48,0	34,3	17,7	50,3	36,2 ; 64,7	33,7*	20,7 ; 47,6	15,9**	6,1 ; 26,8
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,878					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	55,1	52,6 ; 57,6	33,5	31,1 ; 36,0	11,3	9,7 ; 13,0
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	42,5**	11,2 ; 78,4	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	54,1	38,7 ; 68,3	31,3*	19,3 ; 44,4	14,6**	5,6 ; 25,6
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,534					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	55,9	53,4 ; 58,4	33,5	31,0 ; 35,9	10,6	9,0 ; 12,2
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	40,9	29,9 ; 52,1	33,2*	23,3 ; 44,2	25,9*	15,0 ; 37,1
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	51,7*	23,3 ; 77,7	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	40,6	35,7 ; 45,5	41,6	36,8 ; 46,3	17,9	14,3 ; 21,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	55,7	50,5 ; 60,9	34,4	29,5 ; 39,6	9,9	7,0 ; 13,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	58,3	53,6 ; 63,1	31,2	26,6 ; 35,7	10,5	7,4 ; 13,9
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	69,4	64,2 ; 74,6	24,8	20,1 ; 29,7	5,8*	3,1 ; 8,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	42,4	36,8 ; 47,9	39,1	33,8 ; 44,2	18,5	14,3 ; 23,0
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	58,2	55,4 ; 61,0	32,5	29,8 ; 35,3	9,3	7,5 ; 11,1
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	36,3	29,0 ; 43,4	42,7	35,7 ; 50,0	21,0	15,7 ; 26,7
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	58,1	55,5 ; 60,6	32,1	29,7 ; 34,7	9,8	8,2 ; 11,5
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	57,8	54,6 ; 61,0	31,2	28,2 ; 34,3	11,0	8,9 ; 13,2
Étudiants	62,8	27,9	9,3	62,9	53,8 ; 72,0	31,7	22,7 ; 40,6	5,4**	1,4 ; 10,2
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	39,7	31,0 ; 49,0	37,6	28,8 ; 46,6	22,7*	14,8 ; 30,8
Retraités	49,7	38,1	12,2	48,2	43,6 ; 52,9	40,0	35,7 ; 44,6	11,8	8,7 ; 14,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	54,8	52,3 ; 57,2	33,6	31,3 ; 35,9	11,6	10,0 ; 13,2
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	43,0	37,9 ; 48,5	36,8	31,8 ; 41,9	20,1	15,9 ; 24,4
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	58,4	55,6 ; 61,1	32,6	30,0 ; 35,2	9,0	7,4 ; 10,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	67,6	64,4 ; 70,8	26,2	23,1 ; 29,2	6,2	4,5 ; 8,1
Bon	41,4	42,6	16,0	44,6	40,2 ; 48,7	42,4	38,2 ; 46,8	13,0	10,2 ; 16,1
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	26,2	20,6 ; 32,7	42,5	35,7 ; 49,1	31,3	24,6 ; 37,6
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	41,7	36,4 ; 47,2	38,1	32,8 ; 43,4	20,2	15,8 ; 24,8
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	58,6	55,9 ; 61,3	32,3	29,6 ; 34,9	9,1	7,4 ; 10,9
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,017					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	50,6	44,0 ; 57,1	41,2	35,0 ; 47,7	8,2*	5,1 ; 11,7
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	55,5	52,7 ; 58,1	32,7	30,2 ; 35,3	11,8	10,1 ; 13,7
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	60,5	57,8 ; 63,2	31,1	28,6 ; 33,7	8,3	6,8 ; 10,0
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	36,0	30,7 ; 41,8	41,8	36,4 ; 47,2	22,2	17,7 ; 27,0
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,004					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	62,6	57,8 ; 67,3	28,6	24,0 ; 33,1	8,8*	6,1 ; 11,6
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	52,4	49,1 ; 55,6	34,5	31,4 ; 37,7	13,1	11,0 ; 15,5

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	10,8	9,6 ; 12,1	7,9	6,4 ; 9,4	13,7	11,9 ; 15,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	1,0**	0,1 ; 2,1	x	;	x	;
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	12,7	10,4 ; 15,1	10,2*	7,4 ; 13,7	15,1	11,7 ; 18,9
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	36,5	31,7 ; 41,4	29,0	22,1 ; 36,5	42,1	35,5 ; 48,7
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,014		P = 0,340		P = 0,060	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	31,0	25,2 ; 37,5	25,5*	17,3 ; 34,8	35,6	27,1 ; 44,6
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	42,9	33,9 ; 52,3	36,4*	22,8 ; 50,0	47,8	35,2 ; 60,6
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	50,7*	34,4 ; 68,4	x	;	58,6*	38,8 ; 76,9
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	25,0	21,5 ; 28,6	15,6	11,5 ; 20,1	35,0	29,8 ; 40,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	8,7	6,4 ; 11,3	7,4*	4,3 ; 11,1	9,8*	6,4 ; 13,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	4,4*	2,8 ; 6,3	3,9**	1,8 ; 6,5	4,9*	2,3 ; 7,8
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	2,5**	1,1 ; 4,2	2,4**	0,4 ; 4,9	2,5**	0,6 ; 4,8
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	21,5	17,6 ; 25,7	15,3*	9,7 ; 21,7	25,4	20,1 ; 31,0
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	8,2	6,9 ; 9,6	6,4	4,9 ; 8,1	10,1	8,1 ; 12,2
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,164		P = 0,005	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	16,1	11,7 ; 20,8	10,5**	5,3 ; 17,0	20,8*	14,3 ; 28,1
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	9,6	8,4 ; 10,8	7,0	5,5 ; 8,7	12,0	10,2 ; 14,0

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,8	74,7 ; 78,8	20,3	18,3 ; 22,3	2,9	2,1 ; 3,8
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	65,8	62,2 ; 69,3	29,0	25,5 ; 32,3	5,3*	3,8 ; 7,0
Femmes	87,9	11,3	0,7	87,5	85,2 ; 89,5	11,9	9,8 ; 14,2	0,6**	0,2 ; 1,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,129					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	80,0	73,6 ; 86,3	18,0*	11,8 ; 24,4	2,1**	0,2 ; 4,5
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	80,3	76,6 ; 84,0	17,4	13,8 ; 21,1	2,3**	1,0 ; 3,9
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	75,8	72,5 ; 79,0	21,4	18,3 ; 24,7	2,8*	1,5 ; 4,1
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	69,1	64,4 ; 73,7	25,6	21,3 ; 30,1	5,2*	2,9 ; 7,7
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,826					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	78,0	74,0 ; 81,9	19,2	15,4 ; 23,1	2,8**	1,4 ; 4,4
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	73,1	69,4 ; 76,4	23,7	20,5 ; 27,3	3,2*	1,9 ; 4,7
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	78,5	74,5 ; 82,3	18,6	14,9 ; 22,4	2,9**	1,5 ; 4,6
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	81,9	73,7 ; 90,4	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	73,3	59,6 ; 85,9	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,131					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	75,1	72,6 ; 77,5	22,2	19,8 ; 24,6	2,8*	1,9 ; 3,7
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	79,2	72,4 ; 85,6	17,3*	11,5 ; 23,8	3,4**	0,9 ; 6,7
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	83,7	77,0 ; 89,8	12,0*	6,7 ; 17,7	4,3**	1,3 ; 8,0
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	79,5	69,0 ; 89,4	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	67,3	62,5 ; 72,0	26,8	22,2 ; 31,3	5,9*	3,8 ; 8,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	78,5	74,2 ; 82,6	19,0	15,1 ; 23,3	2,5**	1,0 ; 4,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	78,9	74,9 ; 83,0	19,0	15,1 ; 23,1	2,1**	0,8 ; 3,6
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	85,4	81,0 ; 89,0	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,031					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	73,9	69,0 ; 78,4	21,2	16,8 ; 25,7	5,0*	2,7 ; 7,7
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	77,8	75,3 ; 80,2	20,0	17,6 ; 22,5	2,2*	1,4 ; 3,1
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,032					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	71,3	64,8 ; 77,1	23,1	17,7 ; 29,3	5,6**	2,6 ; 9,0
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	77,8	75,5 ; 80,0	19,7	17,6 ; 21,9	2,5*	1,7 ; 3,4
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,434					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	77,0	74,3 ; 79,8	20,1	17,5 ; 22,8	2,9*	1,8 ; 4,0
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	86,1	79,4 ; 92,3	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	76,6	68,8 ; 84,0	19,7*	12,5 ; 27,3	3,8**	0,9 ; 7,3
Retraités	72,9	23,2	3,8	71,0	66,6 ; 75,0	24,6	20,6 ; 28,7	4,4*	2,5 ; 6,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,8	74,7 ; 78,8	20,3	18,3 ; 22,3	2,9	2,1 ; 3,8
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,196					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	73,1	68,0 ; 77,8	23,3	18,7 ; 28,3	3,6**	1,7 ; 5,8
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	78,0	75,6 ; 80,3	19,3	17,1 ; 21,7	2,7*	1,8 ; 3,6
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	80,6	77,7 ; 83,4	17,4	14,6 ; 20,3	2,0*	1,1 ; 3,0
Bon	75,1	21,2	3,6	75,5	71,7 ; 79,0	21,8	18,3 ; 25,6	2,6**	1,3 ; 4,2
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	63,2	56,7 ; 69,7	29,0	23,0 ; 35,1	7,8*	4,4 ; 11,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,045					
Élevé	77,2	19,2	3,6	71,9	67,0 ; 76,8	24,6	19,9 ; 29,4	3,5**	1,7 ; 5,6
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	78,4	75,9 ; 80,6	19,0	16,7 ; 21,3	2,6*	1,8 ; 3,5
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,453					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	74,0	68,5 ; 79,3	22,1	17,0 ; 27,3	3,9**	1,8 ; 6,3
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	77,1	74,7 ; 79,3	20,1	18,0 ; 22,4	2,8*	1,9 ; 3,7
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,008					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	88,7	85,4 ; 91,8	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	72,2	69,2 ; 75,1	24,1	21,2 ; 26,9	3,8*	2,6 ; 5,2

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	76,8	74,7 ; 78,8	65,8	62,2 ; 69,3	87,5	85,2 ; 89,5
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	20,3	18,3 ; 22,3	29,0	25,5 ; 32,3	11,9	9,8 ; 14,2
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	2,9	2,1 ; 3,8	5,3*	3,8 ; 7,0	0,6**	0,2 ; 1,1
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,142					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	74,0	68,5 ; 79,3	60,8	50,2 ; 71,4	81,2	74,9 ; 86,9
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	22,1	17,0 ; 27,3	30,8*	21,0 ; 41,1	x	;
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	3,9**	1,8 ; 6,3	8,3**	3,1 ; 14,2	x	;
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	77,1	74,7 ; 79,3	66,1	62,3 ; 69,9	88,4	85,9 ; 90,7
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	20,1	18,0 ; 22,4	28,9	25,2 ; 32,5	11,1	8,8 ; 13,6
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	2,8*	1,9 ; 3,7	5,0*	3,4 ; 6,8	0,5**	0,1 ; 1,0

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	30,5	28,1 ; 33,0	15,9	13,9 ; 17,9	53,6	50,9 ; 56,3
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	21,7	18,4 ; 25,1	15,0	12,1 ; 17,9	63,3	59,4 ; 67,3
Femmes	41,7	18,2	40,1	39,6	36,1 ; 43,2	16,8	14,1 ; 19,6	43,6	40,0 ; 47,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	24,0	17,2 ; 30,7	16,4*	10,3 ; 23,0	59,6	51,5 ; 67,5
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	25,2	21,3 ; 29,3	19,7	16,1 ; 23,5	55,2	50,6 ; 59,7
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	37,1	32,8 ; 41,5	14,2	11,4 ; 17,2	48,7	44,4 ; 52,8
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	36,9	31,0 ; 43,1	8,7*	5,4 ; 12,3	54,4	48,2 ; 61,0
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,017					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	29,3	24,0 ; 34,6	11,1*	7,2 ; 15,6	59,6	53,7 ; 65,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	29,5	24,3 ; 34,5	18,2	14,0 ; 22,6	52,4	46,9 ; 57,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	27,3	23,1 ; 31,8	18,2	14,3 ; 22,4	54,5	49,7 ; 59,5
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	37,1	32,2 ; 42,8	15,4	11,9 ; 19,1	47,5	41,8 ; 52,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,208					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	33,8	27,7 ; 40,1	12,3*	8,5 ; 16,6	53,9	47,2 ; 60,3
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	30,3	27,5 ; 33,1	16,6	14,4 ; 19,0	53,1	50,0 ; 56,2
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,144					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	30,0	26,9 ; 33,1	16,4	14,2 ; 18,9	53,6	50,1 ; 57,0
Étudiants	28,8	16,3	54,9	25,6*	17,9 ; 33,7	20,1*	13,5 ; 27,7	54,3	45,3 ; 63,8
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	32,2	22,7 ; 41,9	14,4**	6,4 ; 23,7	53,4	42,9 ; 63,9
Retraités	38,0	12,4	49,6	36,5	31,3 ; 41,8	9,9*	6,7 ; 13,3	53,6	48,0 ; 59,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
2,6	1,8 ; 3,4	48,0	45,6 ; 50,4	34,4	32,2 ; 36,8	15,0	13,3 ; 16,8	Ensemble de la population	
P = 0,000									
1,3**	0,5 ; 2,2	40,7	37,1 ; 44,3	41,8	38,0 ; 45,3	16,3	13,7 ; 19,0	Sexe	
4,0*	2,7 ; 5,4	55,4	52,0 ; 58,6	27,0	24,1 ; 30,0	13,7	11,5 ; 16,0	Hommes	
P = 0,111									
x	;	67,4	53,2 ; 80,8	16,7**	6,4 ; 28,2	x	;	Femmes	
4,0**	0,3 ; 8,6	69,9	60,7 ; 78,6	17,9*	10,6 ; 26,1	8,2**	3,4 ; 14,1	Groupe d'âge	
P = 0,000									
5,6**	2,3 ; 9,4	69,1	61,8 ; 76,5	17,5*	11,9 ; 23,9	7,9**	3,7 ; 12,9	15-17 ans	
2,1**	0,9 ; 3,4	49,2	44,5 ; 53,8	33,5	29,4 ; 37,9	15,3	12,0 ; 18,7	18-24 ans	
1,5**	0,7 ; 2,4	39,8	35,9 ; 43,7	40,6	36,5 ; 44,4	18,2	15,3 ; 21,2	15-24 ans	
3,1**	1,2 ; 5,3	42,9	37,7 ; 47,7	39,5	34,6 ; 44,3	14,6	11,1 ; 18,4	25-44 ans	
P = 0,902									
x	;	69,5	46,9 ; 90,0	x	;	x	;	45-64 ans	
x	;	63,9	48,5 ; 79,2	26,4*	13,3 ; 41,3	x	;	65 ans et plus	
P = 0,293									
x	;	65,9	54,0 ; 77,7	22,6*	12,7 ; 33,5	x	;	Hommes	
x	;	40,5	33,9 ; 47,2	41,4	34,8 ; 48,5	x	;	15-17 ans	
1,2**	0,1 ; 2,5	32,8	27,3 ; 38,4	48,2	41,9 ; 54,0	17,9	13,7 ; 22,4	18-24 ans	
x	;	31,5	24,1 ; 38,9	49,0	40,8 ; 57,0	x	;	25-44 ans	
P = 0,317									
x	;	64,7	45,3 ; 82,6	17,7**	3,0 ; 34,3	x	;	45-64 ans	
x	;	75,8	64,8 ; 86,0	9,6**	2,8 ; 17,9	x	;	65 ans et plus	
P = 0,000									
8,8**	3,2 ; 15,5	72,4	63,2 ; 81,5	12,1**	5,8 ; 19,7	6,7**	2,3 ; 12,0	Femmes	
3,2**	1,3 ; 5,6	59,3	53,1 ; 65,4	24,2	19,0 ; 29,8	13,2*	8,9 ; 17,9	15-24 ans	
1,8**	0,6 ; 3,2	46,7	41,1 ; 52,5	33,0	27,7 ; 38,4	18,5	14,5 ; 22,7	25-44 ans	
5,2**	1,9 ; 9,1	51,7	44,6 ; 58,6	32,1	25,9 ; 38,4	11,0*	6,9 ; 15,7	45-64 ans	
P = 0,003									
3,4**	1,8 ; 5,3	41,8	36,8 ; 46,8	36,7	32,0 ; 41,4	18,1	14,5 ; 22,1	65 ans et plus	
4,4*	2,3 ; 6,7	52,2	47,1 ; 57,4	30,1	25,6 ; 34,7	13,3	10,3 ; 16,7	Niveau de scolarité	
0,7**	0,1 ; 1,5	47,5	42,4 ; 52,3	36,0	31,3 ; 40,9	15,8	12,2 ; 19,4	Niveau inférieur au DES	
1,4**	0,3 ; 2,8	50,9	45,2 ; 56,5	35,9	30,6 ; 41,3	11,8*	8,4 ; 15,5	Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 0,652									
2,6**	0,4 ; 5,3	41,6	34,1 ; 48,9	36,4	29,8 ; 43,4	19,4*	14,0 ; 25,6	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
1,9**	0,1 ; 4,3	42,7	34,7 ; 50,6	41,4	33,8 ; 48,8	14,1*	9,3 ; 19,6	Diplôme d'études universitaires	
x	;	40,7	33,4 ; 47,8	43,2	36,0 ; 50,6	x	;	Hommes	
x	;	36,3	27,8 ; 44,4	49,1	40,7 ; 57,5	x	;	Niveau inférieur au DES	
P = 0,000									
4,3**	1,9 ; 7,2	42,0	35,7 ; 48,7	37,1	30,5 ; 43,3	16,6	11,8 ; 21,5	Diplôme d'études secondaires (DES)	
6,7**	3,3 ; 10,9	60,9	54,1 ; 67,3	19,7	14,5 ; 25,3	12,6	8,7 ; 17,0	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
1,6**	0,3 ; 3,2	54,9	48,2 ; 61,4	28,1	22,1 ; 34,2	15,5*	10,5 ; 20,6	Diplôme d'études universitaires	
2,8**	0,7 ; 5,4	64,7	57,5 ; 71,4	23,4	17,4 ; 29,7	9,2*	5,2 ; 13,6	Indice du niveau de revenu du ménage	
P = 0,034									
4,8*	2,6 ; 7,4	46,3	40,7 ; 51,9	31,9	26,6 ; 36,9	17,1	13,2 ; 21,3	Quintile 1 (faible)	
2,1*	1,3 ; 3,0	48,3	45,3 ; 51,2	35,0	32,3 ; 37,8	14,6	12,6 ; 16,7	Quintile 2 et suivants	
P = 0,120									
4,6**	0,4 ; 9,7	37,7	27,8 ; 47,8	36,0	26,6 ; 45,4	21,6*	14,1 ; 29,8	Hommes	
x	;	41,2	37,1 ; 45,3	43,1	38,7 ; 47,2	x	;	Quintile 1 (faible)	
P = 0,673									
4,9**	2,5 ; 7,9	51,9	45,1 ; 58,5	29,1	22,9 ; 35,2	14,0*	10,0 ; 18,8	Quintile 2 et suivants	
3,8*	2,2 ; 5,6	56,0	52,1 ; 59,8	26,2	22,9 ; 29,7	14,0	11,4 ; 16,6	Femmes	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	39,9	37,5 ; 42,3	3,0	2,1 ; 3,9	57,1	54,7 ; 59,5
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,099					
Hommes	36,6	3,6	59,9	40,3	36,7 ; 43,7	4,0*	2,4 ; 5,7	55,8	52,2 ; 59,4
Femmes	40,5	2,3	57,1	39,6	36,7 ; 42,6	2,1*	1,1 ; 3,1	58,4	55,3 ; 61,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	15,1*	9,4 ; 21,0	5,3**	1,8 ; 9,4	79,6	72,9 ; 86,0
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	41,5	37,0 ; 46,0	2,5**	0,9 ; 4,3	56,1	51,6 ; 60,7
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	49,9	45,7 ; 53,9	2,7*	1,5 ; 4,2	47,4	43,5 ; 51,5
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	39,4	34,6 ; 44,3	2,4**	1,0 ; 4,0	58,2	53,2 ; 63,0
<b>Hommes</b>	P = 0,000			P = 0,058					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	18,2**	8,6 ; 29,0	7,3**	0,9 ; 14,7	74,5	62,9 ; 85,7
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	42,4	35,8 ; 49,1	2,3**	0,1 ; 4,9	55,4	48,6 ; 62,0
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	46,5	40,5 ; 52,6	4,8**	2,5 ; 7,7	48,7	42,8 ; 54,5
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	45,9	37,8 ; 54,3	x	;	x	;
<b>Femmes</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	11,9**	5,6 ; 18,6	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	40,5	34,6 ; 46,4	2,7**	0,6 ; 5,3	56,8	50,7 ; 62,9
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	53,1	47,2 ; 58,6	x	;	x	;
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	34,6	28,4 ; 41,1	2,9**	0,8 ; 5,4	62,5	56,0 ; 69,2
<b>Statut pondéral</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	29,3*	15,0 ; 45,0	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	11,1	8,7 ; 13,5	4,4*	2,7 ; 6,0	84,6	81,8 ; 87,3
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	60,2	55,8 ; 64,4	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	92,3	88,7 ; 95,6	x	;	x	;
<b>Hommes</b>	P = 0,000			P = 0,025					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	45,1**	9,8 ; 84,9	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	8,0*	4,7 ; 11,5	7,6*	4,2 ; 11,2	84,4	79,6 ; 89,1
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	53,4	47,6 ; 59,1	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	90,9	85,3 ; 95,9	x	;	x	;
<b>Femmes</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	24,2**	10,4 ; 39,9	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	13,3	10,2 ; 16,7	2,0**	0,7 ; 3,6	84,7	81,2 ; 88,0
Embonpoint	69,6	x	x	70,8	64,6 ; 77,0	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	93,9	89,0 ; 97,9	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	79,9	76,4 ; 83,3	11,8	9,0 ; 14,5	8,3	6,0 ; 10,7
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,095					
Hommes	81,4	10,5	8,0	84,5	79,1 ; 89,3	8,7*	4,9 ; 12,9	6,8**	3,4 ; 10,5
Femmes	74,5	14,1	11,5	76,8	72,1 ; 81,4	13,8	10,1 ; 17,7	9,3*	6,3 ; 12,6
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,001			P = 0,815					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	79,1	64,5 ; 92,3	x	;	x	;
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	80,1	73,9 ; 85,8	12,7*	7,9 ; 17,7	7,1**	3,4 ; 11,5
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	77,0	71,6 ; 82,2	12,1*	8,1 ; 16,4	10,8*	7,2 ; 14,9
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	88,7	81,9 ; 94,9	7,5**	2,4 ; 13,6	3,7**	0,3 ; 7,7
<b>Hommes</b>	P = 0,252			P = 0,921					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	87,2	57,8 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	78,1	66,0 ; 88,8	13,1**	5,0 ; 22,8	8,9**	1,8 ; 17,7
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	86,2	79,1 ; 92,2	5,6**	1,8 ; 10,6	8,2**	3,0 ; 14,3
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	92,2	81,3 ; 100,0	x	;	x	;
<b>Femmes</b>	P = 0,004			P = 0,823					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	75,5	57,9 ; 92,0	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	81,4	74,2 ; 88,1	12,5*	6,9 ; 18,6	6,0**	1,9 ; 11,3
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	70,3	62,6 ; 77,9	16,9*	10,7 ; 23,3	12,8*	7,6 ; 18,5
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	86,2	76,8 ; 94,4	7,3**	1,1 ; 15,1	6,5**	0,7 ; 13,2
<b>Statut pondéral</b>	P = 0,117			P = 0,279					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	84,0	77,4 ; 89,8	8,6*	4,3 ; 13,2	7,5**	3,2 ; 12,4
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	80,3	74,8 ; 85,5	12,7*	8,3 ; 17,3	7,0*	4,1 ; 10,4
Obésité	72,3	14,4	13,3	74,1	66,7 ; 81,6	14,2*	8,4 ; 20,5	11,8*	6,6 ; 17,7
<b>Hommes</b>	P = 0,002			P = 0,827					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	93,6	83,8 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	87,0	80,2 ; 93,4	7,2**	2,4 ; 12,8	5,8**	1,7 ; 10,7
Obésité	76,0	12,2	11,8	75,9	64,6 ; 86,5	14,3**	6,0 ; 23,9	9,8**	2,3 ; 18,4
<b>Femmes</b>	P = 0,161			P = 0,340					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	81,3	73,5 ; 88,2	10,3**	5,1 ; 15,9	8,4**	3,2 ; 14,4
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	73,5	65,0 ; 81,6	18,3*	11,1 ; 25,8	8,2**	4,0 ; 13,5
Obésité	68,9	16,4	14,7	72,4	62,3 ; 82,7	14,0**	6,5 ; 22,2	13,7**	5,8 ; 22,1

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
17,1	15,4 ; 19,0	16,8	14,9 ; 18,7	2,6*	1,7 ; 3,6	63,4	61,0 ; 65,9	Ensemble de la population	
P = 0,000									
13,0	10,6 ; 15,5	14,6	11,8 ; 17,4	4,3*	2,5 ; 6,2	68,2	64,4 ; 71,7	Sexe	
21,1	18,5 ; 23,8	19,0	16,3 ; 21,6	1,1**	0,5 ; 1,8	58,9	55,7 ; 62,1	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
7,7**	3,8 ; 11,9	16,0*	10,2 ; 22,0	7,3**	3,3 ; 11,8	69,0	61,7 ; 76,3	Groupe d'âge	
20,3	16,8 ; 24,1	16,0	12,8 ; 19,3	2,9**	1,1 ; 5,1	60,8	56,1 ; 65,3	15-24 ans	
20,6	17,5 ; 23,8	18,1	15,1 ; 21,3	1,0**	0,4 ; 1,8	60,3	56,5 ; 64,0	25-44 ans	
12,5	9,2 ; 16,0	16,5	12,6 ; 20,7	1,0**	0,0 ; 2,1	70,0	65,1 ; 74,6	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,171									
x	;	10,7**	2,6 ; 20,1	13,1**	5,4 ; 22,2	x	;	Hommes	
14,6*	10,0 ; 19,7	12,7*	8,3 ; 17,4	4,4**	1,0 ; 8,4	68,4	61,7 ; 74,7	15-24 ans	
15,8	11,5 ; 20,5	17,5	13,0 ; 22,1	1,4**	0,3 ; 2,8	65,3	59,7 ; 70,9	25-44 ans	
12,7*	7,0 ; 18,8	16,6*	10,5 ; 23,2	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,464									
11,6**	5,0 ; 18,7	21,5*	13,5 ; 30,3	x	;	x	;	Femmes	
26,4	21,0 ; 32,1	19,5	14,6 ; 24,5	1,4**	0,2 ; 2,8	52,7	46,8 ; 58,9	15-24 ans	
25,2	20,6 ; 29,8	18,7	14,8 ; 23,0	x	;	x	;	25-44 ans	
12,3*	8,4 ; 16,8	16,5*	11,5 ; 21,6	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,005									
x	;	x	;	16,4**	6,1 ; 29,1	80,7	67,2 ; 92,2	Statut pondéral	
6,6	5,0 ; 8,4	14,3	11,7 ; 17,0	4,0*	2,3 ; 5,8	75,0	71,8 ; 78,4	Poids insuffisant	
22,8	19,4 ; 26,5	19,3	15,8 ; 22,6	x	;	x	;	Poids normal	
40,4	34,2 ; 46,7	21,3	15,9 ; 26,5	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,007									
x	;	x	;	x	;	78,5*	40,9 ; 100,0	Hommes	
2,1**	0,7 ; 3,7	8,6*	5,4 ; 12,3	8,2*	4,6 ; 12,4	81,1	76,0 ; 86,1	Poids insuffisant	
16,8	12,4 ; 21,3	17,9	13,2 ; 22,6	x	;	x	;	Poids normal	
31,5	23,2 ; 40,3	22,7*	14,9 ; 30,9	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,020									
x	;	x	;	14,7**	3,7 ; 28,9	81,4	66,2 ; 93,5	Femmes	
10,1	7,2 ; 13,0	18,6	15,0 ; 22,4	0,8**	0,1 ; 1,7	70,5	66,1 ; 74,9	Poids insuffisant	
32,1	26,1 ; 38,3	21,4	16,1 ; 26,8	x	;	x	;	Poids normal	
50,9	41,9 ; 60,0	19,5*	12,8 ; 26,5	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,001									
36,3	32,8 ; 40,1	21,8	18,3 ; 24,9	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	20,9**	7,1 ; 35,9	75,7	60,9 ; 89,4	Excès de poids	
4,6*	3,1 ; 6,0	14,0	11,7 ; 16,3	3,5*	2,1 ; 5,1	77,9	75,0 ; 80,7	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
32,4	26,8 ; 37,6	14,9*	10,2 ; 19,4	9,0*	5,6 ; 12,5	43,7	37,7 ; 50,0	Ensemble de la population	
P = 0,313									
28,8*	20,5 ; 38,2	16,5**	7,8 ; 25,7	5,7**	1,7 ; 10,5	49,0	38,1 ; 60,0	Sexe	
34,6	27,4 ; 41,4	13,9*	9,3 ; 19,1	10,9*	6,0 ; 16,3	40,5	33,5 ; 47,8	Hommes	
								Femmes	
P = 0,954									
37,4**	9,5 ; 69,6	x	;	x	;	35,6**	7,9 ; 66,7	Groupe d'âge	
37,0	27,1 ; 46,7	16,4*	8,6 ; 25,1	9,3**	3,8 ; 15,8	37,2	28,0 ; 47,3	15-24 ans	
32,6	24,1 ; 40,9	13,9*	7,9 ; 20,7	9,5**	4,3 ; 15,2	44,0	35,1 ; 53,6	25-44 ans	
14,8**	4,6 ; 26,8	11,0**	2,7 ; 21,1	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,913									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
36,8*	20,3 ; 55,4	21,9**	5,3 ; 38,5	x	;	x	;	15-24 ans	
28,1*	15,9 ; 43,2	15,6**	3,3 ; 29,0	7,0**	0,3 ; 15,6	49,2*	33,6 ; 65,4	25-44 ans	
20,1**	2,4 ; 43,1	x	;	x	;	74,6	48,7 ; 94,4	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,990									
51,4**	13,8 ; 91,4	x	;	x	;	x	;	Femmes	
37,1*	24,9 ; 48,7	13,2**	5,6 ; 22,2	11,8**	3,5 ; 21,2	37,8*	26,1 ; 50,5	15-24 ans	
35,3	24,3 ; 45,7	12,9*	6,8 ; 19,9	11,1**	3,7 ; 19,2	40,7	30,1 ; 52,2	25-44 ans	
x	;	19,5**	5,4 ; 35,5	x	;	62,6*	43,7 ; 82,0	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,713									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
42,0*	27,5 ; 56,6	12,4**	3,4 ; 23,4	9,2**	0,8 ; 18,7	36,3*	23,3 ; 50,2	Poids insuffisant	
26,3*	17,9 ; 34,4	15,1*	8,4 ; 22,5	8,0**	3,7 ; 13,0	50,7	40,9 ; 60,1	Poids normal	
33,3	23,3 ; 43,0	16,0**	8,0 ; 24,3	10,0**	3,6 ; 17,0	40,7	31,3 ; 51,2	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,987									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	x	;	x	;	58,0**	15,1 ; 96,3	Poids insuffisant	
26,3*	15,0 ; 39,3	14,4**	3,0 ; 27,3	7,0**	0,4 ; 14,9	52,3	36,3 ; 67,5	Poids normal	
31,2*	16,9 ; 47,7	22,0**	6,4 ; 36,7	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,754									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
42,9*	27,4 ; 58,3	14,3**	4,1 ; 26,8	x	;	x	;	Poids insuffisant	
26,2*	14,9 ; 37,5	15,6*	8,4 ; 24,2	8,9**	2,6 ; 16,7	49,3	37,1 ; 61,5	Poids normal	
34,9*	22,0 ; 47,7	11,5**	4,1 ; 20,2	14,5**	4,3 ; 26,1	39,1*	26,8 ; 52,8	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	88,5	85,8 ; 91,0	6,1	4,2 ; 8,1	5,4*	3,6 ; 7,4
Sexe	P = 0,001			P = 0,422					
Hommes	88,9	6,9	4,2	91,2	86,7 ; 95,0	5,4**	2,6 ; 8,6	3,5**	0,8 ; 6,8
Femmes	85,7	7,5	6,8	86,7	83,0 ; 90,2	6,6*	4,0 ; 9,3	6,7*	4,2 ; 9,4
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,919					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	90,2	80,4 ; 98,1	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	88,8	83,7 ; 93,2	6,8**	3,4 ; 10,9	4,4**	1,5 ; 8,1
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	88,4	84,3 ; 92,3	4,9**	2,4 ; 7,6	6,7*	3,7 ; 10,1
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	86,6	78,9 ; 93,3	8,0**	2,8 ; 14,1	5,4**	1,0 ; 10,6
Hommes	P = 0,121			P = 'n.d.'					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	90,8	81,8 ; 98,0	x	;	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	90,4	83,5 ; 95,8	5,0**	1,3 ; 9,6	4,6**	0,3 ; 9,9
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	89,1	77,3 ; 98,9	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,893					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	85,8	72,4 ; 96,9	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	87,5	80,8 ; 93,1	8,1**	3,1 ; 14,0	4,4**	1,2 ; 8,6
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	87,0	81,2 ; 92,3	4,8**	1,5 ; 8,5	8,2**	4,0 ; 13,2
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	84,8	75,3 ; 93,7	5,7**	0,4 ; 12,1	9,5**	1,9 ; 18,2
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,004					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	94,9	91,7 ; 97,7	2,1**	0,4 ; 4,2	3,0**	0,7 ; 5,6
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	90,1	86,1 ; 93,8	4,6**	2,1 ; 7,4	5,4**	2,6 ; 8,6
Obésité	82,0	8,7	9,2	79,2	72,5 ; 85,3	11,9*	6,9 ; 17,5	8,8*	4,6 ; 13,8
Hommes	P = 0,002			P = 'n.d.'					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	97,2	91,0 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	92,0	85,8 ; 97,5	x	;	x	;
Obésité	85,2	8,2	6,6*	86,8	77,0 ; 94,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,034			P = 0,046					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	94,3	90,1 ; 97,6	x	;	x	;
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	88,1	82,1 ; 93,6	5,2**	1,5 ; 9,7	6,7**	3,0 ; 11,2
Obésité	79,1	9,2	11,8	72,3	62,2 ; 82,1	14,7**	6,3 ; 23,5	13,0**	5,9 ; 20,9

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	6,6	4,7 ; 8,7	93,4	91,3 ; 95,3
Sexe	P = 0,024		P = 0,281			
Hommes	6,6	93,4	5,3**	2,7 ; 8,5	94,7	91,5 ; 97,3
Femmes	8,6	91,4	7,5*	4,9 ; 10,3	92,5	89,7 ; 95,1
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,188			
15-24 ans	11,2*	88,8	x	;	x	;
25-44 ans	8,0	92,0	4,9**	1,9 ; 8,4	95,1	91,6 ; 98,1
45-64 ans	7,5	92,5	9,3*	5,9 ; 13,1	90,7	86,9 ; 94,1
65 ans et plus	4,9	95,1	4,4**	0,9 ; 9,1	95,6	90,9 ; 99,1
Hommes	P = 0,409		P = 0,992			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	x	;	x	;
45-64 ans	7,0	93,0	5,3**	1,7 ; 9,6	94,7	90,4 ; 98,3
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,043			
15-24 ans	12,3*	87,7	x	;	x	;
25-44 ans	9,9	90,1	4,8**	1,4 ; 8,8	95,2	91,2 ; 98,6
45-64 ans	7,8	92,2	12,2*	6,7 ; 18,0	87,8	82,0 ; 93,3
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,015			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	3,9**	1,2 ; 7,2	96,1	92,8 ; 98,8
Embonpoint	6,6	93,4	5,4*	2,9 ; 8,4	94,6	91,6 ; 97,1
Obésité	11,3	88,7	11,9*	6,8 ; 17,3	88,1	82,7 ; 93,2
Hommes	P = 0,000		P = 0,149			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	3,0**	0,5 ; 6,2	97,0	93,8 ; 99,5
Obésité	11,5	88,5	9,4**	2,9 ; 17,3	90,6	82,7 ; 97,1
Femmes	P = 0,032		P = 0,039			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	3,7**	0,8 ; 7,3	96,3	92,7 ; 99,2
Embonpoint	8,4	91,6	7,8**	3,3 ; 12,9	92,2	87,1 ; 96,7
Obésité	11,1	88,9	14,2**	6,3 ; 22,4	85,8	77,6 ; 93,7

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	1,0**	0,2 ; 2,0	x	;	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	1,6**	0,6 ; 2,7	x	;	2,2**	0,7 ; 3,9
Rarement	2,8	2,6*	2,9	0,8**	0,2 ; 1,6	x	;	x	;
Jamais	94,8	94,8	94,8	96,5	95,1 ; 98,0	97,9	95,9 ; 99,5	95,6	93,3 ; 97,8
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,703					
Souvent	4,6	4,2	4,9	3,8*	2,3 ; 5,5	3,9**	1,6 ; 6,8	3,8**	1,7 ; 5,9
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	4,5*	2,9 ; 6,2	3,4**	1,1 ; 5,9	5,3*	3,0 ; 7,8
Rarement	5,1	5,5	4,9	3,5*	2,0 ; 5,1	4,1**	1,6 ; 7,2	3,0**	1,4 ; 5,1
Jamais	82,9	81,4	84,0	88,2	85,6 ; 90,9	88,6	83,8 ; 92,5	87,9	84,6 ; 91,3
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,358					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	1,4**	0,5 ; 2,4	x	;	2,0**	0,7 ; 3,8
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	4,8*	3,0 ; 6,9	x	;	5,5*	3,2 ; 8,3
Rarement	4,5	4,3	4,5	3,5*	2,1 ; 5,2	1,9**	0,3 ; 3,8	4,7*	2,3 ; 7,1
Jamais	86,5	87,5	85,7	90,3	87,6 ; 92,6	93,9	90,2 ; 97,1	87,8	84,0 ; 91,3
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	0,8**	0,1 ; 1,7	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,8	97,8 ; 99,6	99,5	98,4 ; 100,0	98,4	96,9 ; 99,6
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,1	98,3 ; 99,8	99,4	98,2 ; 100,0	99,0	97,8 ; 99,9
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,4	97,2 ; 99,4	x	;	97,3	95,3 ; 99,1
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	98,9	97,8 ; 99,8	99,4	98,0 ; 100,0	98,6	96,9 ; 99,9
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,0**	0,2 ; 2,1	x	;	1,7**	0,4 ; 3,5
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,4	95,8 ; 98,7	99,8	99,2 ; 100,0	95,7	93,1 ; 98,0



Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	98,6	97,3 ; 99,7	99,5	98,3 ; 100,0	98,1	95,9 ; 99,7
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,3	98,5 ; 99,9	99,5	98,3 ; 100,0	99,1	98,1 ; 99,9
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	x	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
3,5*	2,1 ; 5,2	38,4	34,2 ; 42,9	44,4	40,0 ; 48,5	13,7	11,0 ; 16,6	Ensemble de la population	
P = 0,012									
4,6**	1,8 ; 8,1	46,2	38,3 ; 53,8	38,8	31,3 ; 46,3	10,4*	6,7 ; 14,5	Sexe	
2,8**	1,3 ; 4,6	33,3	28,6 ; 38,4	48,1	42,6 ; 53,1	15,8	12,2 ; 19,8	Hommes	
P = 0,735									
x	;	41,1*	23,8 ; 57,7	43,3*	26,7 ; 59,5	x	;	Femmes	
3,6**	0,8 ; 7,0	34,6	27,4 ; 42,1	43,2	35,3 ; 50,5	18,6*	13,0 ; 24,5	Groupe d'âge	
2,4**	0,5 ; 4,6	40,0	33,3 ; 46,6	45,9	39,8 ; 52,7	11,7*	8,0 ; 15,6	15-24 ans	
6,4**	1,5 ; 12,0	40,9	30,6 ; 50,6	43,6	34,0 ; 53,9	9,1**	3,6 ; 15,4	25-44 ans	
P = 0,986									
x	;	64,1**	24,4 ; 100,0	x	;	x	;	45-64 ans	
x	;	41,4*	27,7 ; 55,1	41,4*	27,3 ; 55,5	x	;	65 ans et plus	
x	;	46,7	34,4 ; 57,3	39,6	29,5 ; 51,0	x	;	Hommes	
x	;	44,1*	25,1 ; 62,0	35,6*	19,9 ; 53,8	x	;	15-24 ans	
P = 0,851									
x	;	30,5**	13,4 ; 49,3	49,6*	29,8 ; 67,9	x	;	25-44 ans	
x	;	30,3	21,9 ; 39,2	44,3	34,7 ; 52,9	x	;	45-64 ans	
x	;	35,2	27,2 ; 42,9	50,5	42,3 ; 58,5	x	;	65 ans et plus	
x	;	38,7*	26,2 ; 51,7	49,2	36,3 ; 62,1	x	;	Femmes	
P = 0,634									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
3,1**	0,7 ; 6,0	39,2	30,9 ; 47,2	42,5	34,3 ; 50,0	15,3*	9,9 ; 21,5	Poids insuffisant	
5,1**	2,3 ; 8,4	38,8	32,0 ; 46,1	44,8	38,2 ; 51,6	11,3*	7,7 ; 15,4	Poids normal	
x	;	36,3	28,2 ; 45,1	48,0	39,5 ; 56,5	x	;	Embonpoint	
P = 0,806									
x	;	x	;	x	;	x	;	Obésité	
x	;	53,7*	33,3 ; 70,4	26,9**	12,7 ; 44,2	14,6**	3,9 ; 28,7	Hommes	
7,3**	2,4 ; 13,5	43,6	32,4 ; 54,5	39,0	29,1 ; 49,2	10,1**	4,8 ; 16,1	Poids insuffisant	
x	;	46,7	33,2 ; 60,9	44,5	30,6 ; 58,0	x	;	Poids normal	
P = 0,814									
x	;	x	;	x	;	x	;	Embonpoint	
2,6**	0,2 ; 5,6	35,1	26,5 ; 44,0	46,8	37,6 ; 55,8	15,4*	9,1 ; 22,7	Obésité	
2,9**	0,3 ; 6,1	34,0	25,8 ; 42,9	50,6	41,1 ; 59,3	12,6*	7,4 ; 18,8	Femmes	
x	;	27,1*	18,2 ; 36,9	51,1	40,6 ; 61,8	x	;	Poids insuffisant	
P = 0,814									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids normal	
x	;	x	;	x	;	x	;	Embonpoint	
x	;	x	;	x	;	x	;	Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>									
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	45,3	41,3 ; 49,7	44,0	36,7 ; 51,5	46,3	41,3 ; 51,3
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	38,6	34,6 ; 42,6	35,7	28,9 ; 42,9	40,5	35,6 ; 45,4
Non	14,4	15,3	13,7	16,1	12,9 ; 19,3	20,3	14,1 ; 26,9	13,3	10,0 ; 16,6
		P = 0,018					P = 0,110		
<b>Diminuer les portions</b>									
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	43,1	39,0 ; 47,4	38,1	31,5 ; 45,6	46,4	41,3 ; 51,3
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	40,2	36,0 ; 44,4	44,0	36,6 ; 51,4	37,7	32,7 ; 42,8
Non	19,6	22,6	17,4	16,7	13,5 ; 19,9	17,9*	12,1 ; 23,4	15,9	12,1 ; 19,8
		P = 0,000					P = 0,200		
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>									
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	43,0	38,8 ; 47,3	37,7	31,0 ; 45,0	46,5	41,2 ; 52,0
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	32,5	28,6 ; 36,8	36,4	28,9 ; 43,8	30,0	25,2 ; 34,9
Non	27,7	32,4	24,3	24,5	20,8 ; 28,3	25,9	19,6 ; 32,5	23,5	19,0 ; 28,2
		P = 0,000					P = 0,150		
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>									
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	44,7	40,7 ; 48,8	38,7	31,9 ; 45,7	48,6	43,4 ; 53,7
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	31,2	27,3 ; 35,2	36,7	29,0 ; 43,7	27,5	22,9 ; 32,5
Non	26,1	27,4	25,1	24,1	20,7 ; 27,6	24,6	18,5 ; 30,9	23,8	19,6 ; 28,3
		P = 0,014					P = 0,050		
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>									
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	62,2	57,8 ; 66,3	52,8	45,7 ; 60,4	68,4	63,5 ; 73,3
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	21,1	17,4 ; 24,8	29,3	22,7 ; 36,0	15,7	12,0 ; 19,8
Non	17,4	18,5	16,6	16,7	13,5 ; 20,0	17,9*	12,3 ; 23,9	15,8	12,4 ; 19,8
		P = 0,000					P = 0,000		
<b>Manger des aliments moins gras</b>									
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	64,4	60,1 ; 68,7	57,3	49,8 ; 65,1	69,2	64,1 ; 74,0
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	26,3	22,5 ; 30,3	33,9	26,6 ; 41,3	21,3	16,9 ; 25,8
Non	12,6	14,0	11,6	9,2	6,8 ; 11,7	8,8*	5,1 ; 13,0	9,5*	6,6 ; 12,7
		P = 0,000					P = 0,010		
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>									
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	44,6	40,7 ; 48,7	38,2	32,0 ; 45,3	48,9	43,5 ; 54,0
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	33,5	29,6 ; 37,5	37,0	29,8 ; 44,2	31,1	26,5 ; 36,1
Non	21,5	24,4	19,4	21,9	18,1 ; 25,6	24,8	18,0 ; 31,5	20,0	15,7 ; 24,3
		P = 0,000					P = 0,064		
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>									
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	9,5	7,2 ; 12,0	10,7*	6,6 ; 15,2	8,7*	5,9 ; 11,9
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	15,9	12,9 ; 19,2	24,0	18,0 ; 30,2	10,6*	7,4 ; 13,8
Non	72,0	67,3	75,4	74,5	71,0 ; 78,2	65,3	58,5 ; 72,0	80,7	76,6 ; 84,6
		P = 0,000					P = 0,000		
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>									
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	32,4	28,3 ; 36,4	32,0	25,5 ; 38,6	32,7	27,5 ; 37,7
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	15,1	11,7 ; 18,3	19,2*	12,7 ; 25,6	12,3	9,1 ; 15,7
Non	49,9	43,2	54,7	52,5	48,5 ; 56,8	48,7	41,5 ; 56,2	55,1	50,1 ; 60,4
		P = 0,000					P = 0,100		

Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,106				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	53,5	49,3 ; 57,7	54,8	47,4 ; 61,9	52,6	47,6 ; 57,8	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	17,0	13,7 ; 20,6	20,4*	13,8 ; 26,9	14,9	11,2 ; 18,9	
Non	29,6	28,8	30,2	29,5	25,9 ; 33,4	24,8	19,3 ; 30,9	32,6	27,7 ; 37,3	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,004				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	35,7	31,9 ; 40,1	27,1	21,1 ; 33,6	41,5	36,5 ; 46,7	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	15,1	12,0 ; 18,2	16,7*	11,3 ; 22,6	14,0	10,3 ; 17,9	
Non	48,5	52,0	45,9	49,2	44,9 ; 53,5	56,2	49,2 ; 63,5	44,5	39,4 ; 49,8	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,163				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	37,8	33,5 ; 41,8	39,2	31,7 ; 46,4	36,8	31,5 ; 41,7	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	26,4	22,5 ; 30,1	29,7	23,0 ; 36,5	24,3	19,9 ; 28,7	
Non	37,5	34,7	39,5	35,8	32,0 ; 39,8	31,1	25,0 ; 37,5	38,9	33,8 ; 43,9	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
56,0	53,5 ; 58,5	30,3	28,0 ; 32,7	13,6	11,8 ; 15,5	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
49,9	45,9 ; 53,8	31,8	28,2 ; 35,5	18,3	15,1 ; 21,6	Hommes
62,0	58,9 ; 65,1	28,9	25,8 ; 31,7	9,2	7,2 ; 11,1	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
57,1	41,9 ; 71,4	11,7**	2,3 ; 23,0	31,1*	18,7 ; 45,4	15-17 ans
36,2	26,2 ; 46,5	26,8*	18,4 ; 35,5	37,0	27,3 ; 46,3	18-24 ans
		P = 0,000				
43,2	34,9 ; 51,5	21,7*	15,2 ; 28,8	35,1	27,4 ; 42,5	15-24 ans
37,9	33,5 ; 42,5	43,8	39,2 ; 48,4	18,2	14,7 ; 21,9	25-44 ans
61,8	57,8 ; 65,5	32,8	29,2 ; 36,5	5,4*	3,6 ; 7,5	45-64 ans
93,7	91,1 ; 96,1	x	;	x	;	65 ans et plus
		P = 0,055				Hommes
60,7*	38,4 ; 83,0	x	;	x	;	15-17 ans
29,6**	14,6 ; 45,7	23,5**	10,4 ; 38,7	46,8*	30,3 ; 63,6	18-24 ans
		P = 0,001				
40,8*	27,4 ; 53,6	20,0**	9,9 ; 31,5	39,2*	26,8 ; 51,8	15-24 ans
32,8	26,1 ; 39,0	41,3	34,7 ; 48,2	25,9	19,8 ; 31,9	25-44 ans
55,1	49,1 ; 61,0	37,0	31,3 ; 42,9	7,9*	4,6 ; 11,6	45-64 ans
90,5	85,2 ; 95,2	x	;	x	;	65 ans et plus
		P = 0,000				Femmes
52,8*	32,9 ; 71,4	x	;	x	;	15-17 ans
42,5	29,6 ; 55,8	29,9*	18,5 ; 41,7	27,6*	16,2 ; 38,9	18-24 ans
		P = 0,000				
45,7	35,2 ; 56,2	23,5*	15,1 ; 32,6	30,8*	21,1 ; 40,8	15-24 ans
43,4	37,6 ; 49,4	46,5	40,3 ; 52,3	10,1*	6,6 ; 13,9	25-44 ans
68,2	63,0 ; 73,2	28,7	23,8 ; 33,8	3,1**	1,3 ; 5,1	45-64 ans
96,1	93,5 ; 98,4	x	;	x	;	65 ans et plus

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	42,8	40,4 ; 45,2	48,6	44,7 ; 52,5	37,2	34,0 ; 40,1
Non	56,1	49,9	62,1	57,2	54,8 ; 59,6	51,4	47,5 ; 55,3	62,8	59,9 ; 66,0
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	8,3	7,0 ; 9,8	11,5	9,2 ; 14,0	5,3	3,8 ; 6,9
Non	89,4	85,6	93,2	91,7	90,2 ; 93,0	88,5	86,0 ; 90,8	94,7	93,1 ; 96,2
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,094					
Oui	7,3	9,1	5,5	7,2	5,7 ; 8,7	8,5	6,2 ; 10,9	5,9*	4,3 ; 7,7
Non	92,7	90,9	94,5	92,8	91,3 ; 94,3	91,5	89,1 ; 93,8	94,1	92,3 ; 95,7
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,043					
Oui	5,1	6,3	3,9	5,3	4,0 ; 6,6	6,6*	4,5 ; 8,9	4,1*	2,5 ; 5,6
Non	94,9	93,7	96,1	94,7	93,4 ; 96,0	93,4	91,1 ; 95,5	95,9	94,4 ; 97,5
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Oui	12,3	16,1	8,7	12,0	10,3 ; 13,7	15,2	12,2 ; 18,1	9,0	7,2 ; 11,0
Non	87,7	83,9	91,3	88,0	86,3 ; 89,7	84,8	81,9 ; 87,8	91,0	89,0 ; 92,8
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = 0,244					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,5**	0,1 ; 1,0	0,8**	0,1 ; 1,8	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	99,5	99,0 ; 99,9	99,2	98,2 ; 99,9	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,6**	0,1 ; 1,2	1,2**	0,2 ; 2,4	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,4	98,8 ; 99,9	98,8	97,6 ; 99,8	x	;
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,439					
Oui	0,8	1,2	0,3*	1,0**	0,4 ; 1,7	1,3**	0,2 ; 2,6	0,6**	0,0 ; 1,4
Non	99,2	98,8	99,7	99,0	98,3 ; 99,6	98,7	97,4 ; 99,8	99,4	98,6 ; 100,0
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,234					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,7*	0,9 ; 2,6	2,2**	0,9 ; 3,7	1,2**	0,4 ; 2,3
Non	98,2	98,1	98,4	98,3	97,4 ; 99,1	97,8	96,3 ; 99,1	98,8	97,7 ; 99,6
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,036					
Oui	1,6	2,3	0,9	1,4**	0,7 ; 2,1	2,1**	0,9 ; 3,6	0,6**	0,1 ; 1,3
Non	98,4	97,7	99,1	98,6	97,9 ; 99,3	97,9	96,4 ; 99,1	99,4	98,7 ; 99,9
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,891					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,4**	0,1 ; 0,8	0,4**	0,0 ; 0,9	0,4**	0,0 ; 1,0
Non	99,5	99,3	99,8	99,6	99,2 ; 99,9	99,6	99,1 ; 100,0	99,6	99,0 ; 100,0

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	12,2	16,2	8,3	12,4	10,7 ; 14,2	16,9	13,8 ; 20,0	8,0	6,2 ; 10,0	
Non	87,8	83,8	91,7	87,6	85,8 ; 89,3	83,1	80,0 ; 86,2	92,0	90,0 ; 93,8	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,163				
Oui	1,6	2,3	0,8	1,4*	0,8 ; 2,1	2,0**	0,9 ; 3,1	0,9**	0,2 ; 1,8	
Non	98,4	97,7	99,2	98,6	97,9 ; 99,2	98,0	96,9 ; 99,1	99,1	98,2 ; 99,8	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,566				
Oui	1,8	2,4	1,3	2,1*	1,3 ; 3,0	2,4**	1,1 ; 3,7	1,8**	0,8 ; 3,1	
Non	98,2	97,6	98,7	97,9	97,0 ; 98,7	97,6	96,3 ; 98,9	98,2	96,9 ; 99,2	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,613				
Oui	1,4	1,7	1,0	1,7*	0,9 ; 2,5	1,9**	0,7 ; 3,2	1,5**	0,4 ; 2,6	
Non	98,6	98,3	99,0	98,3	97,5 ; 99,1	98,1	96,8 ; 99,3	98,5	97,4 ; 99,6	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,472				
Oui	0,8	1,2	0,4*	1,1**	0,5 ; 1,7	1,3**	0,4 ; 2,4	0,8**	0,1 ; 1,7	
Non	99,2	98,8	99,6	98,9	98,3 ; 99,5	98,7	97,6 ; 99,6	99,2	98,3 ; 99,9	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 'n.d.'				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = 'n.d.'				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,132				
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,5**	0,1 ; 0,9	0,8**	0,1 ; 1,6	x	;	
Non	99,6	99,6	99,7	99,5	99,1 ; 99,9	99,2	98,4 ; 99,9	x	;	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	13,6	11,8 ; 15,5	18,3	15,1 ; 21,6	9,2	7,2 ; 11,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	31,1*	18,7 ; 45,4	25,5**	6,3 ; 47,0	38,0*	19,4 ; 57,3
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	37,0	27,3 ; 46,3	46,8*	30,3 ; 63,6	27,6*	16,2 ; 38,9
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	18,2	14,7 ; 21,9	25,9	19,8 ; 31,9	10,1*	6,6 ; 13,9
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	5,4*	3,6 ; 7,5	7,9*	4,6 ; 11,6	3,1**	1,3 ; 5,1
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	26,7	24,4 ; 29,1	7,9	6,5 ; 9,4	9,4	7,7 ; 11,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	28,7	25,0 ; 32,2	9,6	7,4 ; 12,1	11,8	9,2 ; 14,5
Femmes	25,4	6,8	7,4	24,8	22,1 ; 27,6	6,2	4,5 ; 8,1	7,0	5,2 ; 8,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	29,4*	15,8 ; 43,4	7,3**	0,8 ; 15,7	x	;
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	30,9	21,8 ; 40,6	14,3**	7,4 ; 22,3	18,6*	11,1 ; 26,7
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	30,4	22,8 ; 38,3	12,0*	6,7 ; 17,8	14,4*	8,8 ; 20,4
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	35,6	31,1 ; 40,0	11,8	9,1 ; 14,7	14,7	11,4 ; 18,2
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	26,4	23,0 ; 30,1	5,7*	4,0 ; 7,6	6,1*	4,1 ; 8,1
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	5,1*	2,9 ; 7,6	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,352					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	30,4**	9,1 ; 51,6	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	28,9**	14,2 ; 45,0	18,2**	6,4 ; 31,4	23,3**	10,2 ; 37,6
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	29,4*	17,7 ; 41,8	14,4**	5,7 ; 24,6	15,4**	6,9 ; 25,1
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	35,4	28,6 ; 41,8	13,1*	8,8 ; 17,9	18,8	13,3 ; 24,3
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	29,9	24,4 ; 35,8	7,6*	4,6 ; 10,9	7,5*	4,4 ; 10,7
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	7,6**	3,2 ; 12,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,192					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	28,2**	12,0 ; 46,4	x	;	x	;
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	32,7*	21,4 ; 45,0	10,6**	2,5 ; 19,8	14,1**	6,3 ; 23,0
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	31,3	22,1 ; 40,9	9,5**	3,3 ; 16,7	13,5**	6,6 ; 21,5
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	35,8	29,8 ; 41,5	10,5*	6,9 ; 14,2	10,4*	6,9 ; 14,4
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	23,2	18,7 ; 28,0	3,9**	1,9 ; 6,3	4,7**	2,2 ; 7,4
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	3,3**	1,2 ; 5,6	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	77,6	75,7 ; 79,5	81,4	78,6 ; 84,2	73,9	71,4 ; 76,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	34,1*	21,5 ; 48,1	21,4**	4,5 ; 42,1	49,5*	30,5 ; 68,9
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	84,6	76,5 ; 91,4	79,1	64,7 ; 91,7	89,7	81,9 ; 95,9
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	67,8	60,2 ; 75,1	58,4	46,2 ; 70,5	77,4	68,2 ; 85,4
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	92,4	89,9 ; 94,7	93,4	89,8 ; 96,7	91,3	87,6 ; 94,6
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	84,8	82,3 ; 87,2	89,8	86,5 ; 92,8	80,0	75,9 ; 83,9
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	58,1	53,5 ; 62,8	63,8	56,8 ; 70,9	52,1	45,8 ; 58,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	79,1	75,0 ; 83,0	82,2	75,9 ; 88,4	76,3	70,9 ; 81,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	89,2	86,5 ; 91,6	93,3	90,1 ; 96,1	84,9	80,4 ; 88,9
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	87,6	84,3 ; 90,7	90,3	85,4 ; 94,5	85,3	80,3 ; 89,4
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	88,7	86,6 ; 90,5	85,9	82,8 ; 88,9	91,6	89,2 ; 93,8
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	9,9	8,1 ; 11,8	11,6	8,9 ; 14,6	8,0	5,8 ; 10,4
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,5**	0,7 ; 2,3	2,5**	1,1 ; 4,0	0,4**	0,0 ; 1,0
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	48,3	46,9 ; 49,6	1,0**	0,2 ; 2,2	98,8	97,9 ; 99,6
Femmes	51,5	97,5	0,8	51,3	50,0 ; 52,6	98,7	97,5 ; 99,6	0,6**	0,0 ; 1,2
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,4**	0,1 ; 0,9	x	;	0,6**	0,0 ; 1,4

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	88,7	86,6 ; 90,5	9,9	8,1 ; 11,8	1,5**	0,7 ; 2,3
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,010					
Hommes	86,4	10,7	2,9	85,9	82,8 ; 88,9	11,6	8,9 ; 14,6	2,5**	1,1 ; 4,0
Femmes	91,6	7,4	0,9*	91,6	89,2 ; 93,8	8,0	5,8 ; 10,4	0,4**	0,0 ; 1,0
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,156					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	47,8*	24,2 ; 73,1	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	65,8	55,1 ; 76,3	28,4*	18,2 ; 38,9	5,8**	1,0 ; 11,7
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	62,8	53,3 ; 72,4	31,4	22,3 ; 40,9	5,8**	1,5 ; 11,0
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	89,0	85,9 ; 91,9	9,9	7,3 ; 13,0	1,0**	0,3 ; 1,9
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	96,2	94,5 ; 97,7	x	;	x	;
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	95,2	90,1 ; 99,3	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,640					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	x	;	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	86,6	83,5 ; 89,7	11,4	8,6 ; 14,4	2,0**	0,8 ; 3,4
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,216					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	92,1	89,8 ; 94,3	7,6	5,5 ; 9,9	x	;
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	48,1	43,9 ; 52,0	64,9	60,5 ; 69,4
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000			
15-24 ans	87,9	...	88,0	73,3 ; 99,5	...	;
25-44 ans	62,4	...	67,4	60,5 ; 74,0	...	;
45-64 ans	29,9	...	29,1	23,3 ; 34,8	...	;
65 ans et plus	7,3	...	x	;	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...	...	...	P = 0,000
15-24 ans	...	90,0	...	;	92,3	84,9 ; 98,2
25-34 ans	...	71,0	...	;	76,1	68,3 ; 83,6
35-49 ans	...	53,5	...	;	42,9	35,6 ; 50,3
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,000		P = 0,989	
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	35,9	27,0 ; 45,1	67,4	51,5 ; 81,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	45,4	36,3 ; 54,3	64,8	55,6 ; 73,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	61,7	54,4 ; 68,6	64,8	56,3 ; 72,8
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	44,3	34,5 ; 53,3	64,3	55,2 ; 74,5
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	43,8	64,2	42,6	38,0 ; 47,1	61,3	56,1 ; 66,3
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	80,9	70,2 ; 90,0	91,5	83,6 ; 97,7
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	x	;	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = .		P = .	
Hommes	x	66,6	x	;	64,7	60,1 ; 69,2
Femmes	47,8	x	48,0	43,8 ; 51,9	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	9,9	8,1 ; 11,7	13,0	11,1 ; 15,0	77,2	74,8 ; 79,5
Sexe	P = 0,093			P = 0,273					
Hommes	14,8	14,9	70,3	11,3	8,5 ; 14,2	12,6	9,6 ; 15,5	76,1	72,6 ; 79,6
Femmes	13,2	14,7	72,1	8,3	6,1 ; 10,7	13,4	10,7 ; 16,3	78,3	75,3 ; 81,2
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	54,3*	28,8 ; 78,5	x	;	x	;
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	24,0*	15,2 ; 34,1	34,5	24,0 ; 45,3	41,5	30,5 ; 52,6
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	29,1*	20,7 ; 38,9	34,7	25,7 ; 44,9	36,2	26,5 ; 45,8
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	9,6	6,9 ; 12,4	17,1	13,5 ; 20,8	73,3	69,0 ; 77,5
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	4,7*	2,8 ; 6,7	3,5*	2,2 ; 4,9	91,8	89,4 ; 94,1
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	2,5**	0,4 ; 5,1	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,029					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	13,2*	8,7 ; 18,2	7,3**	3,2 ; 12,0	79,5	73,4 ; 85,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	10,3*	6,5 ; 14,0	13,8*	9,3 ; 18,0	76,0	70,8 ; 81,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	9,2*	5,9 ; 12,5	17,3	13,3 ; 21,6	73,6	68,6 ; 78,1
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	6,8*	3,9 ; 9,8	11,4*	7,7 ; 15,0	81,9	77,3 ; 86,1
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,015					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	7,2	5,5 ; 9,0	8,9	7,1 ; 10,8	83,9	81,5 ; 86,1
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	27,1*	18,2 ; 36,3	45,7	35,6 ; 55,8	27,2*	18,0 ; 37,1
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	56,1*	25,3 ; 83,7	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	13,1	11,2 ; 15,1	15,3	12,3 ; 18,5	10,7	8,4 ; 13,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	62,9*	37,9 ; 85,3	x	;	43,5**	15,0 ; 73,1
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	29,3*	19,7 ; 39,3	32,8**	16,3 ; 51,4	26,3*	14,7 ; 39,1
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	34,9	26,0 ; 44,1	41,6*	24,7 ; 59,2	29,7*	19,0 ; 40,9
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	14,8	11,7 ; 18,2	18,6	13,4 ; 23,9	10,7*	7,2 ; 14,8
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	5,9*	3,9 ; 7,9	7,3*	4,4 ; 10,6	4,3**	2,0 ; 6,9
	3,1*	3,9*	1,8**	2,5**	0,5 ; 5,1	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,673		P = 0,831		P = 0,573	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	14,3*	9,6 ; 19,5	14,4*	7,5 ; 22,2	14,3*	7,8 ; 21,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	13,0	9,0 ; 17,1	16,2*	9,5 ; 22,9	9,9*	5,8 ; 14,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	13,9	10,2 ; 17,7	17,0*	11,3 ; 23,2	10,3*	6,1 ; 15,5
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	10,8*	7,3 ; 14,4	12,9*	7,0 ; 19,3	8,8**	4,6 ; 13,5
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	9,8	8,0 ; 11,7	11,1	8,1 ; 14,2	8,4	6,2 ; 10,9
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	35,8	26,3 ; 45,4	36,1*	22,9 ; 49,9	35,3*	20,6 ; 50,6
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	63,9*	33,3 ; 87,8	67,2*	31,6 ; 93,9	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,089		P = 0,102		P = 0,278	
Hommes	18,7	54,0	17,9	11,1	8,7 ; 13,7	x	;	10,7	8,3 ; 13,1
Femmes	19,2	19,2	x	15,0	11,8 ; 18,1	15,0	11,8 ; 18,1	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	8,0	6,6 ; 9,3	5,7*	4,0 ; 7,4	10,1	8,0 ; 12,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,045		P = 0,029		P = 0,061	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	6,5**	1,1 ; 13,3	x	;	10,7**	0,9 ; 22,0
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,034		P = 0,022		P = 0,054	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	5,5**	0,9 ; 11,0	x	;	8,6**	0,7 ; 18,2
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	10,8	8,2 ; 13,6	6,1*	3,3 ; 9,2	15,9	11,6 ; 20,6
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	8,8	6,5 ; 10,9	8,0*	4,8 ; 11,5	9,4*	6,7 ; 12,6
	2,7	3,2*	2,2	2,3**	0,8 ; 3,9	x	;	2,8**	0,8 ; 5,2
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,005		P = 0,017	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	3,2**	1,6 ; 5,0	2,2**	0,2 ; 4,4	4,3**	1,8 ; 7,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	7,5*	4,6 ; 10,6	4,7**	1,8 ; 8,1	9,9*	5,2 ; 15,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	8,5*	6,1 ; 11,3	5,2**	2,3 ; 8,3	12,1*	8,0 ; 16,6
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	14,0	10,1 ; 17,7	12,5*	6,7 ; 18,4	15,3*	10,4 ; 20,6
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,430		P = 0,051		P = 0,372	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	8,2	;	5,2*	3,3 ; 7,3	11,1	8,3 ; 14,0
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	10,5*	;	11,7**	4,5 ; 20,0	8,7**	2,7 ; 16,7
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	13,8**	;	x	;	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,002		P = 0,160		P = .	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	11,1	8,6 ; 13,9	x	;	11,1	8,5 ; 13,9
Femmes	7,0	7,0	8,9**	6,0*	4,0 ; 7,9	6,0*	4,1 ; 8,0	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	72,7*	31,0 ; 99,1	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	7,9	6,4 ; 9,3	5,5*	3,8 ; 7,3	10,0	7,9 ; 12,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	22,6*	15,0 ; 30,9	77,4	69,1 ; 85,0
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,593			
15-35 ans	25,6	74,4	21,9*	13,8 ; 30,7	78,1	69,3 ; 86,2
36-49 ans	10,5*	89,5	28,0**	4,4 ; 55,1	72,0*	44,9 ; 95,6
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,086			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	44,5**	9,9 ; 77,0	55,5**	23,0 ; 90,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	29,9**	13,8 ; 48,6	70,1	51,4 ; 86,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	20,6**	8,0 ; 33,7	79,4	66,3 ; 92,0
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	x	;	x	;
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	23,9*	15,9 ; 32,5	76,1	67,5 ; 84,1
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Estrie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	72,3	68,8 ; 75,5	17,1	14,5 ; 20,0	10,6	8,4 ; 13,0
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	69,2	56,8 ; 79,8	5,4**	0,7 ; 11,5	25,3*	15,0 ; 36,4
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	82,7	77,6 ; 87,0	8,9*	5,7 ; 12,8	8,4*	5,1 ; 12,4
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	65,8	60,8 ; 70,3	25,9	21,7 ; 30,5	8,3*	5,8 ; 11,1
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,019					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	62,5	54,0 ; 69,7	25,1	18,4 ; 32,7	12,4*	7,7 ; 18,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	70,0	62,9 ; 76,8	16,7*	11,6 ; 22,4	13,3*	8,1 ; 19,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	77,0	70,9 ; 82,7	13,4*	9,2 ; 18,0	9,6*	5,6 ; 14,1
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	78,6	72,4 ; 84,4	15,0*	9,8 ; 20,5	6,4**	3,1 ; 10,2
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,965					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	72,6	69,1 ; 75,9	16,8	14,2 ; 19,6	10,6	8,3 ; 13,1
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	74,0*	24,3 ; 100,0	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	72,7	51,0 ; 90,6	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 06  
**MONTREAL**

---



## 1

## CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population		49,4	50,6			48,6	48,6 ; 48,6	51,4	51,4 ; 51,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	15,2	15,1 ; 15,2	15,5	15,4 ; 15,6	14,8	14,8 ; 14,9
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	37,5	37,5 ; 37,6	39,7	39,7 ; 39,8	35,5	35,4 ; 35,5
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	30,5	30,5 ; 30,5	30,4	30,3 ; 30,4	30,6	30,6 ; 30,7
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	16,8	16,8 ; 16,8	14,4	14,3 ; 14,4	19,1	19,0 ; 19,1
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	13,4	10,7	16,0	17,6	16,3 ; 19,2	14,4	12,6 ; 16,7	20,6	18,7 ; 22,8
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	22,5	20,6 ; 24,5	26,0	23,2 ; 29,1	19,2	16,7 ; 21,5
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	39,9	37,4 ; 42,3	43,3	39,4 ; 46,9	36,7	33,2 ; 40,2
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	10,7	9,1 ; 12,3	6,6	4,8 ; 8,8	14,5	12,2 ; 17,0
Autre	6,7	6,5	6,9	9,3	7,6 ; 11,0	9,6	7,2 ; 12,1	9,0	6,7 ; 11,4
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,256			P = 0,239					
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	67,6	65,0 ; 70,1	65,3	61,3 ; 69,1	69,8	66,6 ; 72,9
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	7,8	6,2 ; 9,3	8,5	6,3 ; 11,0	7,1	5,1 ; 9,1
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	24,6	22,3 ; 26,9	26,2	22,5 ; 29,9	23,1	20,2 ; 26,1
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,912			P = 0,483					
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	64,2	61,9 ; 66,6	62,9	59,5 ; 66,9	65,4	62,0 ; 68,8
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	24,2	22,0 ; 26,5	25,7	22,0 ; 29,1	22,9	19,8 ; 25,9
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	11,6	9,8 ; 13,4	11,4	8,9 ; 14,1	11,8	9,3 ; 14,3
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,683			P = 0,435					
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	19,1	17,2 ; 20,9	18,6	15,5 ; 21,5	19,5	17,1 ; 21,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	20,0	17,9 ; 22,0	21,0	17,8 ; 24,3	19,0	16,3 ; 21,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	24,8	22,5 ; 27,1	23,2	19,8 ; 26,5	26,3	23,2 ; 29,6
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	36,2	33,9 ; 38,5	37,2	33,6 ; 40,8	35,2	32,1 ; 38,3
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	26,7	24,3 ; 28,9	22,9	19,4 ; 26,4	30,3	27,1 ; 33,6
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	22,0	19,7 ; 24,3	21,0	17,5 ; 24,4	22,9	19,9 ; 26,1
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	17,4	15,5 ; 19,5	19,6	16,6 ; 22,9	15,4	12,8 ; 18,0
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	17,8	15,8 ; 20,0	16,7	13,8 ; 19,8	18,9	16,0 ; 21,9
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	16,1	14,2 ; 18,1	19,7	16,6 ; 23,1	12,6	10,2 ; 15,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,114					
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	38,4	35,8 ; 40,9	41,1	37,0 ; 45,2	35,8	32,1 ; 39,2
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	48,4	45,8 ; 51,0	45,2	41,2 ; 49,0	51,4	47,9 ; 55,0
Pauvre	9,4	8,9	9,9	11,3	9,5 ; 13,1	11,4	8,9 ; 14,1	11,1	9,0 ; 13,3
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	2,0*	1,4 ; 2,8	2,3*	1,2 ; 3,6	1,7**	0,9 ; 2,6
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	58,0	55,9 ; 60,0	62,3	59,3 ; 65,4	53,9	51,1 ; 56,6
Étudiants	13,1	13,0	13,2	16,1	14,6 ; 17,8	16,9	14,6 ; 19,2	15,5	13,4 ; 17,6
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	8,2	6,8 ; 9,7	5,1*	3,3 ; 7,1	11,1	9,0 ; 13,4
Retraités	19,6	18,0	21,1	17,7	16,7 ; 18,7	15,7	14,2 ; 17,2	19,5	18,1 ; 21,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	55,2	52,6 ; 57,7	32,7	30,4 ; 35,1	12,1	10,5 ; 13,8
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,061					
Hommes	56,6	33,5	9,9	57,9	54,1 ; 61,9	31,9	28,2 ; 35,5	10,2	8,1 ; 12,7
Femmes	55,5	32,8	11,7	52,6	49,1 ; 56,0	33,5	30,1 ; 36,9	13,8	11,4 ; 16,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	58,0	49,7 ; 66,5	32,1	24,2 ; 39,9	9,9*	5,1 ; 15,2
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	63,8	59,2 ; 67,9	30,1	26,0 ; 34,3	6,2*	4,2 ; 8,6
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	53,1	48,9 ; 57,4	30,8	27,0 ; 34,8	16,1	13,1 ; 19,3
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	35,3	30,0 ; 40,7	43,9	38,4 ; 49,5	20,7	16,1 ; 25,4
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,010					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	49,6	45,5 ; 53,8	32,8	29,1 ; 36,7	17,6	14,7 ; 20,8
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	57,8	52,5 ; 62,7	30,7	26,2 ; 35,7	11,6	8,1 ; 15,2
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	58,5	53,7 ; 63,3	33,2	28,8 ; 37,7	8,4*	5,6 ; 11,2
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	56,5	48,2 ; 64,5	28,0	21,0 ; 35,3	15,5*	9,6 ; 22,1
Autre	46,0	39,4	14,6	47,2	36,5 ; 57,4	37,9	27,5 ; 48,2	15,0*	8,4 ; 22,2
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	33,0	27,4 ; 38,9	41,8	35,5 ; 48,3	25,2	19,8 ; 30,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	54,3	48,5 ; 60,2	33,9	28,3 ; 39,5	11,9*	8,6 ; 15,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	58,7	53,5 ; 64,0	30,4	25,5 ; 35,3	10,9*	7,4 ; 14,6
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	65,0	60,8 ; 68,9	28,6	24,9 ; 32,7	6,4*	4,4 ; 8,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	38,9	33,6 ; 44,1	42,1	37 ; 47,5	19,1	15,4 ; 23,1
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	62,1	59,0 ; 65,1	28,5	25,6 ; 31,3	9,4	7,6 ; 11,3
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	39,8	32,0 ; 46,9	36,5	29,8 ; 43,7	23,6	18,0 ; 29,6
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	58,0	55,3 ; 60,7	32,0	29,4 ; 34,5	10,1	8,3 ; 11,8
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	61,1	57,8 ; 64,5	30,2	27,1 ; 33,4	8,6	6,9 ; 10,5
Étudiants	62,7	32,2	5,0	62,9	55,2 ; 70,8	29,9	22,5 ; 37,3	7,2**	3,1 ; 11,9
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	34,7	25,8 ; 43,7	38,5	28,9 ; 48,3	26,8*	18,4 ; 35,7
Retraités	40,2	39,5	20,4	37,5	32,4 ; 42,5	41,3	36,2 ; 46,6	21,2	17,1 ; 26,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	55,2	52,6 ; 57,7	32,7	30,4 ; 35,1	12,1	10,5 ; 13,8
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,024					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	49,5	44,1 ; 55,0	35,0	29,7 ; 40,3	15,4	11,7 ; 19,4
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	57,1	54,3 ; 60,0	31,9	29,3 ; 34,8	11,0	9,2 ; 12,9
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	66,1	51,0 ; 80,3	24,2**	12,1 ; 38,1	9,7**	1,0 ; 20,5
Poids normal	62,6	29,4	8,0	61,9	58,2 ; 65,7	29,7	26,1 ; 33,1	8,4	6,5 ; 10,6
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	47,3	43,4 ; 51,1	37,6	33,9 ; 41,3	15,2	12,6 ; 17,9
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	64,5	60,7 ; 68,4	28,1	24,4 ; 31,9	7,4	5,4 ; 9,6
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	51,3	47,5 ; 55,1	36,7	33,0 ; 40,5	12,0	9,7 ; 14,6
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	35,6	26,2 ; 44,9	31,1	23,0 ; 40,0	33,3	24,8 ; 42,0
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	36,9	31,5 ; 42,4	37,6	32,5 ; 43,1	25,5	20,9 ; 30,3
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	62,1	59,0 ; 65,0	30,7	27,9 ; 33,5	7,2	5,7 ; 8,8

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	43,0	40,4 ; 45,6	48,3	45,7 ; 50,9	8,7	7,2 ; 10,3
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,708		
Hommes	47,5	46,6	6,0	42,2	38,2 ; 46,2	49,4	45,4 ; 53,3	8,4	6,2 ; 10,8
Femmes	47,1	45,9	7,0	43,8	40,4 ; 47,2	47,2	43,8 ; 50,7	9,0	7,0 ; 11,1
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,000		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	57,6	49,5 ; 65,5	37,1	29,3 ; 44,8	5,3**	1,6 ; 9,7
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	38,3	33,9 ; 42,9	52,0	47,5 ; 56,6	9,7*	7,0 ; 12,7
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	39,2	34,8 ; 43,6	49,7	45,5 ; 54,1	11,1	8,4 ; 14,0
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	47,9	42,0 ; 53,5	47,2	41,5 ; 53,1	4,9*	2,9 ; 7,2
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,002		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	33,8	30,0 ; 37,6	52,8	48,8 ; 56,7	13,5	10,7 ; 16,2
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	50,1	44,6 ; 55,1	44,3	39,1 ; 49,5	5,7*	3,1 ; 8,6
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	45,3	40,6 ; 50,0	47,2	42,5 ; 51,7	7,5*	5,0 ; 10,3
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	34,2	26,6 ; 42,0	56,2	48,0 ; 64,4	9,6*	5,1 ; 14,5
Autre	44,5	46,1	9,4*	44,0	33,6 ; 54,6	44,0	34,2 ; 54,3	12,0**	4,8 ; 20,4
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,298		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	47,6	41,1 ; 53,9	44,7	38,5 ; 51,2	7,7*	4,8 ; 11,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	45,7	39,6 ; 51,5	47,6	41,5 ; 53,7	6,7*	4,0 ; 9,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	41,9	36,6 ; 47,5	47,5	41,6 ; 52,9	10,6*	7,2 ; 14,2
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	40,1	35,7 ; 44,2	50,9	46,6 ; 55,3	9,1	6,6 ; 11,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	34,1	29,3 ; 39,1	51,6	46,6 ; 56,7	14,3	10,7 ; 18,1
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	46,7	43,7 ; 49,9	46,4	43,2 ; 49,5	6,9	5,3 ; 8,7
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	24,4	17,5 ; 31,0	51,1	43,7 ; 58,5	24,5	18,2 ; 31,2
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	46,2	43,3 ; 49	47,9	45,2 ; 50,7	6,0	4,7 ; 7,4
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,003		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	41,4	38,0 ; 44,9	48,9	45,3 ; 52,2	9,8	7,6 ; 12,2
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	51,3	43,2 ; 58,9	42,9	35,3 ; 50,8	5,8**	2,6 ; 9,3
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	29,9*	20,8 ; 39,2	56,7	47,7 ; 66,3	13,4*	7,3 ; 20,2
Retraités	51,9	42,8	5,3	47,4	42,0 ; 52,6	47,0	41,7 ; 52,5	5,6*	3,6 ; 7,9
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	50	46,4 ; 53,6	44,5	40,8 ; 47,9	5,6*	3,8 ; 7,5
Bon	40,5	52,6	6,9	37,2	32,8 ; 41,7	54,5	49,7 ; 59,3	8,3*	5,8 ; 11,1
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	26,9	20,3 ; 33,9	48,7	41,1 ; 56,1	24,4	18,4 ; 30,7
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	22,4	18 ; 27,3	57,2	51,7 ; 63	20,4	16 ; 25
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	49,4	46,3 ; 52,6	45,6	42,6 ; 48,7	4,9	3,6 ; 6,5
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,030		
Oui	21,3	49,3	29,4	32,5**	15,8 ; 51,2	44,9*	23,9 ; 63,8	22,6**	11 ; 38,3
Non	48,1	46,1	5,8	43,5	40,8 ; 46,1	48,3	45,7 ; 50,9	8,2	6,7 ; 9,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	24,5	22,3 ; 26,9	75,5	73,1 ; 77,7
Sexe	P = 0,000		P = 0,007			
Hommes	18,2	81,8	21,2	18,0 ; 24,7	78,8	75,3 ; 82,0
Femmes	26,0	74,0	27,7	24,5 ; 30,9	72,3	69,1 ; 75,5
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,021			
15-24 ans	24,4	75,6	23,5	17,2 ; 30,3	76,5	69,7 ; 82,8
25-44 ans	24,3	75,7	28,8	24,6 ; 32,9	71,2	67,1 ; 75,4
45-64 ans	20,6	79,4	22,2	18,9 ; 25,7	77,8	74,3 ; 81,1
65 ans et plus	18,8	81,2	19,5	15,1 ; 24,4	80,5	75,6 ; 84,9
Composition du ménage	P = 0,000		P = 0,000			
Personne seule	25,7	74,3	27,3	23,7 ; 31,0	72,7	69,0 ; 76,3
Couple sans enfant	17,7	82,3	18,7	14,6 ; 23,2	81,3	76,8 ; 85,4
Couple avec enfants	20,8	79,2	21,6	17,6 ; 25,8	78,4	74,2 ; 82,4
Famille monoparentale	32,2	67,8	35,1	27,3 ; 43,0	64,9	57,0 ; 72,7
Autre	29,7	70,3	34,3	24,6 ; 44,7	65,7	55,3 ; 75,4
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,021			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	31,6	26,3 ; 37,5	68,4	62,5 ; 73,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	20,9	16,4 ; 25,6	79,1	74,4 ; 83,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	25,5	21,1 ; 30,4	74,5	69,6 ; 78,9
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	22,6	19,0 ; 26,5	77,4	73,5 ; 81,0
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	38,1	33,1 ; 43,2	61,9	56,8 ; 66,9
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	20,0	17,4 ; 22,6	80,0	77,4 ; 82,6
Perception de sa situation financière	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	46,7	39,4 ; 54,3	53,3	45,7 ; 60,6
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	21,0	18,7 ; 23,4	79,0	76,6 ; 81,3
Occupation principale	P = 0,000		P = 0,000			
Travailleurs	20,9	79,1	22,9	20,0 ; 25,8	77,1	74,2 ; 80,0
Étudiants	24,8	75,2	24,2	17,6 ; 31,2	75,8	68,8 ; 82,4
Personnes sans emploi	37,9	62,1	46,5	36,6 ; 56,4	53,5	43,6 ; 63,4
Retraités	18,2	81,8	20,2	15,8 ; 24,8	79,8	75,2 ; 84,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	16,2	13,5 ; 19,1	83,8	80,9 ; 86,5
Bon	26,6	73,4	28,5	24,5 ; 33,1	71,5	66,9 ; 75,5
Passable ou mauvais	48,8	51,2	53,5	46,0 ; 61,1	46,5	38,9 ; 54,0
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	12,8	10,1 ; 15,9	87,2	84,1 ; 89,9
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	28,9	25,5 ; 32,4	71,1	67,6 ; 74,5
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	57,2	47,9 ; 66,6	42,8	33,4 ; 52,1
Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	71,2	52,9 ; 87,1	28,8**	12,9 ; 47,1
Non	20,6	79,4	23,1	20,8 ; 25,4	76,9	74,6 ; 79,2
Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	24,2	21,9 ; 26,6	75,8	73,4 ; 78,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,3*	1,5 ; 3,3	2,8**	1,5 ; 4,5	1,9**	0,9 ; 3,0
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,770		P = 0,639		P = 0,735	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	2,8**	0,4 ; 5,9	5,1**	0,4 ; 11,4	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,4**	0,9 ; 4,2	2,8**	0,5 ; 5,9	2,0**	0,5 ; 4,0
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,5**	1,2 ; 4,2	2,9**	1,2 ; 5,3	2,2**	0,3 ; 4,7
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,2**	0,1 ; 2,6	x	;	2,0**	0,2 ; 4,3
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,220		P = 0,112		P = 0,319	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	3,6*	2,2 ; 5,1	6,0*	3,1 ; 9,4	1,9**	0,7 ; 3,5
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	1,8**	0,4 ; 3,5	x	;	x	;
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,2**	0,1 ; 2,6	x	;	x	;
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	4,7**	1,3 ; 8,7	x	;	4,5**	0,6 ; 9,3
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,837		P = 0,475		P = 0,645	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	3,1**	0,9 ; 5,8	5,2**	0,7 ; 10,7	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,0**	0,6 ; 3,9	3,1**	0,5 ; 6,5	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	1,9**	0,6 ; 3,7	1,5**	0,2 ; 3,1	x	;
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	2,4**	1,0 ; 4,2	2,5**	0,3 ; 5,6	2,4**	0,8 ; 4,4
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,932		P = 0,892		P = 0,907	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	2,4**	1,2 ; 3,8	3,0**	1,0 ; 5,6	2,0**	0,6 ; 3,8
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	2,3**	1,2 ; 3,6	2,8**	1,1 ; 4,8	1,9**	0,7 ; 3,4
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,007		P = 0,043		P = 0,087	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	5,3**	2,8 ; 8,3	6,5**	2,4 ; 12,0	4,1**	1,2 ; 7,9
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,9**	1,0 ; 3,0	2,3**	0,8 ; 4,2	1,6**	0,6 ; 2,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,105		P = 0,074		P = 0,300	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	1,7**	0,9 ; 2,7	2,0**	0,7 ; 3,5	1,4**	0,4 ; 2,7
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	4,1**	1,0 ; 8,2	6,9**	0,8 ; 14,5	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	4,8**	1,0 ; 10,2	x	;	5,1**	0,1 ; 12,1
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,1**	0,2 ; 2,3	x	;	1,7**	0,1 ; 3,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,123		P = 0,034	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,8**	0,8 ; 3,1	2,2**	0,5 ; 4,4	1,5**	0,4 ; 2,8
Bon	2,5	2,7	2,4	1,6**	0,5 ; 3,1	2,5**	0,2 ; 5,3	0,8**	0,0 ; 2,0
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	6,8**	3,4 ; 11,0	7,9**	3,3 ; 13,7	6,0**	1,4 ; 12,0
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030		P = 0,202		P = 0,155	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	1,6**	0,7 ; 2,8	2,1**	0,4 ; 4,2	1,2**	0,2 ; 2,6
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,0**	0,9 ; 3,5	2,8**	0,6 ; 5,6	1,3**	0,4 ; 2,5
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	5,8**	2,8 ; 9,5	7,4**	2,7 ; 13,7	4,4**	0,6 ; 9,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,002	
Élevé	7,7	9,0	6,8	6,9*	4,2 ; 10,4	8,9**	3,8 ; 15,6	5,5**	2,4 ; 9,1
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,9**	0,4 ; 1,6	1,3**	0,3 ; 2,5	x	;

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,4**	0,1 ; 0,7	x	;	0,6**	0,1 ; 1,2
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,421		P = 0,102		P = 0,198	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	x	;	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,213		P = .		P = 0,379	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	1,1**	0,2 ; 2,1	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,499		P = 0,149		P = 0,499	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,151		P = .		P = 0,151	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	x	;	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,542		P = 0,002		P = .	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,4**	0,1 ; 0,8	x	;	0,7**	0,2 ; 1,5
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,091		P = 0,029		P = 0,130	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	1,3**	0 ; 2,9	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,036		P = 0,039		P = 0,042	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	1,8**	0,1 ; 4,0	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = .		P = .	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	1,3**	0,3 ; 2,7	x	;	2,3**	0,5 ; 4,7
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,924				
Oui	10,2	10,0	10,3	9,9	8,4 ; 11,6	10,0	7,7 ; 12,7	9,8	7,9 ; 11,9	
Non	89,8	90,0	89,7	90,1	88,4 ; 91,6	90,0	87,3 ; 92,3	90,2	88,1 ; 92,1	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,021				
Oui	4,4	3,5	5,3	4,6	3,6 ; 5,6	3,3*	2,1 ; 4,7	5,8	4,3 ; 7,3	
Non	95,6	96,5	94,7	95,4	94,4 ; 96,4	96,7	95,3 ; 97,9	94,2	92,7 ; 95,7	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	9,6	8,0 ; 11,3	10,8	8,3 ; 13,3	8,5	6,6 ; 10,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,022		P = 0,044		P = 0,485	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	14,6*	9,3 ; 20,7	18,8*	10,6 ; 27,8	10,5**	3,8 ; 18,5
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	10,5	7,6 ; 13,6	11,0*	6,5 ; 15,9	9,9*	6,0 ; 14,0
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	7,9	5,7 ; 10,3	9,4*	5,9 ; 13,6	6,6*	4,0 ; 9,2
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	6,4*	4,0 ; 9,2	4,7**	0,9 ; 9,4	7,5*	4,4 ; 11,1
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,189		P = 0,618		P = 0,082	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	8,5	6,4 ; 10,9	7,2*	3,2 ; 10,7	9,4*	6,6 ; 12,6
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	9,3*	6,3 ; 12,5	8,7*	4,3 ; 13,4	10,2*	5,9 ; 15,2
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	8,5*	5,9 ; 11,3	11,4*	7,0 ; 16,1	5,3**	2,3 ; 8,4
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	10,1*	5,7 ; 15,2	12,3**	3,2 ; 23,3	9,1**	4,1 ; 15,0
Autre	14,9	16,7	13,2*	15,6**	7,3 ; 24,3	14,2**	3,6 ; 26,1	17,0**	5,3 ; 29,5
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,798		P = 0,452		P = 0,904	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	9,2*	5,8 ; 13,0	10,7**	4,9 ; 17,1	7,8**	4,0 ; 12,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	11,1*	7,4 ; 15,2	14,6*	8,5 ; 21,3	7,5**	3,8 ; 11,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	9,5*	6,5 ; 12,7	10,1*	5,2 ; 15,5	9,0*	5,4 ; 12,8
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	8,9*	6,2 ; 11,8	8,4*	4,6 ; 12,7	9,3*	5,7 ; 13,5
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,968		P = 0,284		P = 0,071	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	9,7*	6,6 ; 13,2	7,9**	3,2 ; 13,5	10,9*	7,0 ; 15,4
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	9,6	7,8 ; 11,6	11,9	8,9 ; 15,0	7,1*	5,0 ; 9,5
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,007		P = 0,005		P = 0,652	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	9,0	7,0 ; 11,0	9,8	6,8 ; 12,8	8,1*	5,7 ; 11,0
Étudiants	17,1	21,4	12,9	16,0*	10,1 ; 22,1	20,3*	11,1 ; 29,6	11,6**	4,5 ; 20,0
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	6,7**	2,7 ; 11,6	x	;	8,7**	3,2 ; 15,5
Retraités	7,5	7,0	7,9	7,2*	4,6 ; 10,0	6,9**	2,2 ; 12,1	7,5*	4,6 ; 10,7

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	86,9	80,7 ; 92,3	93,2	85,2 ; 98,9	79,2	69,5 ; 88,1
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	13,1*	7,7 ; 19,3	6,8**	1,1 ; 14,8	20,8*	11,9 ; 30,5
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	25,2*	16,7 ; 33,5	33,9*	20,6 ; 47,2	14,3**	4,8 ; 25,3
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	6,5**	2,7 ; 11,1	5,7**	0,5 ; 12,3	7,5**	1,9 ; 14,3
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	19,0*	12,3 ; 26,8	20,9*	11,9 ; 32,0	16,7**	6,7 ; 28,3
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	8,0**	3,7 ; 12,9	x	;	10,3**	5,0 ; 16,7
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	19,5*	13,2 ; 26,2	22,1*	12,0 ; 32,7	16,3*	8,8 ; 25,3
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	6,2**	2,0 ; 11,4	x	;	10,2**	2,3 ; 20,1
Autre	12,1	8,1	17,6	15,6*	10,3 ; 21,9	8,3**	2,9 ; 15,1	24,7*	14,9 ; 35,2
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	23,1*	16,0 ; 30,9	20,1*	11,0 ; 30,3	26,7*	16,1 ; 38,8
Printemps	21,2	20,7	21,9	26,2*	17,6 ; 35,2	24,3**	12,6 ; 37,6	28,5*	16,3 ; 41,3
Été	29,1	30,3	27,4	28,3	20,0 ; 36,2	36,5*	23,4 ; 49,1	18,4**	9,6 ; 28,5
Automne	23,7	24,0	23,3	22,4*	15,5 ; 30,1	19,1**	9,7 ; 30,0	26,4*	16,0 ; 37,8
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	40,0	31,7 ; 48,9	33,6*	22,4 ; 46,1	47,5	35,2 ; 60,4
Endroit public	28,1	24,8	32,5	33,6	25,2 ; 42,7	28,2*	16,8 ; 40,8	39,9*	28,2 ; 52,7
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	23,9*	15,5 ; 32,5	33,4*	20,0 ; 47,1	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	2,6**	0,3 ; 5,6	4,8**	0,4 ; 10,5	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	5,9**	1,6 ; 11,2	7,0**	0,4 ; 15,1	x	;
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	x	;	x	;	x	;
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	4,8**	1,6 ; 8,5	x	;	5,3**	0,9 ; 10,8
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	9,0**	3,7 ; 15,5	9,2**	2,4 ; 17,7	8,7**	1,0 ; 19,1
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	2,2**	0,2 ; 4,8	x	;	x	;
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	25,0*	17,5 ; 32,8	24,6*	14,9 ; 35,7	25,5*	14,7 ; 36,8
Chute	34,6	30,5	40,3	34,7	26,4 ; 43,1	33,9*	21,1 ; 46,4	35,7*	25,3 ; 47,7
Autres	13,7	12,5	15,3	14,6*	9,0 ; 20,9	12,4**	4,9 ; 21,2	17,2*	8,9 ; 26,5
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	x	;	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	19,2*	11,8 ; 27,4	22,5*	11,7 ; 34,2	15,1**	6,2 ; 25,8
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	41,5	32,7 ; 50,4	46,0	33,2 ; 58,3	36,0*	24,5 ; 48,2
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	x	;	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	21,2*	14,4 ; 28,6	22,2*	12,4 ; 33,0	20,0*	10,4 ; 30,3
Autre	11,9	10,9	13,2	14,7*	9,0 ; 21,0	7,1**	1,8 ; 13,6	24,1*	13,7 ; 35,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	4,6*	2,5 ; 7,2	x	;	5,8**	3,0 ; 9,1
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,321		P = 0,302		P = 0,406	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	3,0**	0,8 ; 5,8	x	;	4,1**	1,0 ; 7,9
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	5,5**	1,8 ; 10,2	x	;	6,1**	1,8 ; 11,0
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,366		P = 0,581		P = 0,331	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	6,4**	3,3 ; 10,1	x	;	7,8**	3,9 ; 12,3
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	3,6**	0,5 ; 7,3	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,085		P = 0,085		P = 0,042	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	9,7**	1,6 ; 20,0	9,7**	;	12,8**	2,4 ; 25,8
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	3,6**	1,5 ; 6,1	3,6**	0,0 ; 8,5	3,7**	1,3 ; 6,4
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,011		P = 0,008		P = 0,124	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	11,0**	3,4 ; 20,4	x	;	9,3**	2,3 ; 17,9
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	2,7**	1,0 ; 4,6	x	;	3,8**	1,3 ; 6,7
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,293		P = .		P = 0,148	
Oui	5,9	3,6*	7,3	5,9**	2,5 ; 10,0	x	;	8,5**	3,7 ; 14,3
Non	2,7*	2,2**	3,1*	3,2**	0,8 ; 6,5	x	;	3,7**	0,6 ; 7,6
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,551		P = .		P = 0,233	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	5,3**	0,4 ; 11,4	x	;	7,9**	0,7 ; 16,8
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	3,6**	1,2 ; 6,3	x	;	3,5**	1,1 ; 6,5
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,899		P = 'n.d.'		P = 0,618	
Résidence	62,7	52,8	68,6	76,7	50,7 ; 95,5	x	;	80,1	53,8 ; 99,1
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	78,9*	41,3 ; 100,0	x	;	70,3**	27,8 ; 100,0
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	x	;	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	41,4**	12,9 ; 68,8	x	;	42,8**	11,4 ; 70,9
Été	29,3*	28,8**	29,5*	30,9**	3,9 ; 58,0	x	;	x	;
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	20,4**	3,5 ; 45,4	x	;	26,9**	5,6 ; 54,4
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	31,9**	8,3 ; 59,0	x	;	43,4**	13,2 ; 70,6
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	45,2**	19,7 ; 73,3	x	;	36,8**	14,7 ; 66,0
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	12,5	10,8 ; 14,1	12,8	10,3 ; 15,4	12,2	9,8 ; 14,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,028		P = 0,034	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	11,6*	6,6 ; 17,5	13,1**	6,1 ; 21,2	10,2**	3,4 ; 18,4
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	15,1	12,1 ; 18,5	15,8*	11,3 ; 20,8	14,5*	10,1 ; 19,1
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	14,9	11,7 ; 18,2	14,2*	9,7 ; 18,9	15,6*	11,0 ; 20,5
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	2,8**	1,3 ; 4,5	x	;	3,9**	1,6 ; 6,6
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,250		P = 0,332		P = 0,219	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	9,6	7,2 ; 12,2	10,8*	6,7 ; 15,5	8,8*	5,7 ; 12,0
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	11,0*	7,8 ; 14,4	13,0*	8,0 ; 18,1	8,5*	4,5 ; 13,0
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	13,5	10,3 ; 17,0	13,9*	9,4 ; 18,9	13,1*	8,5 ; 18,2
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	14,4*	9,2 ; 19,9	5,3**	0,1 ; 11,9	18,4*	11,6 ; 26,0
Autre	11,4	12,8*	10,2*	16,8*	9,1 ; 25,3	18,3**	7,8 ; 30,5	15,2**	4,5 ; 27,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,106		P = 0,092		P = 0,371	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	9,5*	6,0 ; 13,4	10,4**	4,7 ; 16,8	8,6**	4,2 ; 13,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	10,1*	6,8 ; 13,8	8,4**	4,2 ; 13,4	11,8*	6,7 ; 17,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	13,7	10,1 ; 17,5	11,8*	7,1 ; 17,3	15,2*	9,9 ; 20,7
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	14,6	11,5 ; 18,0	17,0	12,1 ; 22,2	12,3*	8,5 ; 16,5
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,166		P = 0,107		P = 0,896	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	10,4	7,6 ; 13,5	8,7**	4,4 ; 13,6	11,6*	7,9 ; 15,7
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	13,1	11,0 ; 15,2	14,2	11,1 ; 17,4	11,9	9,1 ; 14,9
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,312		P = 0,300		P = 0,003	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	14,7*	9,6 ; 20,2	8,5**	2,1 ; 15,8	21,1*	12,9 ; 30,0
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	12,0	10,3 ; 13,8	13,6	10,9 ; 16,7	10,5	8,2 ; 12,9
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,006		P = 0,035		P = 0,091	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	15,2	12,8 ; 17,8	15,9	12,4 ; 19,7	14,5	11,3 ; 18,2
Étudiants	9,9	9,7	10,1	11,1*	6,3 ; 16,4	10,6**	4,2 ; 18,3	11,6**	4,3 ; 19,4
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	12,1**	5,4 ; 19,5	x	;	15,4**	6,4 ; 25,6
Retraités	6,9	6,7	7,0	5,5*	3,3 ; 7,9	6,0**	2,0 ; 10,5	5,1**	2,5 ; 8,1

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,416				
Oui	45,2	47,6	42,8	39,8	32,2 ; 47,7	43,1	32,3 ; 55,3	36,4*	25,9 ; 47,6	
Non	54,8	52,4	57,2	60,2	52,3 ; 67,8	56,9	44,7 ; 67,7	63,6	52,4 ; 74,1	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,877				
Oui	25,4	27,6	23,1	34,4	26,7 ; 42,0	33,8*	23,1 ; 44,6	35,0*	23,4 ; 46,0	
Non	74,6	72,4	76,9	65,6	58,0 ; 73,3	66,2	55,4 ; 76,9	65,0	54,0 ; 76,6	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,162				
Oui	17,6	15,6	19,6	15,8*	10,3 ; 21,5	12,0**	5,5 ; 19,9	19,7*	11,4 ; 28,8	
Non	82,4	84,4	80,4	84,2	78,5 ; 89,7	88,0	80,1 ; 94,5	80,3	71,2 ; 88,6	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,866				
Oui	8,1	7,2	9,0	6,5*	3,5 ; 10,3	6,8**	1,8 ; 12,8	6,2**	2,1 ; 11,1	
Non	91,9	92,8	91,0	93,5	89,7 ; 96,5	93,2	87,2 ; 98,2	93,8	88,9 ; 97,9	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	1,9**	0,2 ; 4,1	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	46,0	38,7 ; 54,1	42,8	31,7 ; 53,3	49,2	38,4 ; 60,2	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	22,8	16,3 ; 29,5	24,8*	15,4 ; 34,8	20,8*	12,0 ; 30,2	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	4,3**	1,5 ; 7,6	x	;	x	;	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	18,1*	12,0 ; 24,3	19,2*	10,5 ; 28,5	16,9*	8,7 ; 26,0	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	7,0**	2,8 ; 12,0	6,2**	1,5 ; 12,1	7,7**	0,7 ; 16,1	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	28,9	26,7 ; 31,4	22,5	19,4 ; 25,8	35,0	31,7 ; 38,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,412		P = 0,002	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	23,0	16,4 ; 30,0	17,9*	9,8 ; 27,9	27,9*	17,7 ; 38,7
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	24,6	20,9 ; 28,4	21,0	15,9 ; 26,5	28,4	23,1 ; 34,2
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	34,8	31,0 ; 38,9	25,8	20,2 ; 31,7	43,3	37,6 ; 49,0
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	33,4	28,2 ; 38,7	24,7*	16,0 ; 33,4	39,6	33,1 ; 46,1
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,078		P = 0,030	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	32,4	28,8 ; 36,4	21,7	16,4 ; 27,6	39,5	34,5 ; 44,4
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	29,2	24,4 ; 33,8	22,8	16,5 ; 29,0	37,4	30,2 ; 44,7
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	24,0	20,0 ; 28,2	19,9	14,8 ; 25,6	28,4	22,1 ; 34,7
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	35,1	27,9 ; 42,7	16,4**	6,1 ; 29,9	43,1	34,5 ; 52,5
Autre	34,0	32,4	35,4	38,7	29,1 ; 48,9	36,7*	23,8 ; 50,8	40,7*	26,0 ; 54,9
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,085		P = 0,020	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	33,2	28,0 ; 39,2	28,2	19,9 ; 36,7	37,7	30,6 ; 45,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	29,7	24,6 ; 35,0	23,4*	15,9 ; 31,4	36,3	29,0 ; 44,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	34,0	29,2 ; 39,5	25,7	18,8 ; 33,2	41,0	34,4 ; 48,3
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	22,8	19,4 ; 26,4	17,2	12,9 ; 22,1	28,4	23,6 ; 33,9
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,016		P = 0,986		P = 0,008	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	33,6	29,1 ; 38,6	23,0*	15,7 ; 30,7	41,3	35,5 ; 47,6
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	27,5	24,9 ; 30,4	22,9	19,3 ; 26,9	32,3	28,5 ; 36,5
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,039		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	43,5	36,5 ; 51,1	30,6*	20,9 ; 41,7	57,0	47,7 ; 66,4
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	26,2	23,8 ; 28,6	20,2	16,8 ; 23,6	31,7	28,4 ; 35,4
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,046		P = 0,096	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	28,0	25,1 ; 31,2	21,3	17,8 ; 25,4	35,4	30,9 ; 40,1
Étudiants	20,7	14,8	26,3	20,1*	14,1 ; 26,9	15,0**	7,5 ; 24,1	25,3*	15,4 ; 35,8
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	35,3	26,4 ; 44,9	33,9**	16,4 ; 55,2	35,9*	25,3 ; 47,2
Retraités	34,2	30,5	37,2	36,5	31,4 ; 41,8	30,3	21,3 ; 38,7	41,3	35,0 ; 47,9
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	21,7	18,9 ; 24,8	17,3	13,4 ; 21,6	26,3	22,2 ; 30,6
Bon	33,9	28,1	39,6	30,7	26,6 ; 35,0	22,4	17,0 ; 28,5	37,9	32,3 ; 44,0
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	54,3	46,6 ; 61,4	44,8	32,7 ; 56,5	60,9	50,6 ; 70,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	42,3	37,3 ; 48,0	33,8	25,6 ; 42,8	48,3	41,8 ; 55,1
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	23,9	21,4 ; 26,5	18,4	15,0 ; 22,1	29,5	25,8 ; 33,4
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,018		P = 0,570		P = 0,003	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	17,9**	8,3 ; 30,7	x	;	17,9**	7,6 ; 31,3
Poids normal	28,3	22,9	32,1	27,5	24,1 ; 31,1	20,6	15,7 ; 25,9	32,5	28,0 ; 37,2
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	28,1	24,1 ; 32,5	21,7	16,8 ; 27,0	38,9	31,8 ; 46,1
Obésité	37,9	30,5	46,1	37,4	31,0 ; 44,7	28,3*	18,9 ; 38,6	47,2	37,5 ; 57,1

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	30,3	25,3	35,2	28,9	26,7 ; 31,4	22,5	19,4 ; 25,8	35,0	31,7 ; 38,2		
Non	69,7	74,7	64,8	71,1	68,6 ; 73,3	77,5	74,2 ; 80,6	65,0	61,8 ; 68,3		
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	9,5	6,4	12,5	7,3	6,2 ; 8,6	4,4*	3,0 ; 6,0	10,1	8,4 ; 12,2		
Non	90,5	93,6	87,5	92,7	91,4 ; 93,8	95,6	94,0 ; 97,0	89,9	87,8 ; 91,6		
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,005					
Oui	14,5	12,2	16,7	14,5	12,8 ; 16,4	11,7	9,3 ; 14,3	17,2	14,4 ; 20,2		
Non	85,5	87,8	83,3	85,5	83,6 ; 87,2	88,3	85,7 ; 90,7	82,8	79,8 ; 85,6		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	13,5	10,8	16,1	10,8	9,2 ; 12,5	7,7	5,7 ; 9,9	13,8	11,6 ; 16,1		
Non	86,5	89,2	83,9	89,2	87,5 ; 90,8	92,3	90,1 ; 94,3	86,2	83,9 ; 88,4		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	14,5	11,8	17,2	14,5	12,7 ; 16,3	10,5	8,3 ; 12,9	18,2	15,6 ; 20,9		
Non	85,5	88,2	82,8	85,5	83,7 ; 87,3	89,5	87,1 ; 91,7	81,8	79,1 ; 84,4		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,001					
Oui	17,8	16,0	19,6	15,5	13,8 ; 17,4	12,3	10,0 ; 14,9	18,5	15,9 ; 21,3		
Non	82,2	84,0	80,4	84,5	82,6 ; 86,2	87,7	85,1 ; 90,0	81,5	78,7 ; 84,1		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	14,2	10,6	17,8	15,8	13,9 ; 17,7	11,7	9,2 ; 14,5	19,6	17,0 ; 22,4		
Non	85,8	89,4	82,2	84,2	82,3 ; 86,1	88,3	85,5 ; 90,8	80,4	77,6 ; 83,0		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	51,7	49,1 ; 54,3	32,7	30,3 ; 35,1	15,6	13,7 ; 17,6
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,039					
Hommes	52,6	34,1	13,3	48,3	44,2 ; 52,1	35,4	31,8 ; 39,3	16,3	13,4 ; 19,5
Femmes	60,1	29,8	10,1	55,0	51,4 ; 58,6	30,2	26,9 ; 33,4	14,9	12,3 ; 17,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,523					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	53,3	45,0 ; 61,3	29,8	22,4 ; 37,6	16,9*	10,3 ; 23,8
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	52,4	47,8 ; 56,9	33,8	29,5 ; 38,0	13,8	10,7 ; 17,2
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	52,0	47,7 ; 56,2	30,6	26,7 ; 34,7	17,4	14,0 ; 21,0
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	47,9	42,2 ; 54,0	37,1	31,5 ; 42,7	15,0	11,1 ; 19,5
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,134					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	52,5	48,3 ; 56,9	32,9	28,9 ; 36,8	14,6	11,9 ; 17,6
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	59,1	53,7 ; 64,2	29,1	24,4 ; 34,2	11,8*	8,3 ; 15,5
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	49,4	44,7 ; 54,0	34,4	29,9 ; 38,9	16,2	12,7 ; 19,8
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	47,2	39,4 ; 55,4	35,1	27,2 ; 43,3	17,7*	11,3 ; 25,2
Autre	48,0	34,3	17,7	46,0	35,1 ; 56,1	33,7	24,0 ; 43,4	20,3*	12,7 ; 28,8
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	57,8	54,7 ; 60,9	29,2	26,3 ; 32,2	13,0	10,9 ; 15,2
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	39,9	28,7 ; 50,7	39,2	29,0 ; 50,7	20,9*	11,9 ; 30,1
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	38,2	33,0 ; 43,6	40,4	35,0 ; 45,7	21,4	16,7 ; 26,1
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	54,3	51,2 ; 57,4	31,9	29,1 ; 34,8	13,8	11,7 ; 16,0
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	56,0	50,0 ; 62,2	27,5	22,2 ; 33,1	16,5	11,7 ; 21,1
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	27,8	20,3 ; 36,0	47,8	39,0 ; 56,1	24,4*	16,9 ; 32,0
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	35,4	29,7 ; 41,1	38,4	32,7 ; 44,7	26,2	20,7 ; 32,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	53,5	47,5 ; 59,6	32,0	26,7 ; 37,5	14,5	10,4 ; 18,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	50,6	45,4 ; 56,1	34,4	29,1 ; 39,6	15,0	10,8 ; 19,1
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	59,4	55,0 ; 63,7	29,0	25,0 ; 33,2	11,6	8,8 ; 14,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	36,0	31,2 ; 40,9	40,1	35,2 ; 45,0	24,0	19,5 ; 28,8
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	57,1	53,9 ; 60,2	30,0	27,1 ; 33,0	12,9	10,8 ; 15,2
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	28,2	22,2 ; 35,2	47,4	39,7 ; 54,9	24,4	17,8 ; 30,9
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	55,5	52,7 ; 58,2	30,3	27,7 ; 33,0	14,2	12,1 ; 16,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,003					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	55,1	51,8 ; 58,6	30,9	27,8 ; 34,1	14,0	11,7 ; 16,4
Étudiants	62,8	27,9	9,3	52,8	45,1 ; 60,3	30,9	24,0 ; 38,3	16,2*	10,2 ; 22,6
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	33,1	24,9 ; 42,2	42,7	33,1 ; 52,1	24,2*	15,5 ; 33,0
Retraités	49,7	38,1	12,2	47,6	42,4 ; 53,0	36,6	31,7 ; 41,9	15,8	11,8 ; 20,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	51,7	49,1 ; 54,3	32,7	30,3 ; 35,1	15,6	13,7 ; 17,6
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	44,4	39,1 ; 49,8	32,2	27,0 ; 37,6	23,4	18,6 ; 28,4
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	53,9	50,9 ; 56,9	32,9	30,2 ; 35,8	13,2	11,2 ; 15,4
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	66,5	63,0 ; 69,7	25,5	22,4 ; 28,6	8,0	6,1 ; 10,1
Bon	41,4	42,6	16,0	33,6	29,7 ; 37,7	43,8	39,1 ; 48,3	22,7	18,5 ; 26,7
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	34,0	27,2 ; 41,0	35,4	28,1 ; 42,4	30,6	23,5 ; 37,9
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	41,4	36,0 ; 46,4	35,4	30,0 ; 40,8	23,3	18,7 ; 28,2
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	55,7	52,6 ; 58,7	31,5	28,7 ; 34,4	12,8	10,6 ; 15,1
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,840					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	53,4	45,7 ; 61,2	32,7	25,6 ; 39,8	13,9*	8,4 ; 20,0
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	51,6	48,9 ; 54,3	32,8	30,2 ; 35,4	15,6	13,5 ; 17,7
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	54,7	51,9 ; 57,6	33,0	30,3 ; 35,7	12,3	10,3 ; 14,3
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	39,1	33,2 ; 45,1	31,6	26,2 ; 37,3	29,3	23,9 ; 34,9
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,001					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	58,0	53,3 ; 62,5	31,0	27,0 ; 35,4	11,0	8,0 ; 14,1
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	48,5	44,9 ; 51,8	33,3	29,9 ; 36,6	18,3	15,6 ; 21,0

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	7,4	6,4 ; 8,4	5,6	4,3 ; 7,1	9,1	7,7 ; 10,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	7,7	5,9 ; 9,9	7,2*	4,5 ; 10,3	8,3*	5,5 ; 11,2
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	31,3	26,4 ; 36,5	25,2*	17,5 ; 34,0	35,5	29,3 ; 42,0
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,056		P = 0,676		P = 0,127	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	28,1	21,8 ; 34,9	23,9*	15,0 ; 34,1	31,5	22,4 ; 41,3
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	32,0	23,4 ; 41,0	25,4**	10,4 ; 43,3	36,3	26,2 ; 46,3
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	51,3*	31,9 ; 70,6	x	;	53,4*	31,3 ; 73,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	22,9	19,0 ; 27,5	12,0*	7,5 ; 17,2	32,6	26,3 ; 39,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	7,5*	5,1 ; 10,2	8,1*	4,5 ; 12,4	6,7*	3,9 ; 10,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	5,3*	3,3 ; 7,6	5,8**	2,4 ; 9,4	4,9**	2,4 ; 7,9
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	0,9**	0,3 ; 1,5	1,1**	0,1 ; 2,3	0,6**	0,0 ; 1,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,004		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	11,7	9,2 ; 14,4	9,7*	5,8 ; 14,2	13,1	10,0 ; 16,7
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	5,1	4,1 ; 6,3	4,1*	2,7 ; 5,6	6,1	4,5 ; 7,9
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,134		P = 0,423		P = 0,007	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	9,3*	6,1 ; 12,6	4,2**	1,0 ; 8,0	14,5*	9,1 ; 20,4
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	6,9	5,9 ; 8,1	5,8	4,3 ; 7,6	8,0	6,5 ; 9,6

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	80,5	78,5 ; 82,6	16,9	14,9 ; 18,9	2,5*	1,7 ; 3,5
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	72,2	68,6 ; 75,8	23,1	19,6 ; 26,3	4,8*	3,1 ; 6,6
Femmes	87,9	11,3	0,7	88,3	86,0 ; 90,6	11,2	8,9 ; 13,4	0,5**	0,1 ; 1,0
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,504					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	85,3	79,1 ; 91,0	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	82,8	79,5 ; 86,1	14,8	11,8 ; 18,0	2,4**	0,9 ; 4,0
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	78,3	74,7 ; 81,9	19,4	16,0 ; 22,8	2,2**	1,1 ; 3,6
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	74,4	69,6 ; 79,3	21,6	16,8 ; 26,2	4,0**	1,9 ; 6,7
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,450					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	79,3	75,9 ; 82,5	17,7	14,7 ; 20,9	2,9*	1,6 ; 4,4
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	79,5	75,0 ; 83,7	18,9	14,8 ; 23,2	1,6**	0,2 ; 3,5
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	81,6	77,8 ; 85,4	16,2	12,5 ; 19,8	2,2**	0,8 ; 3,9
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	84,4	78,2 ; 90,1	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	75,1	65,8 ; 83,5	18,0*	10,8 ; 26,2	6,9**	2,3 ; 13,1
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,693					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	79,3	76,9 ; 81,9	18,0	15,4 ; 20,3	2,7*	1,8 ; 3,8
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	84,3	78,7 ; 89,4	13,8*	8,9 ; 19,0	2,0**	0,1 ; 4,3
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	85,8	79,2 ; 91,7	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	74,5	60,7 ; 87,4	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,019					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	72,1	66,5 ; 77,4	22,4	17,4 ; 27,7	5,4**	2,7 ; 8,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	80,5	75,6 ; 85,0	17,0	12,8 ; 21,7	2,5**	0,9 ; 4,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	83,3	79,3 ; 87,6	14,5	10,5 ; 18,3	2,2**	0,6 ; 4,1
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	82,4	78,9 ; 85,7	16,1	12,9 ; 19,5	1,5**	0,3 ; 2,8
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,006					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	75,9	71,5 ; 80,4	19,6	15,5 ; 23,6	4,5**	2,3 ; 7,2
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	82,4	80,0 ; 84,9	15,9	13,5 ; 18,2	1,7*	0,9 ; 2,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,004					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	74,8	68,4 ; 81,0	19,0	13,7 ; 24,7	6,2**	2,5 ; 10,5
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	81,5	79,3 ; 83,7	16,5	14,3 ; 18,7	2,0*	1,2 ; 2,9
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,274					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	81,7	79,0 ; 84,4	16,5	13,9 ; 19,0	1,8*	1,0 ; 2,8
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	86,2	80,4 ; 91,4	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	69,6	60,5 ; 78,3	25,4*	17,4 ; 34,6	5,0**	0,2 ; 11,0
Retraités	72,9	23,2	3,8	75,3	70,7 ; 79,6	20,4	16,4 ; 24,6	4,3**	2,1 ; 6,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	80,5	78,5 ; 82,6	16,9	14,9 ; 18,9	2,5*	1,7 ; 3,5
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,027					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	75,5	70,5 ; 80,0	20,4	15,9 ; 25,0	4,1*	2,2 ; 6,4
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	82,0	79,7 ; 84,3	16,0	13,7 ; 18,1	2,1*	1,2 ; 3,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,002					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	83,7	81,2 ; 86,4	15,2	12,6 ; 17,7	1,1**	0,4 ; 2,0
Bon	75,1	21,2	3,6	77,8	74,0 ; 81,8	17,7	14,3 ; 21,3	4,4*	2,5 ; 6,7
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	73,4	66,9 ; 79,4	22,5	16,8 ; 28,8	4,1**	1,2 ; 7,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,072					
Élevé	77,2	19,2	3,6	79,5	74,7 ; 83,8	16,2	12,1 ; 20,5	4,3**	2,0 ; 7,1
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	81,4	78,9 ; 83,8	16,8	14,5 ; 19,1	1,8*	1,1 ; 2,7
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,003					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	69,0	61,7 ; 76,0	25,4	18,6 ; 32,1	5,6**	2,0 ; 10,1
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	81,4	79,3 ; 83,6	16,3	14,2 ; 18,3	2,3*	1,5 ; 3,2
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,195					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	89,4	86,4 ; 92,2	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	76,7	73,5 ; 79,7	20,0	17,0 ; 22,9	3,3*	2,1 ; 4,7

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	80,5	78,5 ; 82,6	72,2	68,6 ; 75,8	88,3	86,0 ; 90,6
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	16,9	14,9 ; 18,9	23,1	19,6 ; 26,3	11,2	8,9 ; 13,4
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	2,5*	1,7 ; 3,5	4,8*	3,1 ; 6,6	0,5**	0,1 ; 1,0
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,201					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	69,0	61,7 ; 76,0	56,3	43,0 ; 68,2	76,4	67,7 ; 84,7
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	25,4	18,6 ; 32,1	33,1*	21,3 ; 46,1	x	;
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	5,6**	2,0 ; 10,1	10,6**	2,3 ; 20,6	x	;
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	81,4	79,3 ; 83,6	73,2	69,4 ; 77,0	89,5	87,1 ; 91,8
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	16,3	14,2 ; 18,3	22,4	18,9 ; 25,9	x	;
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	2,3*	1,5 ; 3,2	4,4*	2,7 ; 6,3	x	;

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	36,6	34,1 ; 39,2	16,3	14,3 ; 18,5	47,0	44,4 ; 49,7
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	27,7	24,2 ; 31,5	15,4	12,4 ; 18,7	56,9	52,8 ; 61,0
Femmes	41,7	18,2	40,1	45,3	41,7 ; 48,8	17,2	14,4 ; 20,0	37,4	33,9 ; 40,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	29,5	22,3 ; 37,3	11,5*	6,6 ; 16,7	59,0	51,1 ; 66,6
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	33,2	29,2 ; 37,4	19,5	15,7 ; 23,3	47,3	42,9 ; 51,9
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	43,4	39,1 ; 47,8	17,2	13,8 ; 20,9	39,4	35,4 ; 43,5
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	40,9	34,1 ; 47,9	9,8*	5,5 ; 14,5	49,3	42,2 ; 56,3
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,019					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	33,8	26,9 ; 41,2	9,8*	5,7 ; 14,5	56,3	49,0 ; 63,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	35,6	29,6 ; 41,5	13,7*	9,3 ; 18,4	50,7	44,1 ; 57,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	36,5	31,0 ; 41,8	18,1	14,0 ; 22,5	45,3	39,8 ; 51,1
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	38,3	34,2 ; 42,4	19,0	15,5 ; 22,6	42,6	38,2 ; 47,1
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,005					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	33,1	28,2 ; 38,4	12,1*	8,4 ; 15,9	54,8	49,3 ; 60,4
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	37,5	34,5 ; 40,7	18,1	15,5 ; 20,8	44,4	41,2 ; 47,6
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,009					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	36,8	33,5 ; 40,2	19,0	16,2 ; 21,8	44,3	40,9 ; 47,8
Étudiants	28,8	16,3	54,9	30,6	23,1 ; 37,9	13,2*	7,8 ; 19,2	56,2	48,1 ; 63,9
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	42,7	32,1 ; 52,8	11,4**	5,0 ; 18,5	45,9	35,8 ; 56,5
Retraités	38,0	12,4	49,6	42,1	35,5 ; 48,4	10,1*	6,3 ; 14,4	47,8	41,4 ; 54,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
3,5*	2,5 ; 4,8	49,8	47,3 ; 52,5	32,8	30,4 ; 35,1	13,8	12,1 ; 15,6	Ensemble de la population	
P = 0,000									
1,8**	0,5 ; 3,2	42,4	38,7 ; 46,4	41,3	37,4 ; 45,3	14,5	11,8 ; 17,3	Sexe	
5,3*	3,7 ; 7,2	57,1	53,7 ; 60,5	24,4	21,4 ; 27,3	13,2	11,0 ; 15,6	Hommes	
P = 0,141									
x	;	68,3	52,3 ; 83,0	16,4**	5,0 ; 29,4	x	;	Femmes	
9,1**	2,9 ; 16,2	68,3	58,7 ; 77,2	13,7*	7,6 ; 20,9	9,0**	3,3 ; 15,4	Groupe d'âge	
P = 0,000									
10,3**	4,9 ; 16,1	68,3	60,1 ; 76,2	14,5*	8,9 ; 20,9	7,0**	2,9 ; 11,9	15-17 ans	
3,5*	2,1 ; 5,3	52,7	48,3 ; 57,0	32,8	28,5 ; 36,8	11,1	8,3 ; 13,9	18-24 ans	
1,4**	0,5 ; 2,4	40,2	36,2 ; 44,4	40,0	35,5 ; 44,3	18,5	15,1 ; 22,2	15-24 ans	
1,5**	0,2 ; 3,1	44,0	38,5 ; 49,8	36,6	31,0 ; 42,0	17,9	13,9 ; 22,2	25-44 ans	
P = 0,695									
x	;	70,5	47,4 ; 90,8	x	;	x	;	45-64 ans	
x	;	68,9	54,7 ; 82,0	17,4**	8,0 ; 29,1	x	;	65 ans et plus	
P = 0,062									
7,9**	0,9 ; 16,2	69,4	57,6 ; 80,0	15,4**	8,1 ; 24,7	7,3**	1,8 ; 14,1	Hommes	
x	;	42,7	36,3 ; 49,5	43,4	36,7 ; 50,0	x	;	15-17 ans	
x	;	30,6	25,4 ; 36,5	48,8	41,8 ; 55,6	x	;	25-44 ans	
x	;	37,5	28,4 ; 47,4	48,0	37,6 ; 57,7	x	;	45-64 ans	
P = 0,265									
x	;	65,7*	41,4 ; 87,9	x	;	x	;	65 ans et plus	
12,8**	2,9 ; 24,2	67,7	53,6 ; 80,9	10,2**	2,6 ; 19,5	9,3**	0,9 ; 19,3	Femmes	
P = 0,000									
12,6**	4,7 ; 21,9	67,1	55,4 ; 78,7	13,5**	5,9 ; 22,2	6,7**	0,7 ; 14,0	15-17 ans	
6,6*	3,9 ; 10,0	64,2	58,0 ; 70,0	20,6	15,8 ; 25,6	8,7*	5,2 ; 12,5	18-24 ans	
2,0**	0,6 ; 3,7	49,3	43,4 ; 55,4	31,4	25,5 ; 36,8	17,3	13,0 ; 21,7	25-44 ans	
2,5**	0,4 ; 5,2	48,6	41,9 ; 55,2	28,6	22,7 ; 35,1	20,3	15,1 ; 25,8	45-64 ans	
P = 0,005									
4,6**	1,6 ; 7,9	44,1	38,1 ; 50,4	34,2	28,5 ; 39,7	17,1	13,0 ; 21,7	65 ans et plus	
1,7**	0,3 ; 3,5	46,2	40,1 ; 52,1	34,8	28,8 ; 40,9	17,3	12,9 ; 22,2	Niveau de scolarité	
4,7**	2,0 ; 8,0	47,4	42,1 ; 53,0	31,3	26,3 ; 36,3	16,6	12,5 ; 20,9	Niveau inférieur au DES	
3,3*	1,9 ; 5,0	55,7	51,4 ; 60,0	32,4	28,4 ; 36,6	8,6	6,5 ; 11,0	Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 0,913									
x	;	40,5	31,2 ; 50,0	43,2	34,0 ; 53,0	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
x	;	44,5	35,8 ; 53,3	34,9	26,4 ; 43,7	x	;	Diplôme d'études universitaires	
x	;	40,7	32,1 ; 49,2	40,5	31,9 ; 49,2	x	;	Hommes	
x	;	42,9	36,6 ; 49,4	44,8	38,1 ; 51,2	x	;	Niveau inférieur au DES	
P = 0,001									
6,3**	1,9 ; 11,5	47,6	39,6 ; 55,6	25,7	19,2 ; 32,4	20,4*	14,6 ; 26,9	Diplôme d'études secondaires (DES)	
2,5**	0,4 ; 5,3	48,0	39,3 ; 56,0	34,6	26,4 ; 43,0	14,8*	9,1 ; 21,0	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
5,9**	2,2 ; 10,4	53,3	46,3 ; 60,6	23,2	17,1 ; 29,4	17,6*	11,9 ; 23,3	Diplôme d'études universitaires	
6,0*	3,4 ; 9,3	68,8	63,2 ; 74,1	19,7	15,4 ; 24,4	5,5*	3,2 ; 8,1	Indice du niveau de revenu du ménage	
P = 0,390									
2,4**	0,8 ; 4,3	51,1	45,9 ; 56,3	31,2	26,8 ; 35,8	15,3	11,8 ; 18,8	Quintile 1 (faible)	
4,1*	2,7 ; 5,6	49,4	46,3 ; 52,7	33,4	30,3 ; 36,4	13,1	10,9 ; 15,3	Quintile 2 et suivants	
P = 0,579									
x	;	45,7	36,9 ; 54,3	42,4	34,0 ; 51,2	x	;	Hommes	
2,4**	0,7 ; 4,3	41,6	37,2 ; 46,2	41,0	36,4 ; 45,9	15,0	11,8 ; 18,4	Quintile 1 (faible)	
P = 0,109									
4,2**	1,4 ; 7,4	55,2	49,0 ; 61,6	22,9	18,3 ; 27,8	17,8	13,2 ; 22,3	Quintile 2 et suivants	
5,9*	3,9 ; 8,5	58,1	53,9 ; 62,6	24,9	21,1 ; 28,8	11,0	8,2 ; 13,9	Femmes	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	37,8	35,3 ; 40,1	4,1	3,0 ; 5,2	58,1	55,6 ; 60,6
Sexe	P = 0,000			P = 0,123					
Hommes	36,6	3,6	59,9	37,0	33,3 ; 40,5	5,2*	3,4 ; 7,2	57,8	54,1 ; 61,7
Femmes	40,5	2,3	57,1	38,5	35,3 ; 41,8	3,0*	1,9 ; 4,3	58,4	54,9 ; 61,7
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	18,7*	12,7 ; 25,1	7,8**	3,2 ; 12,8	73,4	65,8 ; 80,6
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	33,5	29,1 ; 37,5	5,1*	3,1 ; 7,4	61,4	56,7 ; 66,0
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	51,3	47,1 ; 55,5	1,5**	0,7 ; 2,6	47,2	43,1 ; 51,5
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	39,7	34,3 ; 45,0	3,2**	1,6 ; 5,1	57,1	51,9 ; 62,5
Hommes	P = 0,000			P = 0,005					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	17,4*	9,1 ; 26,4	13,7**	4,7 ; 23,5	68,8	57,1 ; 80,2
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	33,6	27,5 ; 39,5	5,7**	2,7 ; 9,2	60,7	54,2 ; 67,4
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	50,0	43,1 ; 56,2	2,3**	0,7 ; 4,1	47,8	41,6 ; 54,6
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	40,0	30,1 ; 49,7	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,028					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	20,0*	10,4 ; 29,8	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	33,3	27,7 ; 38,8	4,4**	1,8 ; 7,6	62,3	56,0 ; 68,2
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	52,5	46,7 ; 58,2	0,8**	0,1 ; 1,8	46,6	41,0 ; 52,4
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	39,5	33,0 ; 46,1	4,9**	2,3 ; 8,0	55,7	49,0 ; 62,1
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	36,5*	20,1 ; 52,3	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	11,7	9,5 ; 14,2	4,7**	3,0 ; 6,5	83,6	80,8 ; 86,3
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	58,3	53,7 ; 62,8	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	91,2	86,4 ; 95,7	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,021					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	81,4*	40,6 ; 100,0	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	5,7*	3,1 ; 8,5	7,4*	4,1 ; 11,2	86,9	82,4 ; 90,9
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	53,1	46,7 ; 58,8	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	87,7	79,2 ; 95,6	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	21,9**	9,9 ; 37,1	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	16,1	12,7 ; 19,7	2,7**	1,2 ; 4,5	81,2	77,4 ; 84,9
Embonpoint	69,6	x	x	67,1	60,2 ; 73,7	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	94,9	90,3 ; 98,6	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	72,9	69,0 ; 77,0	14,1	11,1 ; 17,5	13,0	9,9 ; 16,1
Sexe	P = 0,000			P = 0,241					
Hommes	81,4	10,5	8,0	74,3	67,9 ; 81,0	15,6*	10,2 ; 21,1	10,1*	5,7 ; 14,9
Femmes	74,5	14,1	11,5	71,8	66,8 ; 76,9	13,0	9,4 ; 16,7	15,2	11,0 ; 19,4
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,472					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	73,7	59,4 ; 87,0	16,9**	5,1 ; 29,4	9,4**	1,9 ; 19,4
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	74,3	67,3 ; 80,7	13,1*	8,3 ; 18,4	12,6*	7,5 ; 18,0
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	68,0	61,4 ; 74,5	13,4*	8,8 ; 18,6	18,5*	13,1 ; 24,5
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	81,7	73,6 ; 89,8	x	;	x	;
Hommes	P = 0,252			P = 0,950					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	74,2	51,0 ; 96,2	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	77,7	67,5 ; 87,7	12,2**	4,3 ; 21,6	10,1**	3,8 ; 17,2
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	68,5	56,6 ; 80,3	16,6**	7,8 ; 27,4	14,8**	6,0 ; 25,2
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	76,9	59,1 ; 93,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,849					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	73,3	54,4 ; 90,4	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	71,0	61,6 ; 80,1	14,0*	7,4 ; 21,3	15,0**	7,7 ; 23,2
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	67,7	59,3 ; 75,8	11,4*	6,6 ; 17,2	20,9*	13,5 ; 28,6
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	85,0	76,0 ; 92,9	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,012					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	81,1	74,7 ; 86,8	10,1*	5,7 ; 14,7	8,8**	4,5 ; 13,8
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	72,5	65,7 ; 78,9	15,5*	10,3 ; 21,3	12,0*	7,5 ; 16,7
Obésité	72,3	14,4	13,3	61,5	53,0 ; 70,7	18,6*	11,8 ; 26,3	19,8*	12,2 ; 27,5
Hommes	P = 0,002			P = 0,376					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	86,8	76,5 ; 95,3	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	74,5	65,0 ; 84,0	16,4**	8,4 ; 24,9	9,1**	3,4 ; 15,5
Obésité	76,0	12,2	11,8	61,7	47,6 ; 76,5	17,6**	6,6 ; 29,1	20,7**	8,2 ; 33,8
Femmes	P = 0,161			P = 0,199					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	78,6	70,9 ; 85,9	9,4**	4,6 ; 14,9	12,0**	6,0 ; 19,1
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	69,9	59,7 ; 79,4	14,4*	7,9 ; 21,5	15,6*	8,6 ; 23,6
Obésité	68,9	16,4	14,7	61,4	49,2 ; 72,3	19,6*	10,1 ; 30,0	19,1**	9,8 ; 29,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
19,3	17,2 ; 21,4	15,6	13,8 ; 17,5	3,1*	2,2 ; 4,2	61,9	59,4 ; 64,3	Ensemble de la population	
P = 0,016									
17,1	14,1 ; 20,3	14,6	11,8 ; 17,4	4,2*	2,5 ; 6,3	64,2	60,4 ; 67,9	Sexe	
21,4	18,5 ; 24,3	16,6	14,2 ; 19,0	2,1*	1,3 ; 3,2	59,8	56,4 ; 63,1	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
18,8*	12,7 ; 25,1	7,7**	3,9 ; 12,0	7,9**	3,7 ; 12,9	65,6	57,7 ; 72,7	Groupe d'âge	
18,9	15,5 ; 22,5	17,3	14,0 ; 20,7	3,6**	1,9 ; 5,8	60,1	55,9 ; 64,4	15-24 ans	
22,7	19,3 ; 26,2	17,9	14,5 ; 21,5	1,2**	0,5 ; 2,0	58,2	53,8 ; 62,4	25-44 ans	
14,1	10,5 ; 18,4	14,7	10,8 ; 18,7	1,1**	0,2 ; 2,2	70,0	64,9 ; 74,8	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,014									
18,4*	9,4 ; 28,1	5,5**	1,4 ; 10,7	11,8**	4,5 ; 20,7	64,2	52,4 ; 75,0	Hommes	
16,0*	11,3 ; 21,2	18,5	13,2 ; 23,8	4,7**	1,8 ; 8,5	60,7	54,2 ; 67,4	15-24 ans	
19,5	14,6 ; 24,8	13,4*	9,0 ; 18,2	1,3**	0,2 ; 2,5	65,9	59,6 ; 71,9	25-44 ans	
12,9*	7,1 ; 19,9	16,1*	9,4 ; 23,8	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,054									
19,1*	10,5 ; 28,3	9,8**	3,4 ; 16,7	4,1**	0,2 ; 9,0	67,0	56,1 ; 77,2	Femmes	
21,9	16,4 ; 27,0	16,1	12,1 ; 20,5	2,5**	0,8 ; 4,4	59,6	53,7 ; 65,3	15-24 ans	
25,8	21,0 ; 30,9	22,2	17,1 ; 27,2	1,0**	0,2 ; 2,1	51,0	45,2 ; 56,9	25-44 ans	
15,0*	10,5 ; 20,1	13,7*	9,2 ; 18,5	1,9**	0,4 ; 3,8	69,4	63,0 ; 75,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,000									
x	;	x	;	14,4**	4,0 ; 26,8	79,0	65,1 ; 90,2	Statut pondéral	
8,8	6,6 ; 11,0	15,0	12,6 ; 17,6	4,8*	3,0 ; 6,8	71,4	68,0 ; 74,9	Poids insuffisant	
26,1	22,1 ; 30,2	19,1	15,2 ; 22,8	1,0**	0,1 ; 2,1	53,8	49,2 ; 58,4	Poids normal	
44,7	38,0 ; 52,2	14,4*	9,8 ; 19,7	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,286									
x	;	x	;	x	;	75,7*	29,7 ; 100,0	Hommes	
5,5**	2,8 ; 8,5	12,2*	8,3 ; 16,0	8,1*	4,4 ; 12,7	74,2	68,6 ; 79,8	Poids insuffisant	
22,8	17,6 ; 28,0	17,7	12,8 ; 22,6	x	;	x	;	Poids normal	
38,4	27,7 ; 49,4	15,3*	8,2 ; 23,2	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,009									
x	;	x	;	13,2**	2,9 ; 26,2	80,0	65,2 ; 92,7	Femmes	
11,3	8,1 ; 14,5	17,1	14,0 ; 20,6	2,3**	1,1 ; 3,6	69,4	64,9 ; 73,6	Poids insuffisant	
31,5	24,9 ; 38,4	21,4	15,4 ; 27,4	x	;	x	;	Poids normal	
51,5	41,9 ; 61,5	13,5*	7,7 ; 19,8	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,068									
37,0	33,2 ; 41,4	18,3	15,1 ; 21,7	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	32,5*	19,7 ; 47,4	62,9	47,8 ; 76,7	Excès de poids	
8,6	6,6 ; 10,6	15,2	12,8 ; 17,7	2,9*	1,7 ; 4,3	73,3	70,2 ; 76,3	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
24,1	19,1 ; 29,5	18,1	13,9 ; 22,9	8,1*	4,8 ; 11,8	49,7	43,6 ; 55,4	Ensemble de la population	
P = 0,558									
26,1*	18,1 ; 35,0	14,1*	7,7 ; 21,2	8,4**	3,5 ; 14,5	51,3	41,3 ; 60,7	Sexe	
22,5	15,8 ; 29,4	21,1	14,9 ; 27,6	7,9**	3,8 ; 12,5	48,5	40,2 ; 56,4	Hommes	
P = 0,783									
30,8**	12,8 ; 50,0	26,0**	8,9 ; 44,5	x		x		Groupe d'âge	
26,8*	18,0 ; 36,6	15,6*	9,4 ; 22,9	7,9**	2,5 ; 14,1	49,7	38,6 ; 60,0	15-24 ans	
20,8*	13,5 ; 28,4	19,9*	12,9 ; 27,9	8,0**	3,1 ; 13,6	51,3	41,4 ; 60,6	25-44 ans	
16,4**	6,4 ; 28,2	11,0**	2,3 ; 22,2	13,2**	3,1 ; 25,3	59,4	44,4 ; 73,4	45-64 ans	
P = 0,998									
x		x		x		46,2**	14,8 ; 78,0	65 ans et plus	
26,1**	13,0 ; 41,1	11,3**	3,1 ; 21,3	x		x		Hommes	
31,0*	16,6 ; 45,8	13,1**	3,9 ; 24,3	x		x		15-24 ans	
x		x		x		66,4*	38,1 ; 90,9	25-44 ans	
P = 0,847									
37,6**	8,8 ; 65,5	26,1**	3,7 ; 53,6	x		x		45-64 ans	
27,5*	15,1 ; 40,6	19,1**	9,5 ; 30,5	5,5**	0,2 ; 11,8	47,9*	33,3 ; 62,2	65 ans et plus	
14,1**	6,4 ; 22,5	24,4*	14,0 ; 35,9	8,5**	1,3 ; 16,3	53,0	40,8 ; 65,2	Femmes	
17,7**	5,6 ; 32,2	12,1**	1,5 ; 25,1	15,1**	1,5 ; 32,1	55,1*	36,7 ; 72,5	15-24 ans	
P = 0,617									
x		x		x		x		25-44 ans	
30,6*	18,0 ; 44,2	14,4**	6,9 ; 24,1	5,9**	0,3 ; 12,5	49,2	34,4 ; 62,6	45-64 ans	
22,7*	14,6 ; 30,7	16,7*	10,2 ; 23,8	5,8**	1,8 ; 10,5	54,8	45,7 ; 64,2	65 ans et plus	
21,8*	13,1 ; 30,7	20,9*	12,3 ; 30,2	11,9**	5,0 ; 19,8	45,4	33,7 ; 56,4	Statut pondéral	
P = 0,790									
x		x		x		x		Poids insuffisant	
36,2**	11,4 ; 66,8	x		x		59,0*	25,8 ; 85,6	Poids normal	
21,3*	10,8 ; 33,0	13,7**	5,4 ; 23,4	6,5**	0,7 ; 13,8	58,6	45,9 ; 71,4	Embonpoint	
30,5**	14,1 ; 48,5	20,6**	6,9 ; 35,9	13,3**	2,2 ; 27,6	35,5*	17,9 ; 53,9	Obésité	
P = 0,881									
x		x		x		x		Femmes	
28,7**	14,3 ; 44,3	19,3**	9,5 ; 32,0	x		x		Poids insuffisant	
24,4**	11,9 ; 37,0	20,5**	10,3 ; 31,9	x		x		Poids normal	
15,1**	6,7 ; 25,5	21,1**	9,5 ; 34,1	10,8**	2,6 ; 20,6	53,1	38,1 ; 67,1	Embonpoint	
P = 0,881									
P = 0,881									
P = 0,881									
P = 0,881									

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	85,4	82,2 ; 88,6	8,3	5,8 ; 10,9	6,2*	4,2 ; 8,5
Sexe	P = 0,001			P = 0,008					
Hommes	88,9	6,9	4,2	91,1	87,0 ; 94,8	5,9**	2,5 ; 9,6	2,9**	1,0 ; 5,3
Femmes	85,7	7,5	6,8	81,0	76,2 ; 85,6	10,2*	6,7 ; 14,0	8,8*	5,4 ; 12,2
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,046					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	68,6	53,4 ; 83,4	18,4**	6,3 ; 31,7	13,0**	2,9 ; 24,1
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	91,4	86,7 ; 95,3	5,8**	2,7 ; 9,4	2,8**	0,2 ; 6,5
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	83,1	77,9 ; 88,4	8,7*	4,5 ; 13,1	8,1*	4,8 ; 11,8
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	88,9	82,0 ; 94,7	6,0**	1,7 ; 11,1	5,1**	1,2 ; 10,1
Hommes	P = 0,121			P = 0,947					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	89,6	69,9 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	97,2	92,9 ; 100,0	x	;	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	84,7	75,7 ; 92,7	9,0**	2,5 ; 16,3	6,3**	1,2 ; 12,7
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	87,4	73,7 ; 98,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,118					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	51,5*	30,6 ; 73,5	26,9**	8,6 ; 46,2	21,6**	3,7 ; 38,9
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	85,7	77,3 ; 92,8	8,7**	3,6 ; 14,5	5,6**	0,5 ; 12,4
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	82,2	75,1 ; 88,7	8,5**	3,1 ; 14,8	9,3*	5,1 ; 14,6
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	89,9	82,4 ; 96,3	5,1**	0,4 ; 11,0	5,0**	0,4 ; 10,7
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,193					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	91,8	86,7 ; 96,2	5,7**	2,3 ; 9,6	2,5**	0,0 ; 6,5
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	82,9	77,4 ; 88,5	11,3*	6,7 ; 16,1	5,8**	2,6 ; 9,1
Obésité	82,0	8,7	9,2	83,2	76,6 ; 89,7	5,6**	1,7 ; 9,9	11,2*	6,2 ; 16,9
Hommes	P = 0,002			P = 0,486					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	96,7	90,3 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	87,4	80,4 ; 93,3	9,7**	3,9 ; 16,2	2,9**	0,3 ; 6,3
Obésité	85,2	8,2	6,6*	93,8	86,1 ; 99,7	x	;	x	;
Femmes	P = 0,034			P = 0,334					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	89,5	82,7 ; 95,2	6,9**	2,6 ; 12,0	3,6**	0,0 ; 9,3
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	77,2	67,6 ; 86,7	13,4**	5,8 ; 21,7	9,5**	3,1 ; 16,3
Obésité	79,1	9,2	11,8	73,9	63,4 ; 84,0	10,1**	3,1 ; 18,4	16,0*	8,0 ; 24,9

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	11,5	8,6 ; 14,5	88,5	85,5 ; 91,4
Sexe	P = 0,024		P = 0,974			
Hommes	6,6	93,4	11,5*	7,3 ; 16,0	88,5	84,0 ; 92,7
Femmes	8,6	91,4	11,4*	7,5 ; 15,4	88,6	84,6 ; 92,5
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,083			
15-24 ans	11,2*	88,8	20,5**	8,0 ; 34,2	79,5	65,8 ; 92,0
25-44 ans	8,0	92,0	10,0*	6,0 ; 14,5	90,0	85,5 ; 94,0
45-64 ans	7,5	92,5	12,6*	7,8 ; 17,9	87,4	82,1 ; 92,2
65 ans et plus	4,9	95,1	4,5**	0,8 ; 9,0	95,5	91,0 ; 99,2
Hommes	P = 0,409		P = 0,270			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	8,2**	2,5 ; 14,8	91,8	85,2 ; 97,5
45-64 ans	7,0	93,0	13,6**	6,0 ; 22,5	86,4	77,5 ; 94,0
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,267			
15-24 ans	12,3*	87,7	18,7**	3,0 ; 37,6	81,3	62,4 ; 97,0
25-44 ans	9,9	90,1	11,8*	6,0 ; 18,4	88,2	81,6 ; 94,0
45-64 ans	7,8	92,2	11,9**	5,2 ; 19,1	88,1	80,9 ; 94,8
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,012			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	5,5**	2,6 ; 9,0	94,5	91,0 ; 97,4
Embonpoint	6,6	93,4	12,0*	7,0 ; 17,3	88,0	82,7 ; 93,0
Obésité	11,3	88,7	18,0*	10,8 ; 25,9	82,0	74,1 ; 89,2
Hommes	P = 0,000		P = 0,005			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	9,3**	4,0 ; 15,6	90,7	84,4 ; 96,0
Obésité	11,5	88,5	25,1**	12,0 ; 38,3	74,9	61,7 ; 88,0
Femmes	P = 0,032		P = 0,236			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	6,9**	2,9 ; 11,6	93,1	88,4 ; 97,1
Embonpoint	8,4	91,6	15,3**	6,8 ; 24,4	84,7	75,6 ; 93,2
Obésité	11,1	88,9	11,6**	3,7 ; 19,9	88,4	80,1 ; 96,3

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 0,906					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	1,2**	0,4 ; 2,3	x	;	1,2**	0,1 ; 2,6
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	3,4**	1,8 ; 5,3	x	;	2,7**	0,8 ; 5,3
Rarement	2,8	2,6*	2,9	4,5*	2,6 ; 6,4	4,3**	1,5 ; 7,4	4,6**	2,2 ; 7,5
Jamais	94,8	94,8	94,8	90,9	88,2 ; 93,5	90,2	85,9 ; 94,4	91,5	87,8 ; 94,8
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,287					
Souvent	4,6	4,2	4,9	7,7*	5,4 ; 10,3	7,5*	4,1 ; 11,2	7,8*	4,8 ; 11,3
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	9,3	6,8 ; 11,9	12,0*	7,6 ; 16,7	7,1*	4,5 ; 10,0
Rarement	5,1	5,5	4,9	7,0*	4,7 ; 9,6	7,6**	3,5 ; 12,2	6,4*	3,9 ; 9,4
Jamais	82,9	81,4	84,0	76,1	71,9 ; 80,0	72,9	66,3 ; 79,4	78,6	73,7 ; 83,1
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,921					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	1,9**	0,6 ; 3,5	x	;	2,1**	0,4 ; 4,3
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	9,5	6,8 ; 12,5	x	;	9,4*	6,1 ; 13,2
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,5*	2,8 ; 6,4	5,2**	2,2 ; 8,6	4,0**	2,0 ; 6,4
Jamais	86,5	87,5	85,7	84,0	80,6 ; 87,4	83,5	77,8 ; 89,0	84,4	80,2 ; 88,7
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	1,5**	0,6 ; 2,8	x	;	2,0**	0,5 ; 3,9
Jamais	98,2	98,5	98,0	97,1	95,3 ; 98,6	97,1	94,5 ; 99,1	97,1	94,7 ; 99,1
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	0,9**	0,2 ; 1,9	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	98,6	97,4 ; 99,5	98,6	96,6 ; 100,0	98,5	97,0 ; 99,7
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,7	97,5 ; 99,7	98,8	96,8 ; 100,0	98,6	96,9 ; 99,9
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	1,1**	0,2 ; 2,3	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	98,4	97,1 ; 99,6	98,1	95,8 ; 100,0	98,7	97,0 ; 99,9
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,6**	0,5 ; 2,9	x	;	2,5**	0,7 ; 4,7
Jamais	97,3	98,6	96,3	95,8	93,8 ; 97,7	97,1	93,9 ; 99,5	94,8	91,9 ; 97,5

Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	1,3**	0,4 ; 2,5	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	97,5	96,0 ; 98,8	96,8	94,0 ; 99,0	98,1	96,3 ; 99,6
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	1,7**	0,3 ; 3,5	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	97,7	95,9 ; 99,3	97,0	93,4 ; 100,0	98,2	96,6 ; 99,6
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,3	98,5 ; 99,9	x	;	98,8	97,4 ; 99,9

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
3,4*	2,0 ; 5,1	32,9	28,9 ; 37,0	47,8	43,4 ; 52,2	15,9	12,6 ; 19,2	Ensemble de la population	
P = 0,820									
4,0**	1,6; 7,0	34,1	27,8 ; 40,9	45,6	38,5 ; 52,8	16,3*	10,6 ; 22,3	Sexe	
3,0**	1,3; 4,9	32,0	26,8 ; 37,5	49,5	44,0 ; 55,1	15,5	11,5 ; 19,6	Hommes	
								Femmes	
P = 0,698									
x	;	30,0*	16,3 ; 44,8	49,4	33,2 ; 64,4	x	;	Groupe d'âge	
2,9**	0,8; 5,6	28,5	21,7 ; 35,4	50,8	43,3 ; 58,4	17,8*	12,3 ; 24,1	15-24 ans	
2,6**	0,7; 5,0	36,0	29,4 ; 42,5	46,1	39,1 ; 52,7	15,3*	10,2 ; 21,0	25-44 ans	
8,0**	1,8; 15,6	41,6	31,1 ; 52,7	41,2	30,6 ; 52,5	9,2**	3,3 ; 16,2	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,980									
x	;	36,1**	13,6 ; 59,5	42,9**	17,8 ; 67,5	x	;	Hommes	
x	;	31,2*	20,8 ; 41,9	49,3	37,7 ; 61,3	x	;	15-24 ans	
x	;	36,5	24,8 ; 47,9	42,9	31,5 ; 55,0	x	;	25-44 ans	
x	;	37,0*	19,2 ; 56,5	40,8*	21,0 ; 60,4	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,819									
x	;	24,8**	8,0 ; 44,9	54,9*	33,8 ; 76,8	x	;	Femmes	
x	;	25,8*	17,1 ; 35,3	52,3	41,8 ; 61,8	x	;	15-24 ans	
3,4**	0,7; 7,1	35,6	27,4 ; 44,2	48,1	39,6 ; 56,7	12,9*	7,8 ; 18,5	25-44 ans	
x	;	44,5	31,2 ; 57,9	41,5*	29,3 ; 54,4	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,954									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
4,1**	1,4; 7,5	32,3	25,3 ; 39,8	46,6	38,7 ; 54,5	16,9*	11,5 ; 22,7	Poids insuffisant	
3,9**	1,6; 6,7	35,4	28,5 ; 42,5	47,1	39,8 ; 54,6	13,6*	8,3 ; 19,3	Poids normal	
x	;	31,0	22,3 ; 39,9	48,0	38,7 ; 57,4	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,891									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	29,3*	17,5 ; 42,6	46,1*	30,1 ; 60,4	x	;	Poids insuffisant	
3,4**	0,6; 7,2	37,2	27,0 ; 47,0	45,1	34,9 ; 55,5	14,3**	6,9 ; 22,9	Poids normal	
x	;	32,3*	19,2 ; 47,1	47,0*	31,1 ; 62,2	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,891									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
x	;	29,3*	25,1 ; 42,3	46,1*	38,1 ; 55,8	x	;	Poids insuffisant	
3,4**	0,9; 8,8	37,2	23,7 ; 43,4	45,1	38,5 ; 60,1	14,3**	5,9 ; 20,7	Poids normal	
x	;	32,3*	18,8 ; 42,0	47,0*	36,8 ; 61,7	x	;	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,070				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	50,8	46,5 ; 55,1	56,3	49,2 ; 62,9	46,5	41,1 ; 51,8	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	38,1	34,0 ; 42,3	33,4	27,1 ; 39,8	41,7	36,1 ; 47,2	
Non	14,4	15,3	13,7	11,1	8,9 ; 13,6	10,2*	6,5 ; 14,5	11,8	8,8 ; 14,9	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	42,3	38,0 ; 46,5	31,4	24,9 ; 38,1	50,7	45,0 ; 55,9	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	36,1	31,9 ; 40,4	40,8	33,6 ; 47,8	32,4	27,4 ; 37,6	
Non	19,6	22,6	17,4	21,6	18,1 ; 25,1	27,8	21,5 ; 33,9	16,8	13,0 ; 21,1	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,042				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	43,8	39,1 ; 48,2	37,7	30,9 ; 44,7	48,5	42,8 ; 54,1	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	25,7	21,9 ; 30,1	26,9	20,6 ; 33,8	24,8	20,1 ; 30,1	
Non	27,7	32,4	24,3	30,5	26,5 ; 34,7	35,3	28,7 ; 42,3	26,7	21,8 ; 32,1	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,724				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	42,5	38,2 ; 46,7	43,4	36,2 ; 50,2	41,8	36,5 ; 47,1	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	27,3	23,5 ; 31,4	28,2	22,0 ; 34,2	26,6	22,0 ; 32,0	
Non	26,1	27,4	25,1	30,2	26,4 ; 34,3	28,5	22,5 ; 34,9	31,6	26,4 ; 36,9	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,010				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	64,6	60,3 ; 68,6	59,2	52,2 ; 66,3	68,9	63,6 ; 73,8	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	17,8	14,4 ; 21,4	23,8	17,8 ; 30,0	13,2	9,4 ; 17,2	
Non	17,4	18,5	16,6	17,5	14,3 ; 20,8	17,1*	11,9 ; 22,5	17,9	13,9 ; 22,1	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,015				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	63,8	59,6 ; 67,9	56,7	49,6 ; 63,6	69,3	64,1 ; 74,5	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	21,5	18,1 ; 25,1	26,9	20,6 ; 33,5	17,3	12,9 ; 21,6	
Non	12,6	14,0	11,6	14,7	11,7 ; 17,9	16,4*	11,3 ; 21,9	13,5	9,7 ; 17,5	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,733				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	55,7	51,2 ; 59,9	54,2	47,5 ; 61,2	56,8	51,0 ; 62,3	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	23,2	19,5 ; 27,2	23,1	17,4 ; 29,2	23,3	18,5 ; 28,4	
Non	21,5	24,4	19,4	21,1	17,9 ; 24,8	22,7	17,3 ; 28,6	19,9	15,8 ; 24,6	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,128				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	14,4	11,0 ; 17,9	16,6*	10,7 ; 22,5	12,6	9,0 ; 16,4	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	13,1	10,3 ; 16,3	15,7*	10,9 ; 21,2	11,1*	7,5 ; 15,1	
Non	72,0	67,3	75,4	72,5	68,5 ; 76,7	67,7	61,1 ; 75,0	76,3	71,3 ; 81,2	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,002				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	37,6	33,5 ; 41,7	44,5	37,8 ; 51,6	32,2	27,1 ; 37,5	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	13,2	10,0 ; 16,3	15,4*	10,2 ; 21,0	11,4*	7,6 ; 15,6	
Non	49,9	43,2	54,7	49,2	45,0 ; 53,5	40,1	33,3 ; 46,7	56,4	50,9 ; 62,0	



Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,044				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	54,8	50,4 ; 59,3	51,9	44,7 ; 58,7	57,1	51,3 ; 62,6	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	14,9	11,6 ; 18,2	19,4	13,7 ; 25,4	11,4*	7,9 ; 15,1	
Non	29,6	28,8	30,2	30,3	26,4 ; 34,2	28,7	22,6 ; 35,4	31,5	26,7 ; 36,8	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,986				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	36,9	32,6 ; 41,3	36,5	29,5 ; 43,3	37,2	32,0 ; 42,9	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	11,9	9,4 ; 14,8	12,0*	8,1 ; 16,4	11,9*	8,5 ; 15,7	
Non	48,5	52,0	45,9	51,2	46,7 ; 55,6	51,5	44,2 ; 58,5	50,9	45,4 ; 56,3	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,089				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	39,6	35,3 ; 43,7	44,8	37,8 ; 51,7	35,6	30,4 ; 41,2	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	21,0	17,2 ; 24,8	20,7	14,9 ; 26,9	21,3	16,6 ; 25,9	
Non	37,5	34,7	39,5	39,4	35,1 ; 43,7	34,5	28,0 ; 41,6	43,1	37,8 ; 48,5	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe		P = 0,000	
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge		P = 0,000	
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
		P = 0,000	
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes		P = 0,000	
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
		P = 0,000	
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes		P = 0,000	
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
		P = 0,000	
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
54,8	52,3 ; 57,4	30,8	28,4 ; 33,2	14,4	12,6 ; 16,3	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
48,0	44,0 ; 51,9	31,8	28,1 ; 35,5	20,2	17,1 ; 23,5	Hommes
61,3	57,8 ; 64,6	29,8	26,7 ; 33,1	8,8	6,9 ; 10,9	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
52,4	36,2 ; 67,7	11,3**	3,0 ; 22,2	36,2*	21,1 ; 51,8	15-17 ans
38,8	29,1 ; 48,9	24,3*	16,2 ; 32,6	36,9	27,1 ; 46,9	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
43,0	34,4 ; 50,8	20,4	14,4 ; 26,8	36,7	28,8 ; 45,0	25-44 ans
50,3	45,9 ; 54,7	32,7	28,7 ; 37,0	16,9	13,8 ; 20,2	45-64 ans
50,4	46,0 ; 54,7	43,4	39,1 ; 48,0	6,2*	4,4 ; 8,2	65 ans et plus
89,7	85,6 ; 93,5	x	;	x	;	
		P = 0,000				Hommes
42,7*	21,1 ; 64,6	12,2**	0,2 ; 29,4	45,1*	21,2 ; 67,0	15-17 ans
36,7*	21,9 ; 51,2	18,5**	8,6 ; 30,0	44,8*	29,3 ; 60,1	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
38,8*	26,6 ; 50,9	16,3*	8,9 ; 25,3	44,9	32,5 ; 57,4	25-44 ans
45,0	38,3 ; 51,7	30,5	24,4 ; 36,8	24,5	19,0 ; 30,1	45-64 ans
41,8	35,7 ; 48,6	48,7	41,9 ; 55,2	9,4*	6,1 ; 13,0	65 ans et plus
85,9	78,1 ; 93,7	x	;	x	;	
		P = 0,023				Femmes
64,7*	40,5 ; 84,8	x	;	x	;	15-17 ans
40,6*	27,2 ; 55,3	29,4*	17,3 ; 42,0	29,9*	17,6 ; 43,5	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
47,0	35,6 ; 58,7	24,3*	15,0 ; 34,1	28,6*	18,9 ; 39,9	25-44 ans
55,9	49,6 ; 61,8	35,1	29,4 ; 41,2	9,0*	5,9 ; 12,3	45-64 ans
58,5	52,7 ; 64,3	38,4	32,8 ; 44,1	3,1**	1,4 ; 5,1	65 ans et plus
92,3	88,3 ; 95,8	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	43,9	50,1	37,9	43,4	40,9 ; 45,9	50,6	46,7 ; 54,5	36,7	33,5 ; 40,2
Non	56,1	49,9	62,1	56,6	54,1 ; 59,1	49,4	45,5 ; 53,3	63,3	59,8 ; 66,5
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	10,6	14,4	6,8	12,1	10,4 ; 14,0	16,6	13,6 ; 20,0	8,0	6,1 ; 10,0
Non	89,4	85,6	93,2	87,9	86,0 ; 89,6	83,4	80,0 ; 86,4	92,0	90,0 ; 93,9
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,006			
Oui	7,3	9,1	5,5	7,0	5,6 ; 8,3	8,8	6,6 ; 11,3	5,2	3,8 ; 6,7
Non	92,7	90,9	94,5	93,0	91,7 ; 94,4	91,2	88,7 ; 93,4	94,8	93,3 ; 96,2
<b>Ecstasy</b>		P = 0,000				P = 0,002			
Oui	5,1	6,3	3,9	5,7	4,4 ; 7,0	7,7	5,4 ; 10,1	3,7*	2,4 ; 5,2
Non	94,9	93,7	96,1	94,3	93,0 ; 95,6	92,3	89,9 ; 94,6	96,3	94,8 ; 97,6
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,3	16,1	8,7	12,9	11,1 ; 14,7	16,6	13,7 ; 19,7	9,3	7,4 ; 11,6
Non	87,7	83,9	91,3	87,1	85,3 ; 88,9	83,4	80,3 ; 86,3	90,7	88,4 ; 92,6
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,071				P = 0,471			
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,8**	0,4 ; 1,3	1,0**	0,3 ; 1,9	0,6**	0,2 ; 1,2
Non	99,5	99,4	99,6	99,2	98,7 ; 99,6	99,0	98,1 ; 99,7	99,4	98,8 ; 99,8
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,000				P = 0,147			
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,6**	0,2 ; 1,2	1,0**	0,1 ; 2,0	0,3**	0,0 ; 0,7
Non	99,5	99,2	99,7	99,4	98,8 ; 99,8	99,0	98,0 ; 99,9	99,7	99,3 ; 100,0
<b>Kétamine</b>		P = 0,000				P = 0,008			
Oui	0,8	1,2	0,3*	1,0**	0,5 ; 1,6	1,8**	0,7 ; 3,0	0,3**	0,0 ; 0,7
Non	99,2	98,8	99,7	99,0	98,4 ; 99,5	98,2	97,0 ; 99,3	99,7	99,3 ; 100,0
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,179				P = 0,962			
Oui	1,8	1,9	1,6	2,1*	1,5 ; 2,8	2,1*	1,1 ; 3,2	2,1*	1,2 ; 3,1
Non	98,2	98,1	98,4	97,9	97,2 ; 98,5	97,9	96,8 ; 98,9	97,9	96,9 ; 98,8
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,000				P = 0,004			
Oui	1,6	2,3	0,9	1,5*	0,8 ; 2,3	2,7**	1,4 ; 4,3	0,4**	0,0 ; 0,9
Non	98,4	97,7	99,1	98,5	97,7 ; 99,2	97,3	95,7 ; 98,6	99,6	99,1 ; 100,0
<b>Drogues par injection</b>		P = 0,000				P = 0,162			
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,6**	0,2 ; 1,1	0,9**	0,2 ; 1,8	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,4	98,9 ; 99,8	99,1	98,2 ; 99,8	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,2	16,2	8,3	13,5	11,8 ; 15,4	19,0	16,0 ; 22,2	8,4	6,6 ; 10,4
Non	87,8	83,8	91,7	86,5	84,6 ; 88,2	81,0	77,8 ; 84	91,6	89,6 ; 93,4
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,007			
Oui	1,6	2,3	0,8	2,0*	1,2 ; 2,9	3,2**	1,6 ; 4,9	0,9**	0,3 ; 1,6
Non	98,4	97,7	99,2	98,0	97,1 ; 98,8	96,8	95,1 ; 98,4	99,1	98,4 ; 99,7
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,052			
Oui	1,8	2,4	1,3	1,4**	0,7 ; 2,2	2,2**	1,0 ; 3,7	0,7**	0,1 ; 1,4
Non	98,2	97,6	98,7	98,6	97,8 ; 99,3	97,8	96,3 ; 99,0	99,3	98,6 ; 99,9
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,039			
Oui	1,4	1,7	1,0	1,2**	0,6 ; 1,9	1,9**	0,7 ; 3,3	0,4**	0,0 ; 1,0
Non	98,6	98,3	99,0	98,8	98,1 ; 99,4	98,1	96,7 ; 99,3	99,6	99,0 ; 100,0
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,114			
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,8**	0,4 ; 1,4	1,2**	0,4 ; 2,3	x	;
Non	99,2	98,8	99,6	99,2	98,6 ; 99,6	98,8	97,7 ; 99,6	x	;
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = .			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = .			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = 0,681			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,227			
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,4**	0,1 ; 0,7	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;
Non	99,6	99,6	99,7	99,6	99,3 ; 99,9	99,4	98,8 ; 99,9	x	;
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = .			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	14,4	12,6 ; 16,3	20,2	17,1 ; 23,5	8,8	6,9 ; 10,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	36,2*	21,1 ; 51,8	45,1*	21,2 ; 67,0	25,1**	7,6 ; 46,6
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	36,9	27,1 ; 46,9	44,8*	29,3 ; 60,1	29,9*	17,6 ; 43,5
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	16,9	13,8 ; 20,2	24,5	19,0 ; 30,1	9,0*	5,9 ; 12,3
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	6,2*	4,4 ; 8,2	9,4*	6,1 ; 13,0	3,1**	1,4 ; 5,1
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	25,0	22,6 ; 27,3	8,9	7,3 ; 10,5	11,3	9,7 ; 13,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	26,5	22,8 ; 29,9	10,8	8,2 ; 13,5	14,7	11,8 ; 17,8
Femmes	25,4	6,8	7,4	23,5	20,5 ; 26,6	7,1	5,4 ; 9,1	8,0	6,2 ; 10,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,187					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	33,3*	20,1 ; 48,6	x	;	7,9**	0,3 ; 18,2
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	35,0	25,4 ; 44,7	9,9**	4,7 ; 15,9	16,3*	9,2 ; 24,5
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,4	8,4	15,9	34,5	27,0 ; 42,4	8,8**	4,3 ; 13,9	13,7*	8,1 ; 20,2
45-64 ans	29,9	12,3	16,1	22,8	19,2 ; 26,5	11,5	8,7 ; 14,5	15,3	12,3 ; 18,8
65 ans et plus	29,0	7,1	7,2	30,2	26,1 ; 34,3	9,8	7,1 ; 12,6	9,7	7,3 ; 12,4
Hommes	7,1	0,5**	0,4**	9,1*	5,4 ; 13,1	x	;	x	;
15-17 ans	P = 0,000			P = 0,726					
18-24 ans	31,4	6,9**	6,7**	37,0**	18,4 ; 59,8	x	;	x	;
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,088					
25-44 ans	33,9	9,9	25,6	33,8*	19,3 ; 47,7	8,7**	1,6 ; 17,9	20,8**	9,6 ; 33,9
45-64 ans	33,0	8,7	18,3	34,9*	23,8 ; 47,0	9,6**	2,6 ; 18,2	16,7**	8,0 ; 26,8
65 ans et plus	29,0	13,5	21,1	22,1	16,8 ; 27,7	12,7*	8,2 ; 17,4	20,2	14,8 ; 25,8
Femmes	32,2	9,0	10,0	33,5	26,6 ; 39,9	12,9*	8,2 ; 17,9	11,8*	8,1 ; 16,1
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,034					
25-44 ans	10,0	0,8**	0,6**	12,5**	4,9 ; 20,2	x	;	x	;
45-64 ans	P = 0,000			P = 0,000					
65 ans et plus	24,6	3,4*	10,9*	28,7**	8,7 ; 51,2	x	;	x	;
15-17 ans	39,2	10,7	15,0	36,1*	22,9 ; 49,8	10,9**	3,4 ; 19,9	12,4**	3,7 ; 22,5
18-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
45-64 ans	33,8	8,1	13,5	34,1*	24,0 ; 45,4	8,0**	2,3 ; 14,6	10,8**	4,2 ; 18,7
65 ans et plus	30,8	11,0	11,0	23,6	18,3 ; 28,9	10,2*	6,9 ; 14,0	10,3*	7,1 ; 14,0
Femmes	25,9	5,3	4,5	27,1	22,1 ; 32,5	6,8*	4,3 ; 9,8	7,7*	4,8 ; 11,0
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	4,8	0,2**	0,3**	6,7**	3,5 ; 10,6	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	73,8	71,8 ; 75,9	80,5	77,6 ; 83,5	67,4	64,5 ; 70,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	40,0*	25,4 ; 56,3	32,8**	13,8 ; 56,5	49,2*	25,6 ; 74,9
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	71,4	61,7 ; 80,7	70,2	55,8 ; 84,2	72,5	58,3 ; 85,3
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	62,0	54,0 ; 70,3	57,6	45,4 ; 70,1	66,4	54,5 ; 78,0
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	90,5	87,6 ; 93,1	92,0	87,9 ; 95,8	88,9	84,6 ; 92,6
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	76,1	72,5 ; 79,4	83,8	79,1 ; 88,1	68,9	63,7 ; 73,9
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	47,3	41,1 ; 53,8	56,9	47,5 ; 67,2	38,7	31,0 ; 46,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	73,2	67,9 ; 78,4	84,6	77,8 ; 90,8	60,8	52,8 ; 68,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	77,7	73,2 ; 82,1	80,5	73,5 ; 87,1	75,3	69,2 ; 81,3
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	84,7	81,5 ; 87,6	89,0	84,3 ; 92,9	80,5	76,1 ; 84,6
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	86,0	83,8 ; 88,0	82,0	78,5 ; 85,1	90,4	87,6 ; 93,0
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	11,2	9,3 ; 13,3	13,7	10,8 ; 17,0	8,4*	6,0 ; 11,0
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	2,8*	1,8 ; 4,0	4,3*	2,6 ; 6,2	1,2**	0,4 ; 2,3
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	48,6	46,8 ; 50,3	4,7*	2,9 ; 6,7	98,1	97,0 ; 99,1
Femmes	51,5	97,5	0,8	50,6	48,9 ; 52,4	94,8	92,8 ; 96,6	0,7**	0,2 ; 1,4
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,8**	0,3 ; 1,3	0,5**	0,0 ; 1,1	1,2**	0,3 ; 2,1

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	86,0	83,8 ; 88,0	11,2	9,3 ; 13,3	2,8*	1,8 ; 4,0
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	86,4	10,7	2,9	82,0	78,5 ; 85,1	13,7	10,8 ; 17,0	4,3*	2,6 ; 6,2
Femmes	91,6	7,4	0,9*	90,4	87,6 ; 93,0	8,4*	6,0 ; 11,0	1,2**	0,4 ; 2,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,173					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	79,9	59,6 ; 97,1	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	63,6	52,9 ; 74,4	31,6*	21,1 ; 42,3	4,8**	0,9 ; 9,7
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	66,8	57,4 ; 76,0	27,7*	18,6 ; 36,9	5,5**	1,7 ; 10,2
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	85,8	82,6 ; 88,8	10,8	8,2 ; 13,8	3,4*	1,7 ; 5,3
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	92,5	89,8 ; 94,7	6,0*	4,1 ; 8,3	1,6**	0,3 ; 3,0
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	93,4	88,2 ; 97,5	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,149					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	67,9	47,5 ; 86,6	15,5**	0,6 ; 33,9	16,6**	3,2 ; 32,9
Femmes	87,3	10,2	2,5	83,1	79,6 ; 86,4	13,4	10,6 ; 16,7	3,4*	1,8 ; 5,3
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	91,5	88,8 ; 93,9	8,0*	5,7 ; 10,7	0,5**	0,0 ; 1,2
Femmes	92,1	x	x	86,6*	47,5 ; 100,0	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	49,7	45,4 ; 54,2	69,6	65,0 ; 74,7
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000	...	...	...
15-24 ans	87,9	...	84,3	71,7 ; 95,5	...	;
25-44 ans	62,4	...	64,0	57,3 ; 70,9	...	;
45-64 ans	29,9	...	31,2	24,5 ; 38,3	...	;
65 ans et plus	7,3	...	5,2**	0,7 ; 10,9	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...	...	P = 0,000	...
15-24 ans	...	90,0	...	;	90,9	81,6 ; 98,0
25-34 ans	...	71,0	...	;	71,3	62,9 ; 79,6
35-49 ans	...	53,5	...	;	57,8	49,7 ; 66,1
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,010	...	P = 0,380	...
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	28,1*	16,4 ; 41,0	54,1*	28,6 ; 78,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	49,5	39,8 ; 59,0	66,9	52,8 ; 80,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	52,8	43,1 ; 62,7	71,9	63,3 ; 79,8
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	55,0	47,9 ; 62,2	71,6	64,0 ; 78,9
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,007	...	P = 0,009	...
Un partenaire	43,8	64,2	46,0	41,2 ; 50,8	67,3	61,9 ; 72,7
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	65,9	53,0 ; 78,3	86,7	75,5 ; 95,3
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	76,5*	50,1 ; 100,0	82,8*	43,4 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = 0,858	...	P = 0,645	...
Hommes	x	66,6	x	;	69,8	65,0 ; 74,8
Femmes	47,8	x	49,7	45,4 ; 54,2	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	62,0**	20,9 ; 100,0

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	21,2	18,7 ; 23,9	19,8	17,3 ; 22,4	59,0	56,2 ; 61,8
Sexe	P = 0,093			P = 0,788					
Hommes	14,8	14,9	70,3	21,3	17,7 ; 25,0	19,0	15,5 ; 22,6	59,7	55,7 ; 63,7
Femmes	13,2	14,7	72,1	21,0	17,4 ; 25,0	20,7	17,1 ; 24,5	58,2	54,0 ; 62,2
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,002					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	70,9	47,6 ; 91,2	x	;	x	;
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	42,8	31,6 ; 54,1	41,4	30,9 ; 51,9	15,8*	8,6 ; 24,1
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	48,2	38,2 ; 58,4	38,4	29,0 ; 48,1	13,3*	7,5 ; 20,2
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	23,2	19,1 ; 27,5	25,1	20,9 ; 29,3	51,7	47,1 ; 56,3
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	11,1	8,1 ; 14,4	7,7*	5,1 ; 10,4	81,2	77,0 ; 84,8
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	3,1**	0,4 ; 6,5	5,0**	0,8 ; 10,5	91,9	86,0 ; 96,8
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,711					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	20,4*	12,5 ; 29,6	17,1*	9,8 ; 24,9	62,5	53,3 ; 71,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	21,8	16,0 ; 28,1	16,0*	10,6 ; 21,6	62,2	55,5 ; 69,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	22,8	17,3 ; 28,3	20,3	15,3 ; 25,7	56,9	50,7 ; 62,9
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	20,2	16,5 ; 24,5	22,0	17,9 ; 26,4	57,8	52,8 ; 62,6
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	16,8	14,2 ; 19,6	16,7	14,0 ; 19,4	66,5	63,3 ; 69,6
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	43,2	33,6 ; 52,7	40,5	31,1 ; 50,0	16,2*	10,2 ; 23,1
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	66,5	47,0 ; 84,0	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	29,5	26,7 ; 32,4	28,5	24,7 ; 32,6	30,6	26,7 ; 34,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	88,9	71,7 ; 100,0	x	;	79,6*	49,9 ; 100,0
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	65,1	54,2 ; 75,3	69,3	53,3 ; 83,1	61,5	46,0 ; 75,7
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	69,7	60,4 ; 78,7	75,2	61,9 ; 86,9	65,1	51,1 ; 77,5
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	32,5	28,1 ; 37,3	32,1	25,6 ; 38,7	33,0	26,8 ; 39,3
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	14,5	10,9 ; 18,2	14,7*	10,3 ; 19,8	14,1*	9,1 ; 19,8
	3,1*	3,9*	1,8**	3,1**	0,4 ; 6,6	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,357		P = 0,190		P = 0,623	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	27,3*	18,7 ; 36,3	31,6*	20,1 ; 43,5	21,5**	7,5 ; 35,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	26,2	20,5 ; 32,3	23,4*	16,1 ; 31,3	30,6*	20,5 ; 40,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	33,6	27,7 ; 39,8	35,6	26,0 ; 44,8	31,9	24,0 ; 40,3
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	29,2	24,7 ; 33,9	26,7	20,4 ; 33,0	31,9	25,4 ; 38,6
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	24,4	21,5 ; 27,5	21,3	17,2 ; 25,5	27,6	23,3 ; 32,1
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	57,5	47,8 ; 66,7	59,3	47,2 ; 70,2	54,0	37,9 ; 70,5
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	76,0	57,2 ; 93,8	71,2*	48,1 ; 93,2	94,6	71,9 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,013		P = 0,000		P = 0,010	
Hommes	18,7	54,0	17,9	31,6	27,6 ; 35,7	59,3*	36,9 ; 77,5	30,1	26,1 ; 34,2
Femmes	19,2	19,2	x	26,8	22,8 ; 31,0	26,8	22,8 ; 31,0	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	72,6*	40,6 ; 99,9	65,7**	10,9 ; 100,0	76,0*	35,0 ; 100,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	9,3	8,0 ; 10,8	8,8	6,7 ; 11,2	9,8	8,0 ; 11,9
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,090		P = 0,015	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	4,3**	0,6 ; 8,9	x	;	x	;
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,051		P = 0,008	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	3,4**	0,5 ; 7,0	x	;	x	;
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	10,4	7,9 ; 13,1	8,4*	4,6 ; 12,4	12,4*	8,9 ; 16,5
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	12,7	10,3 ; 15,7	12,7*	8,8 ; 17,0	12,8	9,4 ; 16,8
	2,7	3,2*	2,2	4,2**	2,0 ; 6,8	7,3**	2,2 ; 13,3	2,0**	0,5 ; 3,6
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,114		P = 0,005	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	2,4**	1,0 ; 4,2	x	;	3,1**	1,0 ; 5,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	8,7*	5,5 ; 12,4	9,9**	4,8 ; 15,7	7,4**	3,5 ; 12,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	10,8	7,7 ; 14,1	10,0**	5,0 ; 15,6	11,4*	7,4 ; 15,9
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	11,7	9,3 ; 14,4	10,4*	6,9 ; 14,4	13,0	9,6 ; 17,0
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,467	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	9,2	7,5 ; 11,1	7,1*	4,8 ; 9,5	11,5	8,9 ; 14,3
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	13,3*	7,9 ; 19,6	12,1**	5,3 ; 20,7	15,6**	7,2 ; 26,4
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	38,0*	18,9 ; 57,9	41,9**	17,6 ; 65,1	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,027		P = 0,006		P = 0,326	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	12,6	10,2 ; 15,3	28,1**	9,4 ; 47,9	11,8	9,4 ; 14,6
Femmes	7,0	7,0	8,9**	8,3	5,9 ; 10,9	8,2	5,9 ; 10,9	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,327		P = 0,165		P = .	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	x	;	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	9,5	8,1 ; 11,0	8,8	6,7 ; 11,3	10,1	8,3 ; 12,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	13,5*	6,9 ; 21,0	86,5	79,0 ; 93,1
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,002			
15-35 ans	25,6	74,4	15,5**	7,9 ; 24,4	84,5	75,6 ; 92,1
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,321			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	21,4**	7,1 ; 38,0	78,6	62,0 ; 92,9
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	7,9**	1,3 ; 16,1	92,1	83,9 ; 98,7
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = 0,569			
Né au Canada	24,8	75,2	14,9**	6,7 ; 24,1	85,1	75,9 ; 93,3
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Montréal et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	72,8	69,1 ; 76,3	12,9	10,6 ; 15,5	14,3	11,3 ; 17,2
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,031					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	55,7	41,8 ; 69,2	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	79,3	74,2 ; 84,3	8,1*	4,9 ; 11,7	12,5*	8,3 ; 17,3
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	71,6	66,7 ; 76,6	21,5	16,9 ; 26,0	6,9*	3,9 ; 10,0
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,040					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	59,0	47,4 ; 70,0	23,1*	13,8 ; 33,1	17,9*	8,9 ; 27,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	73,6	65,2 ; 81,9	12,4*	7,2 ; 18,4	14,1**	7,0 ; 21,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	67,9	60,4 ; 75,2	14,1*	9,0 ; 19,4	18,0*	11,7 ; 24,7
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	79,5	74,2 ; 84,7	9,6*	6,4 ; 13,0	11,0*	6,6 ; 15,5
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,000					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	76,4	72,6 ; 80,4	13,9	11,0 ; 16,9	9,7*	6,7 ; 12,8
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	44,7*	29,5 ; 61,9	9,8**	2,1 ; 20,0	45,5*	28,6 ; 61,1
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	71,1	62,8 ; 78,8	11,5*	6,1 ; 17,3	17,3*	10,9 ; 24,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 07

**OUTAOUAIS**

---





## 1

## CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population		49,4	50,6			49,4	49,4 ; 49,4	50,6	50,6 ; 50,6
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	16,2	16,2 ; 16,2	17,0	16,9 ; 17,0	15,4	15,4 ; 15,5
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	34,6	34,6 ; 34,6	34,8	34,8 ; 34,9	34,4	34,4 ; 34,5
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	35,9	35,9 ; 35,9	35,8	35,8 ; 35,9	35,9	35,9 ; 36,0
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	13,3	13,3 ; 13,3	12,3	12,3 ; 12,4	14,2	14,2 ; 14,3
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,142					
Personne seule	13,4	10,7	16,0	11,5	10,4 ; 12,7	9,8	8,4 ; 11,5	13,0	11,4 ; 14,8
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	28,9	27,0 ; 30,8	28,6	25,8 ; 31,4	29,2	26,5 ; 31,9
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	43,6	41,2 ; 45,8	46,0	42,6 ; 49,4	41,2	37,9 ; 44,2
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	9,2	7,7 ; 10,7	8,6	6,4 ; 10,9	9,8	7,9 ; 11,8
Autre	6,7	6,5	6,9	6,9	5,5 ; 8,4	7,0*	4,8 ; 9,2	6,8	4,9 ; 8,9
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,256			P = 'n.d.'					
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	93,7	92,4 ; 94,9	92,5	90,5 ; 94,4	94,8	93,1 ; 96,4
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,8**	0,3 ; 1,4	1,4**	0,4 ; 2,4	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	5,5	4,4 ; 6,7	6,1	4,5 ; 8,0	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,912			P = 0,074					
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	84,3	82,6 ; 86,0	85,3	82,7 ; 87,8	83,4	80,9 ; 85,7
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	14,5	13,0 ; 16,2	12,7	10,4 ; 15,2	x	;
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	1,2*	0,6 ; 1,8	2,0**	1,0 ; 3,2	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,683			P = 0,035					
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	24,1	22,2 ; 26,2	26,5	23,4 ; 29,8	21,7	19,2 ; 24,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	27,4	25,1 ; 29,7	26,2	22,9 ; 29,6	28,6	25,4 ; 31,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	23,7	21,5 ; 25,8	21,5	18,7 ; 24,6	25,9	22,7 ; 28,8
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	24,8	22,9 ; 26,8	25,8	22,8 ; 28,8	23,8	21,3 ; 26,4
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	12,7	11,2 ; 14,4	10,9	8,8 ; 13,3	14,5	12,3 ; 16,9
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	14,6	12,8 ; 16,4	12,9	10,6 ; 15,3	16,2	13,6 ; 18,9
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	18,1	16,1 ; 20,1	16,5	13,7 ; 19,5	19,6	16,6 ; 22,5
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	18,0	16,0 ; 20,0	17,7	14,7 ; 20,7	18,3	15,6 ; 21,1
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	36,6	34,2 ; 39,0	41,9	38,3 ; 45,6	31,4	28,2 ; 34,6
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,267					
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	43,0	40,5 ; 45,6	44,4	40,6 ; 48,0	41,7	38,4 ; 45,2
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	47,3	44,6 ; 49,8	45,0	41,2 ; 48,8	49,4	45,9 ; 52,8
Pauvre	9,4	8,9	9,9	8,2	6,9 ; 9,7	8,9	6,9 ; 11,1	7,6	5,9 ; 9,5
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,5*	0,9 ; 2,1	1,7**	0,8 ; 2,7	1,3**	0,6 ; 2,1
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	63,3	61,5 ; 65,2	66,1	63,4 ; 68,7	60,6	58,0 ; 63,2
Étudiants	13,1	13,0	13,2	12,4	11,0 ; 13,8	13,0	10,8 ; 15,0	11,9	10,0 ; 13,9
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	5,6	4,5 ; 6,7	2,9*	1,7 ; 4,2	8,2	6,6 ; 10,0
Retraités	19,6	18,0	21,1	18,7	17,6 ; 19,7	18,1	16,6 ; 19,8	19,2	17,7 ; 20,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	56,5	54,1 ; 58,8	31,1	28,8 ; 33,3	12,4	10,9 ; 14,0
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,369					
Hommes	56,6	33,5	9,9	55,4	51,8 ; 59,1	32,7	29,3 ; 36,3	11,9	9,6 ; 14,2
Femmes	55,5	32,8	11,7	57,4	54,2 ; 60,8	29,6	26,6 ; 32,6	13,0	10,8 ; 15,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	65,3	57,4 ; 73,0	29,2	22,1 ; 36,8	5,5**	1,9 ; 9,8
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	64,0	59,9 ; 68,0	29,6	25,9 ; 33,3	6,4*	4,3 ; 8,7
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	52,2	48,2 ; 56,3	32,2	28,5 ; 36,0	15,6	12,7 ; 18,4
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	36,1	30,3 ; 42,0	34,6	29,0 ; 40,4	29,4	23,5 ; 35,1
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	46,7	41,7 ; 51,7	34,4	29,7 ; 38,9	18,9	15,3 ; 23,0
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	50,1	45,9 ; 54,3	33,1	29,0 ; 37,1	16,8	13,8 ; 20,1
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	63,7	59,6 ; 67,6	28,5	24,7 ; 32,5	7,8*	5,5 ; 10,2
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	61,9	53,3 ; 70,5	29,3	21,4 ; 37,2	8,8**	4,6 ; 13,4
Autre	46,0	39,4	14,6	47,6	36,0 ; 60,1	30,0*	19,0 ; 41,6	22,4*	11,9 ; 32,4
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	37,8	32,7 ; 43,1	38,8	33,7 ; 44,1	23,4	19,1 ; 27,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	50,1	45,3 ; 54,9	35,4	30,7 ; 40,0	14,5	11,3 ; 18,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	65,3	60,3 ; 70,1	29,0	24,3 ; 33,7	5,7*	3,5 ; 8,3
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	73,0	68,6 ; 77,4	21,3	17,3 ; 25,2	5,7*	3,5 ; 8,2
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	34,5	28,1 ; 41,0	34,4	27,6 ; 41,0	31,1	25,4 ; 37,3
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	59,7	57,1 ; 62,4	30,7	28,3 ; 33,2	9,5	7,9 ; 11,3
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	33,5	25,4 ; 41,4	32,6	25,3 ; 40,3	33,9	26,9 ; 41,1
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	59,2	56,6 ; 61,8	30,8	28,4 ; 33,3	10,0	8,4 ; 11,6
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	62,0	59,1 ; 65,0	29,6	26,8 ; 32,3	8,4	6,7 ; 10,2
Étudiants	62,7	32,2	5,0	66,1	57,0 ; 75,1	28,5	20,2 ; 37,3	5,4**	1,3 ; 10,3
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	32,3	22,0 ; 42,0	34,4	25,0 ; 44,4	33,3	23,5 ; 43,1
Retraités	40,2	39,5	20,4	38,8	33,9 ; 43,6	36,1	31,3 ; 41,0	25,1	20,5 ; 29,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	56,5	54,1 ; 58,8	31,1	28,8 ; 33,3	12,4	10,9 ; 14,0
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	44,2	39,3 ; 48,9	38,2	33,6 ; 42,8	17,6	14,1 ; 21,1
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	61,2	58,4 ; 64,1	28,4	25,7 ; 31,1	10,4	8,7 ; 12,2
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	28,9**	14,4 ; 46,0	41,0*	23,3 ; 61,1	30,1**	11,8 ; 48,6
Poids normal	62,6	29,4	8,0	63,8	60,0 ; 67,6	27,0	23,6 ; 30,6	9,2	7,1 ; 11,3
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	50,8	47,3 ; 54,3	34,5	31,3 ; 37,7	14,6	12,4 ; 17,0
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	65,9	62,6 ; 69,2	24,4	21,3 ; 27,4	9,8	7,8 ; 11,8
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	49,9	46,1 ; 53,9	38,6	34,9 ; 42,4	11,4	8,9 ; 13,8
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	31,5	23,4 ; 40,6	30,3	21,0 ; 38,9	38,2	29,0 ; 47,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	37,0	31,7 ; 42,5	32,6	27,6 ; 37,8	30,3	25,3 ; 35,4
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	62,4	59,7 ; 65,3	30,6	28,1 ; 33,3	6,9	5,6 ; 8,3

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	49,8	47,2 ; 52,2	43,8	41,3 ; 46,3	6,5	5,3 ; 7,7
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,018		
Hommes	47,5	46,6	6,0	50,8	47,1 ; 54,4	44,5	40,8 ; 48,1	4,7	3,3 ; 6,2
Femmes	47,1	45,9	7,0	48,7	45,4 ; 52,1	43,1	39,6 ; 46,5	8,1	6,3 ; 10,2
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,422		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	51,2	42,9 ; 59,6	45,5	37,5 ; 53,9	3,3**	0,5 ; 6,4
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	48,8	44,6 ; 53,0	43,4	39,2 ; 47,8	7,8	5,6 ; 10,2
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	48,0	43,9 ; 51,8	44,9	41,2 ; 48,9	7,1	5,2 ; 9,1
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	55,9	49,6 ; 62,0	39,2	33,0 ; 45,4	4,9*	2,5 ; 7,8
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,010		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	42,8	37,8 ; 47,6	44,5	39,5 ; 49,4	12,7	9,4 ; 16,2
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	56,9	52,5 ; 61,2	38,9	34,6 ; 43,2	4,2*	2,5 ; 6,2
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	48,2	43,9 ; 52,3	45,8	41,8 ; 50,2	6,0*	4,0 ; 8,2
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	44,9	36,0 ; 53,5	48,0	39,2 ; 56,4	7,1**	3,5 ; 11,4
Autre	44,5	46,1	9,4*	43,7	32,1 ; 55,7	46,6	34,9 ; 58,8	9,7**	3,6 ; 16,4
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,671		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	51,5	46,1 ; 56,7	43,9	38,5 ; 49,2	4,6*	2,6 ; 6,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	50,6	45,5 ; 55,4	42,1	37,4 ; 47,2	7,3*	4,9 ; 10,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	47,2	42,0 ; 52,3	45,6	40,3 ; 50,8	7,2*	4,7 ; 9,8
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	49,0	43,7 ; 54,2	44,4	39,6 ; 49,6	6,5*	4,2 ; 9,2
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	46,1	39,1 ; 52,9	39,0	32,3 ; 45,7	14,9*	10,3 ; 19,9
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	50,3	47,6 ; 53,0	44,5	41,8 ; 47,4	5,2	4,0 ; 6,3
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	27,7	20,6 ; 35,2	54,0	46,2 ; 61,7	18,3*	12,9 ; 24,4
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	52,1	49,4 ; 54,6	42,7	40,1 ; 45,4	5,2	4,1 ; 6,4
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,253		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	49,2	46,0 ; 52,5	43,9	40,9 ; 47,0	6,9	5,4 ; 8,4
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	48,4	39,3 ; 58,0	50,0	40,5 ; 59,1	x	;
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	38,3	28,2 ; 48,9	46,3	36,0 ; 56,4	15,4*	8,2 ; 23,1
Retraités	51,9	42,8	5,3	56,6	51,3 ; 61,6	38,0	33,0 ; 43,0	5,4*	3,2 ; 7,9
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	57,8	54,4 ; 61,1	38,6	35,3 ; 41,9	3,6*	2,5 ; 4,9
Bon	40,5	52,6	6,9	39,1	34,7 ; 43,6	54,6	50,0 ; 59,4	6,3*	4,1 ; 8,4
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	39,4	32,6 ; 46,4	40,6	33,6 ; 47,8	20,0	14,6 ; 25,6
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	29,9	24,7 ; 34,9	51,7	46,0 ; 57,4	18,4	14,4 ; 22,7
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	54,7	51,8 ; 57,6	42,0	39,1 ; 44,7	3,3*	2,3 ; 4,3
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	21,3	49,3	29,4	23,2**	9,0 ; 39,3	50,8*	32,5 ; 67,2	26,1**	13,0 ; 41,7
Non	48,1	46,1	5,8	50,6	48,1 ; 53,1	43,5	41,0 ; 46,0	5,9	4,7 ; 7,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	21,0	19,0 ; 23,1	79,0	76,9 ; 81,0
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Hommes	18,2	81,8	17,0	14,2 ; 19,9	83,0	80,1 ; 85,8
Femmes	26,0	74,0	24,8	21,9 ; 27,9	75,2	72,1 ; 78,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,580			
15-24 ans	24,4	75,6	22,6*	16,0 ; 29,6	77,4	70,4 ; 84,0
25-44 ans	24,3	75,7	22,4	19,0 ; 26,0	77,6	74,0 ; 81,0
45-64 ans	20,6	79,4	19,3	16,4 ; 22,6	80,7	77,4 ; 83,6
65 ans et plus	18,8	81,2	20,2	14,9 ; 26,0	79,8	74,0 ; 85,1
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,009			
Personne seule	25,7	74,3	26,1	21,9 ; 30,5	73,9	69,5 ; 78,1
Couple sans enfant	17,7	82,3	18,0	14,7 ; 21,5	82,0	78,5 ; 85,3
Couple avec enfants	20,8	79,2	19,7	16,4 ; 23,4	80,3	76,6 ; 83,6
Famille monoparentale	32,2	67,8	28,2	20,9 ; 36,2	71,8	63,8 ; 79,1
Autre	29,7	70,3	30,2*	18,8 ; 41,9	69,8	58,1 ; 81,2
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,001			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	21,9	17,5 ; 26,8	78,1	73,2 ; 82,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	26,7	22,3 ; 30,9	73,3	69,1 ; 77,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	19,6	15,7 ; 23,7	80,4	76,3 ; 84,3
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	15,2	11,8 ; 18,8	84,8	81,2 ; 88,2
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	36,2	29,9 ; 43,3	63,8	56,7 ; 70,1
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	18,9	16,7 ; 21,2	81,1	78,8 ; 83,3
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	45,4	37,6 ; 53,3	54,6	46,7 ; 62,4
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	18,4	16,3 ; 20,5	81,6	79,5 ; 83,7
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,004			
Travailleurs	20,9	79,1	19,1	16,8 ; 21,6	80,9	78,4 ; 83,2
Étudiants	24,8	75,2	25,1*	17,4 ; 33,4	74,9	66,6 ; 82,6
Personnes sans emploi	37,9	62,1	36,3	26,6 ; 47,1	63,7	52,9 ; 73,4
Retraités	18,2	81,8	19,6	15,3 ; 24,2	80,4	75,8 ; 84,7
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	13,6	11,3 ; 16,1	86,4	83,9 ; 88,7
Bon	26,6	73,4	22,1	18,5 ; 25,8	77,9	74,2 ; 81,5
Passable ou mauvais	48,8	51,2	53,8	46,6 ; 61,0	46,2	39,0 ; 53,4
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	12,6	10,2 ; 15,0	87,4	85,0 ; 89,8
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	24,6	21,2 ; 28,2	75,4	71,8 ; 78,8
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	59,6	50,5 ; 69,2	40,4	30,8 ; 49,5
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	73,7	56,7 ; 88,9	26,3**	11,1 ; 43,3
Non	20,6	79,4	19,1	17,2 ; 21,1	80,9	78,9 ; 82,8
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	20,4	18,4 ; 22,4	79,6	77,6 ; 81,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,3*	1,6 ; 3,1	2,9*	1,6 ; 4,2	1,8*	0,9 ; 2,7
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,778		P = 0,841		P = 0,201	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	2,9**	0,3 ; 6,3	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,3**	1,1 ; 3,6	3,6**	1,4 ; 6,1	x	;
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,4*	1,3 ; 3,6	2,2**	0,5 ; 4,2	2,5**	1,2 ; 4,2
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,277		P = 0,268		P = 0,426	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	4,3*	2,4 ; 6,5	5,1**	1,6 ; 9,1	3,7**	1,4 ; 6,6
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	2,0**	0,8 ; 3,4	2,0**	0,2 ; 4,1	2,0**	0,2 ; 4,0
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,6**	0,6 ; 2,9	2,0**	0,3 ; 4,3	x	;
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	3,8**	0,6 ; 7,6	x	;	x	;
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,939		P = 0,944		P = 0,957	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	2,7**	0,9 ; 4,9	3,1**	0,4 ; 6,7	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,4**	1,0 ; 4,0	3,2**	0,7 ; 6,1	1,6**	0,2 ; 3,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	2,0**	0,7 ; 3,5	x	;	1,9**	0,5 ; 3,7
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	2,2**	1,0 ; 3,7	3,0**	0,9 ; 5,4	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,056		P = 0,023	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	5,4**	2,6 ; 8,6	6,6**	1,5 ; 12,9	4,5**	1,5 ; 12,9
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	1,9*	1,1 ; 2,7	2,3**	1,1 ; 3,8	1,4**	1,1 ; 3,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	10,3*	5,6 ; 16,0	12,6**	4,9 ; 21,7	7,8**	2,8 ; 14,4
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,5*	0,9 ; 2,2	1,8**	0,8 ; 3,0	1,2**	0,5 ; 2,1
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,019		P = 0,009		P = 0,085	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	1,8*	1,1 ; 2,8	1,9**	0,8 ; 3,3	1,8**	0,7 ; 3,0
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	7,4**	2,1 ; 13,3	x	;	4,9**	0,5 ; 10,4
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,8**	0,5 ; 3,4	3,4**	0,5 ; 6,6	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,004		P = 0,063	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	0,8**	0,3 ; 1,4	0,9**	0,0 ; 2,0	0,7**	0,0 ; 1,5
Bon	2,5	2,7	2,4	3,6*	2,0 ; 5,5	3,8**	1,3 ; 6,9	3,4**	1,4 ; 5,9
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	5,9**	2,6 ; 9,8	9,6**	3,3 ; 17,0	2,8**	0,3 ; 6,7
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,032		P = 0,001	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	1,1**	0,4 ; 1,9	1,9**	0,5 ; 3,6	x	;
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,7*	1,4 ; 4,1	3,1**	1,2 ; 5,4	2,2**	0,7 ; 4,1
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	9,4**	4,6 ; 15,2	11,9**	2,3 ; 22,9	8,1**	2,3 ; 15,0
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	8,4*	5,4 ; 11,8	11,5**	5,5 ; 18,3	6,4**	3,2 ; 9,8
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,8**	0,3 ; 1,3	1,2**	0,3 ; 2,2	x	;

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,8**	0,3 ; 1,4	0,6**	0,0 ; 1,3	1,1**	0,3 ; 2,1
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,034		P = 0,024		P = 0,081	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	0,7**	0,0 ; 1,4	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	x	;	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,265		P = 0,004		P = 0,542	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,212		P = 0,029		P = 0,670	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	1,9**	0,5 ; 3,8	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,438		P = 0,927		P = 0,411	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,063		P = 0,020		P = 0,464	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	2,4**	0,3 ; 5,2	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,7**	0,2 ; 1,3	x	;	1,0**	0,2 ; 2,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,844		P = 0,770		P = 0,770	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	0,7**	0,1 ; 1,6	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	1,0**	0,1 ; 2,1	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	x	;	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,109		P = 0,049		P = 0,223	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	1,2**	0,3 ; 2,4	x	;	1,7**	0,1 ; 3,9
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = .		P = 0,000	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	3,8**	1,5 ; 6,5	3,5**	0,2 ; 7,9	4,0**	0,8 ; 8,0
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>	P = 0,553			P = 0,901					
Oui	10,2	10,0	10,3	9,7	8,3 ; 11,2	9,6	7,5 ; 11,8	9,8	7,8 ; 11,8
Non	89,8	90,0	89,7	90,3	88,8 ; 91,7	90,4	88,2 ; 92,5	90,2	88,2 ; 92,2
<b>Tentative de suicide à vie</b>	P = 0,000			P = 0,446					
Oui	4,4	3,5	5,3	4,7	3,7 ; 5,8	4,3*	2,9 ; 5,8	5,1*	3,6 ; 6,8
Non	95,6	96,5	94,7	95,3	94,2 ; 96,3	95,7	94,2 ; 97,1	94,9	93,2 ; 96,4

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	11,2	9,7 ; 12,9	13,2	10,8 ; 15,7	9,3	7,3 ; 11,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,009		P = 0,083	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	18,4*	12,4 ; 24,6	21,1*	12,4 ; 30,4	15,5**	7,1 ; 25,0
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	12,1	9,6 ; 15,0	16,4	12,3 ; 21,1	7,8*	4,9 ; 11,0
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	8,0	6,0 ; 10,1	8,5*	5,5 ; 11,8	7,5*	5,0 ; 10,3
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	9,0*	5,4 ; 12,9	6,8**	1,4 ; 13,9	10,8*	6,5 ; 16,0
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,137		P = 0,017		P = 0,913	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	9,1*	6,3 ; 11,9	8,0**	3,6 ; 12,5	9,9*	6,3 ; 13,9
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	9,6	7,1 ; 12,0	10,0*	6,3 ; 14,0	9,1*	6,0 ; 12,5
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	11,7	8,9 ; 14,5	13,9*	9,8 ; 18,2	9,4*	5,9 ; 13,2
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	15,6*	9,8 ; 21,8	21,1**	10,7 ; 33,4	10,7**	5,0 ; 17,6
Autre	14,9	16,7	13,2*	16,1**	7,8 ; 25,3	25,8**	11,3 ; 41,0	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,877		P = 0,716		P = 0,824	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	12,0*	8,5 ; 15,7	15,1*	9,7 ; 20,8	8,3**	4,2 ; 12,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	10,3*	7,2 ; 13,7	11,0*	6,3 ; 16,5	9,6*	5,9 ; 14,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	11,6	8,5 ; 14,9	13,4*	8,3 ; 19,0	10,1*	6,3 ; 14,3
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	10,9	8,1 ; 14,0	13,8*	9,3 ; 18,9	7,8*	4,4 ; 11,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,642		P = 0,957		P = 0,322	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	12,1*	8,1 ; 16,9	13,4**	6,5 ; 21,9	11,1*	6,3 ; 17,3
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	11,1	9,4 ; 12,9	13,7	11,1 ; 16,5	8,4	6,4 ; 10,7
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,134		P = 0,090		P = 0,337	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	11,0	9,2 ; 13,0	13,4	10,6 ; 16,5	8,4	6,3 ; 10,8
Étudiants	17,1	21,4	12,9	16,0*	9,6 ; 22,7	17,8**	8,4 ; 28,1	14,1**	4,8 ; 25,0
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	11,9**	5,5 ; 19,6	29,0**	7,6 ; 51,5	6,1**	1,4 ; 11,9
Retraités	7,5	7,0	7,9	8,7*	5,6 ; 12,1	7,8**	2,8 ; 13,5	9,6*	6,0 ; 13,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	77,1	70,0 ; 84,0	78,6	69,2 ; 87,4	74,9	64,6 ; 85,3
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	22,9*	16,0 ; 30,0	21,4*	12,6 ; 30,8	25,1*	14,7 ; 35,4
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	29,8	22,8 ; 36,9	33,0	23,5 ; 43,2	25,3*	14,7 ; 36,6
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	12,1*	7,3 ; 17,6	11,1**	4,7 ; 18,8	13,4**	6,0 ; 22,3
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	15,9*	10,2 ; 22,3	20,9*	12,8 ; 30,4	8,8**	1,9 ; 17,1
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	8,8*	5,2 ; 13,4	6,0**	1,3 ; 11,8	12,7**	6,2 ; 20,2
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	15,7*	10,1 ; 21,5	15,5*	7,8 ; 23,6	15,9*	7,9 ; 24,7
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	2,6**	0,6 ; 4,9	x	;	5,1**	1,0 ; 10,0
Autre	12,1	8,1	17,6	15,2*	10,2 ; 21,1	x	;	18,8*	11,0 ; 28,1
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	20,9	15,4 ; 27,3	18,3*	11,2 ; 26,3	24,6*	15,5 ; 34,6
Printemps	21,2	20,7	21,9	23,4	16,8 ; 30,0	18,7*	10,8 ; 27,4	29,9*	19,1 ; 40,2
Été	29,1	30,3	27,4	36,4	28,5 ; 43,8	41,3	30,5 ; 51,5	29,6*	19,3 ; 40,2
Automne	23,7	24,0	23,3	19,3*	13,4 ; 25,3	21,8*	13,6 ; 30,7	16,0**	8,3 ; 24,9
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	42,5	34,9 ; 50,1	34,7	24,4 ; 44,9	53,7	41,5 ; 65,6
Endroit public	28,1	24,8	32,5	23,5	17,1 ; 30,4	24,3*	15,2 ; 34,2	22,3*	13,7 ; 31,9
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	29,5	22,2 ; 37,3	33,4	23,1 ; 43,7	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	4,5**	1,2 ; 8,2	7,7**	2,0 ; 13,9	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	8,2*	4,1 ; 12,5	8,9**	3,3 ; 15,3	7,1**	1,7 ; 13,6
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	4,0**	1,0 ; 7,5	x	;	x	;
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	4,9**	1,2 ; 9,3	x	;	x	;
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	9,5**	4,7 ; 14,7	11,9**	4,9 ; 20,1	6,0**	0,8 ; 12,5
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	x	;	x	;	x	;
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	23,5	17,2 ; 30,2	26,3*	18,1 ; 35,6	19,7**	10,1 ; 30,1
Chute	34,6	30,5	40,3	35,4	28,7 ; 43,0	26,2*	17,0 ; 35,7	48,2	37,6 ; 59,9
Autres	13,7	12,5	15,3	12,7*	7,5 ; 18,3	13,9**	6,6 ; 21,7	11,1**	4,0 ; 19,9
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	x	;	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	21,9	15,8 ; 28,7	24,0*	15,2 ; 33,3	19,1*	10,6 ; 28,3
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	48,6	41,1 ; 56,3	43,7	32,8 ; 53,8	55,3	44,2 ; 66,6
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	x	;	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	16,3*	11,0 ; 21,8	18,8*	11,2 ; 27,3	12,9**	5,7 ; 20,5
Autre	11,9	10,9	13,2	9,9*	5,7 ; 14,6	9,9**	4,0 ; 16,5	9,9**	3,9 ; 17,5

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	5,6*	3,2 ; 8,4	x	;	8,9*	4,8 ; 13,6
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,293		P = .		P = 0,387	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	7,0**	3,6 ; 11,1	x	;	11,4**	5,5 ; 18,3
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	3,8**	0,2 ; 8,2	x	;	6,9**	0,4 ; 15,0
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,577		P = 0,165		P = 0,827	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	6,6**	2,6 ; 11,3	x	;	8,2**	3,0 ; 14,5
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	5,1**	2,0 ; 8,7	x	;	9,1**	3,5 ; 15,7
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,099		P = .		P = 0,219	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	11,0**	2,1 ; 22,5	x	;	15,2**	2,1 ; 31,9
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	4,2**	1,9 ; 7,0	x	;	7,4**	3,4 ; 12,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,253		P = 0,011		P = 0,615	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	8,7**	3,0 ; 15,7	x	;	11,0**	3,4 ; 19,9
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	5,1**	2,3 ; 8,6	x	;	8,7**	3,7 ; 14,9
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,192		P = .		P = 0,172	
Oui	5,9	3,6*	7,3	7,7**	3,3 ; 13,1	x	;	12,1**	5,2 ; 20,5
Non	2,7*	2,2**	3,1*	3,6**	0,8 ; 6,9	x	;	4,9**	0,5 ; 10,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,053		P = .		P = 0,048	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	12,6**	3,6 ; 23,5	x	;	18,0**	5,5 ; 32,3
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	4,4**	1,7 ; 7,6	x	;	6,1**	2,1 ; 10,9
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,436		P = 'n.d.'		P = .	
Résidence	62,7	52,8	68,6	57,5**	29,8 ; 89,5	x	;	73,6*	45,6 ; 95,9
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	76,0**	28,0 ; 100,0	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	26,5**	5,9 ; 50,6	x	;	28,2**	6,1 ; 53,7
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	31,6**	5,7 ; 58,6	x	;	33,5**	6,1 ; 62,5
Été	29,3*	28,8**	29,5*	37,5**	12,7 ; 64,5	x	;	33,7**	8,3 ; 60,7
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	x	;	x	;	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	17,8**	1,9 ; 37,6	x	;	20,5**	2,4 ; 42,6
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	31,6**	8,5 ; 57,6	x	;	36,4**	10,5 ; 63,6
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	15,0	13,2 ; 16,8	15,3	12,6 ; 18,1	14,6	12,4 ; 17,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,052		P = 0,011	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	9,9*	5,3 ; 14,9	12,8**	5,7 ; 21,0	6,9**	1,5 ; 13,2
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	17,8	14,6 ; 21,2	18,8	14,1 ; 24,1	16,8	12,6 ; 21,4
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	17,7	14,7 ; 20,9	16,6	12,2 ; 21,6	18,8	14,8 ; 23,0
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	6,3*	3,6 ; 9,3	5,2**	1,5 ; 9,7	7,2**	3,7 ; 11,4
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,153		P = 0,547		P = 0,363	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	12,7	9,6 ; 16,3	12,0*	6,6 ; 17,8	13,2	9,1 ; 17,6
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	13,7	10,8 ; 16,7	13,7*	9,7 ; 18,3	13,7*	9,7 ; 17,8
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	17,2	14,1 ; 20,5	17,7	13,2 ; 22,5	16,7	12,4 ; 21,3
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	17,3*	11,5 ; 23,9	18,8**	8,6 ; 30,4	16,1*	9,4 ; 23,7
Autre	11,4	12,8*	10,2*	9,0**	2,7 ; 16,7	11,5**	1,8 ; 23,6	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,002		P = 0,079		P = 0,013	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	8,8*	6,0 ; 11,8	9,7*	5,4 ; 14,7	7,8*	4,4 ; 11,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	17,3	13,8 ; 20,9	15,1*	9,9 ; 20,8	19,1	14,0 ; 24,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	16,3	12,5 ; 20,1	17,5*	11,6 ; 23,9	15,3	10,9 ; 20,3
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	17,2	13,6 ; 21,2	19,0*	13,4 ; 25,0	15,3*	10,8 ; 20,2
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,434		P = 0,090		P = 0,425	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	13,0*	8,4 ; 17,7	7,1**	1,7 ; 13,7	17,3*	10,5 ; 24,6
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	15,2	13,3 ; 17,3	16,1	13,2 ; 19,4	14,3	11,9 ; 16,8
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,177		P = 0,708		P = 0,101	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	19,0*	12,8 ; 25,9	17,1**	8,1 ; 26,6	21,3*	12,4 ; 31,2
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	14,7	12,9 ; 16,7	15,2	12,3 ; 18,3	14,3	11,9 ; 16,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,035		P = 0,070	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	17,7	15,3 ; 20,1	18,4	14,9 ; 22,1	17,0	13,8 ; 20,1
Étudiants	9,9	9,7	10,1	10,4**	4,9 ; 16,4	11,5**	4,0 ; 20,7	9,2**	2,1 ; 17,4
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	18,1*	10,5 ; 27,1	x	;	18,5*	9,6 ; 28,7
Retraités	6,9	6,7	7,0	8,1*	5,5 ; 10,9	7,4**	3,4 ; 11,8	8,7*	5,2 ; 12,5

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,141				
Oui	45,2	47,6	42,8	47,4	40,8 ; 54,3	52,1	42,5 ; 62,4	42,5	33,2 ; 51,6	
Non	54,8	52,4	57,2	52,6	45,7 ; 59,2	47,9	37,6 ; 57,5	57,5	48,4 ; 66,8	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,080				
Oui	25,4	27,6	23,1	22,8	17,1 ; 29,0	27,6*	18,7 ; 36,8	17,7*	10,7 ; 25,4	
Non	74,6	72,4	76,9	77,2	71,0 ; 82,9	72,4	63,2 ; 81,3	82,3	74,6 ; 89,3	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,294				
Oui	17,6	15,6	19,6	20,2	15,1 ; 25,3	17,6*	10,1 ; 25,1	22,9*	15,7 ; 29,8	
Non	82,4	84,4	80,4	79,8	74,7 ; 84,9	82,4	74,9 ; 89,9	77,1	70,2 ; 84,3	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,289				
Oui	8,1	7,2	9,0	7,1**	3,7 ; 11,0	5,2**	1,4 ; 10,0	9,1**	3,5 ; 16,0	
Non	91,9	92,8	91,0	92,9	89,0 ; 96,3	94,8	90,0 ; 98,6	90,9	84,0 ; 96,5	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	4,2**	1,6 ; 7,0	x	;	6,4**	2,2 ; 11,3	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	53,9	47,7 ; 60,3	46,9	37,3 ; 56,9	61,1	52,9 ; 69,8	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	18,1	12,8 ; 23,7	21,2*	12,7 ; 29,8	15,0*	8,7 ; 21,9	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	3,6**	1,6 ; 5,9	x	;	x	;	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	18,3	13,3 ; 23,7	26,1*	17,9 ; 35,0	10,3*	5,3 ; 16,0	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	1,9**	0,4 ; 3,7	x	;	x	;	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	33,2	30,9 ; 35,5	27,3	24,2 ; 30,5	39,1	35,8 ; 42,4
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,024	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	22,0	15,7 ; 28,8	13,4**	6,2 ; 21,7	31,2*	20,4 ; 42,3
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	30,7	26,5 ; 34,6	26,4	21,0 ; 32,1	34,9	29,0 ; 40,7
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	39,9	36,1 ; 43,7	34,4	28,8 ; 40,0	45,2	40,2 ; 50,3
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	35,6	30,0 ; 41,2	28,1	19,8 ; 36,5	42,1	34,7 ; 49,6
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,258		P = 0,565		P = 0,558	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	35,0	30,5 ; 39,6	32,3	24,9 ; 39,7	37,0	30,8 ; 43,1
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	36,6	32,7 ; 40,7	30,4	24,8 ; 36,2	42,6	36,9 ; 48,7
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	30,8	26,8 ; 34,8	25,6	20,4 ; 30,8	36,5	30,7 ; 42,5
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	34,8	26,8 ; 43,1	26,3*	14,6 ; 38,7	42,1	31,8 ; 52,8
Autre	34,0	32,4	35,4	30,3*	20,1 ; 41,1	23,4**	10,5 ; 38,3	37,1*	20,8 ; 53,2
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,508		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	37,1	32,1 ; 42,3	29,5	23,3 ; 36,0	46,1	38,5 ; 54,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	37,9	33,2 ; 42,5	28,3	21,9 ; 35,2	46,5	40,1 ; 53,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	32,9	28,1 ; 37,6	28,3	21,5 ; 35,1	36,7	30,1 ; 43,6
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	24,7	20,5 ; 29,0	23,0	17,1 ; 29,6	26,4	20,7 ; 32,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,017		P = 0,967		P = 0,012	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	40,1	33,9 ; 46,5	27,3*	18,4 ; 37,2	49,3	40,0 ; 57,9
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	32,1	29,5 ; 34,6	27,1	23,6 ; 30,8	37,2	33,5 ; 40,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	55,8	47,8 ; 63,8	51,5	40,4 ; 63,0	60,5	49,3 ; 71,0
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	30,7	28,3 ; 33,1	24,5	21,1 ; 27,7	36,6	33,1 ; 40,0
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,101		P = 0,015	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	33,4	30,5 ; 36,3	28,7	24,6 ; 32,7	38,4	34,1 ; 42,6
Étudiants	20,7	14,8	26,3	21,9*	14,6 ; 30,2	15,2**	6,2 ; 25,7	29,1*	17,2 ; 41,6
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	49,2	39,5 ; 59,7	29,6**	12,1 ; 51,9	55,5	44,2 ; 67,6
Retraités	34,2	30,5	37,2	35,1	30,1 ; 39,8	29,7	22,7 ; 36,7	40,3	33,5 ; 46,8
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	24,9	22,0 ; 28,0	20,8	16,8 ; 25,0	28,7	24,6 ; 32,9
Bon	33,9	28,1	39,6	37,2	32,9 ; 41,3	28,9	23,3 ; 34,6	46,0	39,7 ; 52,2
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	60,3	53,2 ; 67,6	51,6	40,6 ; 63,2	67,9	58,7 ; 76,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	52,6	47,4 ; 58,1	45,1	36,2 ; 54,4	57,6	50,6 ; 64,5
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	27,5	25,0 ; 29,9	22,9	19,6 ; 26,3	32,3	28,5 ; 36,1
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,251		P = 0,000	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	26,8**	13,4 ; 43,8	x	;	25,1**	10,5 ; 43,6
Poids normal	28,3	22,9	32,1	31,7	28,2 ; 35,4	26,1	20,6 ; 32,2	35,3	30,5 ; 40,0
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	30,1	26,3 ; 33,8	25,2	20,6 ; 29,9	38,3	32,0 ; 44,7
Obésité	37,9	30,5	46,1	44,3	38,7 ; 49,7	34,3	26,4 ; 42,3	55,7	47,3 ; 63,6

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	30,3	25,3	35,2	33,2	30,9 ; 35,5	27,3	24,2 ; 30,5	39,1	35,8 ; 42,4		
Non	69,7	74,7	64,8	66,8	64,5 ; 69,1	72,7	69,5 ; 75,8	60,9	57,6 ; 64,2		
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,007					
Oui	9,5	6,4	12,5	12,1	10,6 ; 13,6	9,9	7,9 ; 12,1	14,3	12,1 ; 16,6		
Non	90,5	93,6	87,5	87,9	86,4 ; 89,4	90,1	87,9 ; 92,1	85,7	83,4 ; 87,9		
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,215					
Oui	14,5	12,2	16,7	15,9	14,2 ; 17,6	14,9	12,4 ; 17,5	17,0	14,4 ; 19,5		
Non	85,5	87,8	83,3	84,1	82,4 ; 85,8	85,1	82,5 ; 87,6	83,0	80,5 ; 85,6		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	13,5	10,8	16,1	16,2	14,5 ; 18,0	12,8	10,7 ; 15,2	19,5	16,9 ; 22,3		
Non	86,5	89,2	83,9	83,8	82,0 ; 85,5	87,2	84,8 ; 89,3	80,5	77,7 ; 83,1		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	14,5	11,8	17,2	16,2	14,4 ; 17,9	12,2	9,9 ; 14,6	20,0	17,4 ; 22,6		
Non	85,5	88,2	82,8	83,8	82,1 ; 85,6	87,8	85,4 ; 90,1	80,0	77,4 ; 82,6		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,131					
Oui	17,8	16,0	19,6	20,7	18,6 ; 22,5	19,2	16,4 ; 21,9	22,2	19,4 ; 24,9		
Non	82,2	84,0	80,4	79,3	77,5 ; 81,4	80,8	78,1 ; 83,6	77,8	75,1 ; 80,6		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	14,2	10,6	17,8	14,6	12,9 ; 16,4	9,7	7,5 ; 11,9	19,4	16,7 ; 22,3		
Non	85,8	89,4	82,2	85,4	83,6 ; 87,1	90,3	88,1 ; 92,5	80,6	77,7 ; 83,3		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	57,9	55,5 ; 60,2	31,0	28,7 ; 33,2	11,1	9,5 ; 12,8
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,107					
Hommes	52,6	34,1	13,3	55,6	51,8 ; 59,3	31,9	28,3 ; 35,2	12,6	10,1 ; 15,0
Femmes	60,1	29,8	10,1	60,1	57,0 ; 63,3	30,1	27,3 ; 33,2	9,8	7,8 ; 11,8
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	57,2	49,2 ; 64,6	35,4	27,8 ; 43,0	7,4**	3,3 ; 11,9
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	67,5	63,5 ; 71,4	23,2	19,9 ; 26,8	9,3	6,9 ; 11,9
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	56,3	52,5 ; 60,2	31,0	27,4 ; 34,4	12,8	10,3 ; 15,6
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	36,5	31,1 ; 42,4	47,0	40,9 ; 53,0	16,4	11,9 ; 21,5
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,003					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	50,8	45,7 ; 55,8	34,7	30,1 ; 39,4	14,5	11,1 ; 18,2
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	52,3	48,0 ; 56,5	36,2	32,0 ; 40,2	11,5	8,9 ; 14,4
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	64,3	60,2 ; 68,3	25,5	21,8 ; 29,1	10,2	7,6 ; 12,9
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	59,3	50,7 ; 68,1	31,6	23,4 ; 40,0	9,1**	4,7 ; 14,1
Autre	48,0	34,3	17,7	46,8	34,7 ; 59,0	38,5*	25,9 ; 51,3	14,7**	6,3 ; 23,9
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,916					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	57,9	55,5 ; 60,3	31,1	28,8 ; 33,4	11,0	9,3 ; 12,6
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	42,1**	6,3 ; 81,8	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	60,5	49,2 ; 71,5	25,4*	15,6 ; 36,1	14,1**	6,9 ; 22,6
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,841					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	58,6	55,9 ; 61,2	30,5	28,0 ; 33,0	11,0	9,3 ; 12,7
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	55,4	48,3 ; 62,1	32,4	26,0 ; 38,7	12,2*	7,8 ; 16,8
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	42,6**	15,1 ; 72,7	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	40,6	35,4 ; 45,8	43,4	38,1 ; 48,7	16,0	12,3 ; 20,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	52,1	47,2 ; 57,2	33,0	28,2 ; 37,5	14,9	11,5 ; 18,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	68,0	63,1 ; 72,5	25,6	21,4 ; 30,2	6,4*	3,9 ; 9,2
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	71,4	66,9 ; 75,7	21,9	17,9 ; 26,0	6,7*	4,3 ; 9,3
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	36,1	29,4 ; 42,7	44,6	37,7 ; 51,4	19,3	14,5 ; 24,6
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	61,5	58,8 ; 64,2	28,7	26,1 ; 31,1	9,8	8,1 ; 11,6
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	37,1	28,9 ; 44,9	39,7	31,8 ; 47,6	23,1	16,7 ; 30,6
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	60,2	57,7 ; 62,8	29,8	27,5 ; 32,3	9,9	8,2 ; 11,5
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	63,0	60,0 ; 66,0	26,5	23,8 ; 29,2	10,5	8,5 ; 12,5
Étudiants	62,8	27,9	9,3	59,6	50,0 ; 68,5	35,6	26,8 ; 44,8	4,8**	1,2 ; 9,2
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	52,1	41,2 ; 62,4	32,2	22,9 ; 42,1	15,8*	8,9 ; 23,6
Retraités	49,7	38,1	12,2	40,9	36,1 ; 45,9	43,6	38,4 ; 48,6	15,5	11,6 ; 19,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	57,9	55,5 ; 60,2	31,0	28,7 ; 33,2	11,1	9,5 ; 12,8
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	46,7	41,7 ; 51,6	36,2	31,8 ; 41,0	17,1	13,6 ; 20,8
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	62,2	59,4 ; 64,9	28,9	26,3 ; 31,5	8,9	7,2 ; 10,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	71,6	68,5 ; 74,6	22,4	19,8 ; 25,4	5,9	4,4 ; 7,6
Bon	41,4	42,6	16,0	44,5	40,0 ; 48,8	42,8	38,7 ; 47,4	12,7	9,6 ; 15,7
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	29,7	23,3 ; 36,1	39,6	32,6 ; 46,5	30,7	24,5 ; 37,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	47,3	41,5 ; 52,8	34,1	29,0 ; 39,5	18,6	14,3 ; 23,3
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	61,1	58,3 ; 63,8	30,0	27,3 ; 32,6	9,0	7,3 ; 10,7
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	37,3	30,6 ; 44,2	50,7	43,6 ; 57,8	12,0*	7,6 ; 16,9
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	60,2	57,6 ; 62,7	28,8	26,5 ; 31,2	11,0	9,3 ; 12,8
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	62,3	59,5 ; 65,0	28,6	26,2 ; 31,2	9,1	7,5 ; 10,9
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	43,3	38,3 ; 48,5	38,8	33,6 ; 43,6	17,9	13,9 ; 22,1
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	64,3	60,2 ; 68,4	29,7	25,7 ; 33,6	5,9*	3,9 ; 8,3
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	57,9	54,3 ; 61,1	28,4	25,2 ; 31,3	13,8	11,4 ; 16,2

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	9,7	8,5 ; 10,9	8,5	6,8 ; 10,3	10,8	9,2 ; 12,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	12,2	9,9 ; 14,8	11,2*	7,7 ; 14,8	13,3	10,1 ; 16,8
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	39,2	33,3 ; 45,1	35,6	26,1 ; 45,0	41,9	34,4 ; 49,7
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,233		P = 0,006	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	32,9	25,7 ; 40,0	31,7*	20,8 ; 42,8	34,0	24,9 ; 43,9
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	47,4	36,6 ; 57,9	44,9*	27,9 ; 63,0	49,0	35,2 ; 62,7
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	83,4	51,6 ; 100,0	x	;	91,6	60,7 ; 100,0
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	22,8	19,1 ; 26,8	18,1	12,8 ; 23,5	28,2	22,8 ; 34,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	10,6	8,0 ; 13,4	9,5*	5,6 ; 13,9	11,6*	8,1 ; 15,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	3,0*	1,6 ; 4,7	3,4**	0,9 ; 6,4	2,8**	1,0 ; 4,8
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	2,4**	1,1 ; 3,9	2,6**	0,7 ; 5,0	2,1**	0,3 ; 4,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	23,9	18,6 ; 29,5	20,8*	12,2 ; 29,9	26,1	20,0 ; 33,0
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	7,4	6,2 ; 8,7	6,9	5,2 ; 8,8	8,0	6,2 ; 9,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,012		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	19,3	14,2 ; 25,1	15,5*	8,2 ; 23,6	23,7*	15,9 ; 32,7
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	8,4	7,1 ; 9,7	7,4	5,6 ; 9,4	9,3	7,6 ; 10,9

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,9	74,7 ; 78,9	20,6	18,8 ; 22,8	2,5	1,8 ; 3,3
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	68,8	65,3 ; 72,0	27,1	24,1 ; 30,5	4,1*	2,7 ; 5,6
Femmes	87,9	11,3	0,7	84,6	81,8 ; 87,0	14,4	12,1 ; 17,0	1,0**	0,4 ; 1,6
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,149					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	77,7	70,2 ; 84,1	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	86,1	83,3 ; 89,1	13,0	10,1 ; 15,7	0,9**	0,2 ; 1,8
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	72,1	68,4 ; 75,5	24,8	21,5 ; 28,5	3,1*	1,7 ; 4,6
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	63,7	57,7 ; 69,5	29,2	23,8 ; 34,8	7,1*	3,9 ; 10,6
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,475					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	75,9	71,5 ; 79,8	21,5	17,7 ; 25,7	2,6**	1,1 ; 4,3
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	73,7	69,9 ; 77,2	22,8	19,4 ; 26,4	3,5*	2,0 ; 5,2
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	79,8	76,3 ; 82,9	18,9	15,7 ; 22,3	1,3**	0,4 ; 2,4
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	77,6	69,4 ; 85,4	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	74,4	63,2 ; 84,3	19,7*	10,6 ; 30,4	5,9**	0,6 ; 12,1
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,344					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	73,7	70,9 ; 76,1	23,2	20,7 ; 25,9	3,1*	2,1 ; 4,2
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	85,8	79,9 ; 90,8	x	;	x	;
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	83,3	77,8 ; 88,8	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	79,5	69,0 ; 89,2	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,011					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	68,1	63,1 ; 73,2	27,2	22,4 ; 32,2	4,6*	2,8 ; 6,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	71,5	67,0 ; 75,8	25,4	21,4 ; 29,8	3,1**	1,4 ; 4,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	81,7	77,3 ; 85,7	16,2	12,6 ; 20,3	2,1**	0,7 ; 3,8
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	85,8	82,3 ; 89,2	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,126					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	73,3	67,5 ; 78,8	22,4	17,0 ; 27,9	4,3**	1,6 ; 7,4
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	77,8	75,3 ; 80,0	20,0	17,9 ; 22,5	2,2*	1,5 ; 3,1
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,443					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	72,3	65,0 ; 79,1	24,1	17,5 ; 31,1	3,7**	0,9 ; 7,1
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	77,3	75,0 ; 79,4	20,3	18,3 ; 22,6	2,4*	1,7 ; 3,2
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,328					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	78,6	75,9 ; 81,1	20,1	17,6 ; 22,7	1,3**	0,6 ; 2,1
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	83,7	76,1 ; 90,7	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	72,2	62,7 ; 81,0	x	;	x	;
Retraités	72,9	23,2	3,8	67,2	62,0 ; 71,8	25,3	21,2 ; 29,8	7,5*	4,8 ; 10,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,9	74,7 ; 78,9	20,6	18,8 ; 22,8	2,5	1,8 ; 3,3
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,209					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	73,6	69,0 ; 77,8	23,5	19,4 ; 28,0	2,9**	1,4 ; 4,5
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	78,0	75,5 ; 80,3	19,7	17,4 ; 22,1	2,4*	1,5 ; 3,3
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	82,6	79,9 ; 85,1	16,1	13,7 ; 18,7	1,3*	0,6 ; 2,1
Bon	75,1	21,2	3,6	72,4	68,1 ; 76,3	25,4	21,7 ; 29,5	2,2**	1,0 ; 3,6
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	61,9	55,1 ; 68,5	29,6	23,2 ; 36,1	8,6*	4,6 ; 12,8
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,559					
Élevé	77,2	19,2	3,6	75,3	70,3 ; 80,0	21,7	16,9 ; 26,4	3,0**	1,2 ; 5,1
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	77,3	74,8 ; 79,5	20,6	18,4 ; 23,1	2,1*	1,3 ; 2,9
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	59,0	51,8 ; 65,5	30,6	24,1 ; 37,1	10,4*	6,3 ; 14,8
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	78,7	76,4 ; 80,8	19,6	17,6 ; 21,9	1,7*	1,0 ; 2,4
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,127					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	87,7	84,6 ; 90,5	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	73,9	70,9 ; 76,8	23,7	21,0 ; 26,6	2,4*	1,4 ; 3,6

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	76,9	74,7 ; 78,9	68,8	65,3 ; 72,0	84,6	81,8 ; 87,0
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	20,6	18,8 ; 22,8	27,1	24,1 ; 30,5	14,4	12,1 ; 17,0
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	2,5	1,8 ; 3,3	4,1*	2,7 ; 5,6	1,0**	0,4 ; 1,6
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	59,0	51,8 ; 65,5	37,4*	25,4 ; 49,2	75,2	67,2 ; 82,7
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	30,6	24,1 ; 37,1	45,4	33,8 ; 57,4	19,5*	12,7 ; 26,8
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	10,4*	6,3 ; 14,8	17,2*	9,1 ; 26,4	5,3**	1,5 ; 9,8
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	78,7	76,4 ; 80,8	71,6	68,0 ; 75,0	85,7	82,9 ; 88,3
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	19,6	17,6 ; 21,9	25,5	22,3 ; 29,0	13,8	11,3 ; 16,6
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	1,7*	1,0 ; 2,4	2,9*	1,6 ; 4,3	0,4**	0,1 ; 1,0

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	35,0	32,7 ; 37,5	17,9	16,0 ; 20,0	47,1	44,5 ; 49,5
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	27,9	24,6 ; 31,3	16,3	13,4 ; 19,4	55,8	51,9 ; 59,6
Femmes	41,7	18,2	40,1	42,0	38,7 ; 45,6	19,4	16,6 ; 22,4	38,6	34,9 ; 42,0
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	29,1	22,2 ; 36,3	14,4*	8,6 ; 20,5	56,5	48,4 ; 64,6
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	31,5	27,7 ; 35,2	23,6	20,1 ; 27,5	44,9	40,6 ; 48,9
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	41,6	37,5 ; 45,7	15,1	12,1 ; 18,3	43,3	39,1 ; 47,4
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	36,1	28,9 ; 44,4	10,2*	5,7 ; 15,0	53,7	45,3 ; 61,2
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,004					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	33,6	27,6 ; 39,6	14,2*	9,6 ; 19,1	52,2	46,0 ; 58,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	32,3	27,6 ; 37,2	15,2	11,5 ; 19,0	52,5	47,0 ; 57,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	37,2	32,2 ; 42,2	17,9	14,0 ; 22,0	44,9	39,5 ; 50,0
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	37,2	32,7 ; 42,1	23,5	19,5 ; 27,9	39,2	34,3 ; 43,9
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,013					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	39,1	30,9 ; 47,2	8,7*	4,5 ; 13,4	52,2	43,6 ; 60,7
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	34,2	31,6 ; 36,9	19,0	16,9 ; 21,4	46,8	43,9 ; 49,5
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,047					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	34,0	31,1 ; 37,0	20,3	17,8 ; 22,9	45,7	42,5 ; 48,8
Étudiants	28,8	16,3	54,9	33,7	25,0 ; 42,6	13,8*	7,4 ; 20,8	52,5	42,7 ; 62,2
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	42,2	29,7 ; 54,4	17,3*	8,7 ; 27,0	40,5	29,0 ; 52,4
Retraités	38,0	12,4	49,6	39,8	33,8 ; 46,2	10,9*	7,2 ; 15,1	49,2	42,8 ; 55,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
2,3*	1,5 ; 3,1	44,7	42,2 ; 47,1	34,6	32,5 ; 37,1	18,4	16,5 ; 20,3	Ensemble de la population	
P = 0,000									
1,2**	0,4 ; 2,2	34,8	31,1 ; 38,2	44,2	40,8 ; 48,0	19,8	17,1 ; 22,8	Sexe	
3,4*	2,1 ; 4,8	54,4	51,0 ; 57,7	25,3	22,4 ; 28,3	16,9	14,5 ; 19,4	Hommes	
								Femmes	
P = 0,064									
x	;	76,6	64,6 ; 87,6	12,8**	4,3 ; 22,5	x	;	Groupe d'âge	
8,6**	3,0 ; 14,8	63,5	53,0 ; 73,5	22,2*	13,4 ; 31,3	5,8**	1,4 ; 11,1	15-17 ans	
P = 0,000									
5,7**	2,1 ; 9,8	68,6	60,6 ; 75,7	18,5*	12,2 ; 25,2	7,2**	3,3 ; 11,3	15-24 ans	
1,7**	0,7 ; 2,8	44,8	41,0 ; 49,0	34,3	30,4 ; 38,5	19,2	15,5 ; 22,7	25-44 ans	
1,2**	0,6 ; 1,9	37,3	33,6 ; 40,9	39,0	35,2 ; 42,7	22,5	19,3 ; 25,6	45-64 ans	
2,7**	0,4 ; 5,9	35,5	29,7 ; 41,5	43,4	37,3 ; 49,9	18,5	13,7 ; 23,8	65 ans et plus	
P = 0,445									
x	;	74,6	57,6 ; 89,9	13,5**	1,6 ; 27,8	x	;	Hommes	
x	;	57,2	41,9 ; 71,5	32,4*	18,4 ; 46,8	x	;	15-17 ans	
P = 0,309									
x	;	63,9	52,8 ; 73,8	25,2*	15,4 ; 35,9	x	;	15-24 ans	
x	;	31,1	25,4 ; 36,7	45,5	39,5 ; 51,9	x	;	25-44 ans	
x	;	26,4	21,2 ; 31,8	50,1	44,3 ; 55,8	x	;	45-64 ans	
x	;	31,4	22,7 ; 40,9	48,6	39,1 ; 58,2	x	;	65 ans et plus	
P = 0,682									
x	;	78,6	59,5 ; 93,8	x	;	x	;	Femmes	
14,7**	4,0 ; 26,7	70,0	55,9 ; 83,6	11,7**	2,0 ; 23,0	x	;	15-17 ans	
P = 0,006									
x	;	73,4	62,5 ; 83,7	11,8**	4,3 ; 20,2	x	;	15-24 ans	
2,2**	0,7 ; 4,1	59,1	53,1 ; 65,1	22,7	17,7 ; 27,9	15,9	11,4 ; 20,9	25-44 ans	
2,1**	0,9 ; 3,5	48,0	42,7 ; 53,1	28,0	23,5 ; 32,8	21,8	17,8 ; 26,0	45-64 ans	
1,8**	0,1 ; 3,9	38,6	30,8 ; 46,0	39,3	31,6 ; 47,3	20,3*	13,6 ; 27,4	65 ans et plus	
P = 0,205									
3,5**	1,5 ; 5,7	44,9	39,6 ; 49,9	29,7	25,2 ; 34,5	22,0	18,0 ; 26,4	Niveau de scolarité	
1,4**	0,2 ; 3,0	42,6	37,6 ; 47,4	36,7	32,2 ; 41,6	19,3	15,5 ; 23,2	Niveau inférieur au DES	
2,8**	1,0 ; 5,0	44,5	39,6 ; 49,9	35,1	30,4 ; 39,8	17,6	13,7 ; 21,7	Diplôme d'études secondaires (DES)	
1,7**	0,5 ; 3,0	47,0	41,8 ; 51,8	36,4	31,7 ; 41,6	15,0	11,5 ; 18,7	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
P = 0,703									
3,0**	0,3 ; 6,5	43,4	35,6 ; 50,7	34,1	27,2 ; 41,2	19,5*	13,8 ; 25,5	Diplôme d'études universitaires	
x	;	33,3	26,1 ; 40,8	46,3	38,6 ; 53,8	x	;	Hommes	
x	;	27,9	21,0 ; 35,3	46,1	38,3 ; 53,8	x	;	Niveau inférieur au DES	
x	;	34,3	27,3 ; 40,9	49,1	42,3 ; 56,8	x	;	Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 0,065									
4,0**	1,4 ; 7,3	46,5	38,9 ; 54,0	24,6	18,8 ; 31,0	24,9	18,7 ; 31,5	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
2,3**	0,2 ; 5,1	50,7	44,1 ; 57,0	28,4	22,8 ; 34,3	18,6	14,0 ; 23,7	Diplôme d'études universitaires	
4,6**	1,4 ; 8,3	58,3	51,3 ; 65,4	25,9	20,2 ; 32,3	11,2*	7,1 ; 15,7	Indice du niveau de revenu du ménage	
2,8**	0,8 ; 5,3	61,2	54,3 ; 67,6	22,0	16,4 ; 28,1	14,0*	9,2 ; 19,0	Quintile 1 (faible)	
P = 0,050									
3,9**	1,5 ; 6,8	39,5	32,8 ; 46,3	32,4	26,1 ; 38,8	24,3	18,7 ; 30,2	Quintile 2 et suivants	
2,1*	1,3 ; 3,1	45,4	42,7 ; 48,1	34,9	32,4 ; 37,6	17,5	15,5 ; 19,5	Femmes	
P = 0,703									
x	;	42,0	30,2 ; 52,9	37,0	26,2 ; 47,6	x	;	Hommes	
1,3**	0,4 ; 2,5	34,1	30,3 ; 37,9	44,7	40,8 ; 48,7	19,9	16,8 ; 23,1	Quintile 1 (faible)	
P = 0,000									
6,3**	2,3 ; 11,4	37,7	29,0 ; 46,1	29,1	21,4 ; 37,2	26,9	19,4 ; 34,8	Quintile 2 et suivants	
2,9*	1,5 ; 4,5	57,2	53,3 ; 61,0	24,8	21,6 ; 28,1	15,1	12,5 ; 17,7		

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	39,8	37,6 ; 42,2	2,6	1,9 ; 3,5	57,6	55,1 ; 59,8
Sexe	P = 0,000			P = 0,224					
Hommes	36,6	3,6	59,9	37,7	34,5 ; 41,2	2,9*	1,7 ; 4,3	59,4	55,6 ; 62,9
Femmes	40,5	2,3	57,1	41,7	38,7 ; 44,8	2,4*	1,5 ; 3,3	55,9	52,8 ; 59,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	13,7*	8,2 ; 19,5	2,6**	0,4 ; 5,1	83,8	77,9 ; 89,5
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	37,9	33,6 ; 42,1	3,4*	1,9 ; 5,1	58,7	54,5 ; 63,0
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	51,1	47,1 ; 55,1	1,7**	0,8 ; 2,9	47,2	43,4 ; 51,1
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	46,0	40,0 ; 52,4	3,3**	1,4 ; 5,5	50,7	44,5 ; 56,8
Hommes	P = 0,000			P = 0,001					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	15,6**	7,7 ; 24,3	4,2**	0,2 ; 9,2	80,2	71,2 ; 89,0
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	33,4	27,8 ; 39,3	3,4**	1,2 ; 6,0	63,2	57,3 ; 69,1
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	49,9	44,1 ; 55,9	1,7**	0,2 ; 3,6	48,4	42,4 ; 54,3
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	45,4	35,4 ; 55,5	3,3**	0,3 ; 7,4	51,3	41,2 ; 61,5
Femmes	P = 0,000			P = 0,005					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	11,7**	4,1 ; 20,0	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	42,5	36,4 ; 48,3	3,4**	1,4 ; 5,6	54,1	48,4 ; 60,2
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	52,2	46,9 ; 57,4	1,8**	0,6 ; 3,2	46,0	40,9 ; 51,3
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	46,5	38,8 ; 54,8	3,2**	0,7 ; 6,2	50,2	41,9 ; 57,9
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	29,4**	15,8 ; 46,8	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	12,2	10,0 ; 14,6	4,2*	2,7 ; 5,8	83,6	80,9 ; 86,1
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	50,0	45,9 ; 54,2	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	91,1	87,5 ; 94,4	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	45,3**	4,9 ; 97,7	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	5,4**	2,8 ; 8,6	6,9*	3,8 ; 10,5	87,7	83,5 ; 91,9
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	41,5	36,2 ; 46,8	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	87,6	81,9 ; 92,7	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	23,9**	10,3 ; 41,5	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	16,5	13,2 ; 19,8	2,5*	1,2 ; 3,9	80,9	77,5 ; 84,4
Embonpoint	69,6	x	x	64,7	58,3 ; 71,0	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	95,2	90,9 ; 98,5	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	71,8	68,1 ; 75,4	15,4	12,7 ; 18,5	12,7	10,0 ; 15,5
Sexe	P = 0,000			P = 0,075					
Hommes	81,4	10,5	8,0	76,7	71,1 ; 82,0	11,8*	7,8 ; 16,1	11,5*	7,6 ; 16,0
Femmes	74,5	14,1	11,5	68,4	63,0 ; 72,9	18,0	14,3 ; 22,3	13,6	10,1 ; 17,3
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,602					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	81,7	69,2 ; 92,5	x	;	x	;
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	72,7	66,7 ; 78,1	12,8*	8,8 ; 17,1	14,5*	9,8 ; 19,2
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	66,9	60,9 ; 72,5	18,6	14,2 ; 24,0	14,4	10,2 ; 19,0
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	77,5	66,7 ; 87,8	13,6**	5,8 ; 22,5	8,9**	1,8 ; 17,2
Hommes	P = 0,252			P = 0,870					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	89,5	70,5 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	80,0	71,3 ; 88,5	8,4**	2,4 ; 15,4	11,5**	4,9 ; 18,8
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	71,0	61,6 ; 79,6	13,8*	7,4 ; 20,7	15,2*	8,4 ; 23,2
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	81,0	63,2 ; 96,9	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,772					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	78,4	61,6 ; 92,1	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	67,8	60,0 ; 75,4	15,7*	9,8 ; 21,7	16,5*	10,1 ; 23,0
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	63,1	54,9 ; 70,5	23,2	16,7 ; 30,7	13,7*	8,5 ; 19,6
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	75,2	61,4 ; 88,4	10,2**	2,3 ; 19,9	14,6**	3,2 ; 27,3
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,407					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	75,8	69,0 ; 82,0	14,9*	9,7 ; 20,7	9,3*	5,3 ; 13,9
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	69,5	63,3 ; 75,7	17,0*	12,3 ; 22,2	13,5*	8,9 ; 18,2
Obésité	72,3	14,4	13,3	69,9	62,9 ; 76,5	14,4*	9,6 ; 19,7	15,7*	10,7 ; 21,3
Hommes	P = 0,002			P = 0,870					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	75,6	60,3 ; 89,3	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	78,6	70,7 ; 86,2	11,2**	5,6 ; 17,9	10,2**	4,2 ; 16,5
Obésité	76,0	12,2	11,8	74,1	63,3 ; 83,3	11,3**	4,7 ; 19,2	14,6**	7,1 ; 23,2
Femmes	P = 0,161			P = 0,063					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	75,9	68,1 ; 83,2	14,8*	9,1 ; 21,5	9,3*	4,6 ; 14,4
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	58,5	48,6 ; 67,5	24,0*	16,5 ; 32,8	17,5*	10,6 ; 25,3
Obésité	68,9	16,4	14,7	65,9	55,3 ; 75,1	17,3*	10,1 ; 25,3	16,8*	9,6 ; 24,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
21,2	19,2 ; 23,2	16,7	14,7 ; 18,7	2,7*	1,9 ; 3,7	59,4	57,0 ; 61,9	Ensemble de la population	
P = 0,000									
15,7	13,1 ; 18,4	16,8	14,2 ; 19,8	3,4*	2,0 ; 5,0	64,1	60,5 ; 67,4	Sexe	
26,4	23,4 ; 29,6	16,6	14,1 ; 19,2	2,1*	1,1 ; 3,1	54,9	51,6 ; 58,2	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
15,4*	9,9 ; 21,5	13,7*	8,5 ; 19,7	7,9**	3,8 ; 12,3	63,0	55,2 ; 70,5	Groupe d'âge	
22,9	19,4 ; 26,3	17,5	14,4 ; 20,8	2,3**	1,1 ; 3,7	57,3	53,4 ; 61,3	15-24 ans	
24,7	21,5 ; 28,1	18,4	15,3 ; 21,6	1,0**	0,4 ; 1,7	56,0	52,2 ; 59,8	25-44 ans	
13,6	9,6 ; 18,0	13,2*	9,2 ; 17,3	2,4**	0,7 ; 4,4	70,8	65,1 ; 76,3	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,008									
6,9**	1,6 ; 13,2	10,3**	3,7 ; 17,9	12,3**	5,4 ; 20,0	70,5	60,0 ; 80,9	Hommes	
15,1*	10,7 ; 19,7	17,3	13,0 ; 22,2	2,6**	0,6 ; 5,0	65,0	59,0 ; 70,8	15-24 ans	
21,0	16,6 ; 25,9	21,0	16,0 ; 26,2	x	;	x	;	25-44 ans	
13,2*	6,7 ; 20,7	10,8**	4,8 ; 17,7	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,607									
24,3*	14,5 ; 35,7	17,3**	8,5 ; 27,0	x	;	x	;	Femmes	
30,4	25,0 ; 36,1	17,7	13,3 ; 22,4	2,0**	0,7 ; 3,7	49,9	44,3 ; 55,7	15-24 ans	
28,3	23,7 ; 33,0	15,8	12,2 ; 19,6	1,4**	0,4 ; 2,6	54,5	49,6 ; 59,6	25-44 ans	
13,9*	8,6 ; 19,3	15,0*	9,6 ; 20,7	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,057									
x	;	x	;	18,8**	7,1 ; 33,0	68,3	50,4 ; 84,0	Statut pondéral	
12,9	10,4 ; 15,5	13,4	10,7 ; 16,2	4,4*	2,7 ; 6,2	69,3	65,5 ; 72,8	Poids insuffisant	
24,0	20,5 ; 27,6	18,9	15,6 ; 22,3	1,0**	0,2 ; 1,9	56,1	51,9 ; 60,5	Poids normal	
39,7	33,7 ; 45,5	23,0	17,9 ; 28,1	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,155									
x	;	x	;	x	;	77,0*	30,1 ; 100,0	Hommes	
5,7**	2,9 ; 8,9	8,5*	5,1 ; 12,5	7,6**	4,0 ; 11,6	78,2	72,3 ; 83,7	Poids insuffisant	
18,0	14,0 ; 22,5	19,1	14,7 ; 23,9	1,6**	0,2 ; 3,1	61,3	56,0 ; 66,7	Poids normal	
29,8	22,5 ; 37,7	27,6	20,1 ; 35,8	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,212									
x	;	x	;	20,6**	6,6 ; 38,4	65,3	44,5 ; 84,7	Femmes	
17,4	13,8 ; 21,1	16,4	12,7 ; 20,5	2,4**	1,0 ; 4,1	63,7	58,9 ; 68,2	Poids insuffisant	
34,2	27,9 ; 40,8	18,5	13,6 ; 23,7	x	;	x	;	Poids normal	
50,9	42,7 ; 59,2	17,7*	11,9 ; 24,0	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
39,9	36,0 ; 43,8	19,8	16,8 ; 23,1	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	30,7*	17,5 ; 45,8	65,6	51,2 ; 79,5	Excès de poids	
9,5	7,6 ; 11,6	15,3	12,8 ; 18,0	3,3*	2,0 ; 4,6	71,9	68,6 ; 75,0	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
29,1	24,2 ; 34,0	18,5	14,4 ; 23,0	5,2*	3,0 ; 7,5	47,2	41,9 ; 52,7	Ensemble de la population	
P = 0,059									
34,8	25,8 ; 43,9	11,2**	5,5 ; 17,4	3,0**	0,4 ; 6,1	51,0	42,0 ; 60,5	Sexe	
25,9	20,1 ; 31,7	22,7	16,9 ; 29,0	6,4*	3,4 ; 9,9	45,0	38,4 ; 52,2	Hommes	
								Femmes	
P = 0,837									
18,3**	2,4 ; 35,9	37,4**	17,2 ; 59,2	x		x		Groupe d'âge	
34,8	25,8 ; 43,6	20,2*	13,0 ; 27,9	4,3**	1,0 ; 8,4	40,7	31,4 ; 50,2	15-24 ans	
24,3	17,7 ; 31,6	12,9*	8,2 ; 18,4	5,9**	2,5 ; 9,8	57,0	48,9 ; 64,9	25-44 ans	
44,1*	27,4 ; 61,9	x		x		38,4*	23,1 ; 54,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 'n.d.'									
x		x		x		x		Hommes	
41,5*	25,6 ; 57,6	15,7**	4,4 ; 28,6	x		x		15-24 ans	
22,5**	11,8 ; 35,4	9,0**	2,2 ; 17,5	x		x		25-44 ans	
70,8*	41,4 ; 98,6	x		x		x		45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,957									
x		46,3**	20,8 ; 72,5	x		37,1**	13,0 ; 62,0	Femmes	
31,4*	21,4 ; 42,0	22,4*	13,4 ; 32,1	4,8**	0,6 ; 10,3	41,4	30,2 ; 52,8	15-24 ans	
25,6*	17,0 ; 34,4	15,7*	9,2 ; 23,1	9,1**	3,6 ; 15,5	49,7	39,2 ; 60,1	25-44 ans	
24,9**	7,7 ; 44,9	x		x		56,7*	36,0 ; 77,7	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,395									
x		x		x		x		Statut pondéral	
33,1*	22,5 ; 43,9	22,1*	12,7 ; 32,7	3,7**	0,3 ; 7,9	41,1	30,3 ; 52,2	Poids insuffisant	
34,0	25,8 ; 42,6	14,7*	8,4 ; 21,6	3,9**	0,7 ; 8,0	47,4	38,2 ; 55,9	Poids normal	
19,9*	12,2 ; 27,5	20,1*	12,6 ; 28,7	7,4**	3,1 ; 12,7	52,6	42,7 ; 62,0	Embonpoint	
								Obésité	
P = 'n.d.'									
x		x		x		x		Hommes	
59,7*	22,5 ; 43,9	x		x		32,8**	30,3 ; 52,2	Poids insuffisant	
42,5*	25,8 ; 42,6	8,4**	8,4 ; 21,6	x		x		Poids normal	
15,5**	12,2 ; 27,5	16,5**	12,6 ; 28,7	x		x		Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,841									
x		x		x		x		Femmes	
27,6*	16,5 ; 38,8	25,1*	14,2 ; 37,3	4,4**	0,4 ; 9,6	42,8	31,0 ; 55,2	Poids insuffisant	
26,4*	16,8 ; 37,3	20,4*	10,7 ; 30,8	x		x		Poids normal	
22,8*	13,1 ; 33,5	22,5*	12,1 ; 34,2	10,2**	3,7 ; 18,4	44,4	31,7 ; 56,9	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	86,7	83,8 ; 89,5	7,8	5,6 ; 10,2	5,5*	3,7 ; 7,6
Sexe	P = 0,001			P = 0,052					
Hommes	88,9	6,9	4,2	90,6	86,7 ; 94,2	6,4**	3,2 ; 10,1	3,0**	1,1 ; 5,2
Femmes	85,7	7,5	6,8	83,8	79,7 ; 87,8	8,8*	5,9 ; 11,9	7,4*	4,3 ; 10,7
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,879					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	82,7	69,7 ; 94,9	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	85,2	80,4 ; 89,8	7,9*	4,3 ; 11,8	6,9**	3,4 ; 10,7
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	88,2	84,2 ; 91,8	8,8*	5,6 ; 12,6	3,0**	1,3 ; 5,0
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	91,7	84,5 ; 97,9	x	;	x	;
Hommes	P = 0,121			P = 0,980					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	94,0	76,5 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	89,2	81,9 ; 96,1	x	;	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	91,3	85,4 ; 96,3	x	;	x	;
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	89,3	74,3 ; 100,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,931					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	77,7	60,5 ; 93,8	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	82,6	75,4 ; 89,2	8,7**	4,0 ; 13,9	8,7**	3,8 ; 14,6
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	85,3	79,6 ; 90,7	10,9*	6,1 ; 16,0	3,8**	1,1 ; 7,0
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	93,1	84,5 ; 99,6	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,499					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	88,7	83,0 ; 93,8	6,7**	3,1 ; 11,1	4,6**	0,8 ; 9,0
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	89,0	84,7 ; 92,8	6,0**	3,1 ; 9,5	5,0**	2,5 ; 7,9
Obésité	82,0	8,7	9,2	82,9	76,8 ; 88,7	10,7*	6,1 ; 15,9	6,4**	2,5 ; 10,8
Hommes	P = 0,002			P = 0,953					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	94,6	86,1 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	92,0	86,5 ; 96,7	4,8**	1,0 ; 9,2	3,2**	0,4 ; 6,8
Obésité	85,2	8,2	6,6*	86,8	78,2 ; 94,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,034			P = 0,602					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	87,1	80,2 ; 93,4	7,4**	3,1 ; 12,5	5,5**	0,8 ; 10,8
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	85,3	78,2 ; 91,7	7,4**	2,7 ; 13,0	7,3**	2,9 ; 12,4
Obésité	79,1	9,2	11,8	79,1	70,3 ; 87,5	11,5**	5,5 ; 18,3	9,4**	2,7 ; 16,6

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	10,3	7,8 ; 12,9	89,7	87,1 ; 92,2
Sexe	P = 0,024		P = 0,731			
Hommes	6,6	93,4	9,8*	6,0 ; 14,2	90,2	85,8 ; 94,0
Femmes	8,6	91,4	10,7*	7,3 ; 14,4	89,3	85,6 ; 92,7
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,024			
15-24 ans	11,2*	88,8	21,0**	8,7 ; 34,5	79,0	65,5 ; 91,3
25-44 ans	8,0	92,0	6,8*	3,6 ; 10,1	93,2	89,9 ; 96,4
45-64 ans	7,5	92,5	11,0*	7,1 ; 15,0	89,0	85,0 ; 92,9
65 ans et plus	4,9	95,1	6,6**	0,5 ; 13,5	93,4	86,5 ; 99,5
Hommes	P = 0,409		P = 0,520			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	5,5**	1,2 ; 11,0	94,5	89,0 ; 98,8
45-64 ans	7,0	93,0	11,9**	5,6 ; 19,3	88,1	80,7 ; 94,4
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,016			
15-24 ans	12,3*	87,7	24,3**	7,8 ; 42,2	75,7	57,8 ; 92,2
25-44 ans	9,9	90,1	7,6**	3,3 ; 12,2	92,4	87,8 ; 96,7
45-64 ans	7,8	92,2	10,1*	5,4 ; 15,3	89,9	84,7 ; 94,6
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,618			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	9,1**	4,1 ; 15,1	90,9	84,9 ; 95,9
Embonpoint	6,6	93,4	9,4*	5,7 ; 13,5	90,6	86,5 ; 94,3
Obésité	11,3	88,7	12,1*	7,4 ; 17,1	87,9	82,9 ; 92,6
Hommes	P = 0,000		P = 0,617			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	8,0**	3,1 ; 13,7	92,0	86,3 ; 96,9
Obésité	11,5	88,5	12,9**	5,1 ; 21,4	87,1	78,6 ; 94,9
Femmes	P = 0,032		P = 0,677			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	9,3**	3,6 ; 15,9	90,7	84,1 ; 96,4
Embonpoint	8,4	91,6	11,1**	5,4 ; 17,5	88,9	82,5 ; 94,6
Obésité	11,1	88,9	11,4**	5,5 ; 17,7	88,6	82,3 ; 94,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	0,7**	0,1 ; 1,4	x	;	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	2,2**	1,1 ; 3,6	2,7**	0,7 ; 5,2	x	;
Rarement	2,8	2,6*	2,9	2,0**	0,8 ; 3,5	x	;	2,5**	0,6 ; 4,7
Jamais	94,8	94,8	94,8	95,1	93,2 ; 97,0	95,0	92,0 ; 97,6	95,2	92,5 ; 97,7
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,076					
Souvent	4,6	4,2	4,9	5,2*	3,3 ; 7,4	4,9**	2,3 ; 7,9	5,5**	2,7 ; 8,6
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	10,3	7,7 ; 13,1	13,8*	9,0 ; 18,7	7,7*	4,8 ; 11,0
Rarement	5,1	5,5	4,9	3,2*	1,8 ; 4,8	1,5**	0,3 ; 2,9	4,5*	2,4 ; 7,0
Jamais	82,9	81,4	84,0	81,3	77,8 ; 84,5	79,8	74,3 ; 85,2	82,3	77,9 ; 86,5
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,906					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	3,5*	2,0 ; 5,2	3,2**	0,7 ; 6,2	3,6**	1,8 ; 5,7
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	5,8*	3,9 ; 7,8	6,6*	3,5 ; 10,2	5,2*	3,0 ; 7,9
Rarement	4,5	4,3	4,5	5,2*	3,2 ; 7,3	4,8**	1,9 ; 8,2	5,5*	2,9 ; 8,3
Jamais	86,5	87,5	85,7	85,6	82,4 ; 88,5	85,5	80,3 ; 90,2	85,6	81,7 ; 89,4
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	0,7**	0,1 ; 1,6	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,1	96,6 ; 99,3	98,7	97,1 ; 99,9	97,6	95,3 ; 99,6
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	0,8**	0,1 ; 1,7	1,7**	0,1 ; 3,7	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	98,3	97,0 ; 99,3	98,3	96,3 ; 99,9	98,3	96,7 ; 99,6
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	2,5**	0,8 ; 4,6
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	0,7**	0,0 ; 1,5	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	97,2	95,5 ; 98,5	98,8	96,7 ; 100,0	96,0	93,4 ; 98,2
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,4	98,7 ; 99,9	99,7	98,9 ; 100,0	99,1	98,0 ; 99,9
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,2**	0,4 ; 2,2	x	;	1,9**	0,6 ; 3,4
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,0	95,6 ; 98,2	99,4	98,3 ; 100,0	95,2	92,9 ; 97,3



Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	0,8**	0,2 ; 1,6	x	;	1,1**	0,1 ; 2,5
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	98,4	97,2 ; 99,4	99,5	98,4 ; 100,0	97,6	95,8 ; 99,2
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,3	98,5 ; 99,9	99,3	97,9 ; 100,0	99,3	98,3 ; 100,0
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,5	98,4 ; 100,0	x	;	99,2	97,2 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
5,1*	3,2 ; 7,1	27,9	24,2 ; 31,4	46,2	42,0 ; 50,2	20,9	17,5 ; 24,2	Ensemble de la population	
P = 0,065									
Sexe									
6,4**	3,0 ; 10,1	31,6	25,5 ; 37,7	46,2	39,4 ; 52,8	15,9	11,2 ; 20,7	Hommes	
4,2**	2,1 ; 6,5	25,2	20,8 ; 30,0	46,2	40,9 ; 51,2	24,4	19,5 ; 29,2	Femmes	
P = 0,655									
Groupe d'âge									
x	;	29,9*	15,4 ; 44,7	35,3*	20,8 ; 50,9	x	;	15-24 ans	
4,0**	1,7 ; 6,5	24,9	19,1 ; 30,3	45,3	38,6 ; 52,1	25,8	20,0 ; 31,5	25-44 ans	
6,5**	3,3 ; 10,2	28,2	22,8 ; 33,3	49,7	43,8 ; 55,8	15,7	11,6 ; 19,7	45-64 ans	
x	;	36,8*	25,2 ; 49,1	49,4	37,0 ; 61,9	x	;	65 ans et plus	
P = 0,865									
Hommes									
x	;	x	;	43,0**	13,0 ; 72,5	34,2**	5,9 ; 63,8	15-24 ans	
4,9**	0,5 ; 10,4	34,2	24,0 ; 44,3	41,0	30,3 ; 51,8	20,0*	11,7 ; 28,9	25-44 ans	
9,4**	3,6 ; 16,2	30,0	21,8 ; 38,8	51,2	41,5 ; 60,2	9,4**	4,6 ; 14,8	45-64 ans	
x	;	40,7**	16,2 ; 64,2	42,0**	20,3 ; 67,2	x	;	65 ans et plus	
P = 0,742									
Femmes									
x	;	33,0**	15,3 ; 51,2	32,0**	15,5 ; 50,7	x	;	15-24 ans	
3,4**	0,7 ; 6,6	19,0*	12,4 ; 25,9	48,1	39,1 ; 57,1	29,5	21,3 ; 37,6	25-44 ans	
3,7**	0,9 ; 7,2	26,4	19,8 ; 33,5	48,3	40,6 ; 56,3	21,5	15,5 ; 28,6	45-64 ans	
x	;	34,7*	21,0 ; 50,0	53,5	37,7 ; 67,6	x	;	65 ans et plus	
P = 0,780									
Statut pondéral									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
6,8**	2,9 ; 11,0	24,6	17,8 ; 31,6	45,3	37,6 ; 53,3	23,3	16,8 ; 30,2	Poids normal	
4,9**	1,9 ; 8,4	30,0	24,0 ; 36,2	46,9	40,4 ; 53,7	18,1	13,2 ; 23,4	Embonpoint	
3,7**	0,8 ; 6,9	27,3	20,9 ; 34,4	46,7	38,8 ; 54,1	22,3	15,4 ; 29,3	Obésité	
P = 0,952									
Hommes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
x	;	35,8*	19,1 ; 53,4	42,5*	25,0 ; 60,2	x	;	Poids normal	
7,4**	2,2 ; 13,4	28,9	20,5 ; 37,6	48,6	39,1 ; 58,2	15,0*	8,7 ; 22,6	Embonpoint	
5,8**	0,6 ; 12,2	32,7*	22,8 ; 43,7	44,7	33,1 ; 56,3	16,7**	7,9 ; 25,8	Obésité	
P = 0,737									
Femmes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
7,4**	2,8 ; 12,5	21,6*	14,0 ; 29,3	46,1	37,3 ; 55,2	24,9*	17,2 ; 33,2	Poids normal	
x	;	31,3	22,4 ; 40,3	44,9	35,5 ; 54,3	x	;	Embonpoint	
x	;	22,2*	14,6 ; 30,7	48,6	37,6 ; 58,8	x	;	Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,365					
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	47,7	43,6 ; 51,9	47,5	41,2 ; 54,0	47,8	42,6 ; 53,0		
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	36,2	32,4 ; 40,4	34,0	27,9 ; 40,4	37,8	32,9 ; 43,0		
Non	14,4	15,3	13,7	16,1	13,0 ; 19,1	18,5	13,2 ; 23,8	14,4	10,8 ; 18,3		
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,009					
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	43,8	39,8 ; 47,8	39,1	32,9 ; 45,5	47,2	41,6 ; 52,3		
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	39,8	35,5 ; 44,1	39,2	32,7 ; 45,8	40,3	34,8 ; 45,9		
Non	19,6	22,6	17,4	16,4	13,4 ; 19,4	21,7	16,2 ; 27,4	12,6	9,4 ; 16,0		
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,082					
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	46,0	42,1 ; 50,2	40,2	34,1 ; 46,9	50,0	44,9 ; 55,5		
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	28,6	24,9 ; 32,1	31,3	25,2 ; 37,1	26,6	21,8 ; 31,4		
Non	27,7	32,4	24,3	25,5	21,9 ; 29,0	28,5	22,7 ; 34,6	23,3	18,7 ; 27,7		
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,019					
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	46,3	42,3 ; 50,3	39,6	33,2 ; 45,9	51,0	45,8 ; 56,4		
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	28,2	24,7 ; 32,0	30,0	23,9 ; 36,1	27,0	22,4 ; 31,6		
Non	26,1	27,4	25,1	25,5	22,2 ; 29,0	30,4	24,8 ; 36,4	22,0	17,6 ; 26,5		
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,017					
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	66,6	62,7 ; 70,3	60,3	54,0 ; 66,7	71,2	66,2 ; 76,1		
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	18,2	15,0 ; 21,4	23,4	18,0 ; 29,1	14,5	10,8 ; 18,5		
Non	17,4	18,5	16,6	15,2	12,2 ; 18,3	16,3	11,7 ; 21,5	14,4	10,7 ; 18,4		
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,016					
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	68,1	64,3 ; 71,8	61,8	55,4 ; 67,8	72,4	67,5 ; 77,2		
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	21,3	17,9 ; 24,7	24,1	18,6 ; 29,6	19,3	14,9 ; 23,8		
Non	12,6	14,0	11,6	10,7	8,3 ; 13,2	14,1*	9,8 ; 19,0	8,2*	5,7 ; 11,2		
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,699					
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	52,7	48,8 ; 56,8	50,7	44,4 ; 57,3	54,2	49,1 ; 59,3		
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	26,1	22,5 ; 29,6	26,9	21,3 ; 32,8	25,5	20,9 ; 30,2		
Non	21,5	24,4	19,4	21,2	17,9 ; 24,5	22,4	17,0 ; 27,8	20,3	16,2 ; 24,8		
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,206					
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	16,0	13,1 ; 19,1	15,1	10,7 ; 19,6	16,7	12,8 ; 20,9		
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	14,7	11,8 ; 17,7	17,8	12,9 ; 23,2	12,6	9,1 ; 16,2		
Non	72,0	67,3	75,4	69,2	65,4 ; 73,0	67,2	60,8 ; 72,9	70,7	66,0 ; 75,7		
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,862					
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	39,1	35,1 ; 43,2	39,5	33,3 ; 46,1	38,7	33,4 ; 44,0		
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	15,1	12,3 ; 18,2	15,8	11,3 ; 20,6	14,6	10,7 ; 18,7		
Non	49,9	43,2	54,7	45,8	41,8 ; 49,8	44,7	38,2 ; 51,1	46,7	41,5 ; 51,7		

Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,554				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	58,2	54,3 ; 62,1	55,6	49,2 ; 61,6	60,1	54,9 ; 65,4	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	13,9	11,1 ; 16,8	14,9*	10,8 ; 20,0	13,1*	9,2 ; 17,1	
Non	29,6	28,8	30,2	27,9	24,5 ; 31,4	29,5	23,5 ; 35,2	26,7	22,3 ; 31,3	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,572				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	45,2	41,2 ; 49,2	42,6	36,4 ; 49,4	47,2	41,9 ; 52,4	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	13,4	10,8 ; 16,4	13,8	9,8 ; 18,1	13,0*	9,4 ; 17,2	
Non	48,5	52,0	45,9	41,4	37,2 ; 45,6	43,6	37,0 ; 50,3	39,8	34,5 ; 45,1	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,422				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	42,2	38,3 ; 46,2	42,3	36,1 ; 48,9	42,2	36,9 ; 47,5	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	26,5	22,8 ; 30,1	24,0	18,5 ; 29,7	28,3	23,5 ; 33,2	
Non	37,5	34,7	39,5	31,3	27,6 ; 35,0	33,7	27,6 ; 39,9	29,5	25,0 ; 34,2	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
53,1	50,7 ; 55,5	32,9	30,6 ; 35,1	13,9	12,2 ; 15,9	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
45,8	42,3 ; 49,5	36,6	33,1 ; 40,0	17,6	15,0 ; 20,6	Hommes
60,1	56,8 ; 63,3	29,4	26,2 ; 32,5	10,5	8,2 ; 12,8	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
66,8	53,7 ; 79,9	x	;	x	;	15-17 ans
28,7*	19,1 ; 38,8	27,1*	17,7 ; 37,0	44,2	33,6 ; 55,1	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
43,9	35,4 ; 52,4	18,3*	12,1 ; 24,7	37,8	30,0 ; 46,1	25-44 ans
41,6	37,5 ; 45,5	42,4	38,3 ; 46,3	16,0	13,0 ; 19,1	45-64 ans
56,7	52,8 ; 60,5	37,6	33,8 ; 41,5	5,7*	3,9 ; 7,7	65 ans et plus
89,0	84,9 ; 92,6	x	;	x	;	
		P = 0,029				Hommes
75,3	58,1 ; 90,9	x	;	x	;	15-17 ans
23,6**	10,0 ; 37,6	28,1*	15,2 ; 41,4	48,3	33,2 ; 63,5	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
44,7	32,8 ; 56,7	17,3*	9,1 ; 26,2	38,0	27,2 ; 49,4	25-44 ans
32,9	27,0 ; 38,8	43,8	37,8 ; 49,9	23,3	18,3 ; 28,5	45-64 ans
48,2	42,6 ; 54,3	44,2	38,2 ; 50,2	7,6*	4,6 ; 11,0	65 ans et plus
81,9	73,7 ; 89,7	x	;	x	;	
		P = 0,142				Femmes
57,8*	36,5 ; 79,4	x	;	x	;	15-17 ans
33,7*	19,5 ; 48,6	26,1**	12,4 ; 40,5	40,2*	24,8 ; 55,8	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
43,1	30,6 ; 56,0	19,4*	9,5 ; 29,4	37,5*	25,7 ; 49,8	25-44 ans
49,8	44,0 ; 55,6	41,1	35,2 ; 46,8	9,1*	5,7 ; 12,7	45-64 ans
65,0	59,9 ; 69,8	31,2	26,4 ; 36,2	3,8**	2,0 ; 5,9	65 ans et plus
94,3	90,3 ; 97,8	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	46,0	43,7 ; 48,4	53,1	49,4 ; 56,6	39,1	36,0 ; 42,4
Non	56,1	49,9	62,1	54,0	51,6 ; 56,3	46,9	43,4 ; 50,6	60,9	57,6 ; 64,0
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	10,2	8,7 ; 11,7	13,8	11,4 ; 16,4	6,7	4,9 ; 8,6
Non	89,4	85,6	93,2	89,8	88,3 ; 91,3	86,2	83,6 ; 88,6	93,3	91,4 ; 95,1
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,019					
Oui	7,3	9,1	5,5	6,0	4,7 ; 7,5	7,7	5,7 ; 10,0	4,4*	2,8 ; 6,0
Non	92,7	90,9	94,5	94,0	92,5 ; 95,3	92,3	90,0 ; 94,3	95,6	94,0 ; 97,2
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,763					
Oui	5,1	6,3	3,9	5,3	4,0 ; 6,7	5,5*	3,8 ; 7,4	5,1*	3,3 ; 6,8
Non	94,9	93,7	96,1	94,7	93,3 ; 96,0	94,5	92,6 ; 96,2	94,9	93,2 ; 96,7
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	12,3	16,1	8,7	14,2	12,4 ; 16,0	18,4	15,5 ; 21,2	10,2	8,0 ; 12,3
Non	87,7	83,9	91,3	85,8	84,0 ; 87,6	81,6	78,8 ; 84,5	89,8	87,7 ; 92,0
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = 0,206					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,5**	0,1 ; 0,9	0,8**	0,2 ; 1,6	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	99,5	99,1 ; 99,9	99,2	98,4 ; 99,8	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,247					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,4**	0,1 ; 0,7	0,5**	0,0 ; 1,1	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,6	99,3 ; 99,9	99,5	98,9 ; 100,0	x	;
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,395					
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,6**	0,2 ; 1,0	0,8**	0,1 ; 1,6	x	;
Non	99,2	98,8	99,7	99,4	99,0 ; 99,8	99,2	98,4 ; 99,9	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,492					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,8*	1,1 ; 2,7	2,1*	1,1 ; 3,3	1,6**	0,6 ; 2,7
Non	98,2	98,1	98,4	98,2	97,3 ; 98,9	97,9	96,7 ; 98,9	98,4	97,3 ; 99,4
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,041					
Oui	1,6	2,3	0,9	1,0*	0,6 ; 1,6	1,6**	0,8 ; 2,6	0,5**	0,1 ; 1,0
Non	98,4	97,7	99,1	99,0	98,4 ; 99,4	98,4	97,4 ; 99,2	99,5	99,0 ; 99,9
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,220					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,7**	0,3 ; 1,2	1,0**	0,3 ; 1,8	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,3	98,8 ; 99,7	99,0	98,2 ; 99,7	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,2	16,2	8,3	13,6	11,9 ; 15,6	17,5	14,9 ; 20,5	9,9	7,7 ; 12,1
Non	87,8	83,8	91,7	86,4	84,4 ; 88,1	82,5	79,5 ; 85,1	90,1	87,9 ; 92,3
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,872			
Oui	1,6	2,3	0,8	1,4*	0,8 ; 2,1	1,4**	0,7 ; 2,2	1,5**	0,5 ; 2,7
Non	98,4	97,7	99,2	98,6	97,9 ; 99,2	98,6	97,8 ; 99,3	98,5	97,3 ; 99,5
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,659			
Oui	1,8	2,4	1,3	1,4**	0,8 ; 2,2	1,6**	0,6 ; 2,7	1,2**	0,4 ; 2,2
Non	98,2	97,6	98,7	98,6	97,8 ; 99,2	98,4	97,3 ; 99,4	98,8	97,8 ; 99,6
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,769			
Oui	1,4	1,7	1,0	0,9**	0,4 ; 1,6	0,8**	0,2 ; 1,6	1,0**	0,2 ; 2,1
Non	98,6	98,3	99,0	99,1	98,4 ; 99,6	99,2	98,4 ; 99,8	99,0	97,9 ; 99,8
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,411			
Oui	0,8	1,2	0,4*	1,3**	0,6 ; 2,1	1,7**	0,6 ; 3,0	x	;
Non	99,2	98,8	99,6	98,7	97,9 ; 99,4	98,3	97,0 ; 99,4	x	;
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 'n.d.'			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = .			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,164			
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	x	;	x	;	x	;
Non	99,6	99,6	99,7	x	;	x	;	x	;
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = 'n.d.'			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	13,9	12,2 ; 15,9	17,6	15,0 ; 20,6	10,5	8,2 ; 12,8
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	28,1*	15,4 ; 40,9	23,0**	7,4 ; 39,7	33,4**	14,0 ; 54,6
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	44,2	33,6 ; 55,1	48,3	33,2 ; 63,5	40,2*	24,8 ; 55,8
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	16,0	13,0 ; 19,1	23,3	18,3 ; 28,5	9,1*	5,7 ; 12,7
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	5,7*	3,9 ; 7,7	7,6*	4,6 ; 11,0	3,8**	2,0 ; 5,9
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	27,9	25,5 ; 30,2	8,1	6,7 ; 9,5	10,8	9,2 ; 12,5
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	30,4	26,9 ; 34,0	10,1	7,9 ; 12,5	13,7	11,2 ; 16,3
Femmes	25,4	6,8	7,4	25,6	22,6 ; 28,7	6,2	4,5 ; 7,9	8,1	6,0 ; 10,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,109					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	19,7**	9,2 ; 31,0	x	;	11,2**	2,6 ; 21,6
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	40,6	30,4 ; 50,8	7,6**	2,1 ; 13,8	23,1*	14,1 ; 32,0
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,4	8,4	15,9	32,3	24,7 ; 40,1	5,5**	1,7 ; 9,8	18,3*	11,8 ; 25,0
45-64 ans	29,9	12,3	16,1	30,8	26,8 ; 34,8	11,6	9,0 ; 14,4	16,1	13,0 ; 19,2
65 ans et plus	29,0	7,1	7,2	29,5	25,9 ; 33,2	8,2	6,0 ; 10,4	5,7	4,0 ; 7,5
Hommes	7,1	0,5**	0,4**	8,8*	5,2 ; 12,5	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,178					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	22,7**	8,0 ; 39,9	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	38,1*	24,5 ; 52,9	11,4**	1,4 ; 22,6	26,9**	13,1 ; 41,4
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,067					
25-44 ans	33,0	8,7	18,3	31,8*	21,5 ; 42,3	6,7**	0,8 ; 13,5	16,8**	8,2 ; 26,3
45-64 ans	29,0	13,5	21,1	31,1	25,4 ; 37,3	14,2	9,9 ; 18,6	21,9	16,7 ; 27,0
65 ans et plus	32,2	9,0	10,0	33,7	27,9 ; 39,5	10,3*	6,8 ; 14,2	7,9*	5,1 ; 11,0
Femmes	10,0	0,8**	0,6**	14,2*	6,8 ; 21,9	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,557					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	16,6**	1,7 ; 34,1	x	;	20,9**	3,5 ; 41,0
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	43,2*	28,2 ; 59,0	x	;	19,3**	8,1 ; 31,5
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,022					
25-44 ans	33,8	8,1	13,5	32,8*	21,5 ; 44,8	x	;	19,9*	10,1 ; 30,3
45-64 ans	30,8	11,0	11,0	30,5	25,1 ; 36,0	9,1*	5,9 ; 12,7	10,6*	7,1 ; 14,2
65 ans et plus	25,9	5,3	4,5	25,4	20,9 ; 30,0	6,1*	3,6 ; 8,7	3,5**	1,7 ; 5,5

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	78,9	76,9 ; 80,8	82,8	80,0 ; 85,5	75,3	72,4 ; 77,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	40,8*	27,3 ; 54,2	35,4*	18,8 ; 53,8	46,5*	25,5 ; 67,2
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	85,2	77,3 ; 92,3	85,0	74,2 ; 94,5	85,3	72,7 ; 95,7
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	67,7	60,0 ; 75,4	65,3	54,3 ; 76,1	70,2	59,0 ; 80,7
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	92,9	90,6 ; 95,0	93,3	89,7 ; 96,4	92,6	89,3 ; 95,3
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	82,3	79,5 ; 84,8	88,1	84,3 ; 91,4	76,6	72,6 ; 80,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	59,6	54,0 ; 64,5	66,1	58,9 ; 73,0	52,2	44,1 ; 59,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	81,3	77,4 ; 84,9	84,7	78,9 ; 89,8	78,3	72,8 ; 83,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	86,4	83,0 ; 89,7	89,2	84,1 ; 93,7	84,2	79,1 ; 88,5
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	88,1	85,0 ; 90,9	92,6	88,8 ; 96,0	83,5	78,6 ; 88,0
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	88,5	86,6 ; 90,3	86,6	83,7 ; 89,3	90,5	88,0 ; 92,8
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	9,8	8,2 ; 11,6	10,8	8,3 ; 13,5	8,8	6,6 ; 11,2
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,7*	0,9 ; 2,5	2,6**	1,3 ; 4,1	0,7**	0,1 ; 1,5
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	48,7	47,3 ; 50,1	1,2**	0,5 ; 2,0	98,7	97,8 ; 99,5
Femmes	51,5	97,5	0,8	50,6	49,3 ; 52,0	98,1	97,0 ; 99,0	0,7**	0,1 ; 1,4
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,7**	0,3 ; 1,1	0,7**	0,1 ; 1,5	0,6**	0,1 ; 1,2

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	88,5	86,6 ; 90,3	9,8	8,2 ; 11,6	1,7*	0,9 ; 2,5
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,080					
Hommes	86,4	10,7	2,9	86,6	83,7 ; 89,3	10,8	8,3 ; 13,5	2,6**	1,3 ; 4,1
Femmes	91,6	7,4	0,9*	90,5	88,0 ; 92,8	8,8	6,6 ; 11,2	0,7**	0,1 ; 1,5
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	57,5*	34,0 ; 80,1	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	66,9	55,9 ; 76,8	26,5*	17,4 ; 36,9	6,6**	1,2 ; 13,1
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	64,7	54,6 ; 73,7	30,3	21,7 ; 39,8	5,0**	0,9 ; 10,1
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	89,9	87,3 ; 92,2	8,6	6,4 ; 11,0	1,4**	0,5 ; 2,5
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	94,6	92,7 ; 96,3	4,5*	2,9 ; 6,4	0,9**	0,2 ; 1,8
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	95,3	90,9 ; 98,8	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,690					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	64,9*	30,6 ; 93,8	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	87,5	84,6 ; 90,2	10,0	7,7 ; 12,7	2,5**	1,1 ; 4,0
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,522					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	91,0	88,4 ; 93,2	8,4	6,3 ; 10,8	0,6**	0,0 ; 1,4
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	45,2	41,3 ; 49,2	60,7	56,3 ; 65,5
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000	...	...	...
15-24 ans	87,9	...	72,6	59,3 ; 85,2	...	;
25-44 ans	62,4	...	57,5	51,5 ; 63,6	...	;
45-64 ans	29,9	...	30,1	24,2 ; 36,1	...	;
65 ans et plus	7,3	...	7,5**	0,9 ; 16,3	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...	...	P = 0,000	...
15-24 ans	...	90,0	...	;	90,5	80,8 ; 98,6
25-34 ans	...	71,0	...	;	67,4	59,2 ; 75,6
35-49 ans	...	53,5	...	;	44,4	37,4 ; 51,2
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,169	...	P = 0,497	...
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	39,5	30,1 ; 49,2	51,4*	30,2 ; 70,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	41,0	32,3 ; 49,3	59,3	49,8 ; 68,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	50,5	42,2 ; 59,2	65,3	56,7 ; 73,4
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	49,0	41,4 ; 56,5	59,4	51,2 ; 68,5
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,016	...	P = 0,000	...
Un partenaire	43,8	64,2	42,5	38,5 ; 46,9	57,1	52,1 ; 62,2
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	64,4	50,1 ; 76,8	85,5	74,2 ; 94,8
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	58,3*	26,9 ; 89,4	85,9*	32,7 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = 0,282	...	P = 0,943	...
Hommes	x	66,6	x	;	60,7	56,3 ; 65,5
Femmes	47,8	x	45,4	41,6 ; 49,4	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	10,8	9,0 ; 12,8	15,9	13,9 ; 18,1	73,3	70,8 ; 75,6
Sexe	P = 0,093			P = 0,278					
Hommes	14,8	14,9	70,3	12,1	9,4 ; 14,9	16,6	13,6 ; 19,7	71,3	67,9 ; 74,7
Femmes	13,2	14,7	72,1	9,5	6,9 ; 12,3	15,1	12,3 ; 18,2	75,3	72,0 ; 78,5
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	53,1*	30,7 ; 77,6	x	;	x	;
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	27,7*	17,2 ; 38,2	34,5*	23,8 ; 45,8	37,8	26,6 ; 48,9
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	33,6	24,6 ; 43,6	37,5	27,7 ; 47,6	28,9*	19,6 ; 38,2
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	10,0	7,5 ; 12,7	20,6	17,3 ; 24,1	69,4	65,4 ; 73,2
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	4,8*	3,0 ; 6,9	4,7*	2,8 ; 6,7	90,5	87,8 ; 93,1
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	x	;	5,0**	1,3 ; 9,7	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,126					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	14,0*	8,7 ; 19,9	15,1*	9,3 ; 21,6	70,9	63,9 ; 77,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	10,5*	6,7 ; 14,4	11,3*	7,7 ; 15,3	78,2	73,5 ; 83,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	9,8*	6,2 ; 13,6	20,2	15,5 ; 25,1	70,0	64,5 ; 75,3
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	10,2*	7,0 ; 13,7	17,1	13,3 ; 21,2	72,7	67,9 ; 77,1
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	8,2	6,4 ; 10,0	12,0	10,0 ; 14,1	79,8	77,4 ; 82,3
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	32,6	23,3 ; 42,6	43,2	33,2 ; 53,4	24,2*	16,3 ; 33,1
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	24,4**	4,3 ; 47,9	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	16,6	14,5 ; 18,8	18,5	15,5 ; 21,7	14,6	11,6 ; 17,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	65,1*	42,9 ; 88,0	79,8*	49,2 ; 100,0	53,6**	18,1 ; 88,1
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	42,8	31,5 ; 54,4	49,0*	33,1 ; 65,4	36,4*	20,2 ; 52,7
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	48,1	38,4 ; 58,3	55,4	41,7 ; 70,0	40,9*	26,1 ; 55,3
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	17,2	14,1 ; 20,7	18,5	13,8 ; 23,9	15,9	11,9 ; 20,4
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	6,3*	4,3 ; 8,5	8,1*	5,1 ; 11,8	4,4**	1,9 ; 7,1
	3,1*	3,9*	1,8**	5,1**	1,5 ; 9,6	6,8**	1,1 ; 13,8	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,305		P = 0,104		P = 0,466	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	20,6*	14,5 ; 27,2	25,2*	16,8 ; 34,2	14,0**	4,2 ; 23,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	15,0	10,9 ; 19,2	19,5*	13,0 ; 26,3	10,6*	5,7 ; 16,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	17,7	13,4 ; 22,3	18,2*	11,8 ; 25,2	17,3*	11,2 ; 23,7
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	14,7	11,2 ; 18,5	13,3*	8,6 ; 18,5	16,4*	10,6 ; 22,5
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	12,4	10,3 ; 14,6	13,4	10,4 ; 16,4	11,4	8,4 ; 14,5
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	48,5	38,6 ; 58,6	51,9	39,0 ; 65,3	44,1*	28,3 ; 59,9
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	50,5*	23,9 ; 75,8	49,7**	21,1 ; 79,3	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,111		P = 0,328		P = 0,805	
Hommes	18,7	54,0	17,9	14,5	11,6 ; 17,6	x	;	14,5	11,6 ; 17,7
Femmes	19,2	19,2	x	18,4	15,3 ; 21,8	18,4	15,3 ; 21,8	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	7,0	5,8 ; 8,2	4,7*	3,2 ; 6,2	9,2	7,3 ; 11,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,177		P = 0,782		P = 0,053	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	7,1**	1,8 ; 13,4	x	;	15,0**	3,9 ; 28,2
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,132		P = 0,782		P = 0,093	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	5,4**	1,3 ; 10,4	x	;	10,9**	2,6 ; 20,6
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	9,2	6,8 ; 11,6	6,0*	3,3 ; 9,0	12,3*	8,7 ; 16,4
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	6,3	4,6 ; 8,0	4,7*	2,5 ; 7,1	7,8*	5,3 ; 10,5
	2,7	3,2*	2,2	4,5**	2,0 ; 7,4	5,8**	1,4 ; 11,4	3,4**	0,8 ; 6,8
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,007		P = 0,084	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	2,5**	0,9 ; 4,2	x	;	3,6**	1,0 ; 6,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	6,4*	4,1 ; 8,9	2,0**	0,3 ; 4,2	10,4*	6,2 ; 14,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	9,5*	6,6 ; 12,5	7,2**	3,4 ; 11,3	11,4*	7,2 ; 15,9
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	8,8*	6,2 ; 11,4	7,7*	4,1 ; 11,4	9,9*	6,2 ; 14,0
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,040		P = 0,005		P = 0,416	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	6,7	5,3 ; 8,2	3,7*	2,2 ; 5,3	9,7	7,4 ; 12,2
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	12,6*	7,1 ; 19,2	11,5**	4,5 ; 19,9	14,1**	5,1 ; 25,3
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	x	;	x	;	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,000		P = 0,010		P = 0,691	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	10,2	8,0 ; 12,7	x	;	10,1	7,8 ; 12,6
Femmes	7,0	7,0	8,9**	4,4*	2,9 ; 6,0	4,3*	2,8 ; 5,9	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,005		P = 0,002		P = 0,302	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	36,0**	6,6 ; 72,9	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	6,9	5,7 ; 8,2	4,5*	3,0 ; 6,0	9,2	7,3 ; 11,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	31,5*	20,9 ; 42,4	68,5	57,6 ; 79,1
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,224			
15-35 ans	25,6	74,4	32,8*	21,4 ; 44,6	67,2	55,4 ; 78,6
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,002			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	49,0*	24,4 ; 74,9	51,0*	25,1 ; 75,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	18,2**	6,5 ; 31,9	81,8	68,1 ; 93,5
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	x	;	x	;
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	32,5*	21,8 ; 43,7	67,5	56,3 ; 78,2
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Outaouais et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	75,5	72,5 ; 78,4	18,6	16,1 ; 21,3	5,8*	4,1 ; 7,8
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	82,2	70,1 ; 93,4	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	84,2	79,9 ; 88,5	11,8*	8,0 ; 15,6	3,9**	1,8 ; 6,5
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	66,5	61,9 ; 70,8	28,9	24,6 ; 33,3	4,6*	2,7 ; 6,7
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	54,9	45,5 ; 64,0	36,5	28,0 ; 45,3	8,6**	2,9 ; 15,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	72,6	66,5 ; 78,6	21,2	15,7 ; 27,0	6,1**	2,7 ; 9,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	81,2	75,5 ; 86,1	13,1*	8,6 ; 17,7	5,7**	2,6 ; 9,7
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	82,8	77,3 ; 87,6	12,9*	8,7 ; 17,5	4,3**	1,6 ; 7,8
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,138					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	76,0	72,9 ; 78,9	18,9	16,2 ; 21,8	5,1*	3,4 ; 6,9
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	70,9	55,2 ; 85,7	14,9**	4,2 ; 27,7	14,2**	2,1 ; 29,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 08

# **ABITIBI-TÉMISCAMINGUE**

---



# 1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes	Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
Ensemble de la population		49,4	50,6			50,7	50,6 ; 50,7	49,3	49,3 ; 49,4
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000				P = 0,000			
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	16,2	16,2 ; 16,2	16,7	16,6 ; 16,7	15,7	15,7 ; 15,7
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	31,3	31,3 ; 31,3	31,5	31,5 ; 31,5	31,1	31,0 ; 31,1
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	37,5	37,5 ; 37,5	38,0	37,9 ; 38,0	37,0	37,0 ; 37,0
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	15,0	15,0 ; 15,0	13,9	13,8 ; 13,9	16,2	16,2 ; 16,2
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,003			
Personne seule	13,4	10,7	16,0	12,9	11,9 ; 14,3	10,3	9,0 ; 12,0	15,6	14,0 ; 17,6
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	34,2	32,3 ; 36,1	35,4	32,7 ; 38,1	33,0	30,4 ; 35,8
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	41,1	38,8 ; 43,1	43,5	40,2 ; 46,4	38,6	35,6 ; 41,3
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	6,6	5,5 ; 7,9	5,6	4,1 ; 7,4	7,7	6,0 ; 9,4
Autre	6,7	6,5	6,9	5,2	4,1 ; 6,4	5,3*	3,5 ; 7,1	5,1*	3,6 ; 6,7
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>		P = 0,256				P = 0,206			
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	98,8	98,1 ; 99,3	98,0	96,8 ; 99,0	99,5	99,1 ; 99,9
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,5**	0,1 ; 0,9	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	0,8**	0,3 ; 1,3	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>		P = 0,912				P = 0,489			
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	97,7	96,9 ; 98,3	97,8	96,8 ; 98,7	97,5	96,4 ; 98,4
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	1,9	1,3 ; 2,5	x	;	1,7*	1,1 ; 2,4
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	0,4**	0,1 ; 0,9	x	;	0,8**	0,1 ; 1,7
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,683				P = 0,004			
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	35,9	33,7 ; 38,0	38,0	34,8 ; 41,3	33,7	30,9 ; 36,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	25,7	23,6 ; 27,7	26,3	23,3 ; 29,5	25,1	22,3 ; 27,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	24,3	22,3 ; 26,4	24,5	21,7 ; 27,7	24,1	21,4 ; 27,0
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	14,1	12,6 ; 15,8	11,2	9,0 ; 13,4	17,1	14,9 ; 19,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	15,2	13,5 ; 17,1	12,3	9,9 ; 14,9	18,2	15,9 ; 20,7
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	16,8	15,0 ; 18,6	14,5	11,9 ; 17,2	19,2	16,5 ; 21,9
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	19,1	17,1 ; 21,2	19,0	15,9 ; 22,0	19,2	16,5 ; 22,0
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	20,3	18,2 ; 22,5	20,1	17,2 ; 23,3	20,5	17,6 ; 23,5
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	28,6	26,3 ; 30,9	34,2	30,5 ; 38,0	22,8	19,8 ; 25,9
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000				P = 0,001			
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	35,6	33,4 ; 38,0	39,4	36,1 ; 43,1	31,7	28,7 ; 34,8
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	52,8	50,2 ; 55,2	49,7	46,0 ; 53,4	56,0	52,7 ; 59,2
Pauvre	9,4	8,9	9,9	9,7	8,5 ; 11,2	8,5	6,8 ; 10,4	11,0	9,1 ; 13,0
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,8*	1,2 ; 2,5	2,3*	1,3 ; 3,5	1,3**	0,7 ; 2,1
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	61,4	59,6 ; 63,1	67,0	64,6 ; 69,7	55,6	53,2 ; 58,0
Étudiants	13,1	13,0	13,2	12,4	11,2 ; 13,6	12,3	10,4 ; 14,1	12,5	11,0 ; 14,0
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	7,2	6,1 ; 8,2	2,8*	1,7 ; 4,0	11,6	9,9 ; 13,6
Retraités	19,6	18,0	21,1	19,1	18,1 ; 20,0	17,9	16,5 ; 19,2	20,3	18,9 ; 21,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	51,6	49,2 ; 54,0	35,2	32,9 ; 37,5	13,3	11,8 ; 14,7
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,539					
Hommes	56,6	33,5	9,9	51,1	47,7 ; 54,6	36,3	33,0 ; 39,6	12,6	10,6 ; 14,6
Femmes	55,5	32,8	11,7	52,1	48,7 ; 55,3	34,0	30,9 ; 37,4	13,9	11,6 ; 16,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	59,2	52,2 ; 66,1	35,7	28,7 ; 42,9	5,2**	2,2 ; 8,7
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	64,3	60,1 ; 68,3	29,2	25,6 ; 33,1	6,5*	4,6 ; 8,7
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	45,3	41,6 ; 48,8	38,5	35,1 ; 42,3	16,2	13,6 ; 18,9
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	30,8	26,1 ; 35,7	39,1	33,9 ; 44,3	30,2	25,3 ; 35,1
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	39,1	34,5 ; 43,4	35,6	31,3 ; 40,2	25,3	21,1 ; 29,4
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	44,9	41,3 ; 48,9	37,3	33,6 ; 40,9	17,8	14,8 ; 20,8
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	61,3	57,3 ; 65,4	32,1	28,4 ; 36,1	6,6*	4,6 ; 8,6
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	51,8	42,4 ; 61,0	43,1	33,9 ; 52,6	5,1**	1,9 ; 9,0
Autre	46,0	39,4	14,6	49,9	36,4 ; 63,0	33,2*	22,1 ; 46,0	16,9**	8,4 ; 26,6
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	39,3	35,2 ; 43,3	40,1	36,0 ; 44,3	20,6	17,7 ; 23,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	50,8	46,1 ; 55,2	39,5	34,9 ; 44,4	9,7	7,3 ; 12,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	59,0	54,2 ; 63,7	30,2	25,8 ; 34,7	10,8	7,8 ; 13,8
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	70,4	64,7 ; 76,0	23,8	18,7 ; 29,2	5,8*	3,2 ; 8,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	34,6	28,7 ; 40,6	37,7	32 ; 43,7	27,7	22,3 ; 33,1
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	55,3	52,5 ; 58,1	34,6	31,9 ; 37,4	10,2	8,6 ; 11,8
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	27,1	21,0 ; 33,2	36,2	30,1 ; 42,7	36,8	30,0 ; 43,3
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	55,1	52,5 ; 57,6	34,9	32,4 ; 37,5	10,1	8,7 ; 11,4
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	57,6	54,6 ; 60,6	33,7	30,9 ; 36,6	8,7	7,1 ; 10,5
Étudiants	62,7	32,2	5,0	58,7	49,9 ; 66,7	37,1	29,3 ; 45,8	4,2**	1,5 ; 7,6
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	33,9	26,1 ; 41,6	39,8	31,5 ; 48,5	26,3	19,2 ; 34,0
Retraités	40,2	39,5	20,4	32,7	28,4 ; 37,4	37,7	32,8 ; 42,4	29,6	25,2 ; 34,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	51,6	49,2 ; 54,0	35,2	32,9 ; 37,5	13,3	11,8 ; 14,7
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,004					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	44,5	39,6 ; 49,6	39,8	35,0 ; 44,8	15,6	12,2 ; 19,3
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	54,1	51,4 ; 56,8	33,5	30,8 ; 36,2	12,5	10,8 ; 14,0
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	38,9*	20,6 ; 57,6	36,9*	18,6 ; 56,0	24,1**	9,0 ; 41,3
Poids normal	62,6	29,4	8,0	59,2	55,3 ; 62,9	32,5	28,9 ; 36,3	8,3	6,6 ; 10,1
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	46,4	43,3 ; 49,5	37,1	34,1 ; 40,2	16,4	14,2 ; 18,6
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	58,7	55,3 ; 62,1	30,6	27,3 ; 33,9	10,7	8,6 ; 12,8
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	47,3	43,7 ; 51,2	39,8	36,1 ; 43,3	12,8	10,8 ; 15,0
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	34,6	25,7 ; 43,2	31,9	23,8 ; 40,6	33,6	25,7 ; 41,9
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	32,6	27,8 ; 37,1	40,3	35,4 ; 45,2	27,1	22,7 ; 31,3
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	57,7	55,0 ; 60,4	33,3	30,7 ; 35,9	9,1	7,6 ; 10,5

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	47,8	45,4 ; 50,2	45,5	43,1 ; 47,9	6,8	5,7 ; 8,0
<b>Sexe</b>	P = 0,097			P = 0,019					
Hommes	47,5	46,6	6,0	46,6	43,1 ; 50,2	48,1	44,4 ; 51,5	5,4	4,0 ; 7,0
Femmes	47,1	45,9	7,0	49,0	45,8 ; 52,3	42,8	39,8 ; 46,1	8,1	6,4 ; 10,0
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,002					
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	56,5	49,4 ; 63,6	40,3	33,3 ; 47,3	3,3**	1,1 ; 5,8
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	44,6	40,2 ; 49,2	46,7	42,1 ; 51,2	8,7	6,3 ; 11,3
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	44,2	40,4 ; 47,9	49,1	45,1 ; 52,9	6,7	5,0 ; 8,6
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	54,5	48,9 ; 60,1	38,7	33,4 ; 44,0	6,7*	4,2 ; 9,6
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	38,2	49,2	12,5	39,4	34,8 ; 44,3	47,2	42,3 ; 51,7	13,4	9,9 ; 17,0
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	51,4	47,6 ; 55,4	43,6	39,7 ; 47,4	5,0*	3,3 ; 7,1
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	46,3	42,0 ; 50,4	48,2	43,9 ; 52,5	5,5*	3,8 ; 7,5
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	43,8	34,5 ; 53,3	47,5	38,0 ; 56,8	8,8*	4,7 ; 13,7
Autre	44,5	46,1	9,4*	58,2	44,9 ; 69,7	30,6*	20,6 ; 42,9	11,2**	3,6 ; 20,3
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,017					
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	53,5	49,5 ; 57,5	41,1	37,0 ; 45,0	5,5	3,9 ; 7,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	46,3	41,5 ; 51,0	46,8	42,0 ; 51,7	6,9*	4,7 ; 9,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	45,6	40,8 ; 50,5	47,1	42,0 ; 51,9	7,3*	5,0 ; 10,0
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	39,8	33,7 ; 46,3	51,1	44,6 ; 57,6	9,0*	5,1 ; 13,4
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	46,6	40,0 ; 52,9	41,3	35,3 ; 47,9	12,1*	8,3 ; 16,1
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	47,8	45,0 ; 50,7	46,6	43,8 ; 49,4	5,6	4,4 ; 7,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	40,6	33,8 ; 47,1	45,3	38,7 ; 52,0	14,1*	9,7 ; 18,9
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	48,8	46,2 ; 51,5	45,4	42,9 ; 48	5,7	4,6 ; 7,0
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,066					
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	45,0	41,9 ; 48,2	48,1	45,0 ; 51,2	6,9	5,4 ; 8,5
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	55,2	46,8 ; 63,4	40,6	32,3 ; 48,7	4,3**	1,3 ; 7,8
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	47,5	39,2 ; 55,6	42,6	34,7 ; 50,9	9,9*	6,0 ; 14,4
Retraités	51,9	42,8	5,3	51,5	46,4 ; 56,3	41,5	36,8 ; 46,1	7,1*	4,7 ; 9,7
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	54,0	50,5 ; 57,6	41,5	37,9 ; 44,9	4,5*	3,1 ; 6,0
Bon	40,5	52,6	6,9	41,9	37,7 ; 45,9	51,9	47,7 ; 56,1	6,2	4,3 ; 8,1
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	38,6	32,2 ; 44,3	44,2	38,1 ; 50,3	17,2	13,0 ; 21,8
<b>Niveau de détresse psychologique</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	27,7	55,6	16,8	27,3	23,2 ; 31,8	55,3	50,3 ; 60,1	17,4	13,9 ; 21,2
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	53,6	50,8 ; 56,5	42,9	40,2 ; 45,8	3,4	2,5 ; 4,6
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	21,3	49,3	29,4	24,6*	12,3 ; 37,4	50,3	36,0 ; 65,0	25,1*	13,1 ; 37,9
Non	48,1	46,1	5,8	48,6	46,2 ; 51,1	45,4	43,0 ; 48,0	5,9	4,9 ; 7,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	22,2	20,2 ; 24,1	77,8	75,9 ; 79,8
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Hommes	18,2	81,8	16,3	13,9 ; 18,9	83,7	81,1 ; 86,1
Femmes	26,0	74,0	28,1	25,3 ; 31,3	71,9	68,7 ; 74,7
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,128			
15-24 ans	24,4	75,6	19,6*	14,3 ; 25,5	80,4	74,5 ; 85,7
25-44 ans	24,3	75,7	25,8	22,1 ; 29,6	74,2	70,4 ; 77,9
45-64 ans	20,6	79,4	20,7	17,9 ; 23,6	79,3	76,4 ; 82,1
65 ans et plus	18,8	81,2	20,9	16,5 ; 25,3	79,1	74,7 ; 83,5
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,161			
Personne seule	25,7	74,3	27,1	22,9 ; 31,7	72,9	68,3 ; 77,1
Couple sans enfant	17,7	82,3	20,0	16,9 ; 23,1	80,0	76,9 ; 83,1
Couple avec enfants	20,8	79,2	22,5	19,1 ; 26,1	77,5	73,9 ; 80,9
Famille monoparentale	32,2	67,8	24,7*	17,2 ; 32,9	75,3	67,1 ; 82,8
Autre	29,7	70,3	16,8*	8,7 ; 26,2	83,2	73,8 ; 91,3
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,113			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	25,2	21,8 ; 29,1	74,8	70,9 ; 78,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	21,8	18,1 ; 25,8	78,2	74,2 ; 81,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	21,2	17,5 ; 25,1	78,8	74,9 ; 82,5
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	17,9	13,1 ; 23,1	82,1	76,9 ; 86,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,037			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	26,1	21,1 ; 31,6	73,9	68,4 ; 78,9
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	20,7	18,3 ; 23,0	79,3	77,0 ; 81,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	39,7	33,3 ; 46,2	60,3	53,8 ; 66,7
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	19,8	17,7 ; 21,8	80,2	78,2 ; 82,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,149			
Travailleurs	20,9	79,1	21,0	18,5 ; 23,6	79,0	76,4 ; 81,5
Étudiants	24,8	75,2	22,1*	15,4 ; 29,1	77,9	70,9 ; 84,6
Personnes sans emploi	37,9	62,1	30,5	23,5 ; 38,2	69,5	61,8 ; 76,5
Retraités	18,2	81,8	23,0	18,9 ; 27,1	77,0	72,9 ; 81,1
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	13,9	11,7 ; 16,3	86,1	83,7 ; 88,3
Bon	26,6	73,4	25,7	22,3 ; 29,2	74,3	70,8 ; 77,7
Passable ou mauvais	48,8	51,2	45,9	39,6 ; 52,1	54,1	47,9 ; 60,4
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	12,6	10,5 ; 15,0	87,4	85,0 ; 89,5
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	26,7	23,6 ; 30,0	73,3	70,0 ; 76,4
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	58,9	49,6 ; 68,0	41,1	32,0 ; 50,4
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	55,9	41,3 ; 71,5	44,1*	28,5 ; 58,7
Non	20,6	79,4	20,8	18,8 ; 22,7	79,2	77,3 ; 81,2
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,024			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	21,8	19,9 ; 23,8	78,2	76,2 ; 80,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,9	2,1 ; 3,8	3,3*	2,1 ; 4,8	2,5*	1,6 ; 3,6
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,555		P = 0,850		P = 0,548	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	3,4**	0,8 ; 6,7	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,9*	1,6 ; 4,4	2,9**	1,2 ; 5,1	2,9**	1,0 ; 5,3
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	3,3*	2,0 ; 4,7	3,5**	1,7 ; 5,9	3,0**	1,4 ; 4,9
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,4**	0,3 ; 2,8	2,4**	0,0 ; 5,6	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,353		P = 0,146		P = 0,144	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	3,8*	2,1 ; 5,8	5,9**	2,5 ; 9,9	2,4**	0,8 ; 4,3
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	2,4**	1,2 ; 3,9	1,1**	0,2 ; 2,4	3,8**	1,6 ; 6,4
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	2,3**	1,0 ; 3,8	3,4**	1,3 ; 6,1	x	;
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	4,7**	1,7 ; 8,3	x	;	4,6**	0,8 ; 8,9
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,403		P = 0,612		P = 0,404	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	2,9*	1,6 ; 4,4	3,9**	1,8 ; 6,6	1,7**	0,6 ; 3,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	1,8**	0,8 ; 3,1	2,0**	0,4 ; 4,0	1,7**	0,3 ; 3,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	3,6**	1,9 ; 5,7	3,2**	0,7 ; 6,4	4,1**	1,7 ; 7,1
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	3,9**	1,4 ; 6,9	5,1**	0,5 ; 11,1	3,1**	0,4 ; 6,9
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,407		P = 0,671		P = 0,531	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	2,0**	0,7 ; 3,6	2,1**	0,0 ; 5,0	1,9**	0,3 ; 4,1
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	2,9*	1,9 ; 3,9	2,9**	1,5 ; 4,6	2,8*	1,6 ; 4,3
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,066		P = 0,021		P = 0,907	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	4,7*	2,4 ; 7,4	7,1**	3,0 ; 11,9	2,6**	0,4 ; 5,8
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	2,7*	1,9 ; 3,6	2,9*	1,6 ; 4,5	2,4*	1,4 ; 3,7
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,542		P = 0,240		P = 0,776	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,8*	1,9 ; 3,9	2,8**	1,5 ; 4,3	2,9**	1,5 ; 4,6
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	4,0**	0,6 ; 8,2	-	;	-	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	4,5**	1,7 ; 8,0	10,0**	0,8 ; 22,6	3,1**	0,6 ; 6,3
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	2,0**	0,8 ; 3,5	2,4**	0,4 ; 5,2	1,7**	0,4 ; 3,5
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,126		P = 0,015	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,6**	0,8 ; 2,7	2,1**	0,7 ; 3,8	1,2**	0,3 ; 2,4
Bon	2,5	2,7	2,4	3,6*	2,1 ; 5,5	4,2**	1,7 ; 7,1	3,1**	1,3 ; 5,2
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	6,1*	3,7 ; 8,8	5,8**	2,6 ; 9,7	6,3**	2,6 ; 10,5
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,008		P = 0,000	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	1,5**	0,7 ; 2,4	1,5**	0,4 ; 2,8	1,5**	0,4 ; 2,9
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	3,2*	2,0 ; 4,8	4,3**	2,2 ; 7,1	2,0**	0,8 ; 3,5
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	11,3*	5,8 ; 17,5	10,7**	3,6 ; 19,6	11,8**	4,1 ; 20,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	7,4*	5,0 ; 10,1	8,8*	4,7 ; 13,7	6,6*	3,9 ; 9,8
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	1,6**	0,9 ; 2,5	2,2**	1,0 ; 3,6	0,9**	0,2 ; 1,9

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,6**	0,2 ; 1,2	0,6**	0,1 ; 1,4	0,6**	0,1 ; 1,3
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,310		P = 0,777		P = 0,476	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	1,2**	0,2 ; 2,5	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	x	;	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,075		P = 0,059		P = 0,342	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,771		P = 0,104		P = 0,201	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	0,7**	0,1 ; 1,6	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,762		P = 0,860		P = 0,578	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,266		P = 0,400		P = 0,300	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,6**	0,1 ; 1,1	x	;	0,5**	0,0 ; 1,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,419		P = 0,905		P = 0,500	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	1,3**	0,2 ; 2,8	x	;	1,9**	0,1 ; 4,5
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,002		P = 0,136	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	0,4**	0,0 ; 1,0	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	4,8**	0,9 ; 9,8	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024		P = 0,126		P = .	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	1,7**	0,5 ; 3,4	x	;	1,5**	0,2 ; 3,1
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région	Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,898			
Oui	10,2	10,0	10,3	12,4	10,8 ; 14,0	12,3	10,1 ; 14,7	12,5	10,3 ; 14,6
Non	89,8	90,0	89,7	87,6	86,0 ; 89,2	87,7	85,3 ; 89,9	87,5	85,4 ; 89,7
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,018			
Oui	4,4	3,5	5,3	5,1	4,1 ; 6,2	3,7*	2,5 ; 5,1	6,5	4,9 ; 8,4
Non	95,6	96,5	94,7	94,9	93,8 ; 95,9	96,3	94,9 ; 97,5	93,5	91,6 ; 95,1

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	12,4	10,8 ; 14,0	13,7	11,3 ; 16,3	11,1	9,1 ; 13,4
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,003		P = 0,234	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	19,7	13,9 ; 26,0	23,2*	13,8 ; 33,0	16,0*	8,9 ; 23,9
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	12,5	9,8 ; 15,6	14,3*	10,2 ; 18,8	10,6*	6,8 ; 14,8
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	10,7	8,2 ; 13,1	10,9*	7,6 ; 14,3	10,5*	7,3 ; 14,2
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	8,5*	5,9 ; 11,1	8,5*	4,6 ; 12,9	8,5*	4,9 ; 12,3
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,040		P = 0,239		P = 0,129	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	11,8	8,5 ; 15,1	10,2*	5,8 ; 15,2	12,98	8,6 ; 17,4
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	9,9	7,6 ; 12,3	10,7*	7,4 ; 14,1	9,0*	5,9 ; 12,6
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	13,6	10,7 ; 16,6	15,8	11,4 ; 20,2	11,1*	7,5 ; 15,2
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	10,2**	5,2 ; 16,4	15,6**	5,3 ; 28,6	6,2**	2,3 ; 11,2
Autre	14,9	16,7	13,2*	22,3**	11,0 ; 34,0	22,2**	5,6 ; 40,9	22,3**	7,1 ; 38,2
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,552		P = 0,131		P = 0,885	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	12,2	9,5 ; 14,9	12,7	9,0 ; 16,6	11,5*	7,7 ; 15,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	11,4	8,3 ; 14,5	10,7*	6,4 ; 15,1	12,1*	7,9 ; 16,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	14,5	10,8 ; 18,1	19,0*	13,0 ; 25,4	9,9*	6,1 ; 14,2
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	11,4*	7,2 ; 15,9	13,3**	6,5 ; 20,7	10,1**	5,1 ; 15,8
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,212		P = 0,364		P = 0,497	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	9,3*	6,3 ; 12,8	10,2**	4,9 ; 16,6	8,7*	5,1 ; 12,8
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	12,1	10,2 ; 13,9	13,5	10,6 ; 16,5	10,5	7,9 ; 13,1
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,034		P = 0,122		P = 0,113	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	12,6	10,4 ; 14,7	14,5	11,4 ; 17,7	10,3	7,5 ; 13,4
Étudiants	17,1	21,4	12,9	17,7*	11,5 ; 24,4	17,3*	8,8 ; 27,6	18,0*	9,5 ; 27,7
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	9,2**	4,6 ; 14,7	x	;	10,9**	5,3 ; 17,4
Retraités	7,5	7,0	7,9	9,4	6,8 ; 12,1	9,8*	5,6 ; 14,5	9,0*	5,7 ; 12,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	83,6	77,7 ; 88,8	84,5	76,0 ; 91,9	82,5	74,5 ; 89,5
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	16,4*	11,2 ; 22,3	15,5**	8,1 ; 24,0	17,5*	10,5 ; 25,5
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	21,3*	14,8 ; 27,7	26,2*	16,2 ; 35,7	15,2**	7,8 ; 23,4
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	11,4*	7,1 ; 16,0	12,7**	6,7 ; 20,1	9,6**	4,3 ; 15,8
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	22,1	16,4 ; 28,5	33,6	24,4 ; 43,6	7,6**	2,7 ; 13,3
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	8,5*	4,4 ; 13,1	3,4**	0,5 ; 7,2	14,8**	7,2 ; 23,9
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	18,9	13,8 ; 23,9	14,1*	8,5 ; 20,4	25,0*	16,4 ; 33,6
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	4,5**	1,9 ; 7,3	2,8**	0,0 ; 6,2	6,6**	2,2 ; 11,7
Autre	12,1	8,1	17,6	13,4*	8,9 ; 18,2	7,2**	3,6 ; 11,7	21,2*	12,1 ; 30,0
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	26,2	19,6 ; 32,8	22,0*	13,5 ; 31,2	31,5*	20,9 ; 42,4
Printemps	21,2	20,7	21,9	29,0	22,1 ; 35,9	35,4	25,5 ; 45,9	21,1*	12,6 ; 30,3
Été	29,1	30,3	27,4	24,4	18,4 ; 30,7	26,9*	17,9 ; 36,3	21,2*	13,0 ; 30,0
Automne	23,7	24,0	23,3	20,3	15,2 ; 26,1	15,7*	9,4 ; 23,3	26,2*	17,8 ; 35,8
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	41,6	33,9 ; 48,7	26,4*	18,2 ; 34,9	59,9	48,7 ; 70,0
Endroit public	28,1	24,8	32,5	25,2	19,2 ; 31,6	25,7*	17,6 ; 35,5	24,6*	16,1 ; 33,5
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	24,2	17,3 ; 30,7	31,6*	21,2 ; 41,6	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	9,1*	5,0 ; 13,8	16,3*	9,1 ; 24,6	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	6,4**	3,3 ; 9,9	6,9**	2,1 ; 12,5	5,7**	2,2 ; 9,9
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	1,6**	0,2 ; 3,3	x	;	x	;
Heurt/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	7,5*	4,2 ; 11,2	10,7*	5,8 ; 16,3	x	;
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	6,6**	3,2 ; 10,8	10,3**	4,4 ; 17,1	2,1**	0,0 ; 5,1
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	2,2**	0,2 ; 4,7	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	3,5**	1,0 ; 6,8	x	;	4,9**	0,9 ; 10,4
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	24,5	18,0 ; 31,5	26,0*	16,9 ; 35,9	22,5*	13,6 ; 32,3
Chute	34,6	30,5	40,3	32,6	26,1 ; 39,4	23,1*	15,8 ; 31,1	44,7	33,8 ; 55,9
Autres	13,7	12,5	15,3	15,2*	9,9 ; 20,5	17,2*	8,9 ; 25,8	12,7*	6,9 ; 19,5
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	1,8**	0,5 ; 3,3	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	33,1	25,9 ; 39,9	35,5	25,5 ; 45,4	29,9*	20,2 ; 39,9
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	34,0	27,6 ; 40,9	33,3	24,6 ; 43,0	35,0	24,2 ; 44,8
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	2,5**	0,6 ; 4,8	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	17,6	12,6 ; 22,9	15,9*	9,3 ; 23,1	19,8*	12,3 ; 28,3
Autre	11,9	10,9	13,2	11,0*	7,1 ; 15,4	9,9**	4,9 ; 15,8	12,3**	6,1 ; 19,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	5,7*	3,4 ; 8,4	4,5**	1,4 ; 8,3	6,8**	3,3 ; 10,6
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,151		P = 0,099		P = 0,006	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	3,3**	1,3 ; 5,8	3,5**	0,1 ; 7,8	3,1**	0,8 ; 6,0
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	9,3**	4,3 ; 14,8	x	;	13,6**	5,4 ; 22,6
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,461		P = 0,496		P = 0,419	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	7,1**	3,3 ; 11,6	x	;	8,9**	4,0 ; 14,9
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	4,9**	1,8 ; 8,2	4,8**	0,8 ; 9,9	5,0**	0,3 ; 10,7
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,699		P = .		P = 0,479	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	4,8**	2,4 ; 7,4	3,9**	0,6 ; 8,1	5,6**	2,3 ; 9,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,031		P = 0,410		P = 0,062	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	10,1**	4,1 ; 16,5	x	;	13,5**	5,2 ; 23,0
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	3,3**	1,1 ; 6,1	x	;	4,0**	0,8 ; 8,0
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,128		P = 0,403		P = 0,287	
Oui	5,9	3,6*	7,3	8,4**	3,5 ; 14,2	x	;	10,0**	2,8 ; 18,3
Non	2,7*	2,2**	3,1*	4,0**	1,7 ; 6,7	x	;	5,1**	1,5 ; 9,4
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,052		P = 0,049		P = 0,286	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	10,4**	3,5 ; 18,7	x	;	11,0**	2,9 ; 21,3
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	3,6**	1,3 ; 6,2	x	;	5,4**	1,6 ; 10,0
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,115		P = 0,634		P = 0,375	
Résidence	62,7	52,8	68,6	78,6	54,4 ; 94,7	x	;	88,3	65,6 ; 100,0
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	67,9*	34,8 ; 93,1	x	;	73,6*	34,6 ; 100,0
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	32,5**	7,9 ; 55,8	x	;	44,4**	8,8 ; 73,2
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	20,2**	5,5 ; 39,9	x	;	15,4**	1,2 ; 38,9
Été	29,3*	28,8**	29,5*	17,7**	0,2 ; 39,3	x	;	x	;
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	29,6**	9,9 ; 53,6	x	;	28,3**	4,3 ; 59,9
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	24,0**	7,0 ; 46,7	x	;	21,9**	2,9 ; 51,6
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	41,5**	17,4 ; 65,3	49,6**	6,1 ; 100,0	36,7**	5,7 ; 66,7
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	10,6	9,3 ; 12,1	9,9	8,0 ; 12,2	11,4	9,4 ; 13,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,013		P = 0,079		P = 0,046	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	9,0*	5,5 ; 13,0	4,3**	0,7 ; 9,0	14,1*	8,1 ; 21,0
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	10,5	8,1 ; 13,2	10,2*	6,7 ; 14,0	10,9*	7,5 ; 14,8
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	13,2	10,7 ; 15,9	13,0	9,6 ; 16,9	13,5	9,9 ; 17,3
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	6,1*	3,8 ; 8,9	7,4**	3,1 ; 12,5	4,9**	2,5 ; 8,0
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,608		P = 0,219		P = 0,358	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	10,2*	7,4 ; 13,3	10,8*	6,5 ; 16,1	9,8*	6,4 ; 13,9
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	10,9	8,5 ; 13,5	12,4*	8,7 ; 16,3	9,4*	6,2 ; 12,9
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	10,7	8,2 ; 13,2	7,8*	4,8 ; 10,9	14,0	10,1 ; 18,2
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	13,3**	7,4 ; 20,6	13,0**	3,6 ; 25,1	13,6**	5,7 ; 23,2
Autre	11,4	12,8*	10,2*	6,4**	1,8 ; 12,3	x	;	9,0**	1,8 ; 18,3
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,752		P = 0,694		P = 0,470	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	11,2	8,8 ; 13,9	11,6*	8,2 ; 15,4	10,8*	7,3 ; 14,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	10,4	7,5 ; 13,5	9,1*	5,5 ; 13,3	11,8*	7,5 ; 16,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	11,4	8,4 ; 14,4	8,9*	5,0 ; 13,2	14,0*	9,6 ; 18,5
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	9,0*	5,8 ; 12,6	9,3**	4,2 ; 15,2	8,8**	4,5 ; 13,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,874		P = 0,805		P = 0,776	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	11,0*	7,3 ; 15,3	9,3**	4,1 ; 15,7	12,3*	7,2 ; 17,9
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	10,7	9,1 ; 12,5	10,1	7,8 ; 12,5	11,5	9,0 ; 14,0
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,046		P = 0,216		P = 0,123	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	15,0*	10,2 ; 20,2	13,4*	7,5 ; 20,2	16,4*	9,0 ; 23,7
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	10,3	8,9 ; 11,9	9,8	7,7 ; 12,2	10,9	8,7 ; 13,1
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,671		P = 0,355		P = 0,032	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	10,8	8,9 ; 12,7	10,4	8,0 ; 13,1	11,2	8,6 ; 14,2
Étudiants	9,9	9,7	10,1	11,7*	7,0 ; 17,0	4,8**	0,4 ; 10,9	18,7*	10,9 ; 27,5
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	12,2*	7,6 ; 17,5	15,5**	3,8 ; 30,1	11,4*	6,2 ; 17,1
Retraités	6,9	6,7	7,0	9,1*	6,4 ; 12,2	11,2*	6,6 ; 16,5	7,1*	4,0 ; 10,6

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,573				
Oui	45,2	47,6	42,8	48,7	41,0 ; 56,0	51,1	40,3 ; 62,0	46,6	35,9 ; 57,0	
Non	54,8	52,4	57,2	51,3	44,0 ; 59,0	48,9	38,0 ; 59,7	53,4	43,0 ; 64,1	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,790				
Oui	25,4	27,6	23,1	13,8*	8,4 ; 19,6	13,0**	5,0 ; 21,5	14,5**	7,2 ; 22,5	
Non	74,6	72,4	76,9	86,2	80,4 ; 91,6	87,0	78,5 ; 95,0	85,5	77,5 ; 92,8	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,947				
Oui	17,6	15,6	19,6	21,4	16,1 ; 26,8	21,6*	13,9 ; 30,0	21,2*	14,4 ; 29,2	
Non	82,4	84,4	80,4	78,6	73,2 ; 83,9	78,4	70,0 ; 86,1	78,8	70,8 ; 85,6	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,298				
Oui	8,1	7,2	9,0	10,8*	6,6 ; 15,6	8,1**	2,9 ; 14,6	13,2**	6,5 ; 20,7	
Non	91,9	92,8	91,0	89,2	84,4 ; 93,4	91,9	85,4 ; 97,1	86,8	79,3 ; 93,5	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	2,1**	0,3 ; 4,4	x	;	4,0**	0,6 ; 8,3	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	59,7	52,4 ; 66,9	51,2	40,7 ; 61,7	67,3	57,9 ; 75,8	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	12,8*	8,3 ; 17,9	15,5*	8,3 ; 23,3	10,4**	5,0 ; 17,0	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	3,9**	1,1 ; 7,2	x	;	5,5**	0,7 ; 11,2	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	19,4*	14,0 ; 25,5	29,9*	19,8 ; 40,2	10,1**	5,2 ; 16,0	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	2,0**	0,3 ; 4,1	x	;	2,6**	0,1 ; 5,6	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	32,5	30,4 ; 34,7	28,3	25,4 ; 31,3	36,8	33,6 ; 40,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,017		P = 0,024	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	25,7	19,5 ; 32,5	19,2*	9,9 ; 28,8	32,8	24,0 ; 42,5
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	28,0	24,2 ; 31,8	24,6	19,9 ; 29,7	31,4	25,5 ; 37,2
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	38,4	35,1 ; 42,0	34,1	29,2 ; 39,1	43,0	38,0 ; 48,4
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	34,5	29,7 ; 39,5	32,0	24,4 ; 39,6	36,6	30,1 ; 43,2
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,012		P = 0,117	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	37,2	32,6 ; 41,9	32,1	25,3 ; 39,3	40,6	34,6 ; 46,8
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	37,5	33,9 ; 41,3	33,5	28,6 ; 38,7	41,9	36,7 ; 47,4
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	28,9	25,2 ; 32,7	25,2	20,2 ; 30,2	33,1	27,5 ; 39,0
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	23,2*	16,2 ; 31,1	14,1**	6,2 ; 24,0	30,1*	19,6 ; 42,0
Autre	34,0	32,4	35,4	28,5*	18,4 ; 39,8	21,1**	7,9 ; 37,7	36,3*	21,9 ; 52,1
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,241		P = 0,594		P = 0,168	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	33,8	30,3 ; 37,7	30,8	25,9 ; 35,8	37,3	31,8 ; 42,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	35,2	30,9 ; 39,9	28,8	22,6 ; 35,3	42,1	35,6 ; 49,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	30,3	26,1 ; 34,6	26,6	20,8 ; 32,5	34,1	28,4 ; 40,7
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	29,1	23,4 ; 35,0	24,9*	16,4 ; 33,7	31,9	24,5 ; 39,9
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,001		P = 0,173		P = 0,013	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	40,0	34,2 ; 46,2	33,2	34,2 ; 46,2	44,9	34,2 ; 46,2
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	30,5	28,1 ; 33,0	26,3	28,1 ; 33,0	35,1	28,1 ; 33,0
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	51,0	44,5 ; 57,7	43,5	33,9 ; 54,4	57,8	49,0 ; 65,8
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	30,2	27,9 ; 32,4	26,0	22,8 ; 29,3	34,4	31,2 ; 37,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,011		P = 0,052		P = 0,407	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	33,0	30,4 ; 35,8	29,1	25,5 ; 32,8	37,8	33,6 ; 42,1
Étudiants	20,7	14,8	26,3	22,5*	15,4 ; 30,2	15,2**	5,7 ; 26,0	29,9*	19,7 ; 40,6
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	34,5	27,4 ; 42,5	27,2**	11,5 ; 45,9	36,3	28,4 ; 45,0
Retraités	34,2	30,5	37,2	36,0	31,6 ; 40,4	33,5	26,4 ; 40,2	38,4	32,6 ; 44,3
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	22,2	19,4 ; 25,0	18,5	14,7 ; 22,4	26,0	21,8 ; 30,0
Bon	33,9	28,1	39,6	36,7	33,0 ; 40,6	30,3	25,1 ; 35,8	43,7	38,3 ; 49,6
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	60,1	53,7 ; 66,0	56,8	48,2 ; 65,9	63,1	54,8 ; 71,4
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	56,7	51,7 ; 61,8	53,2	44,6 ; 61,9	58,8	52,4 ; 64,9
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	25,5	23,3 ; 27,8	22,7	19,5 ; 25,7	28,8	25,5 ; 32,4
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,023		P = 0,226		P = 0,007	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	36,5*	19,4 ; 55,0	x	;	46,1*	25,0 ; 67,4
Poids normal	28,3	22,9	32,1	29,0	25,7 ; 32,6	24,5	19,1 ; 30,2	32,2	28,0 ; 36,8
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	33,3	29,7 ; 37,1	28,8	24,5 ; 33,3	40,8	34,1 ; 47,4
Obésité	37,9	30,5	46,1	38,5	33,4 ; 44,0	31,3	24,7 ; 38,6	46,3	39,1 ; 53,7

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	30,3	25,3	35,2	32,5	30,4 ; 34,7	28,3	25,4 ; 31,3	36,8	33,6 ; 40,0	
Non	69,7	74,7	64,8	67,5	65,3 ; 69,6	71,7	68,7 ; 74,6	63,2	60,0 ; 66,4	
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	9,5	6,4	12,5	11,8	10,4 ; 13,3	8,9	7,2 ; 10,7	14,8	12,5 ; 17,2	
Non	90,5	93,6	87,5	88,2	86,7 ; 89,6	91,1	89,3 ; 92,8	85,2	82,8 ; 87,5	
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,002				
Oui	14,5	12,2	16,7	15,6	14,0 ; 17,3	13,0	10,9 ; 15,2	18,2	15,8 ; 20,9	
Non	85,5	87,8	83,3	84,4	82,7 ; 86,0	87,0	84,8 ; 89,1	81,8	79,1 ; 84,2	
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,005				
Oui	13,5	10,8	16,1	14,8	13,1 ; 16,5	12,4	10,1 ; 14,6	17,3	14,8 ; 19,8	
Non	86,5	89,2	83,9	85,2	83,5 ; 86,9	87,6	85,4 ; 89,9	82,7	80,2 ; 85,2	
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,009				
Oui	14,5	11,8	17,2	15,6	14,0 ; 17,2	13,5	11,4 ; 15,6	17,8	15,6 ; 20,3	
Non	85,5	88,2	82,8	84,4	82,8 ; 86,0	86,5	84,4 ; 88,6	82,2	79,7 ; 84,4	
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,128				
Oui	17,8	16,0	19,6	19,9	18,1 ; 21,8	18,5	15,9 ; 21,1	21,3	18,7 ; 24,1	
Non	82,2	84,0	80,4	80,1	78,2 ; 81,9	81,5	78,9 ; 84,1	78,7	75,9 ; 81,3	
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	14,2	10,6	17,8	14,1	12,5 ; 15,7	10,8	8,6 ; 12,8	17,4	15,2 ; 20,0	
Non	85,8	89,4	82,2	85,9	84,3 ; 87,5	89,2	87,2 ; 91,4	82,6	80,0 ; 84,8	

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

### Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	50,1	47,7 ; 52,3	38,3	36,0 ; 40,6	11,6	10,2 ; 13,2
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	52,6	34,1	13,3	45,5	42,0 ; 49,1	40,6	37,1 ; 44,1	13,9	11,7 ; 16,3
Femmes	60,1	29,8	10,1	54,8	51,6 ; 57,9	35,9	32,8 ; 39,1	9,3	7,5 ; 11,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,001					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	54,5	47,5 ; 61,8	37,2	29,9 ; 44,0	8,4*	5,0 ; 12,3
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	56,3	51,9 ; 60,5	33,8	29,8 ; 37,9	9,9	7,5 ; 12,4
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	46,0	42,4 ; 49,7	40,3	36,7 ; 44,0	13,7	11,2 ; 16,3
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	41,9	36,7 ; 47,0	44,3	39,1 ; 49,6	13,8	10,2 ; 17,6
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,123					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	43,2	38,6 ; 47,8	40,3	35,6 ; 44,9	16,5	13,0 ; 20,0
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	49,2	45,2 ; 53,2	39,3	35,4 ; 43,3	11,6	8,9 ; 14,3
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	53,1	49,1 ; 57,4	37,1	33,0 ; 41,1	9,8	7,6 ; 12,1
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	50,3	40,7 ; 59,1	36,9	28,2 ; 46,5	12,8*	7,5 ; 19,0
Autre	48,0	34,3	17,7	57,0	44,1 ; 68,6	31,4*	21,2 ; 43,2	11,6**	4,4 ; 20,3
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,964					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	50,5	48,1 ; 52,7	38,0	35,8 ; 40,4	11,4	10,0 ; 13,0
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	32,1**	7,9 ; 66,2	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,004					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	50,7	48,2 ; 53,0	38,1	35,8 ; 40,5	11,2	9,9 ; 12,8
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	30,3*	19,0 ; 44,9	43,3*	25,8 ; 58,1	26,4**	14,8 ; 40,8
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	x	;	76,4**	14,6 ; 100,0	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	40,5	36,5 ; 44,5	45,2	41,2 ; 49,3	14,2	11,6 ; 17,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	49,5	44,8 ; 54,3	39,9	35,1 ; 44,7	10,5	7,7 ; 13,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	56,6	51,7 ; 61,5	33,2	28,7 ; 37,6	10,1	7,3 ; 13,1
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	64,3	58,4 ; 69,8	27,5	22,3 ; 33,0	8,3*	5,2 ; 11,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	39,5	33,4 ; 45,5	43,4	37,0 ; 49,6	17,1	12,5 ; 22,1
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	52,8	50,0 ; 55,5	37,1	34,3 ; 40,0	10,1	8,5 ; 11,8
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	32,4	26,1 ; 39,1	41,3	34,6 ; 47,9	26,3	20,6 ; 32,5
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	52,9	50,3 ; 55,3	37,6	35,1 ; 40,2	9,5	8,1 ; 11,0
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	52,9	49,9 ; 55,8	36,8	34,0 ; 39,7	10,4	8,6 ; 12,2
Étudiants	62,8	27,9	9,3	57,5	49,0 ; 65,6	34,7	26,7 ; 43,0	7,7*	4,2 ; 11,8
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	34,9	27,2 ; 42,5	43,8	35,8 ; 52,3	21,4*	14,2 ; 28,8
Retraités	49,7	38,1	12,2	42,8	38,2 ; 47,7	43,2	38,1 ; 48,1	13,9	10,6 ; 17,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	50,1	47,7 ; 52,3	38,3	36,0 ; 40,6	11,6	10,2 ; 13,2
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	39,5	34,7 ; 44,4	42,2	37,5 ; 47,4	18,3	15,0 ; 22,1
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	53,7	51,0 ; 56,5	36,9	34,3 ; 39,6	9,3	7,9 ; 10,9
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	62,7	59,5 ; 66,0	31,7	28,6 ; 34,8	5,6	4,2 ; 7,1
Bon	41,4	42,6	16,0	38,8	35,1 ; 42,9	48,0	43,8 ; 51,9	13,2	10,5 ; 16,0
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	31,0	25,1 ; 36,7	37,9	32,2 ; 43,8	31,1	25,5 ; 36,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	40,4	35,5 ; 45,1	43,5	38,6 ; 48,5	16,2	12,9 ; 19,9
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	53,4	50,7 ; 56,0	36,5	33,8 ; 39,1	10,1	8,6 ; 11,8
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,162					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	48,7	43,2 ; 53,7	42,0	37,0 ; 47,4	9,4	6,6 ; 12,3
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	50,4	47,8 ; 53,0	37,5	34,9 ; 40,1	12,1	10,5 ; 13,9
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	54,8	52,0 ; 57,5	36,5	33,8 ; 39,1	8,7	7,2 ; 10,3
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	36,5	32,0 ; 41,2	43,4	38,5 ; 48,2	20,1	16,5 ; 23,9
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,022					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	54,6	49,6 ; 59,8	37,1	32,2 ; 42,4	8,2*	5,5 ; 11,1
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	48,7	45,5 ; 51,8	37,7	34,5 ; 40,8	13,7	11,7 ; 15,8

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	16,8	15,4 ; 18,3	13,3	11,4 ; 15,3	20,4	18,4 ; 22,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	1,6**	0,6 ; 2,8	x	;	2,6**	0,8 ; 4,8
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	22,6	19,6 ; 25,7	19,7	15,7 ; 24,0	25,6	21,3 ; 30,2
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	54,8	49,8 ; 59,7	45,9	38,1 ; 53,8	61,5	55,1 ; 67,5
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,001	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	43,1	37,0 ; 49,5	35,2	26,2 ; 45,0	50,4	41,2 ; 59,3
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	72,5	64,1 ; 80,5	67,8	54,0 ; 82,2	75,2	65,3 ; 84,0
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	80,7	60,9 ; 97,3	86,7*	23,3 ; 100,0	79,0	56,2 ; 99,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	30,3	27,3 ; 33,5	24,6	20,5 ; 29,0	36,6	32,0 ; 41,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	15,1	12,0 ; 18,4	9,2*	5,9 ; 13,0	21,5	16,4 ; 26,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	5,5*	3,5 ; 7,8	3,8**	1,7 ; 6,4	7,4*	4,1 ; 11,2
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	7,3*	4,4 ; 10,6	8,7**	3,3 ; 15,1	6,3**	3,2 ; 10,0
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	31,7	26,7 ; 37,2	23,6*	16,2 ; 32,2	37,1	30,3 ; 44,4
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	13,9	12,2 ; 15,6	11,5	9,4 ; 13,7	16,5	13,9 ; 19,1
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	29,6	24,0 ; 35,4	27,0	18,8 ; 35,9	31,9	24,2 ; 39,8
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	15,1	13,6 ; 16,6	11,7	9,7 ; 13,7	18,6	16,4 ; 20,9

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	74,7	72,7 ; 76,5	21,3	19,5 ; 23,3	4,0	3,1 ; 4,9
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	63,7	60,2 ; 66,8	29,3	26,3 ; 32,5	7,0	5,4 ; 8,9
Femmes	87,9	11,3	0,7	85,8	83,6 ; 87,8	13,3	11,4 ; 15,4	0,9**	0,3 ; 1,5
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,072					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	76,1	69,2 ; 82,4	20,1*	14,0 ; 26,4	3,8**	1,0 ; 7,3
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	77,2	73,4 ; 80,5	20,2	17,0 ; 23,8	2,6**	1,3 ; 4,1
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	75,3	72,0 ; 78,2	20,4	17,4 ; 23,4	4,4*	2,9 ; 6,0
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	65,8	61,0 ; 70,9	28,1	23,5 ; 33,2	6,1*	3,6 ; 8,9
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,881					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	73,5	69,3 ; 77,6	23,1	19,1 ; 27,2	3,4*	1,8 ; 5,3
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	72,9	69,6 ; 76,2	22,6	19,4 ; 25,9	4,4*	2,9 ; 6,1
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	75,8	72,1 ; 79,2	20,2	17,0 ; 23,7	4,0*	2,4 ; 5,8
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	81,0	72,8 ; 88,6	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	79,0	68,7 ; 88,6	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,551					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	73,1	70,7 ; 75,3	22,2	20,0 ; 24,5	4,7	3,6 ; 6,0
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	75,4	69,4 ; 81,0	21,8	16,5 ; 27,6	2,9**	0,8 ; 5,4
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	83,1	77,7 ; 88,2	15,4*	10,6 ; 20,6	1,5**	0,1 ; 3,4
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	75,0	64,1 ; 84,0	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	65,0	61,0 ; 68,7	29,3	25,9 ; 33,1	5,7*	4,0 ; 7,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	77,4	73,3 ; 81,2	19,4	15,7 ; 23,2	3,2**	1,4 ; 5,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	80,0	76,0 ; 83,9	16,5	13,0 ; 20,3	3,5*	1,8 ; 5,4
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	85,0	80,5 ; 89,1	13,5	9,5 ; 18,0	1,5**	0,0 ; 3,4
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,008					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	67,9	62,0 ; 73,7	27,7	22,2 ; 33,7	4,4**	2,1 ; 7,1
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	77,1	74,8 ; 79,3	19,3	17,1 ; 21,5	3,6*	2,5 ; 4,8
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,005					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	65,8	59,5 ; 72,1	28,6	22,6 ; 34,7	5,6**	2,7 ; 8,7
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	76,0	73,9 ; 77,9	20,4	18,4 ; 22,4	3,6	2,7 ; 4,6
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,149					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	77,0	74,5 ; 79,3	19,6	17,3 ; 22,0	3,4*	2,3 ; 4,7
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	76,7	69,4 ; 83,8	19,9*	13,0 ; 27,2	3,4**	0,8 ; 6,7
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	66,5	59,1 ; 74,1	30,1	22,8 ; 37,7	3,4**	0,6 ; 6,8
Retraités	72,9	23,2	3,8	70,0	65,5 ; 74,3	24,0	19,8 ; 28,3	6,0*	3,8 ; 8,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	74,7	72,7 ; 76,5	21,3	19,5 ; 23,3	4,0	3,1 ; 4,9
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,024					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	70,0	65,4 ; 74,4	26,4	22,2 ; 30,8	3,6**	1,7 ; 5,7
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	76,4	74,0 ; 78,6	19,6	17,5 ; 21,8	4,0	3,0 ; 5,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	80,1	77,4 ; 82,6	17,2	14,7 ; 19,8	2,7*	1,7 ; 3,9
Bon	75,1	21,2	3,6	71,2	67,5 ; 74,6	23,8	20,5 ; 27,3	5,0*	3,4 ; 6,9
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	62,9	57,2 ; 68,8	31,1	25,7 ; 36,8	6,0**	3,0 ; 9,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,016					
Élevé	77,2	19,2	3,6	68,8	63,8 ; 73,4	26,5	22,3 ; 31,1	4,7*	2,7 ; 7,0
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	76,4	74,1 ; 78,5	20,0	18,0 ; 22,2	3,6	2,6 ; 4,7
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,003					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	67,5	62,8 ; 72,0	26,9	22,5 ; 31,3	5,6*	3,3 ; 8,2
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	76,1	73,9 ; 78,3	20,2	18,1 ; 22,4	3,6	2,7 ; 4,7
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,069					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	87,1	83,6 ; 90,2	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	71,6	68,8 ; 74,3	23,5	20,8 ; 26,3	5,0	3,7 ; 6,5

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	74,7	72,7 ; 76,5	63,7	60,2 ; 66,8	85,8	83,6 ; 87,8
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	21,3	19,5 ; 23,3	29,3	26,3 ; 32,5	13,3	11,4 ; 15,4
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	4,0	3,1 ; 4,9	7,0	5,4 ; 8,9	0,9**	0,3 ; 1,5
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	67,5	62,8 ; 72,0	52,3	43,8 ; 60,6	77,3	72,1 ; 82,6
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	26,9	22,5 ; 31,3	38,6	30,4 ; 46,9	19,4	14,6 ; 24,2
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	5,6*	3,3 ; 8,2	9,1*	4,8 ; 14,3	3,3**	1,1 ; 6,2
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	76,1	73,9 ; 78,3	65,4	61,5 ; 68,8	88,0	85,6 ; 90,3
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	20,2	18,1 ; 22,4	27,9	24,5 ; 31,5	x	;
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	3,6	2,7 ; 4,7	6,7	4,8 ; 8,7	x	;

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	29,5	27,1 ; 31,8	15,9	13,9 ; 17,9	54,6	52,0 ; 57,1
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	21,2	18,1 ; 24,4	14,8	11,9 ; 17,7	64,0	60,3 ; 67,8
Femmes	41,7	18,2	40,1	38,6	35,0 ; 42,1	17,1	14,4 ; 20,1	44,3	40,7 ; 48,0
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,113					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	25,8	19,4 ; 32,3	16,6*	11,4 ; 22,5	57,6	50,2 ; 64,6
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	29,2	25,3 ; 32,9	17,1	13,9 ; 20,6	53,7	49,6 ; 57,9
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	32,4	28,2 ; 36,4	15,8	12,6 ; 19,1	51,8	47,7 ; 55,9
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	26,9	20,6 ; 34,0	8,1**	3,8 ; 13,1	65,0	57,1 ; 72,0
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,021					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	26,5	22,0 ; 31,2	13,2	10,1 ; 16,9	60,3	55,3 ; 65,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	29,3	24,6 ; 34,0	13,7	10,1 ; 17,6	57,1	51,7 ; 62,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	30,6	25,8 ; 35,2	19,2	15,2 ; 23,6	50,2	45,4 ; 55,3
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	32,2	26,4 ; 38,3	19,6	14,2 ; 25,4	48,3	41,9 ; 54,8
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,245					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	24,8	17,6 ; 32,5	15,3*	10,4 ; 20,9	59,9	51,7 ; 67,5
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	30,7	27,8 ; 33,5	16,3	13,8 ; 18,8	53,0	49,9 ; 56,1
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,081					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	29,2	26,2 ; 32,1	17,4	14,9 ; 20,0	53,5	50,4 ; 56,6
Étudiants	28,8	16,3	54,9	26,8	19,6 ; 34,3	15,6**	9,4 ; 22,4	57,6	49,5 ; 65,6
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	40,5	30,5 ; 50,9	11,6**	5,7 ; 18,1	47,9	37,3 ; 58,4
Retraités	38,0	12,4	49,6	29,7	24,1 ; 36,2	9,7*	6,0 ; 14,0	60,6	53,5 ; 67,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
1,6*	1,1 ; 2,2	41,8	39,4 ; 44,1	36,6	34,4 ; 38,8	20,0	18,2 ; 21,9	Ensemble de la population	
P = 0,000									
0,8**	0,2 ; 1,6	33,7	30,5 ; 37,0	45,1	41,8 ; 48,5	20,4	17,7 ; 23,2	Sexe	
2,5*	1,6 ; 3,5	50,1	46,8 ; 53,5	27,8	25,1 ; 30,9	19,6	17,1 ; 22,2	Hommes	
P = 0,002									
4,7**	0,3 ; 10,3	72,2	61,5 ; 82,5	17,1**	9,1 ; 26,8	6,0**	0,6 ; 12,4	Groupe d'âge	
x	;	63,1	52,9 ; 72,7	23,3*	15,2 ; 32,6	x	;	15-17 ans	
P = 0,000									
3,0**	0,8 ; 5,6	66,9	59,4 ; 73,7	20,8	15,0 ; 27,6	9,4*	5,6 ; 14,2	15-24 ans	
1,3**	0,5 ; 2,2	41,7	37,1 ; 46,0	36,7	32,7 ; 40,9	20,3	16,5 ; 24,1	25-44 ans	
1,2**	0,5 ; 1,9	33,8	30,3 ; 37,4	41,8	38,3 ; 45,3	23,2	20,1 ; 26,4	45-64 ans	
2,0**	0,5 ; 4,0	35,8	31,2 ; 40,7	39,9	34,9 ; 45,1	22,3	17,7 ; 26,9	65 ans et plus	
P = 'n.d.'									
x	;	71,0	54,9 ; 85,0	17,0**	5,5 ; 30,5	x	;	Hommes	
x	;	58,2	40,5 ; 73,9	23,3**	9,7 ; 38,6	x	;	15-17 ans	
P = 'n.d.'									
x	;	64,0	52,1 ; 74,3	20,4*	11,5 ; 30,2	x	;	15-24 ans	
x	;	30,5	24,7 ; 36,5	49,4	43,2 ; 55,7	x	;	25-44 ans	
x	;	27,4	22,8 ; 32,4	50,0	44,6 ; 55,0	x	;	45-64 ans	
x	;	21,0*	14,7 ; 27,8	51,5	43,0 ; 60,3	x	;	65 ans et plus	
P = 0,429									
x	;	73,8	58,5 ; 87,5	17,3**	4,9 ; 31,6	x	;	Femmes	
x	;	67,9	55,6 ; 78,8	23,3*	13,6 ; 34,6	x	;	15-17 ans	
P = 0,000									
2,9**	0,2 ; 6,1	70,1	61,2 ; 78,1	21,1*	13,7 ; 29,4	5,9**	2,2 ; 10,1	15-24 ans	
2,8**	1,1 ; 4,7	54,0	47,2 ; 60,4	22,6	17,6 ; 28,2	20,7	15,2 ; 26,2	25-44 ans	
2,2**	0,8 ; 3,8	40,5	35,0 ; 46,1	33,2	28,4 ; 38,1	24,1	19,5 ; 28,7	45-64 ans	
2,1**	0,4 ; 4,4	47,0	40,3 ; 54,0	31,1	24,7 ; 37,4	19,9	14,7 ; 25,4	65 ans et plus	
P = 0,316									
2,1**	1,0 ; 3,5	40,8	36,7 ; 44,9	34,7	31,0 ; 38,5	22,4	19,2 ; 25,8	Niveau de scolarité	
1,7**	0,7 ; 3,0	45,0	40,2 ; 49,6	33,7	29,2 ; 38,3	19,6	15,9 ; 23,5	Niveau inférieur au DES	
1,4**	0,5 ; 2,5	39,0	34,0 ; 44,0	40,6	35,4 ; 45,6	18,9	14,9 ; 23,1	Diplôme d'études secondaires (DES)	
x	;	43,6	37,3 ; 49,9	39,0	32,4 ; 45,2	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
P = 'n.d.'									
x	;	36,2	30,6 ; 41,8	39,9	34,6 ; 45,6	x	;	Diplôme d'études universitaires	
x	;	37,4	30,7 ; 43,9	43,3	36,8 ; 50,4	x	;	Hommes	
x	;	27,8	21,2 ; 34,8	52,1	44,4 ; 59,7	x	;	Niveau inférieur au DES	
x	;	32,3	23,1 ; 41,9	48,8	38,5 ; 59,2	x	;	Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 0,519									
2,6**	0,9 ; 4,5	46,0	40,3 ; 52,0	28,9	23,7 ; 34,2	22,6	18,2 ; 27,1	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
3,2**	1,2 ; 5,4	53,4	46,7 ; 60,0	23,0	18,1 ; 29,1	20,4	15,1 ; 25,8	Diplôme d'études universitaires	
2,7**	0,8 ; 4,9	51,3	44,1 ; 58,4	28,1	22,2 ; 34,4	18,0*	12,3 ; 23,9	Femmes	
x	;	51,5	43,2 ; 60,0	32,0	24,3 ; 39,8	x	;	Niveau inférieur au DES	
P = 0,007									
1,6**	0,4 ; 3,0	40,5	34,2 ; 46,8	29,7	23,9 ; 35,5	28,3	22,6 ; 34,2	Indice du niveau de revenu du ménage	
1,7*	1,1 ; 2,5	41,5	38,8 ; 44,2	37,8	35,1 ; 40,6	19,0	16,8 ; 21,2	Quintile 1 (faible)	
P = 'n.d.'									
x	;	34,1*	23,4 ; 44,9	36,1	25,3 ; 47,0	x	;	Quintile 2 et suivants	
0,9**	0,2 ; 1,9	33,7	29,9 ; 37,4	46,0	42,1 ; 50,0	19,4	16,3 ; 22,7	Hommes	
P = 0,074									
2,2**	0,5 ; 4,3	44,6	37,2 ; 52,4	25,5	19,0 ; 32,9	27,7	20,9 ; 34,6	Femmes	
2,7*	1,5 ; 4,0	50,4	46,2 ; 54,5	28,5	25,1 ; 32,2	18,5	15,4 ; 21,7	Quintile 1 (faible)	
								Quintile 2 et suivants	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	40,7	38,5 ; 43,0	2,7*	1,9 ; 3,5	56,6	54,3 ; 58,9
Sexe	P = 0,000			P = 0,001					
Hommes	36,6	3,6	59,9	37,0	33,9 ; 40,3	3,4*	2,1 ; 4,9	59,5	56,1 ; 62,7
Femmes	40,5	2,3	57,1	44,5	41,2 ; 47,6	1,9*	1,1 ; 2,8	53,6	50,4 ; 57,0
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	17,1*	11,8 ; 22,7	4,7**	1,3 ; 8,7	78,2	72,0 ; 84,2
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	42,5	38,1 ; 47,2	2,2**	1,1 ; 3,6	55,3	50,6 ; 59,7
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	50,2	46,4 ; 54,0	2,2*	1,3 ; 3,2	47,6	43,8 ; 51,5
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	38,3	33,3 ; 43,5	2,5**	0,9 ; 4,5	59,2	54,2 ; 64,2
Hommes	P = 0,000			P = 0,003					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	14,8**	7,5 ; 23,0	7,1**	1,5 ; 13,7	78,1	68,3 ; 86,9
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	38,1	32,1 ; 44,3	2,7**	0,8 ; 4,9	59,2	53,1 ; 65,2
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	45,1	39,9 ; 50,4	2,1**	0,8 ; 3,5	52,8	47,5 ; 58,0
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	40,4	32,3 ; 48,5	4,4**	0,8 ; 8,7	55,2	47,1 ; 63,5
Femmes	P = 0,000			P = 0,156					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	19,8*	12,4 ; 27,8	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	47,3	40,7 ; 54,2	1,8**	0,4 ; 3,5	50,9	44,0 ; 57,4
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	55,6	50,0 ; 60,8	2,2**	0,9 ; 3,7	42,2	36,8 ; 47,7
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	36,8	30,5 ; 43,1	1,1**	0,1 ; 2,2	62,2	55,9 ; 68,3
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	41,6*	23,2 ; 61,9	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	9,7	7,4 ; 11,9	4,4*	2,9 ; 6,2	85,9	83,2 ; 88,5
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	52,2	48,1 ; 55,9	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	88,4	84,6 ; 91,9	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,001					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	3,2**	1,2 ; 5,4	8,3*	5,0 ; 12,1	88,5	84,3 ; 92,3
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	42,1	37,0 ; 46,8	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	85,4	78,9 ; 91,6	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	40,6*	21,1 ; 60,9	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	14,2	10,7 ; 17,6	1,7**	0,6 ; 3,2	84,1	80,5 ; 87,7
Embonpoint	69,6	x	x	69,3	63,5 ; 74,7	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	91,6	87,5 ; 95,0	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	81,0	77,8 ; 84,3	11,1	8,5 ; 13,5	8,0	6,0 ; 10,1
Sexe	P = 0,000			P = 0,005					
Hommes	81,4	10,5	8,0	86,7	82,6 ; 90,5	8,7*	5,4 ; 12,2	4,6*	2,4 ; 7,1
Femmes	74,5	14,1	11,5	76,9	72,5 ; 81,5	12,7	9,2 ; 16,2	10,4*	7,3 ; 13,6
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,541					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	82,4	71,6 ; 91,6	9,6**	2,2 ; 18,3	8,0**	1,5 ; 16,2
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	80,9	74,8 ; 86,7	14,4*	9,1 ; 19,8	4,8**	2,1 ; 7,8
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	80,9	76,1 ; 85,3	9,4*	6,1 ; 13,0	9,7*	6,6 ; 13,3
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	80,0	71,7 ; 88,1	10,4**	4,5 ; 17,0	9,6**	4,3 ; 16,1
Hommes	P = 0,252			P = 0,849					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	77,0	52,7 ; 97,4	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	91,5	85,0 ; 96,8	6,2**	1,8 ; 12,0	2,3**	0,0 ; 6,1
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	86,8	81,1 ; 91,9	8,5**	4,2 ; 13,6	4,7**	2,0 ; 7,7
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	83,4	70,9 ; 94,0	8,5**	0,3 ; 19,0	8,1**	0,9 ; 17,5
Femmes	P = 0,004			P = 0,535					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	85,1	73,2 ; 95,4	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	73,8	64,9 ; 82,6	19,8*	11,8 ; 27,9	6,4**	2,3 ; 11,1
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	76,4	69,6 ; 83,1	10,0*	5,5 ; 15,3	13,7**	8,6 ; 19,4
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	77,0	65,5 ; 87,9	12,0**	4,1 ; 21,2	11,0**	3,1 ; 20,1
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,001					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	88,7	83,8 ; 92,9	4,9**	2,3 ; 8,1	6,4**	3,2 ; 10,3
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	83,3	78,9 ; 87,5	10,8*	7,1 ; 14,5	5,9*	3,4 ; 8,8
Obésité	72,3	14,4	13,3	72,5	66,0 ; 79,1	16,1*	10,9 ; 22,0	11,4*	7,1 ; 16,0
Hommes	P = 0,002			P = 0,836					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	94,9	86,2 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	85,7	79,6 ; 91,1	9,5**	4,8 ; 14,8	4,8**	1,9 ; 8,2
Obésité	76,0	12,2	11,8	86,2	79,1 ; 92,5	8,4**	3,5 ; 14,5	5,4**	1,5 ; 10,2
Femmes	P = 0,161			P = 0,000					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	87,7	82,1 ; 92,4	4,9**	2,0 ; 8,5	7,4**	3,6 ; 11,9
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	80,4	73,1 ; 87,0	12,3*	7,0 ; 18,5	7,3**	2,9 ; 12,5
Obésité	68,9	16,4	14,7	60,0	50,6 ; 70,3	23,2*	14,2 ; 32,0	16,9*	9,8 ; 24,7

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
20,6	18,7 ; 22,6	17,8	16,2 ; 19,6	3,0	2,1 ; 3,9	58,6	56,2 ; 60,9	Ensemble de la population	
P = 0,000									
16,5	14,0 ; 19,2	15,2	12,9 ; 17,8	4,1*	2,6 ; 5,8	64,2	60,6 ; 67,4	Sexe	
24,7	21,8 ; 27,8	20,4	18,0 ; 23,2	1,8*	1,0 ; 2,7	53,1	49,6 ; 56,2	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
15,3*	10,6 ; 20,4	15,5*	11,0 ; 20,6	7,9**	3,6 ; 12,5	61,3	54,0 ; 68,4	Groupe d'âge	
22,7	19,1 ; 26,6	14,4	11,4 ; 17,5	2,9*	1,6 ; 4,4	60,0	55,6 ; 64,1	15-24 ans	
22,9	19,6 ; 26,1	22,0	19,0 ; 25,0	1,5**	0,7 ; 2,5	53,7	50,1 ; 57,3	25-44 ans	
15,7	12,0 ; 19,5	17,2	13,1 ; 21,5	1,4**	0,4 ; 2,5	65,7	60,6 ; 70,5	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,023									
10,6**	4,7 ; 17,9	9,5**	3,4 ; 17,1	12,6**	5,1 ; 20,5	67,3	56,2 ; 77,6	Hommes	
15,8	11,3 ; 20,7	13,0*	9,0 ; 17,3	4,1**	1,7 ; 6,8	67,0	60,9 ; 72,8	15-24 ans	
20,1	16,0 ; 24,5	17,8	13,9 ; 22,0	1,3**	0,2 ; 2,7	60,8	55,4 ; 65,9	25-44 ans	
14,8*	9,0 ; 21,3	21,4*	14,4 ; 28,9	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,225									
20,6*	12,9 ; 29,0	22,3*	15,1 ; 30,7	x	;	x	;	Femmes	
29,9	24,4 ; 36,3	15,8	11,5 ; 20,3	1,7**	0,4 ; 3,2	52,7	46,2 ; 58,9	15-24 ans	
25,7	21,0 ; 30,9	26,3	21,8 ; 31,0	1,7**	0,4 ; 3,2	46,3	41,2 ; 51,7	25-44 ans	
16,3*	11,5 ; 21,2	14,1*	9,6 ; 18,9	1,5**	0,3 ; 3,0	68,1	61,9 ; 74,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,000									
x	;	x	;	15,3**	4,9 ; 28,6	84,7	71,4 ; 95,1	Statut pondéral	
9,2	7,0 ; 11,5	14,2	11,8 ; 16,8	4,8*	3,0 ; 6,7	71,8	68,2 ; 75,3	Poids insuffisant	
25,1	21,7 ; 28,6	21,1	17,9 ; 24,4	1,6**	0,4 ; 2,9	52,3	48,1 ; 56,3	Poids normal	
38,6	33,4 ; 44,0	22,1	17,9 ; 26,6	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,001									
x	;	x	;	x	;	84,1*	39,4 ; 100,0	Hommes	
2,6**	1,1 ; 4,6	5,5*	3,1 ; 8,3	7,7**	3,8 ; 11,8	84,2	79,2 ; 88,7	Poids insuffisant	
19,7	15,6 ; 24,0	20,1	16,1 ; 24,2	2,5**	0,6 ; 4,6	57,8	52,4 ; 62,9	Poids normal	
33,5	26,2 ; 41,0	22,4	15,9 ; 29,5	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
x	;	x	;	15,0**	3,3 ; 29,7	85,0	70,3 ; 96,7	Femmes	
13,7	10,2 ; 17,4	20,2	16,5 ; 24,1	2,8**	1,2 ; 4,6	63,3	58,5 ; 68,0	Poids insuffisant	
34,2	28,4 ; 40,4	22,7	17,7 ; 28,2	x	;	x	;	Poids normal	
44,1	36,7 ; 51,3	21,9	16,0 ; 28,1	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
40,0	36,2 ; 43,8	23,0	20,0 ; 26,1	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	37,8*	20,9 ; 53,5	61,6	46,0 ; 78,6	Excès de poids	
7,7	6,1 ; 9,5	15,1	12,8 ; 17,4	3,1*	1,8 ; 4,3	74,2	71,3 ; 76,9	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
34,0	29,0 ; 39,2	11,8	8,5 ; 15,6	6,3*	3,8 ; 9,2	47,9	42,6 ; 53,2	Ensemble de la population	
P = 0,009									
32,8	24,5 ; 41,5	6,8**	2,9 ; 11,7	2,9**	0,5 ; 6,4	57,4	48,4 ; 65,9	Sexe	
34,9	28,0 ; 41,9	15,2*	10,1 ; 20,8	8,6*	4,7 ; 13,0	41,4	34,9 ; 48,2	Hommes	
								Femmes	
P = 0,394									
40,5*	21,8 ; 58,3	12,5**	2,4 ; 25,9	11,7**	0,9 ; 26,3	35,3*	18,8 ; 52,3	Groupe d'âge	
40,7	30,9 ; 50,3	13,9*	8,0 ; 20,8	2,0**	0,1 ; 4,4	43,4	34,4 ; 53,2	15-24 ans	
29,5	21,7 ; 37,1	10,7**	5,6 ; 16,7	8,5**	4,0 ; 13,8	51,3	43,7 ; 59,4	25-44 ans	
22,0**	11,1 ; 34,2	8,2**	1,7 ; 16,4	5,6**	0,8 ; 11,2	64,2	51,4 ; 77,3	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,987									
32,6**	0,0 ; 66,6	x	;	x	;	46,9**	11,8 ; 79,9	Hommes	
41,7*	25,0 ; 59,1	7,6**	0,9 ; 17,2	x	;	x	;	15-24 ans	
28,7*	17,7 ; 40,3	5,6**	0,7 ; 11,8	x	;	x	;	25-44 ans	
27,2**	6,7 ; 49,7	x	;	x	;	70,4	48,1 ; 91,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,768									
45,0*	21,3 ; 67,9	x	;	x	;	28,6**	10,8 ; 49,0	Femmes	
40,2	28,0 ; 52,0	17,2**	8,6 ; 26,5	2,2**	0,0 ; 5,6	40,4	29,5 ; 52,9	15-24 ans	
30,3*	20,3 ; 40,5	15,0**	6,9 ; 24,6	12,6**	5,2 ; 20,9	42,2	32,2 ; 52,3	25-44 ans	
18,0**	5,1 ; 32,6	13,7**	2,4 ; 27,7	8,8**	0,5 ; 18,4	59,5	42,5 ; 76,9	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,288									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
36,3*	23,8 ; 50,0	12,4**	4,1 ; 22,4	14,6**	4,6 ; 25,6	36,7*	24,2 ; 50,1	Poids insuffisant	
33,7	25,5 ; 41,5	9,8*	5,4 ; 14,8	5,9**	2,3 ; 10,3	50,7	43,0 ; 58,8	Poids normal	
33,5	24,6 ; 42,2	13,7*	7,7 ; 20,8	3,0**	0,5 ; 6,1	49,8	40,9 ; 59,0	Embonpoint	
								Obésité	
P = 'n.d.'									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
31,3**	0,4 ; 72,5	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
35,4*	23,4 ; 47,0	x	;	3,7**	0,0 ; 9,6	x	;	Poids normal	
30,4*	18,0 ; 44,4	11,1**	3,6 ; 20,9	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,762									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
37,0*	23,4 ; 51,5	11,1**	2,6 ; 21,5	15,4**	4,4 ; 28,1	36,5*	23,0 ; 50,5	Poids insuffisant	
31,9*	21,1 ; 42,2	17,1*	9,2 ; 25,6	8,1**	2,4 ; 14,9	42,9	32,8 ; 53,7	Poids normal	
35,9*	23,1 ; 47,9	15,7**	6,6 ; 26,5	4,5**	0,6 ; 9,6	43,8	32,9 ; 56,4	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	87,6	84,8 ; 90,3	7,0	4,9 ; 9,0	5,4*	3,7 ; 7,3
Sexe	P = 0,001			P = 0,415					
Hommes	88,9	6,9	4,2	87,9	83,7 ; 91,7	7,9*	4,7 ; 11,6	4,2**	2,2 ; 6,6
Femmes	85,7	7,5	6,8	87,4	83,7 ; 90,9	6,3*	4,1 ; 9,0	6,3*	3,8 ; 9,2
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,471					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	90,0	80,6 ; 97,3	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	88,9	83,7 ; 93,6	4,4**	2,0 ; 7,1	6,7**	2,8 ; 11,4
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	86,0	81,9 ; 89,9	8,9*	5,6 ; 12,6	5,0*	2,8 ; 7,4
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	87,5	80,3 ; 93,4	4,0**	1,0 ; 8,1	8,5**	3,4 ; 14,8
Hommes	P = 0,121			P = 0,833					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	86,3	65,5 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	91,9	85,6 ; 97,3	5,1**	0,6 ; 10,9	3,0**	0,1 ; 6,8
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	85,5	78,7 ; 91,6	10,4**	4,9 ; 16,6	4,1**	1,3 ; 7,7
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	88,8	77,9 ; 97,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,866					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	92,0	83,1 ; 99,0	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	87,0	79,2 ; 93,8	3,9**	1,3 ; 7,2	9,1**	2,9 ; 16,6
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	86,4	80,8 ; 91,4	7,8**	3,8 ; 12,5	5,8**	2,5 ; 9,4
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	86,2	76,5 ; 94,7	6,1**	0,7 ; 13,4	7,6**	0,8 ; 15,9
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,000					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	96,2	93,3 ; 98,6	2,0**	0,2 ; 4,3	1,9**	0,3 ; 3,9
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	91,4	88,1 ; 94,4	4,7**	2,4 ; 7,4	3,9**	1,9 ; 6,1
Obésité	82,0	8,7	9,2	78,0	71,6 ; 84,5	13,2*	8,3 ; 18,4	8,8**	4,7 ; 13,7
Hommes	P = 0,002			P = 0,808					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	91,0	78,1 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	91,8	87,0 ; 95,8	4,8**	1,4 ; 9,1	3,5**	1,3 ; 6,1
Obésité	85,2	8,2	6,6*	82,4	74,1 ; 90,7	13,0**	5,5 ; 20,6	4,6**	1,0 ; 9,0
Femmes	P = 0,034			P = 0,048					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	97,0	94,3 ; 99,2	x	;	x	;
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	91,0	86,2 ; 95,5	4,6**	1,7 ; 8,1	4,4**	1,1 ; 8,5
Obésité	79,1	9,2	11,8	74,0	64,9 ; 82,6	13,3*	7,3 ; 20,4	12,7**	5,5 ; 21,1

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	6,9	5,0 ; 8,9	93,1	91,1 ; 95,0
Sexe	P = 0,024		P = 0,922			
Hommes	6,6	93,4	7,0*	4,2 ; 10,2	93,0	89,8 ; 95,8
Femmes	8,6	91,4	6,8*	4,4 ; 9,4	93,2	90,6 ; 95,6
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,393			
15-24 ans	11,2*	88,8	10,3**	3,5 ; 18,2	89,7	81,8 ; 96,5
25-44 ans	8,0	92,0	4,8**	2,0 ; 8,3	95,2	91,7 ; 98,0
45-64 ans	7,5	92,5	6,9*	4,1 ; 9,9	93,1	90,1 ; 95,9
65 ans et plus	4,9	95,1	8,7**	3,7 ; 14,5	91,3	85,5 ; 96,3
Hommes	P = 0,409		P = 0,187			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	x	;	x	;
45-64 ans	7,0	93,0	10,0**	5,1 ; 15,6	90,0	84,4 ; 94,9
65 ans et plus	6,5*	93,5	7,7**	1,2 ; 17,0	92,3	83,0 ; 98,8
Femmes	P = 0,003		P = 0,424			
15-24 ans	12,3*	87,7	11,2**	2,4 ; 21,6	88,8	78,4 ; 97,6
25-44 ans	9,9	90,1	7,1**	2,6 ; 12,5	92,9	87,5 ; 97,4
45-64 ans	7,8	92,2	4,5**	1,5 ; 8,0	95,5	92,0 ; 98,5
65 ans et plus	3,8*	96,2	9,5**	2,5 ; 18,0	90,5	82,0 ; 97,5
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,286			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	8,5**	4,3 ; 13,2	91,5	86,8 ; 95,7
Embonpoint	6,6	93,4	7,5*	4,6 ; 10,6	92,5	89,4 ; 95,4
Obésité	11,3	88,7	4,6**	2,1 ; 7,6	95,4	92,4 ; 97,9
Hommes	P = 0,000		P = 0,223			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	8,7*	4,6 ; 13,3	91,3	86,7 ; 95,4
Obésité	11,5	88,5	3,2**	0,2 ; 7,0	96,8	93,0 ; 99,8
Femmes	P = 0,032		P = 0,623			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	8,7**	3,8 ; 14,1	91,3	85,9 ; 96,2
Embonpoint	8,4	91,6	6,0**	2,3 ; 10,4	94,0	89,6 ; 97,7
Obésité	11,1	88,9	5,8**	2,2 ; 10,5	94,2	89,5 ; 97,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 0,703					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	1,0**	0,3 ; 1,8	x	;	0,8**	0,0 ; 1,9
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	1,1**	0,2 ; 2,1	x	;	0,9**	0,0 ; 2,2
Rarement	2,8	2,6*	2,9	1,9**	0,9 ; 3,0	3,0**	1,0 ; 5,4	1,1**	0,2 ; 2,2
Jamais	94,8	94,8	94,8	96,1	94,3 ; 97,6	94,5	91,1 ; 97,2	97,2	95,3 ; 98,7
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,155					
Souvent	4,6	4,2	4,9	3,5*	2,1 ; 5,0	4,1**	1,9 ; 6,5	3,0**	1,3 ; 5,0
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	6,0	4,3 ; 7,9	7,0*	4,2 ; 10,2	5,3*	3,2 ; 7,6
Rarement	5,1	5,5	4,9	6,0*	4,2 ; 8,0	8,2*	4,9 ; 12,2	4,5*	2,5 ; 6,7
Jamais	82,9	81,4	84,0	84,5	81,8 ; 87,3	80,7	75,7 ; 85,7	87,3	83,8 ; 90,5
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,579					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	2,3*	1,3 ; 3,5	1,9**	0,5 ; 3,8	2,6**	1,1 ; 4,3
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	7,0*	4,8 ; 9,3	6,8*	3,7 ; 10,4	7,0*	4,1 ; 10,1
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,4*	2,9 ; 6,2	3,2**	1,3 ; 5,6	5,3*	3,1 ; 7,9
Jamais	86,5	87,5	85,7	86,3	83,4 ; 89,0	88,1	83,7 ; 91,9	85,0	81,1 ; 88,7
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	1,2**	0,2 ; 2,4
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	0,6**	0,0 ; 1,4	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,2	97,0 ; 99,2	98,5	96,8 ; 99,8	97,9	96,2 ; 99,3
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	98,9	97,9 ; 99,7	98,9	97,4 ; 100,0	98,8	97,5 ; 99,8
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	1,0**	0,1 ; 2,2	x	;	1,3**	0,1 ; 3,1
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,5	97,2 ; 99,5	99,3	97,7 ; 100,0	98,0	96,0 ; 99,4
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,4	98,8 ; 99,9	99,4	98,2 ; 100,0	99,5	98,6 ; 100,0
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	0,2**	0,0 ; 0,5	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	1,0**	0,3 ; 1,9	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,3**	0,4 ; 2,3	x	;	1,8**	0,5 ; 3,5
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,5	96,2 ; 98,7	99,0	97,4 ; 100,0	96,5	94,4 ; 98,3

Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Commencer ou recommencer à fumer	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;	0,8**	0,1 ; 1,9
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	98,5	97,6 ; 99,3	98,5	96,9 ; 99,8	98,5	97,2 ; 99,6
Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	0,5**	0,1 ; 1,1	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,2	98,5 ; 99,8	99,4	98,1 ; 100,0	99,0	98,0 ; 99,8
Se faire vomir	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,6	99,0 ; 100,0	99,6	98,5 ; 100,0	99,6	98,7 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
4,1*	2,5 ; 5,8	37,6	33,7 ; 41,5	40,8	37,1 ; 44,8	17,5	14,3 ; 20,5	Ensemble de la population	
P = 0,002									
5,0**	2,2 ; 8,2	44,3	38,1 ; 50,3	39,8	34,0 ; 45,6	11,0*	7,2 ; 15,1	Sexe	
3,4**	1,7 ; 5,5	33,0	28,2 ; 37,9	41,5	36,6 ; 46,6	22,1	17,6 ; 26,6	Hommes	
								Femmes	
P = 0,736									
x	;	37,3*	25,3 ; 50,3	40,0*	28,4 ; 52,3	x	;	Groupe d'âge	
2,5**	0,3 ; 5,2	34,2	27,5 ; 41,5	40,2	33,0 ; 47,5	23,1	16,5 ; 29,5	15-24 ans	
4,3**	2,3 ; 6,6	38,8	33,2 ; 44,7	40,8	35,4 ; 47,0	16,1	11,6 ; 20,7	25-44 ans	
4,4**	0,3 ; 9,7	43,2	33,0 ; 53,8	43,6	33,6 ; 54,1	8,8**	3,1 ; 15,4	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,958									
x	;	47,6*	21,7 ; 73,0	30,6**	11,0 ; 55,0	x	;	Hommes	
3,5**	0,0 ; 8,2	38,6	27,1 ; 50,7	43,5	32,0 ; 55,2	14,4**	6,0 ; 23,6	15-24 ans	
3,3**	0,8 ; 6,5	48,7	39,9 ; 57,4	37,0	28,9 ; 45,7	11,0*	6,0 ; 17,2	25-44 ans	
x	;	38,6*	22,4 ; 55,4	49,7*	33,5 ; 66,3	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,899									
x	;	31,9*	19,1 ; 45,7	44,9*	30,2 ; 60,0	x	;	Femmes	
x	;	31,4	23,2 ; 40,1	38,0	29,2 ; 47,4	x	;	15-24 ans	
5,0**	1,9 ; 8,8	31,3	23,9 ; 39,0	43,7	36,3 ; 51,9	19,9*	13,3 ; 26,7	25-44 ans	
x	;	47,5	34,3 ; 61,6	37,8*	25,2 ; 50,7	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,617									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
6,3**	2,8 ; 10,7	36,9	29,0 ; 44,8	39,3	31,8 ; 47,2	17,5*	11,0 ; 23,9	Poids insuffisant	
4,7**	2,1 ; 8,0	38,4	32,7 ; 44,1	41,9	36,3 ; 47,6	15,0	10,7 ; 19,6	Poids normal	
x	;	37,5	30,4 ; 44,7	41,4	34,6 ; 48,9	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,703									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
17,7**	2,0 ; 35,1	38,7*	20,1 ; 59,0	40,7*	20,9 ; 61,4	x	;	Poids insuffisant	
6,1**	1,8 ; 11,2	41,5	33,1 ; 49,2	40,1	32,5 ; 47,9	12,4*	6,9 ; 18,6	Poids normal	
x	;	49,3	37,9 ; 60,7	39,9	29,4 ; 51,0	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,712									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
4,5**	1,3 ; 8,6	36,6	28,2 ; 45,5	39,1	31,1 ; 47,8	19,8*	12,5 ; 27,4	Poids insuffisant	
3,1**	0,1 ; 7,0	34,8	26,8 ; 42,9	44,1	35,6 ; 52,4	18,0*	11,2 ; 25,2	Poids normal	
x	;	27,0	19,0 ; 35,0	42,7	33,2 ; 52,6	x	;	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,574				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	50,4	46,6 ; 54,2	48,9	42,9 ; 55,0	51,5	46,4 ; 56,5	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	36,7	32,9 ; 40,3	36,7	30,8 ; 42,9	36,6	32,0 ; 41,6	
Non	14,4	15,3	13,7	12,9	10,6 ; 15,5	14,4	10,7 ; 18,8	11,8	8,8 ; 15,0	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,177				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	46,4	42,3 ; 50,2	42,3	36,2 ; 48,8	49,3	44,0 ; 54,1	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	36,2	32,6 ; 40,0	38,1	31,9 ; 44,4	34,8	30,4 ; 39,7	
Non	19,6	22,6	17,4	17,4	14,5 ; 20,5	19,6	14,7 ; 24,8	15,9	12,6 ; 19,7	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	46,2	42,3 ; 50,1	36,7	30,7 ; 43,0	52,9	47,9 ; 57,9	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	26,8	23,4 ; 30,1	31,1	25,3 ; 36,9	23,8	19,8 ; 28,1	
Non	27,7	32,4	24,3	27,0	23,7 ; 30,4	32,2	26,3 ; 38,4	23,3	19,3 ; 27,5	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,150				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	45,6	41,6 ; 49,4	42,4	36,7 ; 48,3	47,9	42,9 ; 52,7	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	28,2	24,6 ; 31,8	32,1	25,9 ; 37,9	25,4	21,1 ; 29,8	
Non	26,1	27,4	25,1	26,2	23,0 ; 29,4	25,5	20,6 ; 30,8	26,7	22,5 ; 31,0	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	62,0	58,3 ; 65,6	52,7	46,5 ; 58,8	68,5	64,1 ; 73,2	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	22,5	19,4 ; 25,8	28,6	23,1 ; 34,4	18,1	14,4 ; 22,0	
Non	17,4	18,5	16,6	15,6	12,6 ; 18,4	18,7	14,1 ; 23,7	13,4	9,8 ; 16,7	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,168				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	60,0	56,0 ; 63,9	55,9	49,6 ; 61,9	63,0	57,9 ; 67,8	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	26,7	23,3 ; 30,2	28,9	23,3 ; 34,8	25,1	21,1 ; 29,5	
Non	12,6	14,0	11,6	13,2	10,8 ; 15,9	15,1	10,8 ; 19,7	11,9	8,9 ; 15,1	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,004				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	46,2	42,3 ; 49,8	42,6	36,9 ; 48,8	48,7	43,7 ; 53,4	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	30,8	27,4 ; 34,5	27,6	22,1 ; 33,2	33,1	28,5 ; 38,1	
Non	21,5	24,4	19,4	23,0	19,8 ; 26,2	29,8	23,9 ; 35,6	18,2	14,5 ; 21,9	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,065				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	13,1	10,5 ; 16,1	12,8*	8,8 ; 17,4	13,3	10,0 ; 17,0	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	15,1	12,5 ; 18,2	19,2	14,6 ; 24,2	12,3	8,9 ; 15,8	
Non	72,0	67,3	75,4	71,7	68,0 ; 75,2	68,1	61,8 ; 73,6	74,4	69,7 ; 78,9	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,009				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	33,1	29,3 ; 36,7	30,9	25,5 ; 36,3	34,6	29,7 ; 39,3	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	17,6	14,8 ; 20,6	23,1	17,9 ; 28,2	13,7	10,5 ; 17,3	
Non	49,9	43,2	54,7	49,3	45,7 ; 53,1	46,0	40,1 ; 52,0	51,6	46,9 ; 56,8	



Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,196				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	52,2	48,5 ; 56,2	48,4	42,6 ; 54,5	54,9	49,9 ; 59,9	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	20,1	17,1 ; 23,2	22,7	17,7 ; 27,7	18,3	14,6 ; 22,1	
Non	29,6	28,8	30,2	27,7	24,4 ; 31,3	28,9	23,4 ; 34,6	26,8	22,3 ; 31,4	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,036				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	36,8	33,2 ; 40,4	30,9	25,2 ; 36,5	41,0	35,8 ; 45,8	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	16,9	14,1 ; 20,1	17,5	12,6 ; 22,7	16,5	13,0 ; 20,4	
Non	48,5	52,0	45,9	46,3	42,6 ; 50,2	51,7	45,6 ; 57,9	42,6	37,6 ; 47,4	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,789				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	36,4	32,5 ; 40,0	35,2	29,4 ; 41,1	37,2	32,1 ; 42,2	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	28,3	24,7 ; 31,7	27,9	22,5 ; 33,4	28,5	24,1 ; 33,1	
Non	37,5	34,7	39,5	35,4	31,8 ; 39,1	36,8	31,1 ; 42,7	34,4	29,7 ; 39,3	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
51,1	48,9 ; 53,4	35,7	33,5 ; 38,0	13,2	11,6 ; 14,7	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
44,6	41,3 ; 48,0	38,3	35,1 ; 41,6	17,1	14,4 ; 19,8	Hommes
57,6	54,6 ; 60,7	33,2	30,2 ; 36,2	9,2	7,4 ; 11,2	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
53,5	42,5 ; 65,4	11,3**	4,4 ; 18,5	35,1*	24,1 ; 46,3	15-17 ans
31,9	24,0 ; 40,1	26,5*	18,2 ; 35,2	41,7	31,7 ; 51,1	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
41,0	34,6 ; 48,0	20,1	14,6 ; 26,0	38,9	31,8 ; 45,5	25-44 ans
32,7	28,6 ; 36,9	51,8	47,3 ; 56,4	15,5	12,4 ; 18,8	45-64 ans
55,6	52,2 ; 59,4	39,8	36,0 ; 43,3	4,6*	3,1 ; 6,2	65 ans et plus
94,7	92,4 ; 96,8	x	;	x	;	
		P = 0,012				Hommes
57,6	41,4 ; 73,1	x	;	x	;	15-17 ans
22,4*	11,5 ; 34,9	29,1*	15,6 ; 44,1	48,6*	32,5 ; 64,1	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
38,9	28,9 ; 49,1	17,0*	9,3 ; 25,8	44,1	33,3 ; 54,9	25-44 ans
27,5	22,1 ; 33,1	50,4	43,9 ; 56,9	22,1	17,1 ; 27,3	45-64 ans
47,8	42,9 ; 53,1	46,4	41,1 ; 51,5	5,8*	3,4 ; 8,5	65 ans et plus
92,8	88,4 ; 96,5	x	;	x	;	
		P = 0,000				Femmes
47,9*	32,9 ; 65,1	22,4**	8,5 ; 36,5	29,7*	14,3 ; 44,9	15-17 ans
40,6	29,3 ; 52,1	24,1*	14,5 ; 34,6	35,3*	24,5 ; 46,2	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
43,3	34,5 ; 52,7	23,4*	15,7 ; 31,7	33,2	24,6 ; 41,7	25-44 ans
38,2	32,1 ; 44,2	53,3	47,0 ; 59,7	8,5*	5,1 ; 12,6	45-64 ans
63,7	58,8 ; 68,7	33,0	28,1 ; 38,2	3,3**	1,6 ; 5,5	65 ans et plus
96,0	93,1 ; 98,4	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	46,6	44,4 ; 48,8	52,3	49,0 ; 55,5	40,9	37,8 ; 44,1
Non	56,1	49,9	62,1	53,4	51,2 ; 55,6	47,7	44,5 ; 51,0	59,1	55,9 ; 62,2
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	14,5	12,9 ; 16,3	19,7	17,0 ; 22,5	9,4	7,5 ; 11,5
Non	89,4	85,6	93,2	85,5	83,7 ; 87,1	80,3	77,5 ; 83,0	90,6	88,5 ; 92,5
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Oui	7,3	9,1	5,5	9,7	8,2 ; 11,3	12,4	9,9 ; 15,0	7,0	5,5 ; 8,8
Non	92,7	90,9	94,5	90,3	88,7 ; 91,8	87,6	85,0 ; 90,1	93,0	91,2 ; 94,5
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,034					
Oui	5,1	6,3	3,9	6,2	4,9 ; 7,5	7,6	5,3 ; 9,7	4,8*	3,5 ; 6,3
Non	94,9	93,7	96,1	93,8	92,5 ; 95,1	92,4	90,3 ; 94,7	95,2	93,7 ; 96,5
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	12,3	16,1	8,7	13,5	11,8 ; 15,2	17,1	14,4 ; 20,1	9,9	7,9 ; 11,9
Non	87,7	83,9	91,3	86,5	84,8 ; 88,2	82,9	79,9 ; 85,6	90,1	88,1 ; 92,1
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = 0,864					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,3**	0,0 ; 0,6	x	;	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	99,7	99,4 ; 100,0	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,759					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,6**	0,2 ; 1,1	0,5**	0,1 ; 1,1	0,7**	0,0 ; 1,6
Non	99,5	99,2	99,7	99,4	98,9 ; 99,8	99,5	98,9 ; 99,9	99,3	98,4 ; 100,0
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,6**	0,2 ; 1,0	1,1**	0,3 ; 1,9	x	;
Non	99,2	98,8	99,7	99,4	99,0 ; 99,8	98,9	98,1 ; 99,7	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,326					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,7*	1,1 ; 2,3	2,0**	1,0 ; 3,1	1,4**	0,6 ; 2,2
Non	98,2	98,1	98,4	98,3	97,7 ; 98,9	98,0	96,9 ; 99,0	98,6	97,8 ; 99,4
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,124					
Oui	1,6	2,3	0,9	2,5*	1,7 ; 3,3	3,1*	1,8 ; 4,6	1,8*	1,0 ; 2,8
Non	98,4	97,7	99,1	97,5	96,7 ; 98,3	96,9	95,4 ; 98,2	98,2	97,2 ; 99,0
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,040					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,5**	0,2 ; 0,9	0,8**	0,3 ; 1,5	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,5	99,1 ; 99,8	99,2	98,5 ; 99,7	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	12,2	16,2	8,3	12,1	10,6 ; 13,6	16,1	13,5 ; 18,6	8,1	6,3 ; 10,0	
Non	87,8	83,8	91,7	87,9	86,4 ; 89,4	83,9	81,4 ; 86,5	91,9	90,0 ; 93,7	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,010				
Oui	1,6	2,3	0,8	2,0*	1,4 ; 2,8	3,0*	1,8 ; 4,5	1,1**	0,5 ; 1,9	
Non	98,4	97,7	99,2	98,0	97,2 ; 98,6	97,0	95,5 ; 98,2	98,9	98,1 ; 99,5	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,014				
Oui	1,8	2,4	1,3	2,2*	1,4 ; 3,1	3,3*	1,8 ; 5,0	1,1**	0,4 ; 1,8	
Non	98,2	97,6	98,7	97,8	96,9 ; 98,6	96,7	95,0 ; 98,2	98,9	98,2 ; 99,6	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,258				
Oui	1,4	1,7	1,0	2,3*	1,5 ; 3,2	2,9**	1,4 ; 4,4	1,8**	0,8 ; 2,8	
Non	98,6	98,3	99,0	97,7	96,8 ; 98,5	97,1	95,6 ; 98,6	98,2	97,2 ; 99,2	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,007				
Oui	0,8	1,2	0,4*	1,3**	0,6 ; 2,0	2,2**	0,9 ; 3,6	0,4**	0,1 ; 0,8	
Non	99,2	98,8	99,6	98,7	98,0 ; 99,4	97,8	96,4 ; 99,1	99,6	99,2 ; 99,9	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 'n.d.'				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = .				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,962				
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,5**	0,1 ; 0,9	x	;	0,5**	0,0 ; 1,0	
Non	99,6	99,6	99,7	99,5	99,1 ; 99,9	x	;	99,5	99,0 ; 100,0	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = .				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %, estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	13,2	11,6 ; 14,7	17,1	14,4 ; 19,8	9,2	7,4 ; 11,2
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	35,1*	24,1 ; 46,3	39,0*	23,8 ; 55,3	29,7*	14,3 ; 44,9
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	41,7	31,7 ; 51,1	48,6*	32,5 ; 64,1	35,3*	24,5 ; 46,2
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	15,5	12,4 ; 18,8	22,1	17,1 ; 27,3	8,5*	5,1 ; 12,6
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	4,6*	3,1 ; 6,2	5,8*	3,4 ; 8,5	3,3**	1,6 ; 5,5
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	26,2	24,0 ; 28,3	10,0	8,5 ; 11,6	12,8	11,1 ; 14,5
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	26,8	23,8 ; 30,0	12,2	9,8 ; 14,7	16,4	13,5 ; 19,3
Femmes	25,4	6,8	7,4	25,5	22,6 ; 28,4	7,8	5,9 ; 9,7	9,1	7,3 ; 11,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	28,1*	18,1 ; 38,4	3,1**	0,1 ; 7,4	15,2**	6,8 ; 23,6
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	26,8*	18,1 ; 36,2	14,4*	7,9 ; 22,3	27,0*	18,2 ; 36,2
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	27,3	20,9 ; 34,0	9,7*	5,7 ; 14,4	22,0	16,0 ; 28,3
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	30,1	26,1 ; 34,2	17,3	14,0 ; 20,9	19,9	16,2 ; 23,4
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	29,7	26,2 ; 33,0	7,4	5,4 ; 9,6	7,3	5,4 ; 9,2
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	5,2*	3,1 ; 7,6	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	21,0**	8,3 ; 34,9	x	;	19,8**	7,1 ; 34,1
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	24,4**	10,9 ; 38,6	22,9**	10,9 ; 38,3	30,3*	14,6 ; 46,0
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	22,8*	13,8 ; 32,5	12,9**	6,2 ; 21,5	25,4*	16,0 ; 35,2
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	28,9	22,9 ; 35,3	18,7	14,0 ; 23,9	24,8	19,0 ; 30,5
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	32,5	27,2 ; 37,4	9,7*	6,5 ; 13,2	10,0*	7,0 ; 13,3
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	6,9**	3,2 ; 11,3	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,002					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	38,2*	20,8 ; 53,4	x	;	8,7**	0,0 ; 18,8
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	29,0*	18,4 ; 40,1	6,6**	1,5 ; 13,2	24,0*	14,7 ; 33,9
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	32,4	23,1 ; 41,3	6,1**	1,9 ; 11,0	18,3*	11,7 ; 25,0
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	31,4	25,7 ; 37,4	15,8*	11,2 ; 21,0	14,6*	10,4 ; 19,1
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	26,8	22,1 ; 31,4	5,1*	2,7 ; 7,9	4,5*	2,4 ; 6,9
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	4,0**	1,6 ; 6,9	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	79,7	77,9 ; 81,3	82,8	80,3 ; 85,2	76,5	74,1 ; 78,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	40,5	29,7 ; 51,9	35,5*	21,1 ; 51,5	48,1*	31,1 ; 65,3
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	86,3	79,5 ; 92,9	85,6	73,8 ; 95,1	86,9	77,6 ; 95,8
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	66,8	60,1 ; 73,6	61,5	51,4 ; 71,9	72,9	64,0 ; 81,3
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	94,9	93,0 ; 96,6	93,8	90,7 ; 96,5	96,1	93,8 ; 98,0
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	85,8	83,4 ; 87,9	91,3	88,6 ; 93,8	79,9	75,9 ; 83,3
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	65,5	61,7 ; 69,3	70,9	65,6 ; 76,1	59,5	54,2 ; 64,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	85,9	82,7 ; 88,8	90,3	86,2 ; 93,8	81,2	76,1 ; 85,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	87,9	84,8 ; 90,7	89,4	84,8 ; 93,3	86,3	81,9 ; 90,3
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	89,2	85,6 ; 92,5	89,5	83,4 ; 94,6	89,0	84,2 ; 93,0
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	90,4	88,7 ; 92,0	89,3	86,6 ; 91,6	91,6	89,5 ; 93,6
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	8,2	6,8 ; 9,8	8,7	6,6 ; 11,1	7,7	5,8 ; 9,7
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,4**	0,7 ; 2,3	2,0**	0,8 ; 3,6	0,7**	0,1 ; 1,5
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	47,6	46,3 ; 48,8	1,1**	0,3 ; 1,9	98,6	97,4 ; 99,5
Femmes	51,5	97,5	0,8	51,8	50,6 ; 53,0	98,5	97,6 ; 99,4	x	;
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,6**	0,2 ; 1,2	0,4**	0,0 ; 1,0	0,9**	0,2 ; 1,8

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	90,4	88,7 ; 92,0	8,2	6,8 ; 9,8	1,4**	0,7 ; 2,3
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,277					
Hommes	86,4	10,7	2,9	89,3	86,6 ; 91,6	8,7	6,6 ; 11,1	2,0**	0,8 ; 3,6
Femmes	91,6	7,4	0,9*	91,6	89,5 ; 93,6	7,7	5,8 ; 9,7	0,7**	0,1 ; 1,5
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,181					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	75,7	60,5 ; 89,1	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	67,6	57,3 ; 77,9	24,0*	15,1 ; 33,3	8,3**	2,2 ; 16,0
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	69,7	61,3 ; 77,8	23,3*	16,0 ; 30,7	7,0**	2,3 ; 12,9
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	91,4	88,8 ; 93,7	7,7	5,6 ; 10,0	0,9**	0,2 ; 2,0
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	96,0	94,3 ; 97,5	x	;	x	;
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	92,9	88,5 ; 96,5	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,508					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	46,6**	8,8 ; 89,3	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	90,1	87,5 ; 92,3	8,0	6,0 ; 10,3	1,9**	0,6 ; 3,5
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,635					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	92,4	90,4 ; 94,4	x	;	x	;
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	48,0	44,4 ; 51,4	65,2	60,6 ; 69,9
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000	...	...	...
15-24 ans	87,9	...	89,5	80,3 ; 97,7	...	;
25-44 ans	62,4	...	62,0	55,3 ; 68,9	...	;
45-64 ans	29,9	...	30,0	25,2 ; 35,3	...	;
65 ans et plus	7,3	...	11,7**	4,4 ; 20,4	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...	...	P = 0,000	...
15-24 ans	...	90,0	...	;	90,7	84,0 ; 96,4
25-34 ans	...	71,0	...	;	67,2	58,3 ; 75,4
35-49 ans	...	53,5	...	;	53,5	46,5 ; 60,4
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,191	...	P = 0,517	...
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	41,9	35,3 ; 48,4	59,8	48,3 ; 70,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	51,7	44,6 ; 58,9	62,9	53,6 ; 72,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	48,4	40,9 ; 56,3	66,9	58,5 ; 75,2
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	53,5	41,4 ; 63,7	70,1	60,4 ; 79,8
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,129	...	P = 0,104	...
Un partenaire	43,8	64,2	45,4	41,5 ; 49,1	63,1	58,2 ; 68,1
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	70,1	56,9 ; 81,4	84,3	72,4 ; 94,2
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	75,1*	36,8 ; 100,0	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = 0,803	...	P = 0,397	...
Hommes	x	66,6	x	;	65,5	60,7 ; 70,2
Femmes	47,8	x	48,0	44,4 ; 51,5	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	10,9	9,3 ; 12,7	10,6	9,0 ; 12,4	78,5	76,2 ; 80,4
Sexe	P = 0,093			P = 0,083					
Hommes	14,8	14,9	70,3	12,7	10,1 ; 15,5	10,2	7,8 ; 12,9	77,1	73,7 ; 80,0
Femmes	13,2	14,7	72,1	8,9	6,9 ; 11,2	11,0	8,6 ; 13,5	80,1	77,2 ; 82,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	67,8	51,0 ; 84,4	14,8**	4,6 ; 27,1	17,4**	3,3 ; 32,9
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	29,9*	20,1 ; 40,0	31,7*	22,0 ; 41,2	38,4	28,4 ; 49,2
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	39,4	30,6 ; 48,1	27,5*	19,7 ; 35,8	33,1	24,8 ; 41,8
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	9,4	7,0 ; 12,2	14,1	11,2 ; 17,3	76,4	72,6 ; 79,9
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	4,4*	2,6 ; 6,3	3,2*	1,8 ; 4,8	92,4	89,9 ; 94,7
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	2,5**	0,4 ; 5,4	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,262					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	11,4	8,2 ; 15,0	7,8*	5,3 ; 10,6	80,9	76,6 ; 84,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	9,1*	6,2 ; 12,2	12,3	8,7 ; 16,3	78,6	73,7 ; 83,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	13,4*	9,6 ; 17,7	11,8*	8,6 ; 15,7	74,8	69,9 ; 79,5
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	9,5*	5,3 ; 14,1	10,5*	6,8 ; 14,7	79,9	74,1 ; 85,3
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	8,1	6,6 ; 9,9	7,8	6,3 ; 9,6	84,0	81,8 ; 85,9
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	30,7	22,1 ; 40,0	38,2	28,5 ; 48,3	31,1	22,1 ; 40,7
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	73,2*	43,3 ; 93,2	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	14,3	12,5 ; 16,3	16,8	14,0 ; 20,0	11,6	9,3 ; 14,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	67,9	50,7 ; 85,0	74,7*	49,5 ; 97,2	60,2*	36,1 ; 86,6
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	41,7	31,0 ; 52,3	50,8*	32,5 ; 68,1	33,3*	21,3 ; 45,8
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	48,3	39,2 ; 57,1	57,2	39,2 ; 57,1	39,5	39,2 ; 57,1
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	14,3	11,3 ; 17,4	17,4	11,3 ; 17,4	11,0*	11,3 ; 17,4
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	5,1*	3,1 ; 7,1	6,3*	3,1 ; 7,1	3,6**	3,1 ; 7,1
	3,1*	3,9*	1,8**	3,0**	0,6 ; 6,1	4,5**	0,6 ; 6,1	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,699		P = 0,831		P = 0,241	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	13,2	9,8 ; 17,0	15,6*	10,7 ; 20,8	10,0*	5,5 ; 14,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	13,8	10,2 ; 17,7	16,4*	10,6 ; 22,9	10,6*	6,1 ; 15,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	16,4	12,2 ; 20,9	16,8*	10,7 ; 23,5	15,8*	10,7 ; 21,7
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	13,9*	9,1 ; 19,0	20,7*	11,5 ; 30,6	9,2**	4,5 ; 15,2
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	10,9	9,2 ; 12,9	13,0	10,2 ; 16,0	8,8	6,7 ; 11,1
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	41,8	32,5 ; 51,5	43,3*	29,8 ; 56,4	39,9*	25,3 ; 55,2
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	68,3*	35,5 ; 93,0	70,6*	30,3 ; 99,9	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,027		P = 0,343		P = 0,292	
Hommes	18,7	54,0	17,9	11,7	9,5 ; 14,2	x	;	11,4	9,1 ; 13,8
Femmes	19,2	19,2	x	16,5	13,7 ; 19,7	16,5	13,7 ; 19,7	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	31,1**	2,3 ; 70,2	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	7,6	6,4 ; 9,0	7,0	5,4 ; 8,9	8,2	6,4 ; 10,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,001		P = 0,116	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	5,6**	1,9 ; 9,9	x	;	10,2**	3,3 ; 18,0
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,000		P = 0,068	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	5,4**	2,1 ; 9,1	x	;	10,3**	3,9 ; 17,7
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	11,4	8,9 ; 14,2	11,4*	7,4 ; 15,6	11,5*	8,1 ; 15,4
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	7,4	5,6 ; 9,5	7,4*	4,8 ; 10,5	7,5*	4,6 ; 10,6
	2,7	3,2*	2,2	1,3**	0,2 ; 3,0	x	;	2,0**	0,1 ; 4,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,041		P = 0,038	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	3,7*	2,3 ; 5,3	3,3**	1,3 ; 5,2	4,1**	1,9 ; 6,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	8,0*	5,5 ; 11,0	7,2*	4,1 ; 10,8	9,0*	5,2 ; 13,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	10,2	7,3 ; 13,4	10,0*	5,9 ; 14,6	10,5*	6,5 ; 14,8
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	11,0*	7,2 ; 15,3	10,4**	3,9 ; 18,0	11,4*	7,0 ; 16,6
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,384		P = 0,682		P = 0,008	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	8,0	6,5 ; 9,6	7,3	5,2 ; 9,6	8,8	6,6 ; 11,2
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	7,8**	3,4 ; 13,4	7,5**	1,5 ; 15,3	8,3**	1,8 ; 17,6
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	19,3**	1,2 ; 46,0	x	;	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,113		P = 0,401		P = 0,149	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	9,4	7,2 ; 11,7	x	;	9,3	7,1 ; 11,6
Femmes	7,0	7,0	8,9**	7,1	5,3 ; 9,2	7,1	5,3 ; 9,2	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,043		P = 0,074		P = 0,040	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	x	;	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	7,4	6,2 ; 8,8	6,7	5,0 ; 8,6	8,1	6,3 ; 10,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	20,3*	13,5 ; 28,0	79,7	72,0 ; 86,5
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,801			
15-35 ans	25,6	74,4	20,7*	13,6 ; 29,0	79,3	71,0 ; 86,4
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,787			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	16,4**	1,7 ; 35,9	83,6	64,1 ; 98,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	26,4**	8,2 ; 46,6	73,6	53,4 ; 91,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	21,1**	10,4 ; 33,0	78,9	67,0 ; 89,6
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	15,4**	3,3 ; 30,4	84,6	69,6 ; 96,7
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	20,4*	13,5 ; 28,1	79,6	71,9 ; 86,5
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	74,8	71,8 ; 77,8	21,7	18,9 ; 24,4	3,5*	2,3 ; 4,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,005					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	81,5	71,4 ; 90,8	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	90,1	86,2 ; 93,5	8,9*	5,5 ; 12,6	1,1**	0,1 ; 2,2
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	62,2	57,2 ; 66,9	35,6	30,8 ; 40,4	2,2**	1,1 ; 3,5
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,022					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	61,3	54,4 ; 68,2	34,0	27,4 ; 40,3	4,7**	1,8 ; 8,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	75,1	68,7 ; 80,9	19,6	14,7 ; 25,3	5,2**	2,1 ; 9,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	80,0	74,6 ; 85,7	17,1*	11,6 ; 22,4	2,9**	0,9 ; 5,4
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	83,8	78,0 ; 89,4	x	;	x	;
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,000					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	74,8	71,7 ; 77,8	21,8	19,1 ; 24,6	3,3*	2,1 ; 4,7
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 09  
**CÔTE-NORD**

---





## 1

## CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population		49,4	50,6			51,4	51,4 ; 51,4	48,6	48,6 ; 48,6
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	14,9	14,9 ; 14,9	14,8	14,8 ; 14,9	15,0	15,0 ; 15,1
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	32,9	32,9 ; 32,9	32,9	32,9 ; 33,0	32,9	32,8 ; 32,9
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	37,5	37,4 ; 37,5	38,0	37,9 ; 38,0	36,9	36,9 ; 37,0
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	14,7	14,7 ; 14,7	14,3	14,2 ; 14,3	15,2	15,1 ; 15,2
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,005					
Personne seule	13,4	10,7	16,0	11,9	10,9 ; 13,1	11,1	9,5 ; 12,8	12,8	11,3 ; 14,6
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	33,5	31,6 ; 35,4	34,8	32,0 ; 37,5	32,2	29,4 ; 34,9
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	42,6	40,3 ; 44,9	44,0	40,7 ; 47,4	41,2	38,1 ; 44,2
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	7,4	6,2 ; 8,7	5,2	3,7 ; 6,8	9,7	7,8 ; 11,8
Autre	6,7	6,5	6,9	4,5	3,5 ; 5,7	4,9*	3,2 ; 6,8	4,1*	2,7 ; 5,6
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,256			P = 'n.d.'					
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	98,9	98,2 ; 99,4	98,7	97,7 ; 99,7	99,0	98,2 ; 99,6
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	x	;	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,912			P = 0,483					
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	94,6	93,4 ; 95,7	95,3	93,6 ; 96,8	93,9	92,3 ; 95,5
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	3,2	2,4 ; 4,0	2,7*	1,5 ; 3,9	3,8*	2,6 ; 5,2
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	2,2*	1,4 ; 3,0	2,1**	0,9 ; 3,4	2,3*	1,3 ; 3,4
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,683			P = 0,254					
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	34,8	32,5 ; 37,1	35,7	32,4 ; 38,9	33,9	30,7 ; 37,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	26,2	23,9 ; 28,4	25,2	22,0 ; 28,4	27,2	24,0 ; 30,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	26,8	24,8 ; 28,9	28,1	25,2 ; 31,4	25,5	22,5 ; 28,3
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	12,1	10,6 ; 13,8	10,9	8,7 ; 13,3	13,4	11,4 ; 15,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	13,7	12,1 ; 15,3	10,2	8,0 ; 12,5	17,2	14,7 ; 19,9
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	18,2	16,2 ; 20,2	17,1	14,1 ; 20,1	19,3	16,5 ; 22,3
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	18,2	16,2 ; 20,4	18,1	15,3 ; 21,5	18,3	15,4 ; 21,2
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	21,0	18,9 ; 23,3	21,1	18,0 ; 24,2	21,0	17,9 ; 24,0
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	28,9	26,5 ; 31,2	33,5	30,0 ; 37,1	24,2	21,2 ; 27,2
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,020					
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	34,8	32,4 ; 37,1	38,6	35,0 ; 42,3	30,8	27,5 ; 34,0
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	55,2	52,7 ; 57,6	52,2	48,6 ; 56,0	58,2	54,9 ; 61,6
Pauvre	9,4	8,9	9,9	8,5	7,2 ; 10,0	7,9	6,0 ; 10,1	9,2	7,4 ; 11,2
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,5*	0,9 ; 2,2	1,3**	0,5 ; 2,1	1,8**	0,9 ; 2,9
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	61,6	59,7 ; 63,5	68,0	65,5 ; 70,4	55,0	52,1 ; 57,7
Étudiants	13,1	13,0	13,2	10,9	9,7 ; 12,1	9,0	7,3 ; 10,7	12,9	11,1 ; 14,6
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	8,8	7,5 ; 10,2	3,3*	2,0 ; 4,6	14,6	12,3 ; 17,1
Retraités	19,6	18,0	21,1	18,7	17,6 ; 19,8	19,8	18,2 ; 21,3	17,5	16,0 ; 19,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	49,6	47,2 ; 52,1	38,5	36,0 ; 40,8	11,9	10,3 ; 13,5
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,196					
Hommes	56,6	33,5	9,9	48,4	44,8 ; 52,1	40,5	36,8 ; 44,0	11,1	8,9 ; 13,5
Femmes	55,5	32,8	11,7	50,9	47,6 ; 54,3	36,4	33,3 ; 39,5	12,7	10,6 ; 15,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	55,6	47,4 ; 63,7	37,4	30,1 ; 45,3	7,0**	2,7 ; 12,0
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	57,5	53,4 ; 61,8	35,5	31,3 ; 39,5	7,0*	4,9 ; 9,2
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	46,7	42,8 ; 50,6	39,6	35,7 ; 43,6	13,7	11,0 ; 16,6
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	31,4	25,9 ; 37,2	44,0	38,1 ; 50,3	24,6	19,5 ; 30,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	44,3	39,5 ; 49,1	37,3	32,6 ; 42,0	18,3	14,6 ; 22,1
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	47,9	43,7 ; 51,9	38,2	34,2 ; 42,4	13,9	11,1 ; 16,7
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	54,0	49,8 ; 58,4	38,3	34,0 ; 42,5	7,6*	5,3 ; 10,2
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	45,3	35,9 ; 54,5	44,7	35,7 ; 53,9	10,0*	5,1 ; 15,3
Autre	46,0	39,4	14,6	48,2	33,2 ; 62,9	35,8*	22,5 ; 49,9	16,1**	5,7 ; 27,8
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	39,2	34,9 ; 43,5	42,9	38,4 ; 47,3	17,9	14,9 ; 21,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	46,8	41,7 ; 51,7	40,0	35,3 ; 45,1	13,2	9,8 ; 17,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	57,4	52,6 ; 62,0	36,3	31,9 ; 40,8	6,3*	3,9 ; 8,9
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	69,1	62,8 ; 75,5	26,2	20,2 ; 32,5	4,7**	1,8 ; 8,0
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	29	22,4 ; 35,4	40,8	34,4 ; 47,5	30,2	24,1 ; 36,5
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	52,5	49,8 ; 55,2	38,6	35,8 ; 41,2	9,0	7,3 ; 10,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	25,3	18,6 ; 32,5	38,5	30,8 ; 46,4	36,2	28,5 ; 43,7
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	52,7	50,1 ; 55,4	38,4	35,8 ; 40,9	8,9	7,4 ; 10,4
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	54,2	51,2 ; 57,5	38,7	35,6 ; 41,6	7,1	5,5 ; 8,8
Étudiants	62,7	32,2	5,0	62,4	52,9 ; 72,1	31,6	22,8 ; 41,0	6,0**	1,5 ; 11,3
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	24,5	18,1 ; 31,6	41,0	33,4 ; 49,5	34,5	26,0 ; 42,5
Retraités	40,2	39,5	20,4	38,5	33,5 ; 43,7	39,9	34,7 ; 45,2	21,6	17,1 ; 26,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	49,6	47,2 ; 52,1	38,5	36,0 ; 40,8	11,9	10,3 ; 13,5
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,003					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	43,3	38,5 ; 48,1	42,0	37,1 ; 46,8	14,7	11,4 ; 18,1
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	52,2	49,3 ; 55,1	37,0	34,2 ; 39,7	10,8	9,0 ; 12,6
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,001					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	54,1*	32,0 ; 77,8	33,6**	10,8 ; 57,0	12,3**	0,5 ; 27,7
Poids normal	62,6	29,4	8,0	58,8	54,8 ; 62,6	32,3	28,6 ; 36,1	8,9	6,8 ; 11,4
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	43,1	39,9 ; 46,4	42,9	39,5 ; 46,1	14,0	11,7 ; 16,4
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	56,8	53,3 ; 60,2	35,0	31,5 ; 38,4	8,2	6,3 ; 10,3
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	43,4	39,7 ; 47,0	42,6	39,0 ; 46,2	13,9	11,4 ; 16,5
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	32,8*	21,8 ; 44,3	37,4*	24,9 ; 49,9	29,7*	19,4 ; 41,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	28,0	23,3 ; 32,9	46,0	40,4 ; 51,6	26,0	21,3 ; 31,1
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	55,4	52,6 ; 58,2	36,6	33,9 ; 39,4	8,0	6,5 ; 9,5

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	51,2	48,6 ; 53,7	43,8	41,5 ; 46,3	5,0	3,9 ; 6,2
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,719		
Hommes	47,5	46,6	6,0	50,5	46,7 ; 54,3	44,1	40,5 ; 47,7	5,4*	3,7 ; 7,3
Femmes	47,1	45,9	7,0	51,8	48,5 ; 55,1	43,6	40,3 ; 47,1	4,6*	3,2 ; 6,1
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,006		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	60,3	51,9 ; 68,5	33,8	26,2 ; 42,4	5,9**	1,9 ; 10,6
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	48,4	43,9 ; 52,6	48,2	44,1 ; 52,7	3,4*	2,0 ; 4,8
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	47,8	43,8 ; 51,5	45,9	42,1 ; 49,7	6,2*	4,2 ; 8,6
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	57,4	51,2 ; 63,2	38,1	32,5 ; 44,1	4,5**	2,2 ; 7,5
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,480		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	41,5	36,7 ; 46,6	49,4	44,2 ; 54,2	9,1*	6,3 ; 12,2
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	52,9	48,8 ; 56,9	43,4	39,5 ; 47,4	3,7*	2,2 ; 5,4
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	53,3	48,7 ; 57,7	42,2	38,0 ; 46,6	4,5*	2,5 ; 6,7
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	44,8	35,6 ; 54,2	50,6	41,3 ; 59,7	4,6**	1,5 ; 8,4
Autre	44,5	46,1	9,4*	56,2	41,3 ; 70,2	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,035		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	56,1	51,6 ; 60,5	37,9	33,6 ; 42,1	6,0*	3,9 ; 8,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	50,7	45,6 ; 55,6	45,3	40,3 ; 50,3	4,1*	2,4 ; 6,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	49,3	44,3 ; 54,1	45,8	41,0 ; 50,7	4,8*	2,6 ; 7,3
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	42,1	35,4 ; 49,3	53,0	45,7 ; 60,1	4,9**	1,6 ; 9,2
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,161		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	48,9	41,3 ; 55,5	43,8	37,2 ; 50,8	7,4*	4,2 ; 11,3
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	51,0	48,1 ; 54,0	44,7	41,8 ; 47,5	4,3	3,1 ; 5,6
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	34,1	25,9 ; 42,1	51,0	42,9 ; 59,0	14,9*	9,9 ; 20,8
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	53,1	50,5 ; 55,7	43,0	40,5 ; 45,6	3,9*	2,8 ; 5,1
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,168		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	48,8	45,7 ; 51,9	46,7	43,6 ; 49,9	4,4*	3,1 ; 5,9
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	62,8	53,0 ; 72,0	32,5	24,0 ; 41,5	4,8**	0,4 ; 10,3
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	46,0	37,8 ; 54,1	45,2	36,8 ; 53,4	8,8*	4,7 ; 13,4
Retraités	51,9	42,8	5,3	54,6	49,1 ; 60,0	39,9	34,7 ; 45,4	5,4*	3,1 ; 8,2
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	58,5	54,7 ; 61,9	38,3	34,8 ; 41,8	3,3*	2,0 ; 4,7
Bon	40,5	52,6	6,9	46,6	42,4 ; 50,6	48,6	44,6 ; 52,7	4,9*	3,0 ; 7,0
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	35,7	28,8 ; 42,5	51,8	44,4 ; 58,9	12,6*	8,1 ; 18,2
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	29,5	24,1 ; 35,0	57,2	51,5 ; 62,7	13,4	9,5 ; 17,5
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	56,5	53,7 ; 59,3	40,7	37,9 ; 43,4	2,9*	1,9 ; 4,1
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	21,3	49,3	29,4	15,5**	4,9 ; 28,1	59,6	41,3 ; 76,2	24,9**	10,7 ; 40,3
Non	48,1	46,1	5,8	52,1	49,5 ; 54,7	43,4	41,0 ; 45,8	4,5	3,4 ; 5,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	19,8	17,8 ; 21,9	80,2	78,1 ; 82,2
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,061			
Hommes	18,2	81,8	18,0	15,3 ; 21,0	82,0	79,0 ; 84,7
Femmes	26,0	74,0	21,7	18,9 ; 24,5	78,3	75,5 ; 81,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,122			
15-24 ans	24,4	75,6	21,9	15,3 ; 28,9	78,1	71,1 ; 84,7
25-44 ans	24,3	75,7	21,5	18,0 ; 25,2	78,5	74,8 ; 82,0
45-64 ans	20,6	79,4	16,6	13,7 ; 19,5	83,4	80,5 ; 86,3
65 ans et plus	18,8	81,2	22,2	17,3 ; 27,0	77,8	73,0 ; 82,7
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,004			
Personne seule	25,7	74,3	24,3	20,3 ; 28,6	75,7	71,4 ; 79,7
Couple sans enfant	17,7	82,3	15,7	12,8 ; 18,6	84,3	81,4 ; 87,2
Couple avec enfants	20,8	79,2	20,0	16,7 ; 23,6	80,0	76,4 ; 83,3
Famille monoparentale	32,2	67,8	30,0	21,8 ; 38,8	70,0	61,2 ; 78,2
Autre	29,7	70,3	19,6**	8,9 ; 31,4	80,4	68,6 ; 91,1
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	25,4	21,5 ; 29,5	74,6	70,5 ; 78,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	20,4	16,6 ; 24,4	79,6	75,6 ; 83,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	15,0	11,7 ; 18,5	85,0	81,5 ; 88,3
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	14,6*	9,8 ; 19,5	85,4	80,5 ; 90,2
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	38,0	31,3 ; 44,8	62,0	55,2 ; 68,7
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	17,2	15,1 ; 19,4	82,8	80,6 ; 84,9
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	52,0	43,6 ; 60,2	48,0	39,8 ; 56,4
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	16,4	14,5 ; 18,4	83,6	81,6 ; 85,5
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,003			
Travailleurs	20,9	79,1	17,9	15,6 ; 20,4	82,1	79,6 ; 84,4
Étudiants	24,8	75,2	21,4*	14,0 ; 29,3	78,6	70,7 ; 86,0
Personnes sans emploi	37,9	62,1	32,4	24,6 ; 40,3	67,6	59,7 ; 75,4
Retraités	18,2	81,8	19,3	15,3 ; 23,5	80,7	76,5 ; 84,7
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	11,1	9,1 ; 13,4	88,9	86,6 ; 90,9
Bon	26,6	73,4	23,7	20,3 ; 27,2	76,3	72,8 ; 79,7
Passable ou mauvais	48,8	51,2	44,5	37,3 ; 52,2	55,5	47,8 ; 62,7
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	11,4	9,2 ; 13,7	88,6	86,3 ; 90,8
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	25,7	22,6 ; 29,2	74,3	70,8 ; 77,4
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	53,5	40,3 ; 66,2	46,5	33,8 ; 59,7
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	74,6	59,1 ; 88,4	25,4**	11,6 ; 40,9
Non	20,6	79,4	18,2	16,2 ; 20,2	81,8	79,8 ; 83,8
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = .			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	19,5	17,4 ; 21,5	80,5	78,5 ; 82,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,2*	1,5 ; 3,0	2,7*	1,6 ; 3,9	1,8*	0,9 ; 2,7
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,385		P = 0,648		P = 0,315	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,8*	1,4 ; 4,2	2,8**	1,0 ; 5,2	2,7**	0,9 ; 4,7
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,5*	1,3 ; 3,8	3,2**	1,4 ; 5,4	1,7**	0,4 ; 3,6
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,4**	0,2 ; 3,0	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,433		P = 0,266		P = 0,493	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	3,6**	1,8 ; 5,7	5,8**	2,4 ; 9,7	x	;
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	1,6**	0,6 ; 2,8	1,6**	0,1 ; 3,2	1,6**	0,1 ; 3,2
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	2,2**	1,0 ; 3,5	2,8**	0,8 ; 5,0	1,5**	0,8 ; 5,0
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	x	;	x	;	x	;
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,969		P = 0,951		P = 0,670	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	2,0**	0,9 ; 3,2	2,7**	0,9 ; 5,0	1,3**	0,0 ; 2,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,4**	0,9 ; 4,0	2,1**	0,2 ; 4,6	2,7**	0,5 ; 5,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	2,3**	0,9 ; 3,8	3,0**	0,8 ; 5,7	x	;
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	2,5**	0,4 ; 5,1	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,365		P = 0,119		P = 0,986	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	3,4**	0,9 ; 6,4	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	2,2*	1,4 ; 3,0	2,4*	1,3 ; 3,7	1,9**	0,8 ; 3,1
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,004		P = 0,109	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	6,2**	2,6 ; 10,5	8,9**	2,0 ; 17,3	4,1**	0,4 ; 8,3
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,8*	1,1 ; 2,5	2,1*	1,1 ; 3,2	1,5**	0,6 ; 2,5
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,340		P = 0,729		P = 0,593	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,6*	1,7 ; 3,7	3,0*	1,6 ; 4,5	2,2**	0,9 ; 3,7
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	x	;	x	;	x	;
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,7**	0,4 ; 3,4	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,011		P = 0,270		P = 0,044	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,6**	0,8 ; 2,6	2,3**	0,9 ; 4,1	0,9**	0,1 ; 1,9
Bon	2,5	2,7	2,4	2,0**	0,9 ; 3,3	2,3**	0,7 ; 4,4	1,6**	0,2 ; 3,2
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	5,6**	2,7 ; 9,0	5,5**	1,4 ; 10,3	5,7**	1,4 ; 10,8
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,002	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	0,7**	0,2 ; 1,3	1,1**	0,1 ; 2,2	x	;
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	3,1*	1,8 ; 4,5	3,2**	1,5 ; 5,3	2,9**	1,1 ; 5,0
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	11,4**	4,5 ; 19,0	14,1**	3,1 ; 26,9	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,001	
Élevé	7,7	9,0	6,8	8,6*	5,4 ; 11,7	11,7*	6,3 ; 17,9	5,8**	2,6 ; 9,4
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,7**	0,3 ; 1,2	0,7**	0,2 ; 1,4	0,7**	0,1 ; 1,6

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,4**	0,1 ; 0,7	x	;	x	;
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,114		P = 0,575		P = 0,025	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	x	;	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,077		P = 0,022		P = 0,025	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,211		P = 0,875		P = .	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	0,9**	0,1 ; 1,9	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,005		P = 0,000		P = 0,013	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	2,1**	0,2 ; 4,5	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	x	;	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,015		P = 0,000		P = .	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,2**	0,0 ; 0,5	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,234		P = 0,312		P = 0,924	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	0,5**	0 ; 1,1	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	x	;	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,035		P = 0,000		P = 0,245	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = .		P = .		P = .	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	2,0**	0,5 ; 3,8	x	;	x	;
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,852				
Oui	10,2	10,0	10,3	10,1	8,6 ; 11,6	10,0	8,0 ; 12,2	10,2	8,1 ; 12,5	
Non	89,8	90,0	89,7	89,9	88,4 ; 91,4	90,0	87,8 ; 92	89,8	87,5 ; 91,9	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,440				
Oui	4,4	3,5	5,3	4,8	3,7 ; 6,1	4,4*	2,8 ; 6,1	5,3*	3,7 ; 7,1	
Non	95,6	96,5	94,7	95,2	93,9 ; 96,3	95,6	93,9 ; 97,2	94,7	92,9 ; 96,3	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	11,2	9,7 ; 12,9	12,7	10,3 ; 15,2	9,7	7,7 ; 11,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,015		P = 0,161	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	16,5*	11,0 ; 22,9	20,1*	11,8 ; 29,9	12,6**	5,5 ; 21,0
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	13,8	10,8 ; 17,0	15,2	10,7 ; 19,9	12,4*	8,5 ; 16,5
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	8,7	6,5 ; 11,0	10,0*	6,8 ; 13,6	7,2*	4,4 ; 10,3
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	6,8*	4,0 ; 10,0	6,2**	2,1 ; 11,6	7,4**	3,5 ; 11,6
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,132		P = 0,360		P = 0,443	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	9,9	7,1 ; 13,1	10,5	6,1 ; 15,6	9,4	5,7 ; 13,6
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	8,9	6,7 ; 11,3	10,4*	7,0 ; 14,1	7,2*	4,3 ; 10,3
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	12,4	9,6 ; 15,4	14,5	10,2 ; 19,0	10,1*	6,6 ; 14,0
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	13,1*	7,3 ; 20,4	12,0**	1,7 ; 24,5	13,8**	6,7 ; 22,9
Autre	14,9	16,7	13,2*	17,1**	7,5 ; 27,6	21,3**	5,8 ; 40,0	12,0**	1,5 ; 25,1
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,560		P = 0,971		P = 0,356	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	10,1	7,4 ; 13,0	12,3*	8,1 ; 16,9	7,6*	4,4 ; 11,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	11,9	8,9 ; 15,4	12,2*	7,5 ; 17,6	11,6*	7,2 ; 16,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	12,7	9,6 ; 16,2	13,6*	9,1 ; 18,4	11,7*	7,4 ; 16,5
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	10,2*	6,3 ; 14,7	12,1**	5,3 ; 19,7	8,6**	4,1 ; 13,9
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,047		P = 0,560		P = 0,014	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	15,9*	10,6 ; 21,8	15,6**	6,8 ; 25,3	16,0*	9,5 ; 23,3
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	10,8	9,1 ; 12,6	12,8	10,2 ; 15,7	8,5	6,5 ; 10,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,035		P = 0,083		P = 0,388	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	10,9	8,9 ; 13,0	12,2	9,4 ; 15,3	9,3	6,7 ; 12,0
Étudiants	17,1	21,4	12,9	17,6*	10,7 ; 25,1	22,3**	9,8 ; 35,8	14,1**	6,2 ; 24,1
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	12,4*	7,0 ; 18,1	19,2**	3,2 ; 38,7	10,8**	5,5 ; 16,8
Retraités	7,5	7,0	7,9	7,8*	5,0 ; 10,9	8,5**	4,4 ; 13,3	7,0**	3,1 ; 11,3

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Fréquence des blessures</b>										
Une fois	79,1	79,4	78,8	81,7	75,2 ; 88,1	80,3	71,1 ; 88,7	83,7	74,7 ; 92,1	
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	18,3*	11,9 ; 24,8	19,7*	11,3 ; 28,9	16,3**	7,9 ; 25,3	
<b>Activité pratiquée</b>										
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	19,2*	12,5 ; 26,0	25,4*	15,5 ; 35,2	10,6**	3,5 ; 19,1	
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	10,4*	6,0 ; 15,1	10,9**	4,9 ; 17,8	9,7**	3,4 ; 16,8	
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	24,5	17,9 ; 31,2	29,0*	19,7 ; 38,4	18,2**	9,8 ; 28,4	
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	9,7*	5,5 ; 14,7	5,8**	1,3 ; 11,5	15,1**	7,2 ; 23,8	
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	23,3	17,1 ; 29,8	18,6*	10,9 ; 27,0	29,9*	19,8 ; 40,7	
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	4,7**	1,6 ; 8,5	x	;	6,4**	1,6 ; 12,3	
Autre	12,1	8,1	17,6	8,3*	4,9 ; 12,4	x	;	10,1**	4,9 ; 16,3	
<b>Saison de la blessure</b>										
Hiver	26,0	25,0	27,4	22,0	16,1 ; 28,5	20,7*	12,9 ; 29,6	23,7*	15,1 ; 34,2	
Printemps	21,2	20,7	21,9	21,6	14,9 ; 28,4	20,6*	11,9 ; 30,1	22,9*	13,0 ; 33,5	
Été	29,1	30,3	27,4	28,3	21,5 ; 35,1	28,0*	19,2 ; 38,1	28,6*	18,5 ; 38,8	
Automne	23,7	24,0	23,3	28,2	21,0 ; 35,6	30,7*	20,1 ; 41,3	24,8*	15,3 ; 35,7	
<b>Lieu de la blessure</b>										
Résidence	39,7	32,0	49,8	43,6	35,9 ; 51,4	36,4	26,8 ; 47,2	53,7	41,7 ; 65,4	
Endroit public	28,1	24,8	32,5	21,9*	15,3 ; 28,9	16,9*	9,0 ; 25,8	28,7*	17,8 ; 40,1	
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	25,9	18,2 ; 33,1	33,3*	22,5 ; 43,8	x	;	
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	8,6*	4,7 ; 13,4	13,4**	7,0 ; 21,4	x	;	
<b>Cause de la blessure</b>										
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	6,6**	2,9 ; 11,0	8,9**	3,4 ; 15,9	x	;	
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	x	;	x	;	x	;	
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	11,2*	6,3 ; 15,9	13,3**	6,6 ; 20,5	8,2**	2,4 ; 14,9	
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	8,7**	4,3 ; 14,0	11,3**	4,4 ; 19,6	5,2**	0,3 ; 11,4	
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;	
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	2,7**	0,7 ; 5,6	x	;	3,8**	0,4 ; 8,1	
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	23,3	17,0 ; 30,2	23,6*	15,2 ; 33,0	23,0*	13,5 ; 33,3	
Chute	34,6	30,5	40,3	34,7	27,6 ; 42,1	29,0*	19,4 ; 38,4	42,7	31,2 ; 53,9	
Autres	13,7	12,5	15,3	9,4*	5,5 ; 14,0	9,1**	3,7 ; 15,5	9,9**	4,1 ; 17,1	
<b>Partie du corps atteinte</b>										
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	x	;	x	;	x	;	
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	34,1	26,8 ; 41,5	35,8	25,0 ; 46,4	31,8*	21,6 ; 43,3	
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	31,8	24,7 ; 39,0	31,5	22,2 ; 41,5	32,3*	21,7 ; 43,2	
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	x	;	x	;	x	;	
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	18,5*	12,9 ; 24,6	17,1*	10,0 ; 25,3	20,5*	12,0 ; 29,8	
Autre	11,9	10,9	13,2	11,1*	6,4 ; 16,6	12,0**	5,6 ; 19,7	9,9**	2,8 ; 18,0	

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	4,1**	1,9 ; 6,5	4,0**	0,5 ; 8,2	4,1**	1,3 ; 7,5
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,908		P = 0,550		P = 0,713	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	4,3**	1,4 ; 7,6	x	;	3,8**	0,4 ; 8,1
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	3,9**	0,4 ; 8,6	x	;	x	;
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,716		P = 0,892		P = 0,530	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	x	;	x	;	x	;
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	3,9**	1,2 ; 6,9	x	;	4,9**	0,8 ; 10,2
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,515		P = 0,250		P = 0,822	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	3,4**	0,9 ; 6,2	x	;	3,9**	0,7 ; 7,6
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,133		P = 0,028		P = 0,700	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	7,3**	1,0 ; 14,8	x	;	x	;
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	2,7**	0,6 ; 5,2	x	;	3,8**	0,7 ; 7,5
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,002		P = .		P = 0,054	
Oui	5,9	3,6*	7,3	8,8**	3,4 ; 15,1	x	;	8,4**	1,6 ; 16,7
Non	2,7*	2,2**	3,1*	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,017		P = 0,008		P = 0,172	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	10,5**	2,7 ; 19,5	x	;	x	;
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	2,2**	0,2 ; 4,6	x	;	x	;
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,646		P = 0,700		P = .	
Résidence	62,7	52,8	68,6	57,0*	28,3 ; 82,6	x	;	50,6**	18,1 ; 84,3
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	x	;	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	50,7**	15,6 ; 81,6	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	x	;	x	;	x	;
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	x	;	x	;	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	43,9**	9,6 ; 77,2	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	13,2	11,5 ; 14,8	14,6	11,9 ; 17,2	11,7	9,4 ; 14,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,008		P = 0,148		P = 0,086	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	13,6*	7,9 ; 19,4	16,8*	8,9 ; 25,9	10,1**	2,8 ; 18,7
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	15,1	12,1 ; 18,2	15,8	11,0 ; 20,5	14,3	10,5 ; 18,4
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	14,5	11,7 ; 17,5	15,7	11,4 ; 20,1	13,2	9,6 ; 17,0
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	5,1**	2,5 ; 7,9	6,3**	1,9 ; 11,2	4,0**	1,2 ; 7,2
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,436		P = 0,449		P = 0,760	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	9,8*	6,9 ; 12,7	11,9*	6,9 ; 17,2	7,8*	4,5 ; 11,5
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	12,9	10,2 ; 15,7	13,4	9,4 ; 17,4	12,3*	8,8 ; 16,4
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	14,7	11,5 ; 17,8	17,3	12,6 ; 22,1	11,8*	8,0 ; 15,8
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	12,7**	6,6 ; 19,3	x	;	12,8**	5,8 ; 20,5
Autre	11,4	12,8*	10,2*	9,9**	2,5 ; 18,1	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,025		P = 0,026		P = 0,581	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	10,7	7,7 ; 13,6	11,4*	7,4 ; 15,8	9,8*	5,9 ; 13,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	15,5	11,9 ; 19,1	17,9	12,5 ; 23,6	13,2*	8,5 ; 18,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	11,7	8,7 ; 15,0	12,1*	7,4 ; 17,1	11,2*	7,4 ; 15,7
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	18,4*	12,7 ; 24,5	23,5*	13,3 ; 34,3	13,9*	8,0 ; 20,5
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,637		P = 0,871		P = 0,733	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	12,0*	7,5 ; 16,7	13,3**	5,9 ; 21,5	11,2**	5,6 ; 17,3
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	13,3	11,4 ; 15,2	14,1	11,2 ; 17,0	12,4	9,8 ; 15,2
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,368		P = 0,888		P = 0,139	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	15,7*	10,0 ; 21,7	14,2**	5,4 ; 23,6	17,0*	9,0 ; 25,3
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	13,1	11,4 ; 15,0	14,9	12,1 ; 17,8	11,2	8,9 ; 13,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,040		P = 0,174		P = 0,169	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	14,9	12,7 ; 17,1	15,9	12,4 ; 19,1	13,6	10,7 ; 16,8
Étudiants	9,9	9,7	10,1	13,6*	7,1 ; 20,4	19,8**	8,9 ; 32,5	9,1**	2,0 ; 17,8
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	13,7*	7,8 ; 19,9	x	;	14,3*	7,7 ; 21,4
Retraités	6,9	6,7	7,0	7,6*	4,8 ; 10,4	9,1*	4,8 ; 13,6	5,8**	2,8 ; 9,2

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,804				
Oui	45,2	47,6	42,8	48,3	41,4 ; 55,7	49,0	39,2 ; 59,0	47,3	36,6 ; 58,0	
Non	54,8	52,4	57,2	51,7	44,3 ; 58,6	51,0	41,0 ; 60,8	52,7	42,0 ; 63,4	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,279				
Oui	25,4	27,6	23,1	19,3	13,4 ; 25,8	22,3*	14,4 ; 31,6	15,3**	6,9 ; 25,2	
Non	74,6	72,4	76,9	80,7	74,2 ; 86,6	77,7	68,4 ; 85,6	84,7	74,8 ; 93,1	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,149				
Oui	17,6	15,6	19,6	18,7	13,2 ; 24,6	15,1*	8,5 ; 22,2	23,5*	14,4 ; 33,2	
Non	82,4	84,4	80,4	81,3	75,4 ; 86,8	84,9	77,8 ; 91,5	76,5	66,8 ; 85,6	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,479				
Oui	8,1	7,2	9,0	9,6*	5,7 ; 14,1	8,2**	3,0 ; 14,7	11,5**	5,5 ; 18,5	
Non	91,9	92,8	91,0	90,4	85,9 ; 94,3	91,8	85,3 ; 97,0	88,5	81,5 ; 94,5	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 0,974				
Cou	3,1	1,8*	4,3	6,1**	2,7 ; 9,9	5,4**	1,3 ; 10,6	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	56,0	48,8 ; 63,1	53,9	43,8 ; 63,5	58,7	48,8 ; 69,4	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	18,6*	12,6 ; 25,0	21,1*	12,6 ; 30,1	15,2**	7,0 ; 24,2	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	2,5**	0,7 ; 4,7	x	;	x	;	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	13,6*	9,1 ; 18,6	13,5*	7,4 ; 20,4	13,7*	7,3 ; 20,9	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	3,3**	1,0 ; 6,0	x	;	3,3**	0,3 ; 7,3	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	30,1	27,9 ; 32,4	26,2	23,0 ; 29,5	34,3	31,1 ; 37,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,015		P = 0,070		P = 0,107	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	21,1	14,7 ; 27,9	17,1*	9,5 ; 26,3	25,2*	14,7 ; 36,7
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	30,2	26,3 ; 34,0	26,6	21,1 ; 32,5	33,9	28,6 ; 39,4
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	32,3	28,7 ; 36,1	26,6	21,7 ; 31,6	38,6	33,3 ; 43,7
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	33,5	28,3 ; 39,0	33,4	25,5 ; 42,0	33,5	26,8 ; 40,5
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,268		P = 0,522		P = 0,318	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	31,1	26,6 ; 35,5	23,4	17,0 ; 29,9	38,1	31,6 ; 44,1
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	31,6	27,9 ; 35,4	28,9	24,1 ; 34,3	34,5	29,3 ; 40,2
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	27,3	23,2 ; 31,4	24,4	19,3 ; 30,0	30,5	24,7 ; 36,4
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	35,4	27,1 ; 44,0	32,1*	17,1 ; 49,8	37,2	27,2 ; 48,0
Autre	34,0	32,4	35,4	31,9*	19,4 ; 44,7	21,9**	8,1 ; 38,7	43,8*	24,4 ; 62,6
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,051		P = 0,083		P = 0,580	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	33,0	28,9 ; 37,4	29,7	23,9 ; 35,9	36,7	30,7 ; 42,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	32,1	27,3 ; 36,5	29,3	22,7 ; 35,9	34,9	28,0 ; 41,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	25,9	22,1 ; 30,3	21,8	16,3 ; 27,5	30,8	24,9 ; 37,2
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	27,6	21,8 ; 33,7	19,7*	11,6 ; 28,6	34,3	26,5 ; 43,6
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,001		P = 0,444		P = 0,002	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	40,0	33,4 ; 46,6	29,9*	20,3 ; 41,2	46,2	37,9 ; 53,9
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	28,9	26,4 ; 31,5	26,1	22,6 ; 29,7	32,0	28,4 ; 35,7
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,002		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	50,2	42,5 ; 57,9	41,8	30,6 ; 54,5	57,7	47,5 ; 67,7
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	27,8	25,5 ; 30,2	24,3	21,1 ; 27,7	31,5	28,1 ; 34,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,019		P = 0,246	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	29,7	26,7 ; 32,6	25,8	21,8 ; 29,8	34,8	30,5 ; 39,1
Étudiants	20,7	14,8	26,3	20,0*	12,5 ; 27,8	12,7**	3,9 ; 23,1	25,3*	14,1 ; 37,4
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	38,8	30,6 ; 47,0	40,4*	21,1 ; 62,3	38,4	29,5 ; 47,7
Retraités	34,2	30,5	37,2	33,5	28,9 ; 38,4	32,4	25,4 ; 39,4	34,9	28,5 ; 41,9
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	20,7	17,9 ; 23,6	17,2	13,4 ; 21,3	24,2	20,3 ; 28,4
Bon	33,9	28,1	39,6	33,0	29,4 ; 36,8	27,3	22,3 ; 32,7	39,6	34,0 ; 45,2
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	58,8	51,5 ; 66,1	57,6	46,2 ; 69,2	59,9	50,2 ; 69,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	53,6	47,9 ; 59,3	45,8	37,2 ; 54,7	60,3	52,9 ; 67,4
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	24,0	21,8 ; 26,5	20,9	17,7 ; 24,2	27,4	24,0 ; 31,1
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,003		P = 0,003	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	36,4**	13,7 ; 59,4	x	;	41,7**	16,9 ; 65,9
Poids normal	28,3	22,9	32,1	24,5	21,2 ; 28,0	20,4	15,2 ; 25,8	27,6	23,4 ; 32,1
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	30,2	26,5 ; 33,9	24,3	19,7 ; 29,0	39,0	32,9 ; 45,0
Obésité	37,9	30,5	46,1	39,7	34,3 ; 45,5	36,1	28,6 ; 43,7	45,1	36,5 ; 53,9

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,001					
Oui	30,3	25,3	35,2	30,1	27,9 ; 32,4	26,2	23,0 ; 29,5	34,3	31,1 ; 37,5		
Non	69,7	74,7	64,8	69,9	67,6 ; 72,1	73,8	70,5 ; 77,0	65,7	62,5 ; 68,9		
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,001					
Oui	9,5	6,4	12,5	10,0	8,5 ; 11,5	7,6	5,7 ; 9,6	12,6	10,2 ; 14,8		
Non	90,5	93,6	87,5	90,0	88,5 ; 91,5	92,4	90,4 ; 94,3	87,4	85,2 ; 89,8		
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,013					
Oui	14,5	12,2	16,7	13,6	12,0 ; 15,3	11,5	9,3 ; 13,8	15,8	13,5 ; 18,4		
Non	85,5	87,8	83,3	86,4	84,7 ; 88,0	88,5	86,2 ; 90,7	84,2	81,6 ; 86,5		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,067					
Oui	13,5	10,8	16,1	14,0	12,4 ; 15,6	12,5	10,1 ; 15,0	15,6	13,4 ; 17,8		
Non	86,5	89,2	83,9	86,0	84,4 ; 87,6	87,5	85,0 ; 89,9	84,4	82,2 ; 86,6		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,001					
Oui	14,5	11,8	17,2	14,5	12,9 ; 16,2	11,6	9,5 ; 13,9	17,6	15,2 ; 20,1		
Non	85,5	88,2	82,8	85,5	83,8 ; 87,1	88,4	86,1 ; 90,5	82,4	79,9 ; 84,8		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,989					
Oui	17,8	16,0	19,6	18,3	16,5 ; 20,4	18,3	15,6 ; 21,2	18,4	15,8 ; 21,0		
Non	82,2	84,0	80,4	81,7	79,6 ; 83,5	81,7	78,8 ; 84,4	81,6	79,0 ; 84,2		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	14,2	10,6	17,8	13,0	11,4 ; 14,6	8,8	6,8 ; 10,8	17,6	15,1 ; 20,2		
Non	85,8	89,4	82,2	87,0	85,4 ; 88,6	91,2	89,2 ; 93,2	82,4	79,8 ; 84,9		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	52,9	50,4 ; 55,4	35,7	33,4 ; 38,0	11,4	9,7 ; 13,1
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	52,6	34,1	13,3	47,9	44,2 ; 51,6	37,7	34,2 ; 41,4	14,4	11,8 ; 17,2
Femmes	60,1	29,8	10,1	58,2	54,8 ; 61,4	33,6	30,5 ; 36,8	8,3	6,4 ; 10,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,002					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	57,3	49,2 ; 65,3	31,6	24,1 ; 39,2	11,1*	6,1 ; 16,6
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	59,2	54,9 ; 63,5	29,9	26,0 ; 33,8	10,9	7,9 ; 14,0
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	49,5	45,7 ; 53,2	38,9	35,1 ; 42,7	11,6	9,0 ; 14,4
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	42,0	35,9 ; 48,0	45,7	39,5 ; 52,0	12,3*	8,5 ; 16,7
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,033					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	52,5	47,6 ; 57,6	35,5	31,0 ; 40,3	11,9	8,8 ; 15,1
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	50,8	46,7 ; 54,9	39,1	35,3 ; 43,3	10,0	7,5 ; 12,7
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	57,1	52,6 ; 61,6	32,0	27,9 ; 36,2	10,9	8,1 ; 13,9
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	50,3	40,4 ; 59,6	36,0	27,2 ; 45,2	13,7*	8,0 ; 20,3
Autre	48,0	34,3	17,7	37,3*	23,8 ; 51,7	40,0*	26,4 ; 54,6	22,7**	9,9 ; 36,1
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,509					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	53,0	50,4 ; 55,4	35,8	33,5 ; 38,3	11,2	9,5 ; 12,8
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	52,0**	17,8 ; 81,0	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,009					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	54,2	51,6 ; 56,6	35,0	32,7 ; 37,4	10,9	9,3 ; 12,5
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	31,7*	18,5 ; 45,7	48,0*	32,6 ; 63,2	20,3**	8,6 ; 32,9
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	30,7**	13,9 ; 50,1	46,7*	26,6 ; 65,6	22,7**	7,5 ; 40,5
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	41,9	37,4 ; 46,4	40,5	36,3 ; 44,9	17,6	14,1 ; 21,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	50,7	45,6 ; 56,0	38,5	33,6 ; 43,2	10,8	7,6 ; 14,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	61,0	56,4 ; 65,7	32,5	28,0 ; 37,2	6,5*	4,0 ; 9,3
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	69,6	63,4 ; 75,4	23,5	18,2 ; 29,4	6,9*	3,7 ; 10,5
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	40,3	33,4 ; 46,9	38,4	32,0 ; 45,2	21,3	15,5 ; 27,7
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	56,7	54,0 ; 59,5	34,1	31,5 ; 36,8	9,2	7,4 ; 11,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	34,0	26,6 ; 41,9	39,3	31,8 ; 47,0	26,7	19,5 ; 33,8
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	55,4	52,7 ; 58,0	35,0	32,5 ; 37,5	9,6	8,0 ; 11,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	54,5	51,3 ; 57,8	33,7	30,7 ; 36,9	11,8	9,7 ; 14,0
Étudiants	62,8	27,9	9,3	64,5	54,9 ; 73,1	30,1	21,8 ; 39,1	5,3**	1,0 ; 10,6
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	42,7	34,8 ; 50,9	39,7	31,6 ; 47,4	17,7*	11,3 ; 24,3
Retraités	49,7	38,1	12,2	45,2	39,9 ; 50,6	43,9	38,6 ; 49,5	10,9*	7,6 ; 14,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	52,9	50,4 ; 55,4	35,7	33,4 ; 38,0	11,4	9,7 ; 13,1
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	44,7	40,0 ; 49,7	36,7	32,1 ; 41,1	18,6	14,7 ; 22,6
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	56,3	53,4 ; 59,2	35,3	32,5 ; 38,1	8,4	6,8 ; 10,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	66,8	63,3 ; 70,1	27,8	24,7 ; 31,1	5,4*	3,7 ; 7,3
Bon	41,4	42,6	16,0	40,5	36,6 ; 44,5	44,6	40,7 ; 48,8	14,8	11,8 ; 18,1
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	35,6	29,0 ; 42,3	39,2	32,2 ; 46,1	25,2	19,1 ; 31,9
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	38,7	33,2 ; 44,5	40,1	34,5 ; 45,4	21,2	16,8 ; 26,1
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	56,5	53,6 ; 59,3	34,8	32,1 ; 37,6	8,7	7,0 ; 10,5
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,002					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	47,7	42,3 ; 53,1	44,4	38,9 ; 49,9	7,9*	4,9 ; 11,1
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	53,9	51,2 ; 56,8	34,0	31,4 ; 36,6	12,1	10,2 ; 14,0
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	57,7	54,8 ; 60,3	34,1	31,6 ; 36,8	8,2	6,7 ; 9,8
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	32,5	27,4 ; 38,3	42,1	36,2 ; 47,9	25,4	19,6 ; 31,0
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	63,2	58,4 ; 68,3	28,2	23,7 ; 32,9	8,5*	5,8 ; 11,4
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	49,9	46,5 ; 53,3	36,4	33,3 ; 39,7	13,7	11,3 ; 16,2

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	16,0	14,6 ; 17,6	13,4	11,3 ; 15,6	18,8	16,7 ; 20,9
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	1,3**	0,5 ; 2,3	x	;	1,7**	0,4 ; 3,3
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	23,5	20,4 ; 26,8	19,5	15,1 ; 24,1	27,7	23,0 ; 32,7
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	49,8	43,8 ; 56,1	44,1	35,3 ; 53,7	54,9	47,4 ; 62,3
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,130		P = 0,798		P = 0,010	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	46,0	38,7 ; 53,3	44,7	33,8 ; 56,2	47,3	38,0 ; 57,2
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	57,1	46,6 ; 68,0	42,2*	24,0 ; 61,0	68,7	56,0 ; 80,8
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	65,3**	24,3 ; 100,0	x	;	68,1**	20,5 ; 100,0
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	26,8	23,4 ; 30,3	21,8	17,3 ; 26,6	32,1	27,3 ; 37,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	13,1	10,4 ; 16,1	11,3*	7,2 ; 16,0	14,9	10,9 ; 19,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	9,9	7,1 ; 12,6	9,8*	6,1 ; 13,7	10,0*	6,0 ; 14,5
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	5,2*	2,8 ; 7,9	x	;	7,8**	3,8 ; 12,4
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,089		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	29,1	23,6 ; 34,9	19,9*	11,7 ; 29,7	33,9	26,8 ; 41,4
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	14,2	12,5 ; 16,0	13,2	10,8 ; 15,7	15,4	12,9 ; 17,9
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,435		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	25,2	19,0 ; 31,6	16,1*	8,7 ; 25,0	33,0	24,7 ; 42,8
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	14,7	13,2 ; 16,4	13,0	10,8 ; 15,5	16,5	14,3 ; 18,9

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	81,5	79,6 ; 83,4	15,7	13,8 ; 17,5	2,8*	2,0 ; 3,7
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	72,8	69,4 ; 76,0	22,5	19,4 ; 25,8	4,6*	3,1 ; 6,2
Femmes	87,9	11,3	0,7	90,5	88,3 ; 92,5	8,5	6,7 ; 10,5	1,0**	0,3 ; 1,8
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,018					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	85,2	79,1 ; 90,7	12,5*	7,1 ; 18,3	2,3**	0,2 ; 5,0
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	85,4	82,1 ; 88,7	11,7	8,8 ; 14,7	2,9**	1,3 ; 4,9
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	79,3	76,1 ; 82,3	18,5	15,6 ; 21,6	2,2**	1,1 ; 3,5
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	73,7	68,7 ; 79,2	21,2	15,9 ; 25,9	5,1**	2,6 ; 8,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,832					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	78,7	74,3 ; 82,8	19,0	15,0 ; 23,2	2,3**	0,9 ; 3,9
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	79,9	76,5 ; 83,1	17,2	14,1 ; 20,3	2,9*	1,6 ; 4,5
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	83,6	80,0 ; 87,0	13,7	10,6 ; 17,0	2,7**	1,2 ; 4,4
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	85,1	78,2 ; 91,3	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	75,6	62,8 ; 87,4	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,910					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	80,8	78,5 ; 83,0	16,5	14,4 ; 18,7	2,7*	1,7 ; 3,7
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	84,2	78,7 ; 89,4	13,6*	8,5 ; 18,9	2,3**	0,3 ; 4,6
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	81,9	75,1 ; 88,0	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	82,3	70,4 ; 92,2	11,1**	2,7 ; 21,3	6,6**	0,3 ; 15,1
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,337					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	73,7	69,4 ; 77,5	21,2	17,5 ; 25,0	5,1*	3,3 ; 7,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	86,1	82,6 ; 89,4	11,0	7,9 ; 14,2	2,9**	1,2 ; 4,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	84,8	81,2 ; 88,3	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	86,8	81,6 ; 91,9	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,004					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	74,8	68,6 ; 80,6	18,2	13,0 ; 23,9	6,9**	3,3 ; 11,0
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	82,6	80,3 ; 84,7	15,0	13,0 ; 17,1	2,4*	1,5 ; 3,5
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	67,7	60,3 ; 75,0	23,6	16,7 ; 30,6	8,8**	4,1 ; 14,1
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	83,2	81,2 ; 85,1	14,7	12,8 ; 16,5	2,1*	1,4 ; 3,0
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,232					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	82,3	79,7 ; 84,8	15,3	13,0 ; 17,7	2,4*	1,3 ; 3,7
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	89,0	82,5 ; 94,8	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	83,3	77,0 ; 89,1	12,9*	7,6 ; 18,6	3,8**	0,7 ; 7,7
Retraités	72,9	23,2	3,8	74,4	69,8 ; 78,9	20,6	16,0 ; 24,8	5,0*	2,7 ; 7,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	81,5	79,6 ; 83,4	15,7	13,8 ; 17,5	2,8*	2,0 ; 3,7
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,053					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	78,3	74,0 ; 82,4	17,4	13,8 ; 21,2	4,3**	2,1 ; 6,7
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	82,8	80,6 ; 85,0	14,9	12,8 ; 17,1	2,2*	1,4 ; 3,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	86,5	84,1 ; 88,9	12,0	9,7 ; 14,2	1,6**	0,6 ; 2,7
Bon	75,1	21,2	3,6	77,8	74,2 ; 81,2	18,5	15,3 ; 21,8	3,7*	2,2 ; 5,4
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	73,2	66,6 ; 79,2	21,6	16,1 ; 27,6	5,2**	2,0 ; 8,8
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	77,2	19,2	3,6	72,2	66,7 ; 77,5	21,7	16,8 ; 26,6	6,1*	3,3 ; 9,2
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	84,0	81,8 ; 86,0	13,9	12,0 ; 15,9	2,1*	1,3 ; 2,9
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,014					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	75,0	69,8 ; 80,0	21,0	16,3 ; 25,9	4,1**	1,9 ; 6,6
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	82,8	80,7 ; 84,8	14,6	12,7 ; 16,6	2,6*	1,7 ; 3,6
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,091					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	93,4	90,7 ; 95,9	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	77,9	75,1 ; 80,7	18,5	15,9 ; 21,2	3,5*	2,3 ; 4,9

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	81,5	79,6 ; 83,4	72,8	69,4 ; 76,0	90,5	88,3 ; 92,5
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	15,7	13,8 ; 17,5	22,5	19,4 ; 25,8	8,5	6,7 ; 10,5
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	2,8*	2,0 ; 3,7	4,6*	3,1 ; 6,2	1,0**	0,3 ; 1,8
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,094					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	75,0	69,8 ; 80,0	59,4	49,9 ; 68,4	86,5	81,7 ; 91,0
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	21,0	16,3 ; 25,9	32,2	23,7 ; 41,0	x	;
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	4,1**	1,9 ; 6,6	8,4**	3,8 ; 14,0	x	;
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	82,8	80,7 ; 84,8	74,9	71,4 ; 78,4	91,4	89,0 ; 93,6
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	14,6	12,7 ; 16,6	21,0	17,8 ; 24,3	7,6	5,5 ; 9,9
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	2,6*	1,7 ; 3,6	4,0*	2,5 ; 5,7	1,0**	0,1 ; 2,1

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	30,8	28,3 ; 33,3	14,6	12,7 ; 16,6	54,7	51,7 ; 57,3
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	21,9	18,6 ; 25,2	11,4	8,9 ; 14,1	66,7	62,9 ; 70,5
Femmes	41,7	18,2	40,1	40,5	36,6 ; 44,8	18,0	14,9 ; 21,2	41,5	37,3 ; 45,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,018					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	39,4	31,4 ; 47,6	10,4*	5,6 ; 15,7	50,2	42,1 ; 58,2
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	27,7	23,9 ; 31,6	17,2	14,2 ; 20,5	55,0	50,7 ; 59,2
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	29,6	25,8 ; 33,8	15,2	11,9 ; 18,7	55,2	50,7 ; 59,7
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	31,3	23,5 ; 39,5	7,7**	3,4 ; 12,8	61,0	52,5 ; 69,5
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,020					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	30,5	25,5 ; 35,7	9,8*	6,8 ; 13,0	59,8	54,5 ; 65,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	32,4	27,3 ; 37,9	14,4	10,7 ; 18,2	53,2	47,9 ; 58,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	31,9	27,1 ; 36,9	16,4	12,9 ; 20,2	51,7	46,3 ; 56,9
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	27,2	21,3 ; 33,6	21,4*	15,2 ; 27,9	51,4	43,8 ; 58,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,134					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	25,8	18,0 ; 33,4	11,2**	5,6 ; 17,7	63,0	54,4 ; 71,3
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	31,4	28,7 ; 34,4	15,3	13,2 ; 17,6	53,3	50,1 ; 56,2
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,041					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	29,8	26,7 ; 32,8	16,4	14,0 ; 18,9	53,9	50,6 ; 57,1
Étudiants	28,8	16,3	54,9	40,1	30,8 ; 49,9	9,5**	4,1 ; 15,7	50,4	40,8 ; 59,8
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	29,2*	19,9 ; 39,5	13,8*	7,4 ; 21,0	57,1	46,7 ; 67,2
Retraités	38,0	12,4	49,6	27,3	20,9 ; 33,8	9,9*	6,0 ; 14,5	62,8	55,7 ; 69,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
1,8*	1,1 ; 2,6	40,7	38,4 ; 43,2	36,6	34,2 ; 39,1	20,9	18,8 ; 22,8	Ensemble de la population	
P = 0,045									
x	;	33,5	30,2 ; 36,9	42,2	38,4 ; 45,9	x	;	Sexe	
3,3*	2,0 ; 4,8	48,6	45,2 ; 52,0	30,5	27,6 ; 33,7	17,6	15,1 ; 20,1	Hommes	
P = 0,369									
x	;	70,5	58,2 ; 82,2	20,1**	9,7 ; 30,9	x	;	Femmes	
6,0**	0,8 ; 12,5	56,1	44,7 ; 67,3	25,3*	15,8 ; 35,3	12,6**	4,4 ; 22,0	Groupe d'âge	
P = 0,000									
4,6**	0,8 ; 9,0	62,9	54,9 ; 71,2	22,8*	15,7 ; 30,3	9,7**	4,8 ; 15,4	15-17 ans	
1,7**	0,5 ; 3,1	42,6	38,3 ; 46,9	33,1	29,0 ; 37,4	22,6	18,9 ; 26,4	25-44 ans	
1,2**	0,5 ; 2,0	32,1	28,5 ; 35,5	42,7	38,9 ; 46,6	24,0	20,7 ; 27,5	45-64 ans	
x	;	36,7	31,3 ; 42,7	42,8	36,9 ; 49,1	x	;	65 ans et plus	
P = 'n.d.'									
x	;	66,0	47,6 ; 82,8	23,4**	8,3 ; 40,0	x	;	Hommes	
x	;	49,7	34,5 ; 65,5	31,8*	18,4 ; 47,1	x	;	15-17 ans	
P = 'n.d.'									
x	;	56,7	45,2 ; 68,3	28,2*	18,2 ; 39,1	x	;	18-24 ans	
x	;	35,1	29,1 ; 41,5	40,6	34,1 ; 47,2	x	;	15-24 ans	
x	;	24,7	19,9 ; 29,5	47,8	42,2 ; 53,7	x	;	25-44 ans	
x	;	29,3*	20,9 ; 38,6	45,7	35,8 ; 55,5	x	;	45-64 ans	
P = 0,823									
x	;	74,7	57,1 ; 91,1	17,0**	3,5 ; 33,1	x	;	65 ans et plus	
x	;	64,7	46,1 ; 82,0	16,5**	3,2 ; 31,9	x	;	Femmes	
P = 0,183									
x	;	69,9	57,4 ; 82,1	16,8**	7,4 ; 27,4	x	;	15-17 ans	
3,0**	0,8 ; 5,2	50,9	44,9 ; 56,7	24,8	20,1 ; 29,9	21,4	16,2 ; 26,5	15-24 ans	
2,4**	0,9 ; 4,1	40,3	34,7 ; 45,8	37,1	31,9 ; 42,3	20,2	16,1 ; 24,6	25-44 ans	
x	;	43,7	36,3 ; 51,4	40,1	32,5 ; 47,8	x	;	45-64 ans	
P = 0,296									
2,0**	0,6 ; 3,8	36,2	32,0 ; 40,7	37,2	33,1 ; 41,5	24,6	20,5 ; 28,5	65 ans et plus	
2,3**	0,9 ; 3,9	43,0	38,1 ; 47,8	35,7	30,8 ; 40,7	19,0	15,2 ; 23,0	Niveau de scolarité	
1,7**	0,3 ; 3,3	40,1	35,2 ; 44,8	37,4	32,6 ; 42,4	20,9	16,9 ; 24,9	Niveau inférieur au DES	
x	;	49,9	42,6 ; 56,8	34,0	27,4 ; 40,9	x	;	Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 'n.d.'									
x	;	31,9	25,8 ; 38,4	39,0	33,0 ; 45,6	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
x	;	31,4	25,0 ; 38,1	42,8	35,8 ; 50,2	x	;	Diplôme d'études universitaires	
x	;	33,7	27,2 ; 40,5	44,8	37,5 ; 51,5	x	;	Hommes	
x	;	41,6	30,4 ; 53,1	41,9	30,8 ; 52,5	x	;	Niveau inférieur au DES	
P = 0,395									
4,3**	1,3 ; 8,0	40,9	34,8 ; 47,1	35,2	29,4 ; 41,3	19,6	14,8 ; 24,4	Diplôme d'études secondaires (DES)	
3,6**	1,3 ; 6,1	54,7	47,5 ; 61,8	28,6	22,1 ; 35,3	13,2*	8,7 ; 18,1	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
2,9**	0,3 ; 6,1	47,7	40,6 ; 54,6	28,6	22,4 ; 34,8	20,8	15,2 ; 26,4	Diplôme d'études universitaires	
x	;	57,9	48,5 ; 66,9	26,6	18,5 ; 35,2	x	;	Indice du niveau de revenu du ménage	
P = 0,414									
x	;	47,3	40,2 ; 54,3	30,0	23,7 ; 36,2	x	;	Quintile 1 (faible)	
1,4*	0,7 ; 2,2	41,3	38,6 ; 44,2	37,2	34,6 ; 40,0	20,0	17,8 ; 22,3	Quintile 2 et suivants	
P = 'n.d.'									
x	;	51,9	39,3 ; 63,7	34,3*	23,4 ; 46,4	x	;	Hommes	
x	;	32,6	28,9 ; 36,4	43,4	39,2 ; 47,7	x	;	Quintile 1 (faible)	
P = 0,466									
x	;	44,9	36,3 ; 53,5	27,8	20,4 ; 35,1	x	;	Quintile 2 et suivants	
3,1*	1,5 ; 4,7	51,5	47,5 ; 55,3	30,1	26,7 ; 33,7	15,4	12,6 ; 18,3	Femmes	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	42,0	39,5 ; 44,3	2,9*	2,1 ; 3,9	55,0	52,6 ; 57,5
Sexe	P = 0,000			P = 0,725					
Hommes	36,6	3,6	59,9	41,1	37,5 ; 44,7	3,2*	1,9 ; 4,6	55,7	52,0 ; 59,2
Femmes	40,5	2,3	57,1	42,9	39,7 ; 46,3	2,7*	1,4 ; 4,1	54,4	51,0 ; 57,8
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	18,8*	12,1 ; 25,7	6,8**	2,7 ; 11,5	74,5	67,1 ; 82,1
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	41,5	37,3 ; 45,7	1,6**	0,6 ; 2,7	56,9	52,6 ; 61,1
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	52,4	48,7 ; 56,4	3,0*	1,6 ; 4,4	44,6	40,8 ; 48,5
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	39,1	33,3 ; 44,9	2,0**	0,6 ; 3,7	58,8	53,0 ; 64,7
Hommes	P = 0,000			P = 0,005					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	19,9*	10,5 ; 30,0	8,0**	2,4 ; 14,8	72,1	61,3 ; 82,1
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	37,8	31,8 ; 44,1	2,1**	0,6 ; 4,1	60,0	53,6 ; 66,1
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	51,5	46,1 ; 57,2	2,8**	1,0 ; 4,9	45,7	40,2 ; 51,2
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	43,2	33,9 ; 52,6	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,202					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	17,6**	8,8 ; 27,9	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	45,5	39,7 ; 51,3	x	;	x	;
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	53,5	48,1 ; 59,0	3,1**	1,1 ; 5,4	43,4	38,0 ; 48,8
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	35,5	28,3 ; 42,9	2,6**	0,5 ; 5,3	61,9	54,3 ; 69,2
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	40,5**	16,2 ; 61,8	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	9,5	7,4 ; 11,7	5,0**	3,4 ; 6,9	85,5	82,8 ; 88,0
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	53,0	48,7 ; 57,2	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	89,6	86,0 ; 92,9	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	3,3**	1,4 ; 5,6	8,1*	4,9 ; 11,8	88,6	84,5 ; 92,2
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	45,3	39,6 ; 51,3	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	88,1	82,4 ; 92,9	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	38,0**	11,9 ; 62,0	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	14,2	10,6 ; 17,7	2,6**	1,1 ; 4,5	83,2	79,5 ; 86,8
Embonpoint	69,6	x	x	64,7	58,7 ; 70,8	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	92,0	87,1 ; 96,1	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	81,7	78,3 ; 85,0	8,9	6,7 ; 11,2	9,4	6,8 ; 12,1
Sexe	P = 0,000			P = 0,019					
Hommes	81,4	10,5	8,0	81,8	76,6 ; 86,9	6,0*	3,2 ; 9,1	12,2*	7,7 ; 16,8
Femmes	74,5	14,1	11,5	81,6	77,1 ; 85,7	11,4	8,0 ; 15,1	7,0*	4,3 ; 10,1
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,825					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	78,6	64,8 ; 90,9	9,3**	1,3 ; 19,1	12,1**	2,0 ; 24,1
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	81,0	75,5 ; 86,4	10,9*	6,8 ; 15,2	8,1**	4,3 ; 12,6
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	81,9	77,0 ; 86,9	7,8*	4,6 ; 11,4	10,3*	6,1 ; 14,6
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	86,1	78,6 ; 93,1	5,7**	1,1 ; 11,0	8,2**	2,8 ; 14,7
Hommes	P = 0,252			P = 0,934					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	83,4	64,8 ; 99,5	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	79,8	69,7 ; 89,3	8,5**	2,8 ; 14,7	11,7**	4,0 ; 20,1
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	79,9	71,9 ; 88,3	6,8**	2,3 ; 12,2	13,4**	6,0 ; 21,1
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	92,2	81,6 ; 100,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,910					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	74,3	52,6 ; 92,8	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	82,0	75,2 ; 88,3	12,8*	7,4 ; 18,6	5,2**	1,7 ; 9,4
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	83,8	77,5 ; 89,5	8,7**	4,3 ; 13,7	7,5**	3,4 ; 12,3
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	80,4	67,9 ; 91,4	11,0**	2,3 ; 20,3	8,6**	1,2 ; 18,1
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,130					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	87,0	79,8 ; 92,9	7,7**	3,6 ; 12,3	5,3**	1,0 ; 10,9
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	83,8	79,2 ; 88,2	8,9*	5,3 ; 12,5	7,3*	4,1 ; 10,9
Obésité	72,3	14,4	13,3	75,8	69,4 ; 82,2	9,2*	5,1 ; 13,4	15,0*	9,4 ; 20,9
Hommes	P = 0,002			P = 0,687					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	85,9	70,1 ; 98,8	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	88,4	81,6 ; 94,1	5,9**	2,0 ; 10,5	5,8**	1,6 ; 10,8
Obésité	76,0	12,2	11,8	74,1	64,7 ; 83,3	6,3**	1,7 ; 11,8	19,6*	10,9 ; 28,4
Femmes	P = 0,161			P = 0,685					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	87,4	79,7 ; 94,0	8,4**	3,4 ; 14,4	4,1**	0,2 ; 9,9
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	79,4	72,3 ; 86,1	11,8*	6,3 ; 18,0	8,8**	4,2 ; 14,6
Obésité	68,9	16,4	14,7	78,2	69,1 ; 86,6	13,2**	6,0 ; 20,8	8,6**	3,0 ; 15,2

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
18,8	16,8 ; 20,7	17,4	15,5 ; 19,3	2,0*	1,2 ; 2,7	61,8	59,5 ; 64,3	Ensemble de la population	
P = 0,044									
17,1	14,2 ; 19,8	15,9	13,2 ; 18,6	2,4*	1,3 ; 3,5	64,7	61,3 ; 68,2	Sexe	
20,7	18,0 ; 23,5	18,9	16,3 ; 21,6	1,5**	0,7 ; 2,5	58,9	55,5 ; 62,2	Hommes	
P = 0,003									
14,8*	9,0 ; 21,6	14,6*	9,3 ; 20,5	5,7**	2,0 ; 10,0	64,9	57,2 ; 72,3	Femmes	
23,2	19,7 ; 26,9	17,8	14,7 ; 21,3	1,2**	0,5 ; 2,1	57,8	53,4 ; 61,9	Groupe d'âge	
18,4	15,3 ; 21,4	17,7	14,9 ; 20,5	1,2**	0,4 ; 2,1	62,7	59,1 ; 66,4	15-24 ans	
13,7	9,6 ; 17,8	18,3	13,8 ; 23,3	1,8**	0,3 ; 3,8	66,1	60,4 ; 71,7	25-44 ans	
P = 0,475									
15,1**	6,7 ; 24,4	13,0**	5,7 ; 21,0	7,6**	1,9 ; 14,1	64,2	53,4 ; 75,3	45-64 ans	
17,1*	12,1 ; 22,6	18,2	13,4 ; 23,7	1,2**	0,0 ; 2,6	63,5	56,9 ; 69,6	65 ans et plus	
18,6	14,1 ; 23,2	14,1	10,5 ; 18,0	1,5**	0,2 ; 3,0	65,8	60,5 ; 71,4	Hommes	
14,4*	7,8 ; 21,1	18,2*	10,7 ; 26,3	x	;	x	;	15-24 ans	
P = 0,389									
14,5**	6,7 ; 23,8	16,2**	7,8 ; 25,3	x	;	x	;	25-44 ans	
29,5	24,6 ; 34,7	17,4	13,2 ; 21,8	1,3**	0,2 ; 2,6	51,7	45,7 ; 57,5	45-64 ans	
18,2	14,3 ; 22,3	21,6	17,4 ; 25,8	0,9**	0,0 ; 2,1	59,3	54,1 ; 64,5	65 ans et plus	
13,1*	8,0 ; 18,3	18,5*	12,8 ; 24,4	x	;	x	;	Femmes	
P = 0,000									
x	;	x	;	x	;	89,2	75,6 ; 98,9	Statut pondéral	
6,6	4,8 ; 8,4	12,9	10,3 ; 15,7	3,6*	2,2 ; 5,3	76,9	73,6 ; 80,1	Poids insuffisant	
20,4	17,2 ; 23,7	22,2	18,8 ; 25,7	x	;	x	;	Poids normal	
42,8	37,1 ; 48,2	19,4	15,1 ; 24,1	x	;	x	;	Embonpoint	
P = 0,000									
x	;	x	;	x	;	x	;	Obésité	
4,1**	1,7 ; 6,9	7,3*	3,9 ; 11,1	5,6**	2,7 ; 8,7	83,0	78,0 ; 87,9	Hommes	
14,8	11,0 ; 18,9	20,0	15,5 ; 24,8	x	;	x	;	Poids insuffisant	
39,7	31,8 ; 47,4	21,3	15,4 ; 27,9	x	;	x	;	Poids normal	
P = 0,009									
x	;	x	;	x	;	87,6	71,5 ; 98,7	Embonpoint	
8,4*	5,9 ; 11,3	17,2	13,4 ; 21,2	2,2**	0,8 ; 3,7	72,3	67,5 ; 76,8	Obésité	
28,7	23,2 ; 34,5	25,5	20,0 ; 31,1	x	;	x	;	Femmes	
47,5	39,3 ; 55,5	16,6*	11,0 ; 22,9	x	;	x	;	Poids insuffisant	
P = 0,000									
35,7	31,9 ; 39,3	21,3	18,3 ; 24,4	x	;	x	;	Poids normal	
x	;	x	;	17,0**	7,0 ; 29,0	81,8	69,7 ; 91,8	Embonpoint	
7,1	5,4 ; 8,9	15,2	12,8 ; 17,8	2,4*	1,3 ; 3,5	75,3	72,3 ; 78,2	Obésité	
P = 0,000									
Perception à l'égard de son poids									
Excès de poids									
Trop maigre									
À peu près normal(e)									

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
36,5	31,0 ; 42,2	13,0*	9,2 ; 17,2	7,2*	4,0 ; 10,7	43,4	37,7 ; 49,2	Ensemble de la population	
P = 0,299									
37,8	29,4 ; 46,8	9,5**	4,0 ; 15,4	9,8**	3,7 ; 16,4	42,9	33,9 ; 52,7	Sexe	
35,3	27,9 ; 43,3	15,9*	10,5 ; 21,9	5,1**	2,0 ; 8,9	43,7	36,3 ; 51,2	Hommes	
P = 0,867									
47,2*	26,2 ; 73,8	x	;	x	;	22,0**	2,0 ; 44,3	Femmes	
36,1	27,5 ; 44,8	15,1*	8,7 ; 22,1	2,3**	0,1 ; 5,0	46,5	37,6 ; 55,8	Groupe d'âge	
35,6	26,8 ; 44,9	10,6**	5,2 ; 17,1	8,6**	2,8 ; 15,0	45,2	35,8 ; 54,4	15-24 ans	
27,4**	11,5 ; 43,3	11,7**	1,2 ; 24,7	11,7**	1,5 ; 24,8	49,2*	31,5 ; 66,6	25-44 ans	
P = 0,992									
38,5**	10,6 ; 77,5	x	;	x	;	x	;	45-64 ans	
35,7*	19,6 ; 52,8	15,0**	2,3 ; 28,6	x	;	48,3*	31,9 ; 66,3	65 ans et plus	
40,8*	27,4 ; 54,2	8,5**	1,6 ; 17,0	11,1**	1,7 ; 22,0	39,7*	26,6 ; 53,4	Hommes	
x	;	x	;	x	;	54,4*	24,7 ; 83,2	15-24 ans	
P = 0,989									
56,6**	20,7 ; 91,9	x	;	x	;	x	;	25-44 ans	
36,3	25,9 ; 47,2	15,1*	7,7 ; 23,7	x	;	x	;	45-64 ans	
29,7*	17,2 ; 42,9	13,1**	4,7 ; 23,5	x	;	x	;	65 ans et plus	
25,0**	5,9 ; 45,7	21,8**	2,6 ; 44,1	x	;	x	;	Femmes	
P = 0,664									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
46,0*	29,5 ; 61,4	5,6**	0,8 ; 11,9	x	;	x	;	Poids insuffisant	
37,3	28,4 ; 47,0	16,8*	9,8 ; 24,6	4,7**	1,4 ; 8,4	41,1	32,0 ; 49,9	Poids normal	
33,1	24,3 ; 41,8	12,2*	6,6 ; 18,7	9,8**	3,7 ; 16,5	44,9	36,0 ; 54,6	Embonpoint	
P = 0,841									
x	;	x	;	x	;	x	;	Obésité	
58,4**	20,6 ; 88,7	x	;	x	;	37,5**	6,9 ; 74,3	Hommes	
46,4*	32,6 ; 60,5	x	;	5,5**	0,2 ; 12,2	x	;	Poids insuffisant	
29,1*	17,2 ; 41,9	11,2**	3,2 ; 20,1	14,1**	3,7 ; 25,4	45,6*	32,0 ; 59,9	Poids normal	
P = 0,788									
x	;	x	;	x	;	x	;	Embonpoint	
41,5*	23,1 ; 58,7	6,1**	0,1 ; 14,0	x	;	x	;	Obésité	
30,1*	18,9 ; 42,7	23,5*	13,1 ; 34,7	x	;	x	;	Femmes	
37,9*	25,2 ; 50,2	13,4**	5,2 ; 23,1	x	;	x	;	Poids insuffisant	
P = 0,788									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids normal	
41,5*	23,1 ; 58,7	6,1**	0,1 ; 14,0	x	;	x	;	Embonpoint	
30,1*	18,9 ; 42,7	23,5*	13,1 ; 34,7	x	;	x	;	Obésité	
37,9*	25,2 ; 50,2	13,4**	5,2 ; 23,1	x	;	x	;		

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	84,7	81,5 ; 87,7	7,9	5,6 ; 10,3	7,5*	5,3 ; 9,9
Sexe	P = 0,001			P = 0,862					
Hommes	88,9	6,9	4,2	83,9	79,0 ; 88,5	7,9*	4,6 ; 11,9	8,2*	4,5 ; 11,9
Femmes	85,7	7,5	6,8	85,3	81,4 ; 89,0	7,8*	4,9 ; 10,9	6,9*	4,3 ; 9,8
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,642					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	78,9	65,5 ; 91,0	8,3**	0,9 ; 17,7	12,8**	3,0 ; 24,4
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	84,9	79,8 ; 89,6	6,7*	3,6 ; 10,4	8,3*	4,7 ; 12,3
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	84,2	79,1 ; 89,1	9,9*	5,7 ; 14,2	5,9**	3,0 ; 9,3
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	91,2	85,1 ; 96,5	4,6**	0,6 ; 9,4	4,2**	0,7 ; 9,0
Hommes	P = 0,121			P = 0,937					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	81,0	60,3 ; 97,7	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	85,0	76,5 ; 93,2	6,7**	1,7 ; 13,2	8,2**	1,8 ; 15,3
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	80,3	71,7 ; 88,4	12,3**	5,4 ; 19,6	7,4**	2,3 ; 13,5
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	95,0	86,4 ; 100,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,907					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	77,0	56,5 ; 95,0	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	84,9	78,4 ; 90,6	6,8**	2,6 ; 11,8	8,4**	4,1 ; 13,2
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	87,7	82,0 ; 93,0	7,7**	3,3 ; 12,7	4,6**	1,4 ; 8,1
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	87,6	78,0 ; 95,6	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,021					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	91,6	85,9 ; 96,4	3,4**	0,4 ; 7,3	5,1**	1,4 ; 9,8
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	89,2	84,8 ; 92,9	8,3*	4,9 ; 12,2	2,6**	0,8 ; 4,8
Obésité	82,0	8,7	9,2	74,9	68,5 ; 81,2	10,4*	6,1 ; 15,6	14,6*	9,4 ; 20,2
Hommes	P = 0,002			P = 0,677					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	86,3	70,6 ; 99,2	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	92,8	87,6 ; 97,1	x	;	x	;
Obésité	85,2	8,2	6,6*	74,2	65,0 ; 83,1	11,6**	5,2 ; 19,1	14,1**	7,1 ; 22,0
Femmes	P = 0,034			P = 0,447					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	93,3	87,4 ; 98,2	x	;	x	;
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	85,6	78,8 ; 91,8	10,9**	5,5 ; 17,2	3,6**	0,5 ; 7,6
Obésité	79,1	9,2	11,8	75,9	66,7 ; 84,4	8,8**	3,3 ; 14,8	15,4**	7,9 ; 23,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	8,6	6,1 ; 11,3	91,4	88,7 ; 93,9
Sexe	P = 0,024		P = 0,200			
Hommes	6,6	93,4	10,4*	5,9 ; 15,4	89,6	84,6 ; 94,1
Femmes	8,6	91,4	7,0*	4,4 ; 9,8	93,0	90,2 ; 95,6
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,887			
15-24 ans	11,2*	88,8	10,4**	0,5 ; 21,9	89,6	78,1 ; 99,5
25-44 ans	8,0	92,0	9,0*	4,8 ; 13,7	91,0	86,3 ; 95,2
45-64 ans	7,5	92,5	7,4**	3,8 ; 11,4	92,6	88,6 ; 96,2
65 ans et plus	4,9	95,1	9,3**	3,6 ; 15,6	90,7	84,4 ; 96,4
Hommes	P = 0,409		P = 0,655			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	9,1**	1,8 ; 17,7	90,9	82,3 ; 98,2
45-64 ans	7,0	93,0	9,0**	2,5 ; 16,5	91,0	83,5 ; 97,5
65 ans et plus	6,5*	93,5	9,4**	0,3 ; 20,4	90,6	79,6 ; 99,7
Femmes	P = 0,003		P = 0,320			
15-24 ans	12,3*	87,7	x	;	x	;
25-44 ans	9,9	90,1	9,0**	3,9 ; 14,7	91,0	85,3 ; 96,1
45-64 ans	7,8	92,2	5,9**	2,4 ; 10,1	94,1	89,9 ; 97,6
65 ans et plus	3,8*	96,2	9,1**	2,2 ; 17,4	90,9	82,6 ; 97,8
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,007			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	6,1**	2,5 ; 10,4	93,9	89,6 ; 97,5
Embonpoint	6,6	93,4	5,4**	2,6 ; 8,4	94,6	91,6 ; 97,4
Obésité	11,3	88,7	14,1*	8,1 ; 20,3	85,9	79,7 ; 91,9
Hommes	P = 0,000		P = 0,048			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	5,6**	0,9 ; 11,1	94,4	88,9 ; 99,1
Obésité	11,5	88,5	16,8**	8,1 ; 26,2	83,2	73,8 ; 91,9
Femmes	P = 0,032		P = 0,331			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	6,6**	2,7 ; 11,0	93,4	89,0 ; 97,3
Embonpoint	8,4	91,6	5,2**	2,1 ; 8,9	94,8	91,1 ; 97,9
Obésité	11,1	88,9	10,3**	3,5 ; 17,7	89,7	82,3 ; 96,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	0,9**	0,2 ; 1,7	x	;	1,1**	0,2 ; 2,2
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	2,1**	0,6 ; 3,8	x	;	0,9**	0,0 ; 1,9
Rarement	2,8	2,6*	2,9	3,0**	1,5 ; 4,7	3,4**	1,0 ; 6,4	2,7**	1,0 ; 4,6
Jamais	94,8	94,8	94,8	94,0	91,6 ; 96,2	92,4	87,9 ; 96,5	95,4	93,1 ; 97,4
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,195					
Souvent	4,6	4,2	4,9	5,0*	3,0 ; 7,1	6,2**	2,7 ; 10,4	3,9**	2,0 ; 6,1
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	8,1	6,0 ; 10,4	8,3*	4,8 ; 12,0	8,0*	5,2 ; 11,0
Rarement	5,1	5,5	4,9	4,9*	3,1 ; 6,9	6,8**	3,3 ; 10,5	3,3**	1,6 ; 5,4
Jamais	82,9	81,4	84,0	82,0	78,6 ; 85,2	78,7	73,1 ; 84,6	84,8	80,9 ; 88,3
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,388					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	2,1**	0,9 ; 3,6	2,9**	0,7 ; 5,6	1,4**	0,2 ; 3,0
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	6,5*	4,4 ; 8,9	8,3*	4,4 ; 12,8	5,0*	2,8 ; 7,5
Rarement	4,5	4,3	4,5	3,7*	2,0 ; 5,5	2,9**	0,6 ; 5,6	4,4**	2,1 ; 7,1
Jamais	86,5	87,5	85,7	87,7	84,7 ; 90,6	86,0	80,6 ; 90,9	89,2	85,5 ; 92,6
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	99,1	98,4 ; 99,8	99,8	99,3 ; 100,0	98,5	97,1 ; 99,6
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,2	98,5 ; 99,9	99,3	97,9 ; 100,0	99,2	98,1 ; 100,0
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	99,0	98,0 ; 99,7	99,3	97,7 ; 100,0	98,8	97,4 ; 99,8
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,0	98,0 ; 99,8	99,2	97,4 ; 100,0	98,8	97,6 ; 99,9
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	0,4**	0,0 ; 1,0	x	;	x	;
Jamais	97,3	98,6	96,3	98,7	97,7 ; 99,5	99,2	97,9 ; 100,0	98,2	96,7 ; 99,5



Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	1,0**	0,1 ; 2,1	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	1,5**	0,2 ; 3,1
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	97,8	96,4 ; 99,1	98,2	95,9 ; 100,0	97,5	95,6 ; 99,1
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,3	98,6 ; 99,9	99,7	98,8 ; 100,0	99,0	97,7 ; 99,9
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,4	98,1 ; 100,0	98,9	96,1 ; 100,0	99,8	99,3 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
6,5*	4,2 ; 8,9	38,9	34,9 ; 43,1	39,4	35,4 ; 43,4	15,2	12,2 ; 18,2	Ensemble de la population	
P = 0,000									
8,6*	4,7 ; 13,1	46,9	40,4 ; 53,6	32,8	26,9 ; 38,9	11,7*	7,9 ; 15,9	Sexe	
4,7*	2,5 ; 7,3	31,8	26,9 ; 36,9	45,1	39,9 ; 50,7	18,3	13,9 ; 22,5	Hommes	
								Femmes	
P = 0,807									
x	;	38,7*	23,6 ; 54,3	32,6*	18,3 ; 47,1	x	;	Groupe d'âge	
5,2**	2,1 ; 8,9	37,1	30,8 ; 43,9	39,0	32,5 ; 45,6	18,7	13,8 ; 23,7	15-24 ans	
6,4*	3,4 ; 9,9	39,4	33,1 ; 46,0	40,2	33,4 ; 46,7	13,9*	9,0 ; 18,6	25-44 ans	
6,7**	1,2 ; 13,0	43,6	32,8 ; 54,6	45,1	34,5 ; 56,0	4,6**	0,4 ; 10,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,958									
x	;	51,7*	28,7 ; 75,5	23,5**	5,4 ; 44,8	x	;	Hommes	
8,4**	1,5 ; 16,4	44,4	32,9 ; 55,6	38,0	27,0 ; 49,2	9,2**	3,3 ; 15,9	15-24 ans	
8,2**	3,2 ; 14,7	44,5	34,5 ; 54,7	32,0	22,4 ; 41,7	15,3*	8,4 ; 22,9	25-44 ans	
x	;	57,6	39,8 ; 75,0	29,5**	14,5 ; 46,0	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,800									
x	;	26,7**	7,6 ; 46,9	41,0*	21,2 ; 63,3	x	;	Femmes	
2,7**	0,5 ; 5,5	31,3	23,8 ; 38,9	39,7	32,0 ; 47,9	26,3	19,0 ; 33,7	15-24 ans	
4,8**	1,5 ; 8,4	34,7	26,6 ; 43,6	47,9	39,3 ; 56,5	12,6*	6,9 ; 18,7	25-44 ans	
x	;	30,0*	17,2 ; 43,3	60,3	46,3 ; 73,9	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,076									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
7,1**	2,4 ; 12,8	33,4	24,7 ; 41,8	36,6	28,3 ; 45,7	22,8*	15,3 ; 30,5	Poids insuffisant	
5,2**	2,4 ; 8,3	38,4	32,3 ; 44,7	45,4	38,9 ; 51,9	10,9*	7,0 ; 15,2	Poids normal	
6,7**	2,5 ; 11,7	43,4	35,5 ; 50,8	34,2	27,2 ; 41,6	15,8*	10,6 ; 21,5	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,718									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	35,7**	15,5 ; 56,4	29,2**	12,1 ; 48,8	x	;	Poids insuffisant	
7,1**	2,3 ; 12,4	47,1	37,7 ; 56,8	37,4	28,5 ; 46,7	8,4**	3,7 ; 13,7	Poids normal	
9,5**	2,7 ; 17,6	49,5	38,8 ; 60,0	29,2*	19,6 ; 39,0	11,8**	5,3 ; 19,1	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,469									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
5,9**	1,1 ; 12,5	32,6	22,7 ; 42,1	39,1	29,7 ; 49,7	22,3*	13,8 ; 31,2	Poids insuffisant	
3,4**	0,4 ; 7,2	29,9	22,2 ; 37,9	53,3	44,5 ; 62,1	13,5*	7,3 ; 20,1	Poids normal	
x	;	34,4	24,4 ; 45,0	41,4	30,7 ; 52,1	x	;	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,101				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	48,6	44,5 ; 52,9	43,8	37,6 ; 50,5	52,8	47,4 ; 58,2	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	35,3	31,2 ; 39,2	38,5	32,2 ; 45,1	32,5	27,4 ; 37,4	
Non	14,4	15,3	13,7	16,1	13,0 ; 19,1	17,6	12,7 ; 22,9	14,8	11,1 ; 18,6	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,008				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	43,6	39,6 ; 47,7	37,6	31,3 ; 44,0	48,8	43,5 ; 53,8	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	37,4	33,5 ; 41,4	38,8	32,4 ; 45,2	36,2	31,2 ; 41,5	
Non	19,6	22,6	17,4	19,0	15,8 ; 22,4	23,6	18,2 ; 29,7	15,0	11,2 ; 18,9	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,072				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	39,3	35,1 ; 43,4	35,0	28,9 ; 41,3	43,0	37,7 ; 48,3	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	31,9	28,2 ; 36,1	31,8	25,7 ; 38,3	32,0	27,2 ; 37,0	
Non	27,7	32,4	24,3	28,8	25,1 ; 32,7	33,1	27,3 ; 39,6	25,0	20,5 ; 29,7	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,005				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	42,4	38,3 ; 46,3	34,8	28,2 ; 41,1	48,9	43,6 ; 54,1	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	30,1	26,3 ; 34,0	33,4	27,3 ; 40,2	27,2	22,6 ; 32,4	
Non	26,1	27,4	25,1	27,6	24,1 ; 31,2	31,8	25,4 ; 37,8	23,9	19,7 ; 28,5	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,001				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	62,0	58,0 ; 65,9	53,9	47,4 ; 60,7	69,0	64,2 ; 73,6	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	21,2	17,8 ; 24,5	27,4	21,7 ; 33,4	15,8	11,8 ; 19,8	
Non	17,4	18,5	16,6	16,8	13,9 ; 19,9	18,7	13,5 ; 24,3	15,2	11,7 ; 19,1	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	60,4	56,4 ; 64,4	49,0	42,4 ; 55,6	70,3	65,4 ; 74,9	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	25,0	21,5 ; 28,8	32,3	26,0 ; 38,6	18,8	14,7 ; 22,9	
Non	12,6	14,0	11,6	14,5	11,5 ; 17,7	18,7	13,5 ; 24,3	10,9*	7,7 ; 14,4	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,060				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	49,2	44,9 ; 53,4	44,2	37,3 ; 50,7	53,5	47,9 ; 59,0	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	30,5	26,7 ; 34,5	32,0	26,1 ; 38,3	29,2	24,5 ; 34,1	
Non	21,5	24,4	19,4	20,3	17,1 ; 23,7	23,8	18,4 ; 29,7	17,4	13,3 ; 21,5	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	12,9	10,1 ; 15,8	14,3*	10,0 ; 19,1	11,7*	8,4 ; 15,4	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	16,0	12,7 ; 19,3	22,6	17,0 ; 28,5	10,3*	6,9 ; 14,0	
Non	72,0	67,3	75,4	71,1	67,0 ; 74,8	63,1	56,5 ; 69,5	78,1	73,4 ; 82,5	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,061				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	32,7	29,0 ; 36,5	33,5	27,5 ; 39,3	32,1	27,4 ; 37,3	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	16,4	13,3 ; 19,7	20,0	14,7 ; 25,5	13,3	9,6 ; 17,2	
Non	49,9	43,2	54,7	50,9	46,8 ; 54,8	46,5	40,5 ; 53,0	54,7	49,3 ; 59,8	

Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,260				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	49,5	45,3 ; 53,6	46,0	39,4 ; 52,3	52,4	47,1 ; 57,7	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	20,7	17,3 ; 24,3	23,1	17,2 ; 29,4	18,6	14,5 ; 23,1	
Non	29,6	28,8	30,2	29,9	26,3 ; 33,9	30,8	25,0 ; 37,0	29,0	24,1 ; 34,0	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,002				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	33,3	29,5 ; 37,4	27,6	22,2 ; 33,8	38,2	33,3 ; 43,3	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	18,0	14,8 ; 21,3	23,4	17,9 ; 29,4	13,3	9,8 ; 17,3	
Non	48,5	52,0	45,9	48,7	44,5 ; 52,8	48,9	42,2 ; 55,3	48,5	43,2 ; 53,9	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,111				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	32,7	28,9 ; 36,6	28,8	23,5 ; 34,6	36,0	30,8 ; 41,3	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	27,4	23,7 ; 31,3	31,2	25,1 ; 37,3	24,2	20,0 ; 28,9	
Non	37,5	34,7	39,5	39,9	35,9 ; 43,9	40,0	33,8 ; 46,4	39,8	34,8 ; 44,7	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe		P = 0,000	
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge		P = 0,000	
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
		P = 0,000	
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes		P = 0,000	
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
		P = 0,000	
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes		P = 0,000	
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
		P = 0,000	
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.  
 2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.  
 \* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.  
 \*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.  
 Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
49,6	47,3 ; 52,0	35,0	32,7 ; 37,4	15,4	13,5 ; 17,3	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
43,3	40,1 ; 46,6	38,0	34,6 ; 41,3	18,7	15,9 ; 21,7	Hommes
56,2	52,9 ; 59,5	31,9	28,7 ; 35,4	11,9	9,6 ; 14,3	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
46,2	33,7 ; 58,4	18,9**	9,1 ; 30,2	34,9*	23,2 ; 47,9	15-17 ans
27,1*	16,4 ; 39,2	29,2*	19,3 ; 39,7	43,7	32,2 ; 54,9	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
36,3	28,3 ; 44,8	24,2*	17,3 ; 31,7	39,5	31,7 ; 47,7	25-44 ans
31,0	27,1 ; 34,9	47,2	42,7 ; 51,8	21,8	18,2 ; 25,5	45-64 ans
56,9	53,1 ; 60,7	38,2	34,6 ; 42,0	4,9*	3,3 ; 6,6	65 ans et plus
94,8	91,9 ; 97,5	x	;	x	;	
		P = 0,000				Hommes
37,8*	20,3 ; 55,5	21,0**	6,2 ; 37,5	41,2*	23,1 ; 60,5	15-17 ans
26,8**	13,6 ; 42,2	25,2*	13,0 ; 39,9	48,0*	32,1 ; 63,4	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
31,6*	20,8 ; 42,6	23,3*	13,9 ; 33,3	45,1	33,5 ; 57,2	25-44 ans
25,1	19,4 ; 30,8	47,7	41,3 ; 54,8	27,2	21,5 ; 33,3	45-64 ans
48,9	43,3 ; 54,3	44,4	39,3 ; 49,7	6,8*	4,1 ; 9,6	65 ans et plus
92,8	87,3 ; 97,6	x	;	x	;	
		P = 0,000				Femmes
53,0*	35,1 ; 71,1	17,2**	3,9 ; 32,0	29,9**	14,3 ; 47,2	15-17 ans
27,4**	9,7 ; 46,4	33,9*	18,0 ; 51,2	38,7*	22,6 ; 55,7	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
40,9	28,3 ; 53,6	25,1*	14,8 ; 36,3	34,0*	22,8 ; 45,8	25-44 ans
37,2	31,7 ; 42,7	46,7	40,9 ; 52,5	16,2	11,9 ; 20,6	45-64 ans
65,7	60,3 ; 70,8	31,4	26,5 ; 36,8	2,9**	1,3 ; 4,7	65 ans et plus
96,7	93,5 ; 99,3	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	43,9	50,1	37,9	48,9	46,6 ; 51,2	55,0	51,6 ; 58,3	42,7	39,3 ; 45,8
Non	56,1	49,9	62,1	51,1	48,8 ; 53,4	45,0	41,7 ; 48,4	57,3	54,2 ; 60,7
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	10,6	14,4	6,8	14,4	12,6 ; 16,2	18,7	15,9 ; 21,7	9,9	7,9 ; 12,2
Non	89,4	85,6	93,2	85,6	83,8 ; 87,4	81,3	78,3 ; 84,1	90,1	87,8 ; 92,1
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,004			
Oui	7,3	9,1	5,5	7,9	6,6 ; 9,4	9,9	7,8 ; 12,3	5,8	4,2 ; 7,6
Non	92,7	90,9	94,5	92,1	90,6 ; 93,4	90,1	87,7 ; 92,2	94,2	92,4 ; 95,8
<b>Ecstasy</b>		P = 0,000				P = 0,192			
Oui	5,1	6,3	3,9	4,1	3,1 ; 5,2	4,8*	3,3 ; 6,5	3,4*	2,0 ; 4,8
Non	94,9	93,7	96,1	95,9	94,8 ; 96,9	95,2	93,5 ; 96,7	96,6	95,2 ; 98,0
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,3	16,1	8,7	14,4	12,6 ; 16,2	19,2	16,3 ; 22,1	9,4	7,4 ; 11,4
Non	87,7	83,9	91,3	85,6	83,8 ; 87,4	80,8	77,9 ; 83,7	90,6	88,6 ; 92,6
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,071				P = 0,665			
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,3**	0,1 ; 0,6	x	;	0,4**	0,0 ; 0,9
Non	99,5	99,4	99,6	99,7	99,4 ; 99,9	x	;	99,6	99,1 ; 100,0
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,7**	0,3 ; 1,1	1,2**	0,4 ; 2,2	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,3	98,9 ; 99,7	98,8	97,8 ; 99,6	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,000				P = 0,708			
Oui	0,8	1,2	0,3*	x	;	x	;	x	;
Non	99,2	98,8	99,7	x	;	x	;	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,179				P = 0,017			
Oui	1,8	1,9	1,6	1,7*	1,1 ; 2,4	2,4*	1,3 ; 3,6	0,9**	0,4 ; 1,6
Non	98,2	98,1	98,4	98,3	97,6 ; 98,9	97,6	96,4 ; 98,7	99,1	98,4 ; 99,6
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,000				P = 0,015			
Oui	1,6	2,3	0,9	2,3*	1,5 ; 3,1	3,3*	1,9 ; 4,8	1,2**	0,5 ; 2,1
Non	98,4	97,7	99,1	97,7	96,9 ; 98,5	96,7	95,2 ; 98,1	98,8	97,9 ; 99,5
<b>Drogues par injection</b>		P = 0,000				P = 0,244			
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,5**	0,2 ; 0,8	0,7**	0,1 ; 1,3	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,5	99,2 ; 99,8	99,3	98,7 ; 99,9	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	12,2	16,2	8,3	14,4	12,6 ; 16,3	18,1	15,4 ; 20,9	10,6	8,3 ; 12,9	
Non	87,8	83,8	91,7	85,6	83,7 ; 87,4	81,9	79,1 ; 84,6	89,4	87,1 ; 91,7	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,114				
Oui	1,6	2,3	0,8	2,6*	1,7 ; 3,6	3,3*	1,9 ; 4,9	1,9**	0,9 ; 3	
Non	98,4	97,7	99,2	97,4	96,4 ; 98,3	96,7	95,1 ; 98,1	98,1	97,0 ; 99,1	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,042				
Oui	1,8	2,4	1,3	2,3*	1,5 ; 3,2	3,2*	1,8 ; 4,8	1,4**	0,6 ; 2,5	
Non	98,2	97,6	98,7	97,7	96,8 ; 98,5	96,8	95,2 ; 98,2	98,6	97,5 ; 99,4	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,115				
Oui	1,4	1,7	1,0	1,1**	0,6 ; 1,7	1,7**	0,7 ; 2,7	0,6**	0,0 ; 1,2	
Non	98,6	98,3	99,0	98,9	98,3 ; 99,4	98,3	97,3 ; 99,3	99,4	98,8 ; 100,0	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,065				
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,6**	0,2 ; 1,1	0,9**	0,2 ; 1,8	x	;	
Non	99,2	98,8	99,6	99,4	98,9 ; 99,8	99,1	98,2 ; 99,8	x	;	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = .				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = .				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,584				
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,3**	0,1 ; 0,7	x	;	x	;	
Non	99,6	99,6	99,7	99,7	99,3 ; 99,9	x	;	x	;	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = .				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	15,4	13,5 ; 17,3	18,7	15,9 ; 21,7	11,9	9,6 ; 14,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	34,9*	23,2 ; 47,9	41,2*	23,1 ; 60,5	29,9**	14,3 ; 47,2
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	43,7	32,2 ; 54,9	48,0*	32,1 ; 63,4	38,7*	22,6 ; 55,7
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	21,8	18,2 ; 25,5	27,2	21,5 ; 33,3	16,2	11,9 ; 20,6
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	4,9*	3,3 ; 6,6	6,8*	4,1 ; 9,6	2,9**	1,3 ; 4,7
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	28,7	26,4 ; 31,0	9,5	7,9 ; 10,9	12,3	10,7 ; 14,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	29,5	26,3 ; 33,0	10,9	8,6 ; 13,2	16,3	13,6 ; 19,2
Femmes	25,4	6,8	7,4	27,8	24,7 ; 31,1	8,0	6,0 ; 10,0	8,0	6,1 ; 10,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	39,3	26,9 ; 51,3	5,4**	0,5 ; 11,5	9,8**	3,2 ; 18,3
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	33,1*	22,2 ; 44,1	11,2**	4,5 ; 19,2	28,6*	18,4 ; 39,9
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	36,1	28,0 ; 43,9	8,4**	4,1 ; 13,4	19,5*	13,2 ; 26,4
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	33,7	29,7 ; 37,8	15,6	12,3 ; 18,9	19,8	16,4 ; 23,2
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	29,2	25,8 ; 32,9	7,3	5,4 ; 9,3	6,6	4,7 ; 8,7
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	4,4**	1,9 ; 7,2	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,062					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	44,7*	26,8 ; 63,3	x	;	12,9**	1,5 ; 27,2
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	34,5*	19,5 ; 49,4	x	;	30,1*	15,6 ; 45,3
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	39,0	27,7 ; 50,8	7,4**	1,9 ; 13,8	22,5*	13,1 ; 32,9
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	30,3	24,4 ; 36,5	16,5	11,6 ; 21,6	28,1	22,4 ; 34,0
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	32,1	26,9 ; 37,6	10,4*	7,1 ; 13,9	8,6*	5,6 ; 11,9
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	6,3**	1,9 ; 11,6	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,207					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	34,7*	17,2 ; 51,9	x	;	x	;
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	31,5*	15,8 ; 48,0	14,4**	3,0 ; 27,8	26,7**	12,0 ; 42,2
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	33,2*	21,5 ; 44,8	9,5**	2,9 ; 17,2	16,5**	8,2 ; 26,1
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	37,2	32,0 ; 43,0	14,6	10,4 ; 19,1	11,0	7,8 ; 14,7
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	26,0	21,2 ; 30,9	3,9*	2,1 ; 5,9	4,5**	2,2 ; 7,1
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	2,6**	0,3 ; 5,5	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	81,5	79,7 ; 83,1	85,0	82,6 ; 87,3	77,7	75,1 ; 80,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	55,1	43,0 ; 67,3	56,4	38,8 ; 74,5	54,1*	36,4 ; 72,4
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	84,9	75,7 ; 92,8	82,3	69,2 ; 93,2	88,0	74,5 ; 98,7
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	70,5	62,5 ; 78,3	70,8	60,0 ; 81,0	70,1	58,4 ; 81,7
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	95,7	94,0 ; 97,2	96,9	95,0 ; 98,6	94,4	91,4 ; 97,0
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	85,1	82,6 ; 87,5	87,7	84,3 ; 90,8	82,4	78,7 ; 86,0
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	67,3	63,2 ; 71,0	73,9	68,1 ; 79,2	60,4	54,3 ; 66,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	87,1	83,6 ; 90,1	90,0	85,6 ; 93,5	84,2	78,7 ; 89,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	90,3	87,8 ; 92,7	92,1	88,3 ; 95,4	88,4	84,3 ; 92,1
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	90,3	86,5 ; 93,5	90,8	84,6 ; 96,2	89,9	84,7 ; 94,0
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	89,5	87,7 ; 91,1	87,0	84,3 ; 89,6	92,3	90,1 ; 94,4
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	8,8	7,3 ; 10,4	10,3	8,0 ; 12,8	7,0	5,0 ; 9,2
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,7*	1,0 ; 2,5	2,6*	1,4 ; 4,0	0,6**	0,1 ; 1,3
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	47,0	45,8 ; 48,3	1,1**	0,3 ; 2,0	99,1	98,3 ; 99,8
Femmes	51,5	97,5	0,8	52,6	51,3 ; 53,7	98,6	97,6 ; 99,4	x	;
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,4**	0,1 ; 0,8	0,3**	0,0 ; 0,8	0,6**	0,0 ; 1,3

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	89,5	87,7 ; 91,1	8,8	7,3 ; 10,4	1,7*	1,0 ; 2,5
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,005					
Hommes	86,4	10,7	2,9	87,0	84,3 ; 89,6	10,3	8,0 ; 12,8	2,6*	1,4 ; 4,0
Femmes	91,6	7,4	0,9*	92,3	90,1 ; 94,4	7,0	5,0 ; 9,2	0,6**	0,1 ; 1,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,153					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	63,1	46,1 ; 78,7	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	67,7	55,7 ; 78,8	x	;	x	;
	P = 0,000			P = 0,007					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	66,0	56,3 ; 75,2	x	;	x	;
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	89,0	86,2 ; 91,7	8,0	5,8 ; 10,6	3,0*	1,6 ; 4,6
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	96,4	95,0 ; 97,6	x	;	x	;
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	96,6	93,0 ; 99,6	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,413					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	x	;	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	87,8	85,0 ; 90,3	10,0	7,7 ; 12,5	2,2**	1,1 ; 3,5
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,056					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	92,8	90,6 ; 94,9	x	;	x	;
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	49,6	46,0 ; 53,3	59,7	54,9 ; 64,4
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000	...	...	...
15-24 ans	87,9	...	86,8	75,8 ; 96,2	...	;
25-44 ans	62,4	...	67,9	61,8 ; 74,2	...	;
45-64 ans	29,9	...	29,6	24,3 ; 35,5	...	;
65 ans et plus	7,3	...	9,3**	2,5 ; 17,2	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	P = 0,000	...	P = 0,000	...
15-24 ans	...	90,0	...	;	92,7	83,3 ; 99,8
25-34 ans	...	71,0	...	;	64,5	55,8 ; 73,7
35-49 ans	...	53,5	...	;	44,9	38,4 ; 51,4
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,223	...	P = 0,499	...
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	43,3	35,7 ; 50,7	56,1	44,4 ; 68,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	52,4	44,2 ; 59,7	63,7	54,9 ; 72,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	53,9	46,8 ; 61,6	56,1	47,1 ; 64,9
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	49,0	37,5 ; 61,1	64,2	52,8 ; 75,1
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	...	P = 0,002	...
Un partenaire	43,8	64,2	46,5	42,5 ; 50,4	56,9	51,8 ; 61,9
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	69,9	57,2 ; 82,5	83,5	70,8 ; 93,7
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	77,1	52,5 ; 95,1	78,8*	26,9 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = 0,914	...	P = 0,758	...
Hommes	x	66,6	x	;	59,7	54,8 ; 64,4
Femmes	47,8	x	49,6	46,0 ; 53,3	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	11,5	9,6 ; 13,3	13,8	11,9 ; 15,8	74,8	72,5 ; 77,0
Sexe	P = 0,093			P = 0,044					
Hommes	14,8	14,9	70,3	11,4	8,9 ; 13,9	16,1	13,3 ; 19,2	72,6	69,0 ; 75,7
Femmes	13,2	14,7	72,1	11,6	8,9 ; 14,3	11,1	8,8 ; 13,7	77,3	74,2 ; 80,4
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	71,6	55,8 ; 85,4	12,5**	2,6 ; 24,2	15,9**	4,8 ; 29,9
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	28,9*	18,2 ; 40,2	40,2*	28,2 ; 52,6	30,8*	20,1 ; 42,3
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	45,1	35,1 ; 54,4	29,7*	21,0 ; 39,0	25,2*	17,5 ; 33,7
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	9,1	6,7 ; 11,9	20,1	16,6 ; 23,7	70,8	66,6 ; 74,6
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	4,6*	2,8 ; 6,5	4,5*	2,9 ; 6,6	90,8	88,2 ; 93,3
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	x	;	x	;	97,6	94,7 ; 99,9
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,211					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	13,2	9,2 ; 17,2	11,3*	7,5 ; 15,5	75,6	70,6 ; 80,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	13,8	9,9 ; 18,1	13,3*	9,4 ; 17,4	72,8	68,0 ; 77,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	8,0*	5,2 ; 11,0	15,8	12,2 ; 20,0	76,2	71,7 ; 80,6
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	10,3*	6,1 ; 15,1	14,5*	9,5 ; 19,5	75,2	68,7 ; 81,5
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	8,5	6,7 ; 10,3	10,0	8,2 ; 12,0	81,5	79,1 ; 83,8
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	39,6	29,6 ; 49,7	41,9	31,6 ; 52,3	18,5*	11,7 ; 26,2
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	22,8**	5,7 ; 43,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	16,3	14,3 ; 18,5	18,3	15,4 ; 21,6	14,0	11,2 ; 17,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	75,9	60,3 ; 89,8	76,2	52,8 ; 95,7	75,6	51,7 ; 96,4
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	42,5	30,6 ; 54,9	58,2	40,7 ; 76,0	25,5**	9,2 ; 42,9
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	55,2	45,6 ; 65,0	64,6	51,0 ; 77,4	45,8*	31,0 ; 60,5
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	16,4	13,2 ; 19,8	19,5	14,6 ; 25,0	13,1*	9,3 ; 17,4
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	6,1*	4,1 ; 8,3	6,9*	3,9 ; 10,4	5,2*	2,8 ; 8,0
	3,1*	3,9*	1,8**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,275		P = 0,341		P = 0,478	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	17,3	13,1 ; 21,8	19,2*	13,1 ; 25,6	14,8*	9,1 ; 21,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	18,8	14,5 ; 23,3	21,8	15,5 ; 28,4	15,6*	9,4 ; 21,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	13,5	9,9 ; 17,2	16,2*	10,7 ; 22,1	10,4*	6,1 ; 14,9
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	15,0*	10,0 ; 20,9	13,0**	6,1 ; 21,2	16,8*	9,1 ; 25,0
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	12,1	10,1 ; 14,3	12,1	9,2 ; 15,2	12,1	9,2 ; 15,1
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	55,2	45,2 ; 65,1	65,7	53,2 ; 77,1	37,8*	21,8 ; 54,4
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	37,7**	14,6 ; 62,2	42,5**	14,3 ; 70,7	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,053		P = 0,299		P = 0,081	
Hommes	18,7	54,0	17,9	14,0	11,1 ; 17,1	x	;	13,8	10,8 ; 16,9
Femmes	19,2	19,2	x	18,1	15,2 ; 21,5	18,1	15,2 ; 21,5	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	9,5	8,0 ; 11,1	10,2	7,8 ; 12,6	8,8	7,0 ; 10,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,003		P = 0,000	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	18,8**	9,8 ; 29,0	23,7**	8,9 ; 40,4	13,2**	2,8 ; 25,8
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,004		P = 0,000	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	13,2*	7,1 ; 20,0	18,0**	7,6 ; 29,2	7,8**	1,6 ; 15,7
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	14,5	11,4 ; 17,7	14,0*	9,2 ; 18,8	15,0	11,2 ; 19,2
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	6,5	4,6 ; 8,5	7,2*	4,4 ; 10,1	5,8*	3,4 ; 8,5
	2,7	3,2*	2,2	2,0**	0,6 ; 3,8	x	;	2,5**	0,4 ; 5,1
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,749		P = 0,418		P = 0,106	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	8,2*	5,3 ; 11,1	10,1*	5,4 ; 15,3	6,1**	3,2 ; 9,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	10,0*	7,0 ; 13,4	12,1*	7,4 ; 17,4	7,9*	4,4 ; 11,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	9,5	6,9 ; 12,4	6,9*	3,8 ; 10,7	12,5*	8,4 ; 17,0
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	10,5*	6,1 ; 14,9	11,3**	4,8 ; 19,0	9,7**	4,5 ; 15,6
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,009		P = 0,020		P = 0,046	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	9,1	7,4 ; 11,0	9,1	6,5 ; 11,9	9,2	7,1 ; 11,5
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	17,1*	9,7 ; 25,4	21,4**	10,1 ; 33,1	9,9**	1,9 ; 20,0
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	24,4**	7,1 ; 45,1	17,6**	1,3 ; 39,9	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,745		P = 0,110		P = 0,257	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	9,7	7,6 ; 11,9	29,8**	3,1 ; 74,2	9,4	7,4 ; 11,7
Femmes	7,0	7,0	8,9**	10,4	7,8 ; 13,2	10,4	7,8 ; 13,2	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,000	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	68,3*	30,8 ; 100,0	63,3**	15,2 ; 100,0	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	9,4	7,8 ; 11,1	10,0	7,6 ; 12,5	8,8	6,9 ; 10,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%		%	
			Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)	
Ensemble de la population	23,5	76,5	31,4	21,9 ; 41,0	68,6	59,0 ; 78,1
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,168			
15-35 ans	25,6	74,4	33,9*	23,0 ; 45,0	66,1	55,0 ; 77,0
36-49 ans	10,5*	89,5	17,4**	1,4 ; 38,1	82,6	61,9 ; 98,6
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,562			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	35,1**	11,4 ; 62,6	64,9*	37,4 ; 88,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	36,7*	17,9 ; 57,2	63,3	42,8 ; 82,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	32,2**	14,7 ; 50,6	67,8	49,4 ; 85,3
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	16,8**	2,5 ; 33,7	83,2	66,3 ; 97,5
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	31,3	21,7 ; 41,0	68,7	59,0 ; 78,3
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%		%		%	
				Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)	
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	73,1	69,7 ; 76,3	17,1	14,6 ; 19,8	9,8	7,4 ; 12,2
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	71,2	53,3 ; 87,9	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	84,9	80,5 ; 89,2	5,7*	3,1 ; 8,5	9,4*	5,8 ; 13,3
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	64,3	59,5 ; 69,0	28,9	24,5 ; 33,6	6,9*	4,6 ; 9,3
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,020					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	66,4	58,9 ; 73,2	23,7	17,8 ; 29,8	10,0*	5,5 ; 15,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	69,7	62,5 ; 76,3	16,5	11,8 ; 21,8	13,8*	8,5 ; 19,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	77,1	71,2 ; 82,8	15,1*	10,4 ; 20,1	7,8*	4,0 ; 11,8
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	82,8	75,6 ; 89,1	11,0**	5,5 ; 17,2	6,2**	2,2 ; 10,8
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = .					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	73,1	69,6 ; 76,3	17,1	14,6 ; 19,7	9,9	7,4 ; 12,3
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 10

# **NORD-DU-QUÉBEC**





# 1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population		49,4	50,6			53,8	53,8 ; 53,8	46,2	46,2 ; 46,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	15,9	15,9 ; 16,0	16,1	16,1 ; 16,2	15,7	15,7 ; 15,8
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	35,0	35,0 ; 35,0	33,8	33,7 ; 33,8	36,4	36,4 ; 36,5
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	38,5	38,5 ; 38,6	39,6	39,5 ; 39,6	37,3	37,3 ; 37,4
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	10,5	10,5 ; 10,5	10,5	10,5 ; 10,6	10,5	10,5 ; 10,6
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Personne seule	13,4	10,7	16,0	11,1	9,9 ; 12,4	11,8	10,0 ; 13,8	10,2	8,8 ; 11,9
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	35,7	33,7 ; 37,8	34,1	31,5 ; 37,0	37,6	34,7 ; 40,6
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	43,5	41,0 ; 45,6	44,1	40,7 ; 47,3	42,7	39,4 ; 45,7
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	5,5	4,5 ; 6,7	4,3*	2,9 ; 5,9	7,0	5,4 ; 8,8
Autre	6,7	6,5	6,9	4,2*	3,0 ; 5,5	5,8*	3,8 ; 7,8	2,4**	1,3 ; 3,8
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,256			P = 'n.d.'					
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	99,1	98,6 ; 99,5	98,9	98,2 ; 99,6	99,3	98,6 ; 99,8
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,3**	0,0 ; 0,6	0,5**	0,0 ; 1,1	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	0,6**	0,3 ; 1,0	0,5**	0,1 ; 1,1	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,912			P = 0,485					
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	95,6	94,3 ; 97,0	95,7	93,7 ; 97,7	95,5	93,2 ; 97,6
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	1,9*	1,0 ; 2,9	1,3**	0,5 ; 2,4	2,5**	1,0 ; 4,4
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	2,5*	1,4 ; 3,7	2,9**	1,0 ; 4,9	2,0**	0,5 ; 3,8
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,683			P = 0,007					
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	33,3	30,9 ; 35,8	36,5	33,2 ; 40,0	29,6	26,1 ; 33,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	30,0	27,6 ; 32,4	29,3	25,9 ; 32,6	30,8	27,3 ; 34,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	24,6	22,6 ; 26,7	24,1	21,2 ; 27,1	25,2	22,1 ; 28,3
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	12,1	10,6 ; 13,7	10,1	8,1 ; 12,3	14,5	12,2 ; 16,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,066					
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	14,3	12,4 ; 16,3	12,4	9,8 ; 15,2	16,4	13,6 ; 19,2
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	14,8	12,9 ; 16,6	13,4	11,2 ; 16,0	16,2	13,5 ; 19,0
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	19,9	17,8 ; 22,1	19,9	16,9 ; 23,1	20,0	16,8 ; 23,1
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	22,3	19,9 ; 24,6	23,2	19,8 ; 26,5	21,2	18,0 ; 24,5
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	28,7	26,2 ; 31,2	31,0	27,5 ; 34,6	26,2	22,9 ; 29,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,051					
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	39,4	36,9 ; 41,8	39,9	36,4 ; 43,6	38,8	35,3 ; 42,3
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	52,6	50,0 ; 55,2	50,6	47,0 ; 54,2	54,8	51,2 ; 58,3
Pauvre	9,4	8,9	9,9	6,9	5,7 ; 8,2	8,3	6,4 ; 10,4	5,2	3,9 ; 6,7
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,1*	0,7 ; 1,6	1,1**	0,6 ; 1,9	1,1**	0,6 ; 1,9
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	69,7	67,8 ; 71,6	74,5	71,9 ; 77,0	64,1	61,0 ; 67,2
Étudiants	13,1	13,0	13,2	9,6	8,0 ; 11,1	8,8	6,8 ; 10,8	10,5	8,1 ; 12,8
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	6,8	5,7 ; 8,0	2,7*	1,5 ; 4,1	11,5	9,5 ; 13,6
Retraités	19,6	18,0	21,1	14,0	12,9 ; 15,0	14,0	12,7 ; 15,4	13,9	12,3 ; 15,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	54,3	51,9 ; 56,7	34,1	31,7 ; 36,7	11,5	9,9 ; 13,2
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,162					
Hommes	56,6	33,5	9,9	52,7	49,0 ; 56,3	34,4	31,1 ; 37,9	12,9	10,3 ; 15,4
Femmes	55,5	32,8	11,7	56,1	52,6 ; 59,7	33,9	30,4 ; 37,3	10,0	8,1 ; 12,0
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	55,9	47,3 ; 64,8	38,8	30,3 ; 47,7	5,3**	1,7 ; 9,8
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	66,8	62,9 ; 70,9	26,1	22,4 ; 29,7	7,1*	4,7 ; 9,6
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	47,7	43,9 ; 51,5	37,5	33,7 ; 41,4	14,7	12,1 ; 17,6
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	31,4	25,0 ; 37,8	42,6	35,5 ; 49,6	26,0	19,4 ; 32,5
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,217					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	47,2	41,0 ; 53,1	36,8	31,5 ; 42,4	16,0	12,4 ; 19,7
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	51,4	47,3 ; 55,2	33,3	29,9 ; 37,3	15,3	12,5 ; 18,2
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	59,9	55,8 ; 64,2	32,5	28,4 ; 36,7	7,6*	5,0 ; 10,3
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	48,7	38,7 ; 59,7	38,5	28,3 ; 48,6	12,8**	6,4 ; 20,5
Autre	46,0	39,4	14,6	53,5	35,0 ; 69,6	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	39,2	34,0 ; 43,8	41,5	36,8 ; 46,7	19,3	15,9 ; 23,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	56,5	51,6 ; 61,5	34,7	30,0 ; 39,3	8,8*	6,3 ; 11,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	61,3	56,6 ; 66,1	30,4	26,1 ; 34,9	8,2*	5,1 ; 11,5
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	76,5	70,8 ; 82,2	20,3	14,8 ; 26,1	3,2**	1,2 ; 5,5
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	42,3	34,4 ; 49,8	36,1	29,0 ; 43,7	21,5	16,4 ; 27,3
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	57,2	54,4 ; 60,1	33,6	30,8 ; 36,4	9,2	7,4 ; 10,9
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	33,6	25,6 ; 41,7	35,2	27,6 ; 43,7	31,2	23,0 ; 39,5
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	56,4	53,7 ; 59,0	33,9	31,4 ; 36,5	9,7	8,1 ; 11,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	58,3	55,4 ; 61,2	32,8	30,1 ; 35,6	8,9	7,1 ; 10,8
Étudiants	62,7	32,2	5,0	59,9	48,6 ; 70,9	35,7	24,6 ; 46,3	4,4**	0,7 ; 9,2
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	42,1	33,5 ; 51,4	35,5	26,8 ; 44,4	22,5*	14,3 ; 30,5
Retraités	40,2	39,5	20,4	36,8	30,4 ; 43,0	39,0	33,1 ; 45,8	24,2	18,8 ; 29,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	54,3	51,9 ; 56,7	34,1	31,7 ; 36,7	11,5	9,9 ; 13,2
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,001					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	46,6	41,8 ; 51,5	38,7	33,8 ; 43,3	14,7	11,3 ; 18,5
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	57,8	54,9 ; 60,5	32,1	29,3 ; 35,0	10,1	8,4 ; 11,8
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,242					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	49,7*	27,1 ; 72,4	x	;	x	;
Poids normal	62,6	29,4	8,0	59,8	55,7 ; 64,1	32,4	28,2 ; 36,6	7,8	5,8 ; 10,0
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	51,1	47,8 ; 54,3	34,9	31,8 ; 38,2	14,0	11,6 ; 16,4
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	62,2	58,7 ; 65,7	30,3	26,9 ; 33,7	7,6	5,8 ; 9,6
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	47,6	43,7 ; 51,5	38,9	35,1 ; 42,8	13,5	10,8 ; 16,4
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	38,8	27,0 ; 50,3	29,2*	19,0 ; 40,0	32,0*	21,7 ; 42,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	36,9	30,3 ; 43,2	41,0	34,7 ; 47,4	22,1	17,6 ; 26,7
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	59,2	56,5 ; 62,0	32,2	29,7 ; 34,9	8,5	7,0 ; 10,2

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	51,7	49,3 ; 54,2	44,1	41,6 ; 46,7	4,1	3,2 ; 5,1
<b>Sexe</b>	P = 0,097			P = 0,352					
Hommes	47,5	46,6	6,0	51,0	47,3 ; 54,5	44,2	40,7 ; 47,8	4,8	3,4 ; 6,3
Femmes	47,1	45,9	7,0	52,5	48,9 ; 56,2	44,1	40,4 ; 47,6	3,4*	2,2 ; 4,7
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,496					
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	54,4	45,8 ; 63,2	43,6	34,8 ; 52,2	1,9**	0,4 ; 3,9
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	52,4	48,4 ; 56,6	42,7	38,6 ; 46,8	4,9*	3,2 ; 6,9
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	49,8	46,0 ; 53,9	45,5	41,6 ; 49,3	4,7*	3,3 ; 6,3
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	52,5	45,5 ; 59,2	44,7	38,1 ; 51,7	2,8**	0,9 ; 5,2
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	38,2	49,2	12,5	39,8	34,4 ; 45,5	48,9	42,8 ; 55,0	11,3*	7,9 ; 14,7
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	54,8	50,7 ; 59,0	42,7	38,7 ; 46,9	2,5**	1,3 ; 3,9
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	55,0	50,6 ; 59,2	42,0	37,8 ; 46,1	3,1*	1,7 ; 4,5
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	47,2	36,6 ; 58,6	48,0	37,1 ; 58,5	4,8**	1,1 ; 9,4
Autre	44,5	46,1	9,4*	39,6*	24,2 ; 56,8	48,3*	31,4 ; 64,7	12,1**	2,1 ; 24,1
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,183					
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	55,8	51,1 ; 60,3	41,1	36,5 ; 45,7	3,1*	1,9 ; 4,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	51,7	46,8 ; 56,8	43,5	38,4 ; 48,4	4,9*	3,0 ; 6,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	46,1	41,0 ; 51,1	49,6	44,6 ; 54,7	4,3*	2,5 ; 6,3
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	52,0	45,0 ; 58,7	43,1	36,3 ; 50,3	4,9**	1,7 ; 8,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,251					
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	54,0	46,3 ; 61,5	40,2	32,9 ; 48,0	5,8*	3,1 ; 9,0
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	52,7	49,8 ; 55,6	43,9	41,0 ; 46,9	3,4*	2,4 ; 4,6
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,005					
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	44,5	36,0 ; 52,9	46,2	37,7 ; 54,7	9,3*	5,3 ; 13,9
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	52,4	49,8 ; 55,2	43,9	41,2 ; 46,5	3,7	2,8 ; 4,8
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,539					
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	52,3	49,3 ; 55,2	43,5	40,5 ; 46,7	4,2	3,1 ; 5,5
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	55,3	44,0 ; 66,9	x	;	x	;
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	44,2	35,5 ; 53,6	48,2	38,5 ; 57,4	7,5**	3,1 ; 13,1
Retraités	51,9	42,8	5,3	50,0	43,5 ; 56,7	46,4	39,6 ; 52,7	3,5**	1,6 ; 5,9
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	58,7	55,3 ; 62,1	38,4	35 ; 41,7	2,9*	1,8 ; 4,2
Bon	40,5	52,6	6,9	46,0	41,6 ; 50,4	50,4	45,9 ; 54,9	3,6*	2,2 ; 5,1
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	34,8	27,8 ; 43,0	53,3	45,4 ; 60,9	11,8*	7,5 ; 16,7
<b>Niveau de détresse psychologique</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	27,7	55,6	16,8	30,1	24,3 ; 36,0	59,9	53,6 ; 65,7	10,0*	7,3 ; 13,2
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	56,8	54,1 ; 59,6	40,6	37,8 ; 43,4	2,6*	1,8 ; 3,6
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	21,3	49,3	29,4	20,4**	8,0 ; 36,2	59,4*	39,3 ; 75,4	20,1**	8,8 ; 36,2
Non	48,1	46,1	5,8	52,7	50,2 ; 55,3	43,7	41,2 ; 46,1	3,7	2,8 ; 4,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	19,5	17,3 ; 21,5	80,5	78,5 ; 82,7
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,026			
Hommes	18,2	81,8	17,2	14,6 ; 20,3	82,8	79,7 ; 85,4
Femmes	26,0	74,0	22,0	18,8 ; 25,3	78,0	74,7 ; 81,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,142			
15-24 ans	24,4	75,6	24,9*	16,6 ; 33,0	75,1	67,0 ; 83,4
25-44 ans	24,3	75,7	17,2	14,1 ; 20,4	82,8	79,6 ; 85,9
45-64 ans	20,6	79,4	19,4	16,2 ; 22,7	80,6	77,3 ; 83,8
65 ans et plus	18,8	81,2	18,6	13,6 ; 24,4	81,4	75,6 ; 86,4
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,088			
Personne seule	25,7	74,3	23,9	19,3 ; 28,8	76,1	71,2 ; 80,7
Couple sans enfant	17,7	82,3	16,7	13,5 ; 20,2	83,3	79,8 ; 86,5
Couple avec enfants	20,8	79,2	18,6	15,0 ; 22,3	81,4	77,7 ; 85,0
Famille monoparentale	32,2	67,8	30,4*	20,9 ; 40,4	69,6	59,6 ; 79,1
Autre	29,7	70,3	21,7**	7,2 ; 38,2	78,3	61,8 ; 92,8
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,051			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	22,0	17,8 ; 26,1	78,0	73,9 ; 82,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	21,6	17,5 ; 25,4	78,4	74,6 ; 82,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	16,6	12,8 ; 20,4	83,4	79,6 ; 87,2
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	13,8*	9,1 ; 18,9	86,2	81,1 ; 90,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,042			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	25,2	18,6 ; 32,1	74,8	67,9 ; 81,4
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	18,2	15,8 ; 20,5	81,8	79,5 ; 84,2
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	35,1	27,4 ; 43,3	64,9	56,7 ; 72,6
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	18,1	15,9 ; 20,2	81,9	79,8 ; 84,1
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,006			
Travailleurs	20,9	79,1	17,8	15,5 ; 20,2	82,2	79,8 ; 84,5
Étudiants	24,8	75,2	18,3*	9,6 ; 27,5	81,7	72,5 ; 90,4
Personnes sans emploi	37,9	62,1	35,4	25,6 ; 44,9	64,6	55,1 ; 74,4
Retraités	18,2	81,8	21,5	15,5 ; 27,6	78,5	72,4 ; 84,5
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	13,0	10,3 ; 15,7	87,0	84,3 ; 89,7
Bon	26,6	73,4	23,5	19,7 ; 27,4	76,5	72,6 ; 80,3
Passable ou mauvais	48,8	51,2	38,3	31,1 ; 45,8	61,7	54,2 ; 68,9
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	11,3	8,9 ; 13,8	88,7	86,2 ; 91,1
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	26,1	22,5 ; 29,6	73,9	70,4 ; 77,5
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	47,9	36,3 ; 59,8	52,1	40,2 ; 63,7
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	73,1	53,9 ; 90,1	26,9**	9,9 ; 46,1
Non	20,6	79,4	17,7	15,7 ; 19,8	82,3	80,2 ; 84,3
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = .			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	19,2	17,1 ; 21,2	80,8	78,8 ; 82,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,7*	1,7 ; 3,8	3,1**	1,7 ; 4,8	2,2**	1,0 ; 3,7
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,589		P = 0,779		P = 0,497	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	3,1**	1,4 ; 5,2	4,3**	1,2 ; 8,1	1,8**	0,5 ; 3,3
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,4*	1,2 ; 3,6	2,8**	1,2 ; 4,6	1,8**	0,4 ; 3,8
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,138		P = 0,502		P = 0,326	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	3,3**	1,6 ; 5,4	4,0**	1,3 ; 7,1	2,5**	0,2 ; 5,4
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	1,4**	0,5 ; 2,5	2,1**	0,4 ; 4,1	x	;
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	3,6**	1,6 ; 5,9	3,9**	1,0 ; 7,3	3,1**	0,6 ; 6,6
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	4,9**	1,1 ; 9,8	x	;	x	;
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,895		P = 0,768		P = 0,872	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	2,4**	1,0 ; 4,5	2,1**	0,7 ; 3,9	2,9**	0,2 ; 7,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,7**	1,0 ; 4,7	3,6**	0,8 ; 7,2	1,6**	0,1 ; 3,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	2,6**	0,7 ; 5,0	3,2**	0,2 ; 7,6	1,9**	0,1 ; 4,2
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	3,9**	0,9 ; 7,5	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,867		P = 0,442		P = 0,402	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	2,9**	0,7 ; 5,8	x	;	3,7**	0,6 ; 7,8
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	2,7*	1,5 ; 4,0	3,2**	1,5 ; 4,9	2,1**	0,6 ; 4,1
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,278		P = 0,462		P = 0,500	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	4,3**	1,4 ; 7,9	4,7**	0,7 ; 9,9	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	2,6*	1,6 ; 3,7	3,0**	1,4 ; 4,8	2,2**	0,9 ; 3,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,284		P = 0,011		P = 0,399	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,7*	1,6 ; 3,9	3,2**	1,5 ; 5,1	2,0**	0,8 ; 3,5
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	6,3**	0,7 ; 13,8	x	;	x	;
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,4**	0,3 ; 2,8	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,545	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,5**	0,5 ; 2,7	1,2**	0,2 ; 2,6	1,8**	0,2 ; 4,0
Bon	2,5	2,7	2,4	2,1**	0,9 ; 3,4	1,9**	0,4 ; 3,8	2,3**	0,6 ; 4,3
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	10,3**	4,5 ; 16,9	14,3**	5,2 ; 24,4	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,013		P = 0,003	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	1,1**	0,4 ; 1,9	1,4**	0,3 ; 2,7	0,8**	0,1 ; 1,7
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	3,7**	1,8 ; 5,9	4,1**	1,3 ; 7,5	3,1**	0,8 ; 6,2
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	13,4**	5,8 ; 21,8	13,5**	3,1 ; 25,0	13,2**	2,0 ; 26,8
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,001	
Élevé	7,7	9,0	6,8	10,3*	6,2 ; 14,9	13,6**	6,7 ; 20,9	7,3**	2,8 ; 13,4
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,9**	0,3 ; 1,7	1,0**	0,1 ; 2,3	0,7**	0,1 ; 1,6

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,3**	0,1 ; 0,6	x	;	0,4**	0,0 ; 0,9
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,001		P = .		P = 0,013	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	0,8**	0,2 ; 1,5	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,659		P = 0,024	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,760		P = 0,583		P = 0,370	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,098		P = 0,003		P = 0,316	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,3**	0,0 ; 0,5	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,005		P = 0,046		P = 0,001	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,2**	0,0 ; 0,4	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,028		P = 0,053		P = 0,076	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	x	;	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,111		P = 0,001		P = 0,254	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = .		P = .		P = .	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	1,7**	0,5 ; 3,1	x	;	1,9**	0,2 ; 4,0
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,366				
Oui	10,2	10,0	10,3	11,6	9,8 ; 13,4	12,3	10,0 ; 14,9	10,7	8,2 ; 13,4	
Non	89,8	90,0	89,7	88,4	86,6 ; 90,2	87,7	85,1 ; 90	89,3	86,6 ; 91,8	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,395				
Oui	4,4	3,5	5,3	5,1	3,8 ; 6,4	5,6*	3,6 ; 7,6	4,5*	3,1 ; 6,1	
Non	95,6	96,5	94,7	94,9	93,6 ; 96,2	94,4	92,4 ; 96,4	95,5	93,9 ; 96,9	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	12,6	10,7 ; 14,3	16,2	13,2 ; 19,1	8,3	6,3 ; 10,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,089		P = 0,014		P = 0,812	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	15,2*	8,6 ; 22,1	21,7*	12,3 ; 31,9	x	;
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	14,1	10,7 ; 17,4	20,4	14,7 ; 26,1	7,4*	4,7 ; 10,4
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	11,6	9,1 ; 14,1	13,5	9,9 ; 17,2	9,3*	6,3 ; 12,6
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	6,7*	3,7 ; 10,1	4,8**	0,5 ; 9,8	9,0*	4,7 ; 14,0
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,380		P = 0,186		P = 0,251	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	12,2	8,8 ; 16,0	11,9*	7,0 ; 17,6	12,7*	7,8 ; 17,9
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	10,1	7,8 ; 12,6	11,9*	8,2 ; 15,8	8,1*	5,3 ; 11,1
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	14,0	10,6 ; 17,4	19,7	14,3 ; 25,2	7,0**	3,4 ; 11,2
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	15,7*	8,5 ; 23,8	19,5**	5,9 ; 35,6	13,0**	5,5 ; 21,9
Autre	14,9	16,7	13,2*	12,2**	2,7 ; 23,1	15,4**	2,8 ; 30,3	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,883		P = 0,974		P = 0,414	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	13,1	9,4 ; 16,8	16,0*	11,0 ; 21,4	8,8**	4,1 ; 14,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	11,5	8,4 ; 14,7	16,0*	10,6 ; 21,7	6,5*	3,7 ; 9,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	13,0	9,4 ; 16,9	17,4*	11,5 ; 23,8	8,1*	4,8 ; 11,8
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	13,4*	9,0 ; 18,8	15,1**	6,9 ; 24,8	12,1*	6,9 ; 18,0
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,572		P = 0,837		P = 0,704	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	10,7*	6,3 ; 15,6	14,6**	6,3 ; 24,1	7,3**	3,6 ; 11,5
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	12,2	10,2 ; 14,3	15,7	12,4 ; 19,0	8,2	6,1 ; 10,6
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,243		P = 0,295		P = 0,782	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	13,6	11,2 ; 15,7	17,3	13,7 ; 20,6	8,6*	6,0 ; 11,4
Étudiants	17,1	21,4	12,9	12,9**	6,4 ; 20,9	20,7**	9,0 ; 34,2	x	;
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	10,8**	4,5 ; 18,0	x	;	9,1**	4,3 ; 14,7
Retraités	7,5	7,0	7,9	8,0*	4,9 ; 11,2	7,3**	2,7 ; 12,0	8,8*	4,8 ; 13,5

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	70,7	62,5 ; 78,7	70,8	61,1 ; 80,8	70,3	56,4 ; 84,2
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	29,3	21,3 ; 37,5	29,2*	19,2 ; 38,9	29,7*	15,8 ; 43,6
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	26,8	18,9 ; 34,8	28,2*	18,7 ; 38,2	23,6**	9,5 ; 38,6
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	9,0*	5,0 ; 13,6	9,4**	4,4 ; 15,6	8,1**	2,6 ; 14,8
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	26,9	20,7 ; 34,0	32,9	24,5 ; 42,4	13,3**	5,5 ; 22,9
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	6,6**	2,8 ; 11,1	5,2**	0,8 ; 11,1	9,6**	3,0 ; 17,4
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	19,6	14,1 ; 25,4	16,1*	9,7 ; 23,3	27,4*	17,5 ; 38,6
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	1,9**	0,3 ; 4,0	x	;	x	;
Autre	12,1	8,1	17,6	9,3*	4,9 ; 14,6	x	;	x	;
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	31,7	24,2 ; 39,6	30,4*	21,3 ; 39,8	34,7*	20,4 ; 49,5
Printemps	21,2	20,7	21,9	17,5*	12,2 ; 23,9	18,7*	11,9 ; 26,8	14,8**	6,5 ; 24,8
Été	29,1	30,3	27,4	27,1	20,8 ; 34,0	24,7*	16,7 ; 33,0	32,9*	22,1 ; 44,7
Automne	23,7	24,0	23,3	23,6*	16,1 ; 31,0	26,2*	16,3 ; 35,8	17,6**	9,0 ; 27,8
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	32,2	25,1 ; 39,7	28,9*	19,9 ; 38,6	39,7*	28,3 ; 52,8
Endroit public	28,1	24,8	32,5	22,9	17,1 ; 29,6	16,3*	9,7 ; 24,2	37,8*	26,1 ; 51,6
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	28,2	20,7 ; 36,4	32,1	23,1 ; 42,3	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	16,6*	9,6 ; 23,7	22,7*	13,2 ; 32,5	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	9,5**	5,0 ; 14,6	10,1**	4,1 ; 17,2	8,0**	2,2 ; 14,9
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	4,0**	0,9 ; 8,2	5,5**	0,9 ; 11,3	x	;
Heurt/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	9,3**	4,7 ; 14,4	11,2**	5,0 ; 18,5	x	;
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	8,0*	4,2 ; 12,3	9,2**	4,1 ; 15,2	5,0**	0,6 ; 10,6
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	x	;	x	;	13,0**	1,0 ; 27,8
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	18,7	13,2 ; 24,9	17,2*	10,7 ; 24,8	22,1*	12,4 ; 33,0
Chute	34,6	30,5	40,3	32,6	24,8 ; 40,3	33,1*	23,1 ; 43,1	31,4*	20,8 ; 43,0
Autres	13,7	12,5	15,3	10,6*	6,5 ; 15,7	9,3**	4,4 ; 15,2	13,7**	5,5 ; 23,9
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	x	;	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	32,3	24,4 ; 39,7	36,0	25,6 ; 45,8	24,0*	14,1 ; 34,9
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	36,8	29,3 ; 45,4	36,7	27,5 ; 46,8	37,1*	23,6 ; 50,9
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	x	;	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	17,0*	11,7 ; 23,4	14,8*	8,2 ; 22,7	22,0*	13,0 ; 33,3
Autre	11,9	10,9	13,2	9,7*	5,7 ; 14,4	9,8**	4,8 ; 15,7	9,4**	3,8 ; 16,5

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	4,3**	2,1 ; 6,9	x	;	7,5**	3,6 ; 12,1
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,873		P = .		P = 0,760	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	4,0**	1,2 ; 7,2	x	;	6,3**	1,6 ; 12,0
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	5,1**	0,9 ; 10,3	x	;	9,7**	2,0 ; 18,8
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,120		P = .		P = 0,190	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	8,2**	3,4 ; 14,0	x	;	12,1**	5,0 ; 20,9
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	3,2**	0,6 ; 6,4	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,321		P = .		P = 0,047	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	7,6**	1,3 ; 15,8	x	;	18,6**	4,0 ; 35,6
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	4,0**	1,2 ; 7,1	x	;	5,2**	1,2 ; 10,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,709		P = .		P = 0,291	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	5,8**	0,9 ; 12,3	x	;	12,2**	2,2 ; 25,4
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	4,6**	1,6 ; 7,8	x	;	6,2**	1,8 ; 11,3
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,007		P = .		P = 0,006	
Oui	5,9	3,6*	7,3	7,8**	3,2 ; 13,5	x	;	15,2**	6,2 ; 25,9
Non	2,7*	2,2**	3,1*	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,759		P = .		P = 0,673	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	x	;	x	;	x	;
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	4,7**	1,8 ; 8,1	x	;	7,0**	2,3 ; 12,6
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,818		P = 'n.d.'		P = 0,102	
Résidence	62,7	52,8	68,6	58,6**	27,4 ; 97,4	x	;	92,3	66,1 ; 100,0
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	x	;	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	x	;	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	46,8**	11,9 ; 76,4	x	;	43,9**	9,1 ; 76,9
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	x	;	x	;	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	58,9*	28,8 ; 86,7	x	;	59,1**	28,4 ; 89,7
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	11,4	9,8 ; 13,1	11,0	8,9 ; 13,4	11,7	9,3 ; 14,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,248		P = 0,378		P = 0,429	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	10,4*	5,4 ; 16,0	7,7**	2,3 ; 14,2	13,8**	5,8 ; 23,1
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	11,9	9,2 ; 14,6	11,7*	8,0 ; 15,8	12,0*	8,1 ; 16,1
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	12,6	10,0 ; 15,3	12,9*	9,0 ; 17,1	12,3	8,8 ; 16,0
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	6,5**	3,3 ; 10,0	7,0**	2,3 ; 13,1	5,8**	2,0 ; 10,5
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,259		P = 0,308		P = 0,692	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	8,6*	5,5 ; 12,0	6,3**	2,8 ; 10,6	11,7*	6,7 ; 17,0
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	9,8	7,5 ; 12,2	10,1*	6,7 ; 13,6	9,5*	6,2 ; 12,8
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	12,8	10,0 ; 16,0	12,9*	8,8 ; 17,1	12,8*	8,6 ; 17,3
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	8,8**	3,4 ; 14,8	7,1**	0,3 ; 16,0	10,0**	2,2 ; 18,8
Autre	11,4	12,8*	10,2*	16,4**	5,2 ; 29,6	16,0**	3,2 ; 31,9	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,888		P = 0,327		P = 0,536	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	10,4	7,5 ; 13,6	8,3*	5,1 ; 12,1	13,6*	8,4 ; 19,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	11,6	8,7 ; 14,7	12,9*	8,4 ; 17,7	10,2*	6,3 ; 14,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	12,0	9,0 ; 15,2	11,5*	7,1 ; 16,2	12,6*	8,3 ; 17,4
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	11,1*	6,8 ; 15,7	13,8**	6,5 ; 22,1	8,9**	3,9 ; 13,8
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,764		P = 0,173		P = 0,049	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	12,2*	7,6 ; 17,3	7,0**	1,8 ; 13,3	16,7*	9,2 ; 24,8
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	11,5	9,4 ; 13,4	13,1	10,1 ; 16,0	9,6	7,1 ; 12,2
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,006		P = 0,097		P = 0,017	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	18,4*	12,2 ; 25,5	16,7*	8,5 ; 25,9	21,4*	11,2 ; 32,6
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	10,7	9,1 ; 12,5	10,5	8,2 ; 13,0	10,9	8,5 ; 13,5
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,476		P = 0,566		P = 0,246	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	11,7	9,7 ; 13,8	11,5	8,8 ; 14,3	11,9	9,1 ; 15,0
Étudiants	9,9	9,7	10,1	11,5**	4,5 ; 19,1	x	;	14,8**	4,2 ; 27,5
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	12,3*	6,5 ; 18,8	x	;	14,7*	7,8 ; 22,0
Retraités	6,9	6,7	7,0	7,5*	4,5 ; 11,0	9,7**	4,6 ; 15,5	4,9**	1,9 ; 8,5

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,091				
Oui	45,2	47,6	42,8	53,1	44,8 ; 61,2	60,0	48,2 ; 71,3	45,7	34,6 ; 57,5	
Non	54,8	52,4	57,2	46,9	38,8 ; 55,2	40,0	28,7 ; 51,8	54,3	42,5 ; 65,4	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,926				
Oui	25,4	27,6	23,1	20,1*	13,9 ; 27,2	19,8*	11,5 ; 29,2	20,5*	10,1 ; 31,5	
Non	74,6	72,4	76,9	79,9	72,8 ; 86,1	80,2	70,8 ; 88,5	79,5	68,5 ; 89,9	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,255				
Oui	17,6	15,6	19,6	14,6*	8,9 ; 20,3	10,9**	3,6 ; 19,0	18,6*	10,2 ; 27,5	
Non	82,4	84,4	80,4	85,4	79,7 ; 91,1	89,1	81,0 ; 96,4	81,4	72,5 ; 89,8	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,608				
Oui	8,1	7,2	9,0	7,4**	3,4 ; 12,3	6,3**	1,3 ; 12,5	8,6**	2,4 ; 16,4	
Non	91,9	92,8	91,0	92,6	87,7 ; 96,6	93,7	87,5 ; 98,7	91,4	83,6 ; 97,6	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	3,4**	0,4 ; 7,1	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	70,7	63,1 ; 78,1	66,5	54,7 ; 77,6	75,4	65,2 ; 84,5	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	12,1*	6,6 ; 18,2	16,5**	7,8 ; 26,3	7,4**	1,7 ; 14,5	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	3,7**	0,9 ; 7,0	x	;	4,9**	0,3 ; 10,7	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	7,2**	3,7 ; 11,3	8,8**	3,3 ; 15,4	5,4**	1,2 ; 10,9	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	2,9**	0,1 ; 6,6	x	;	x	;	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	31,3	29,2 ; 33,6	31,7	28,5 ; 34,9	30,8	27,9 ; 34,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,001	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	19,2*	13,0 ; 25,7	22,7*	13,9 ; 32,7	15,1**	7,3 ; 23,9
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	27,2	23,2 ; 30,9	23,9	18,4 ; 29,2	30,8	25,4 ; 36,0
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	38,0	34,3 ; 41,6	39,5	34,0 ; 44,5	36,1	30,9 ; 41,5
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	39,4	32,7 ; 46,2	42,3	32,2 ; 52,3	36,0	27,8 ; 44,8
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,090		P = 0,355		P = 0,320	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	34,4	29,2 ; 39,7	31,8	24,2 ; 39,2	38,0	30,3 ; 45,9
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	32,8	29,0 ; 36,4	33,1	27,8 ; 38,3	32,5	27,4 ; 37,8
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	27,9	24,1 ; 31,8	28,6	22,8 ; 34,2	27,1	21,9 ; 32,2
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	36,4	26,4 ; 46,8	38,9*	21,2 ; 58,6	34,6*	22,9 ; 46,9
Autre	34,0	32,4	35,4	40,1*	24,9 ; 56,5	42,4*	23,6 ; 62,1	33,9**	5,7 ; 62,2
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,038		P = 0,108		P = 0,141	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	33,6	29,6 ; 37,9	36,0	30,5 ; 41,7	30,0	24,5 ; 36,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	30,6	26,2 ; 35,1	30,3	23,7 ; 37,0	30,9	25,3 ; 37,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	33,6	28,7 ; 38,3	31,3	24,5 ; 37,8	36,3	29,5 ; 43,0
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	22,8	17,2 ; 28,9	21,1*	11,4 ; 30,4	24,2*	16,6 ; 32,5
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,022		P = 0,163		P = 0,063	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	38,9	31,9 ; 46,3	39,0	28,2 ; 51,1	38,8	29,9 ; 48,2
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	30,2	27,4 ; 32,9	30,8	26,8 ; 34,6	29,4	25,7 ; 33,5
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	55,1	47,1 ; 63,9	53,4	41,8 ; 64,9	57,9	45,4 ; 69,8
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	28,9	26,6 ; 31,3	28,8	25,3 ; 32,2	29,1	25,9 ; 32,6
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,002		P = 0,022	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	31,8	28,9 ; 34,6	31,1	27,1 ; 34,9	32,8	28,7 ; 37,1
Étudiants	20,7	14,8	26,3	13,4**	6,7 ; 21,1	13,9**	4,6 ; 24,9	12,8**	3,6 ; 23,9
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	41,1	32,0 ; 50,2	58,6*	33,6 ; 81,2	36,2	26,7 ; 46,3
Retraités	34,2	30,5	37,2	35,9	30,3 ; 41,8	39,9	31,5 ; 47,8	31,3	24,1 ; 39,0
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	21,3	18,4 ; 24,1	20,3	16,4 ; 24,5	22,4	18,5 ; 26,4
Bon	33,9	28,1	39,6	36,8	32,8 ; 41,2	37,0	31,0 ; 42,9	36,7	31,1 ; 42,9
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	61,9	54,6 ; 69,2	62,6	52,8 ; 72,9	60,7	50,4 ; 71,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	50,6	44,0 ; 56,7	51,0	41,9 ; 60,3	50,2	41,8 ; 59,3
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	26,5	23,9 ; 29,0	27,3	23,6 ; 31,0	25,5	22,3 ; 29,0
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,007		P = 0,665		P = 0,000	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	35,4**	14,5 ; 57,5	x	;	43,5**	18,8 ; 67,3
Poids normal	28,3	22,9	32,1	26,2	22,7 ; 29,8	29,4	23,4 ; 35,2	23,6	19,4 ; 28,4
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	33,1	29,2 ; 36,8	32,2	27,2 ; 37,0	34,6	28,5 ; 40,6
Obésité	37,9	30,5	46,1	38,2	32,8 ; 44,0	33,4	26,2 ; 41,2	45,3	37,2 ; 53,4

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,681				
Oui	30,3	25,3	35,2	31,3	29,2 ; 33,6	31,7	28,5 ; 34,9	30,8	27,9 ; 34,1	
Non	69,7	74,7	64,8	68,7	66,4 ; 70,8	68,3	65,1 ; 71,5	69,2	65,9 ; 72,1	
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,015				
Oui	9,5	6,4	12,5	9,5	8,2 ; 10,9	7,9	6,0 ; 9,7	11,4	9,4 ; 13,6	
Non	90,5	93,6	87,5	90,5	89,1 ; 91,8	92,1	90,3 ; 94,0	88,6	86,4 ; 90,6	
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,575				
Oui	14,5	12,2	16,7	14,1	12,4 ; 15,9	14,6	12,1 ; 17,2	13,6	11,4 ; 15,9	
Non	85,5	87,8	83,3	85,9	84,1 ; 87,6	85,4	82,8 ; 87,9	86,4	84,1 ; 88,6	
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,902				
Oui	13,5	10,8	16,1	15,9	14,2 ; 17,5	16,0	13,5 ; 18,5	15,7	13,3 ; 18,3	
Non	86,5	89,2	83,9	84,1	82,5 ; 85,8	84,0	81,5 ; 86,5	84,3	81,7 ; 86,7	
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,638				
Oui	14,5	11,8	17,2	13,0	11,4 ; 14,7	12,6	10,4 ; 15,0	13,4	11,1 ; 15,8	
Non	85,5	88,2	82,8	87,0	85,3 ; 88,6	87,4	85,0 ; 89,6	86,6	84,2 ; 88,9	
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,012				
Oui	17,8	16,0	19,6	21,6	19,5 ; 23,6	24,0	20,9 ; 27,0	18,8	16,3 ; 21,7	
Non	82,2	84,0	80,4	78,4	76,4 ; 80,5	76,0	73,0 ; 79,1	81,2	78,3 ; 83,7	
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,015				
Oui	14,2	10,6	17,8	10,8	9,4 ; 12,4	9,0	7,1 ; 11,2	12,9	10,8 ; 15,2	
Non	85,8	89,4	82,2	89,2	87,6 ; 90,6	91,0	88,8 ; 92,9	87,1	84,8 ; 89,2	

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	50,3	47,7 ; 52,9	36,7	34,1 ; 39,3	13,0	11,2 ; 14,9
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	52,6	34,1	13,3	43,7	40,3 ; 47,2	40,1	36,4 ; 43,7	16,3	13,6 ; 19,2
Femmes	60,1	29,8	10,1	57,8	54,1 ; 61,4	32,9	29,5 ; 36,5	9,4	7,1 ; 11,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,091					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	45,2	36,2 ; 54,0	42,8	33,9 ; 51,6	12,0*	6,3 ; 18,4
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	54,5	50,7 ; 58,8	32,0	28,1 ; 36,0	13,4	10,4 ; 16,6
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	49,2	45,4 ; 52,9	36,7	33,0 ; 40,5	14,1	11,2 ; 16,9
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	47,0	39,9 ; 54,1	43,9	36,7 ; 50,7	9,1*	5,5 ; 13,4
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,249					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	54,5	48,6 ; 60,0	30,5	25,7 ; 35,7	15,0	11,1 ; 19,1
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	52,0	47,9 ; 55,9	37,1	33,3 ; 40,7	10,9	8,3 ; 13,6
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	50,0	45,7 ; 54,6	36,2	32,2 ; 40,3	13,7	10,5 ; 17,0
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	47,8	37,0 ; 59,0	39,7	29,1 ; 50,5	12,5**	6,5 ; 19,2
Autre	48,0	34,3	17,7	34,9*	20,7 ; 51,5	45,8*	28,2 ; 61,8	19,3**	6,9 ; 34,1
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,811					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	50,2	47,8 ; 52,9	36,9	34,3 ; 39,6	12,9	11,1 ; 14,7
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	x	;	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,583					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	51,8	49,3 ; 54,3	36,4	33,8 ; 38,9	11,8	10,2 ; 13,5
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	29,5**	8,8 ; 55,7	x	;	x	;
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	x	;	43,1**	10,0 ; 73,0	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	40,7	36,2 ; 45,4	41,8	36,8 ; 46,5	17,5	13,8 ; 21,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	49,4	44,8 ; 54,2	40,5	35,7 ; 45,1	10,1	7,3 ; 13,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	53,7	48,9 ; 58,7	33,2	28,7 ; 37,9	13,1	9,4 ; 16,8
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	70,6	63,8 ; 76,7	21,4	16,0 ; 27,2	8,0**	4,1 ; 12,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,057					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	47,6	39,9 ; 55,3	35,3	28,2 ; 42,7	17,1*	12,1 ; 22,2
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	52,5	49,6 ; 55,5	36,6	33,6 ; 39,6	10,9	9,0 ; 13,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	39,0	30,9 ; 47,2	39,3	31,4 ; 47,7	21,6*	14,5 ; 29,4
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	51,3	48,6 ; 54,1	36,5	33,7 ; 39,2	12,2	10,3 ; 14,2
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,919					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	50,4	47,5 ; 53,5	36,1	33,1 ; 39,1	13,4	11,2 ; 15,8
Étudiants	62,8	27,9	9,3	50,4	39,3 ; 61,2	38,9	28,3 ; 50,0	10,7**	4,6 ; 17,7
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	50,3	40,6 ; 59,6	36,1	27,3 ; 45,9	13,6*	7,4 ; 20,2
Retraités	49,7	38,1	12,2	50,4	43,9 ; 56,6	38,9	33,0 ; 45,1	10,6*	7,2 ; 14,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	50,3	47,7 ; 52,9	36,7	34,1 ; 39,3	13,0	11,2 ; 14,9
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	43,6	38,7 ; 48,5	38,1	33,1 ; 42,8	18,3	14,4 ; 22,5
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	53,1	49,9 ; 56,2	36,1	33,3 ; 39,3	10,8	8,9 ; 12,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	61,5	58,1 ; 64,9	30,5	27,1 ; 33,8	8,0	6,2 ; 10,1
Bon	41,4	42,6	16,0	37,9	33,9 ; 42,2	46,8	42,2 ; 51,4	15,2	11,8 ; 18,6
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	34,1	26,9 ; 41,4	35,7	28,7 ; 43,2	30,2	22,6 ; 37,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,013					
Élevé	45,8	35,4	18,9	48,5	42,0 ; 55,0	32,9	26,9 ; 39,1	18,6	13,9 ; 24,0
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	51,0	48,3 ; 53,9	37,5	34,6 ; 40,4	11,5	9,6 ; 13,4
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,073					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	55,2	49,4 ; 60,5	35,7	30,7 ; 41,2	9,1*	5,6 ; 13,1
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	49,1	46,2 ; 52,1	36,9	34,0 ; 39,7	14,0	12,0 ; 16,1
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	55,1	52,2 ; 58,1	34,4	31,6 ; 37,3	10,5	8,5 ; 12,4
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	33,5	28,4 ; 38,6	44,4	38,7 ; 50,1	22,0	17,4 ; 26,9
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,004					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	56,4	51,0 ; 61,9	33,7	28,4 ; 39,0	10,0*	6,6 ; 13,5
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	46,0	42,5 ; 49,5	38,3	34,8 ; 41,8	15,7	13,1 ; 18,4

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	19,0	17,3 ; 20,7	16,9	14,7 ; 19,0	21,4	19,0 ; 23,9
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	2,1**	0,9 ; 3,4	1,4**	0,1 ; 3,0	2,9**	0,8 ; 5,3
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	29,5	26,1 ; 33,0	27,7	22,8 ; 32,4	31,8	27,0 ; 36,7
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	67,0	60,6 ; 73,3	60,3	50,0 ; 70,4	73,7	65,7 ; 81,2
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,435		P = 0,256		P = 0,968	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	67,6	60,1 ; 74,8	63,0	51,8 ; 74,1	72,7	62,6 ; 82,3
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	61,6	47,9 ; 75,2	47,0**	18,9 ; 73,4	72,3	57,2 ; 86,8
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	34,5	30,4 ; 38,5	30,2	25,5 ; 35,2	40,4	33,6 ; 47,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	15,5	12,6 ; 18,5	12,9*	9,0 ; 17,2	18,3	14,1 ; 23,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	9,0	6,5 ; 11,7	8,0*	4,3 ; 12,1	10,2*	6,6 ; 14,1
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	5,8*	3,0 ; 9,2	x	;	8,4**	4,0 ; 13,5
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,124		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	28,7	23,0 ; 34,9	24,5*	14,5 ; 35,2	32,0	24,7 ; 39,6
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	17,5	15,6 ; 19,6	17,0	14,3 ; 20,0	18,1	15,4 ; 20,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	35,7	27,9 ; 43,3	32,9	22,6 ; 43,2	40,4	29,0 ; 52,9
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	17,5	15,8 ; 19,2	15,2	12,9 ; 17,5	20,1	17,5 ; 22,6

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	77,6	75,4 ; 79,7	19,1	17,0 ; 21,1	3,3	2,4 ; 4,4
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	67,4	64,0 ; 70,8	27,0	23,9 ; 30,2	5,5*	3,8 ; 7,5
Femmes	87,9	11,3	0,7	89,1	86,4 ; 91,5	10,1	7,7 ; 12,6	0,9**	0,4 ; 1,5
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,072					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	83,3	76,6 ; 89,7	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	81,6	78,0 ; 84,8	15,5	12,5 ; 18,8	2,9**	1,2 ; 4,9
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	73,9	70,4 ; 77,3	22,0	18,7 ; 25,4	4,1*	2,5 ; 5,9
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	67,8	61,8 ; 73,9	27,9	22,0 ; 33,8	4,3**	1,8 ; 7,3
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,781					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	77,4	72,5 ; 81,7	18,0	14,3 ; 22,5	4,6**	2,4 ; 7,3
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	74,5	70,7 ; 78,2	22,1	18,6 ; 25,6	3,4*	1,9 ; 5,1
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	81,3	77,8 ; 84,7	15,8	12,6 ; 18,9	2,9**	1,3 ; 4,8
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	76,2	65,9 ; 85,5	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	70,3	53,3 ; 87,4	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,727					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	76,6	73,9 ; 79,1	20,0	17,6 ; 22,5	3,4*	2,2 ; 4,6
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	75,9	69,2 ; 82,5	20,3*	14,1 ; 26,9	3,8**	0,8 ; 8,1
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	79,7	73,5 ; 85,8	17,0*	11,3 ; 22,8	3,3**	0,7 ; 6,7
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	89,5	82,4 ; 95,8	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	68,5	64,1 ; 73,0	26,3	21,9 ; 30,5	5,2*	3,4 ; 7,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	78,3	74,1 ; 82,2	19,8	16,0 ; 23,9	1,9**	0,5 ; 3,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	83,6	79,5 ; 87,6	13,1	9,8 ; 16,8	3,2**	1,0 ; 5,8
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	87,3	81,9 ; 91,8	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	74,4	67,6 ; 80,4	18,6	13,4 ; 24,7	6,9**	3,5 ; 11,0
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	80,7	78,3 ; 82,9	17,4	15,4 ; 19,7	1,9*	1,1 ; 2,8
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,004					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	65,7	57,5 ; 74,0	26,6	19,2 ; 34,6	7,7**	3,1 ; 13,2
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	78,7	76,5 ; 81,0	18,3	16,1 ; 20,4	3,0*	2,0 ; 4,1
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,182					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	77,5	75,0 ; 80,0	19,1	16,7 ; 21,6	3,4*	2,0 ; 4,7
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	90,7	84,0 ; 96,0	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	79,1	70,7 ; 86,3	16,6*	10,0 ; 24,2	4,3**	0,7 ; 8,9
Retraités	72,9	23,2	3,8	66,3	60,1 ; 72,9	29,2	22,6 ; 35,5	4,5**	2,3 ; 7,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	77,6	75,4 ; 79,7	19,1	17,0 ; 21,1	3,3	2,4 ; 4,4
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,001					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	71,7	67,3 ; 76,1	23,0	18,7 ; 27,2	5,4*	3,0 ; 8,1
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	80,2	77,7 ; 82,6	17,4	15,1 ; 19,6	2,5*	1,5 ; 3,5
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	82,1	79,4 ; 85,0	15,7	13,0 ; 18,4	2,2**	1,1 ; 3,4
Bon	75,1	21,2	3,6	74,5	70,6 ; 78,1	22,3	18,9 ; 26,0	3,2*	1,9 ; 4,7
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	65,7	58,0 ; 72,9	24,8	18,5 ; 31,7	9,5**	4,3 ; 15,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,025					
Élevé	77,2	19,2	3,6	72,9	67,2 ; 78,9	24,6	19,0 ; 30,1	2,5**	1,1 ; 4,3
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	78,9	76,6 ; 81,1	17,6	15,5 ; 19,9	3,5*	2,3 ; 4,8
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	68,6	63,2 ; 74,1	27,5	22,2 ; 33,0	3,9**	2,1 ; 6,2
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	79,7	77,4 ; 82,0	17,1	14,9 ; 19,3	3,2*	2,1 ; 4,4
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,023					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	90,1	86,8 ; 93,2	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	75,2	72,2 ; 78,3	20,4	17,7 ; 23,3	4,3*	2,8 ; 6,0

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	77,6	75,4 ; 79,7	67,4	64,0 ; 70,8	89,1	86,4 ; 91,5
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	19,1	17,0 ; 21,1	27,0	23,9 ; 30,2	10,1	7,7 ; 12,6
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	3,3	2,4 ; 4,4	5,5*	3,8 ; 7,5	0,9**	0,4 ; 1,5
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,001					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	68,6	63,2 ; 74,1	58,2	50,1 ; 66,4	77,7	70,1 ; 84,8
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	27,5	22,2 ; 33,0	35,8	28,3 ; 44,0	20,2*	13,3 ; 27,9
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	3,9**	2,1 ; 6,2	6,0**	2,4 ; 10,4	2,1**	0,5 ; 4,1
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	79,7	77,4 ; 82,0	69,4	65,5 ; 73,1	92,1	89,7 ; 94,3
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	17,1	14,9 ; 19,3	25,2	21,6 ; 28,8	7,3*	5,2 ; 9,7
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	3,2*	2,1 ; 4,4	5,5*	3,4 ; 7,6	0,5**	0,0 ; 1,2

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	30,2	27,4 ; 33,0	14,5	12,6 ; 16,6	55,3	52,3 ; 58,1
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	22,6	19,0 ; 26,4	13,2	10,6 ; 15,9	64,2	60,0 ; 68,2
Femmes	41,7	18,2	40,1	39,4	35,5 ; 43,5	16,1	13,1 ; 19,4	44,5	40,4 ; 48,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,082					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	27,8	20,1 ; 36,1	10,5**	5,7 ; 16,5	61,7	53,0 ; 70,3
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	30,8	26,9 ; 34,8	16,6	13,5 ; 19,8	52,5	48,3 ; 56,7
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	32,1	27,8 ; 36,4	14,8	11,4 ; 18,3	53,1	48,4 ; 57,5
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	19,0*	9,9 ; 28,4	9,0**	2,8 ; 16,7	72,0	60,8 ; 83,1
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,073					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	27,8	22,2 ; 33,3	10,8*	7,2 ; 15,0	61,4	55,2 ; 67,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	29,7	24,6 ; 34,7	14,0	10,7 ; 17,7	56,3	50,6 ; 61,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	30,8	26,2 ; 35,7	16,8	12,9 ; 21,1	52,3	47,1 ; 57,5
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	34,0	27,4 ; 41,1	18,3*	12,7 ; 24,1	47,7	40,4 ; 54,9
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,227					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	30,0*	19,5 ; 40,1	9,2**	4,3 ; 15,3	60,8	50,8 ; 71,0
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	30,3	27,3 ; 33,2	15,5	13,1 ; 18,1	54,2	50,9 ; 57,5
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,376					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	30,0	27,0 ; 33,1	15,3	12,9 ; 17,6	54,7	51,5 ; 57,9
Étudiants	28,8	16,3	54,9	31,2*	21,0 ; 41,9	14,4**	7,1 ; 23,3	54,4	43,0 ; 65,5
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	33,1*	23,1 ; 44,3	13,9**	7,2 ; 21,9	53,0	40,9 ; 64,0
Retraités	38,0	12,4	49,6	21,5*	13,6 ; 29,7	8,6**	3,4 ; 14,4	70,0	60,8 ; 78,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
1,8*	1,1 ; 2,6	38,6	36,1 ; 41,0	38,2	35,7 ; 40,8	21,4	19,3 ; 23,6	Ensemble de la population	
P = 0,029									
x	;	31,1	28,0 ; 34,4	45,1	41,4 ; 48,9	x	;	Sexe	
3,2*	1,9 ; 4,8	47,6	43,8 ; 51,1	29,9	26,7 ; 33,2	19,3	16,6 ; 22,0	Hommes	
P = 0,256									
x	;	70,2	55,6 ; 83,3	15,2**	6,1 ; 26,7	x	;	Femmes	
x	;	51,3	39,9 ; 62,7	37,7	26,0 ; 49,9	x	;	Groupe d'âge	
P = 0,003									
5,4**	1,4 ; 10,0	58,4	49,4 ; 66,7	29,2	21,2 ; 37,5	7,0**	2,8 ; 12,2	15-17 ans	
1,4**	0,5 ; 2,5	38,7	34,8 ; 42,8	36,3	32,5 ; 40,4	23,5	19,8 ; 27,3	18-24 ans	
1,0**	0,3 ; 1,8	32,7	29,2 ; 36,3	41,3	37,7 ; 44,9	24,9	21,5 ; 28,4	15-24 ans	
x	;	30,1	24,2 ; 36,3	46,8	40,0 ; 53,8	x	;	25-44 ans	
P = 'n.d.'									
x	;	69,5	49,4 ; 88,7	16,1**	2,6 ; 32,8	x	;	45-64 ans	
x	;	42,4*	29,0 ; 57,8	43,6*	28,5 ; 58,8	x	;	65 ans et plus	
P = 'n.d.'									
x	;	50,3	39,0 ; 62,7	35,6*	22,8 ; 47,1	x	;	Hommes	
x	;	30,8	25,5 ; 36,3	41,9	36,3 ; 48,2	x	;	15-17 ans	
x	;	23,3	18,9 ; 27,9	50,4	44,9 ; 55,7	x	;	18-24 ans	
x	;	31,5	22,5 ; 41,5	51,4	40,4 ; 62,0	x	;	15-24 ans	
P = 0,867									
x	;	70,8	50,7 ; 88,2	14,5**	1,8 ; 30,9	x	;	25-44 ans	
x	;	68,7	46,7 ; 84,5	26,0**	11,4 ; 45,7	x	;	45-64 ans	
P = 0,430									
x	;	69,7	55,4 ; 81,9	20,3*	10,4 ; 31,8	x	;	65 ans et plus	
3,1**	1,2 ; 5,3	47,9	42,0 ; 53,7	29,8	24,3 ; 35,1	19,2	14,7 ; 24,2	Femmes	
2,2**	0,8 ; 4,0	44,4	38,2 ; 50,2	30,1	25,1 ; 35,2	23,2	18,6 ; 28,2	15-17 ans	
x	;	28,7	21,0 ; 36,7	42,2	32,9 ; 51,6	x	;	18-24 ans	
P = 0,642									
2,0**	0,5 ; 3,9	37,2	32,5 ; 42,0	36,8	32,5 ; 41,5	24,0	19,8 ; 28,1	25-44 ans	
2,1**	0,8 ; 3,8	38,9	34,0 ; 43,7	38,2	33,3 ; 43,1	20,8	17,1 ; 24,6	45-64 ans	
1,8**	0,6 ; 3,2	37,3	32,5 ; 42,2	41,9	36,9 ; 46,9	19,0	15,0 ; 23,2	65 ans et plus	
x	;	44,4	37,1 ; 51,5	34,1	27,4 ; 41,1	x	;	Niveau de scolarité	
P = 'n.d.'									
x	;	33,7	28,3 ; 39,7	41,8	35,8 ; 48,1	x	;	Niveau inférieur au DES	
x	;	29,1	22,8 ; 35,7	44,4	37,2 ; 51,9	x	;	Diplôme d'études secondaires (DES)	
x	;	28,3	22,4 ; 34,6	51,0	43,8 ; 58,0	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
x	;	35,4	24,6 ; 46,5	43,7	33,1 ; 54,8	x	;	Diplôme d'études universitaires	
P = 0,514									
3,9**	0,7 ; 8,0	42,3	34,2 ; 50,1	29,5	23,7 ; 35,9	24,3	18,8 ; 30,5	Hommes	
3,2**	0,9 ; 5,8	50,3	43,4 ; 56,9	31,0	25,1 ; 37,4	15,5	10,9 ; 20,4	Niveau inférieur au DES	
3,9**	1,3 ; 6,9	48,1	41,3 ; 55,3	31,1	24,6 ; 37,6	16,9*	11,7 ; 22,5	Diplôme d'études secondaires (DES)	
x	;	52,1	42,3 ; 61,1	25,7*	17,4 ; 34,5	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
P = 0,593									
3,6**	0,4 ; 7,7	37,9	30,4 ; 45,2	37,4	30,3 ; 45,5	21,0	15,6 ; 27,3	Diplôme d'études universitaires	
1,7*	0,9 ; 2,6	40,6	37,6 ; 43,6	38,1	35,0 ; 41,1	19,6	17,4 ; 22,1	Indice du niveau de revenu du ménage	
P = 'n.d.'									
x	;	32,8*	30,4 ; 45,2	45,9	30,3 ; 45,5	x	;	Quintile 1 (faible)	
x	;	33,6	37,6 ; 43,6	44,4	35,0 ; 41,1	x	;	Quintile 2 et suivants	
P = 0,644									
5,3**	0,4 ; 7,7	41,9	30,4 ; 45,2	30,8	30,3 ; 45,5	21,9*	15,6 ; 27,3	Femmes	
3,4*	0,9 ; 2,6	49,0	37,6 ; 43,6	30,5	35,0 ; 41,1	17,1	17,4 ; 22,1	Quintile 1 (faible)	
P = 'n.d.'									
P = 'n.d.'									
P = 'n.d.'									
P = 'n.d.'									

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	42,9	40,5 ; 45,2	2,1*	1,5 ; 2,9	55,0	52,7 ; 57,3
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,053					
Hommes	36,6	3,6	59,9	40,2	36,8 ; 43,5	2,5*	1,5 ; 3,8	57,2	53,9 ; 60,6
Femmes	40,5	2,3	57,1	46,0	42,6 ; 49,6	1,6**	0,9 ; 2,6	52,3	48,7 ; 55,7
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	17,2*	10,9 ; 24,0	4,5**	1,4 ; 8,2	78,3	71,1 ; 85,0
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	44,1	40,0 ; 48,0	1,9**	0,8 ; 3,0	54,0	50,0 ; 58,1
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	52,8	49,0 ; 56,5	1,2**	0,4 ; 2,1	46,0	42,4 ; 49,9
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	40,5	33,9 ; 47,2	3,0**	0,9 ; 5,5	56,5	49,9 ; 63,2
<b>Hommes</b>	P = 0,000			P = 0,001					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	13,0**	5,7 ; 21,2	6,3**	1,4 ; 12,1	80,8	71,3 ; 89,2
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	40,2	34,0 ; 46,2	2,5**	0,8 ; 4,6	57,3	51,4 ; 63,5
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	51,6	46,1 ; 57,0	0,9**	0,0 ; 2,1	47,4	42,1 ; 52,9
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	40,1	29,8 ; 51,1	x	;	x	;
<b>Femmes</b>	P = 0,000			P = 0,292					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	22,7*	12,6 ; 35,0	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	48,5	42,7 ; 54,5	1,2**	0,1 ; 2,5	50,3	44,2 ; 56,1
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	54,2	48,6 ; 60,0	1,5**	0,3 ; 3,1	44,3	38,5 ; 49,8
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	40,8	32,2 ; 49,2	3,1**	0,3 ; 6,3	56,2	47,2 ; 64,9
<b>Statut pondéral</b>	P = 0,000			P = 0,006					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	35,8**	14,5 ; 59,1	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	10,3	8,0 ; 12,7	3,5*	2,2 ; 5,0	86,2	83,4 ; 88,9
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	51,4	47,7 ; 55,4	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	88,1	83,9 ; 91,7	x	;	x	;
<b>Hommes</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	5,7**	2,9 ; 8,7	5,5*	3,0 ; 8,3	88,8	84,9 ; 92,6
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	42,4	37,3 ; 47,7	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	82,9	76,1 ; 88,6	x	;	x	;
<b>Femmes</b>	P = 0,000			P = 0,022					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	21,1**	5,5 ; 42,4	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	13,8	10,4 ; 17,7	2,0**	0,7 ; 3,7	84,1	80,1 ; 87,7
Embonpoint	69,6	x	x	67,8	61,6 ; 73,6	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	95,7	92,9 ; 98,1	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	84,4	81,0 ; 87,8	8,1*	5,5 ; 10,9	7,5	5,4 ; 9,9
Sexe	P = 0,000			P = 0,104					
Hommes	81,4	10,5	8,0	88,6	83,5 ; 93,6	6,2**	2,3 ; 10,8	5,2**	2,5 ; 8,4
Femmes	74,5	14,1	11,5	80,7	76,1 ; 85,0	9,7*	6,7 ; 13,2	9,5*	6,2 ; 13,2
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,896					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	80,8	66,2 ; 94,1	x	;	x	;
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	84,3	78,3 ; 90,3	9,6**	4,8 ; 15,1	6,1**	2,9 ; 9,8
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	86,2	81,8 ; 90,0	6,2*	3,7 ; 9,2	7,6*	4,5 ; 11,0
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	80,3	68,9 ; 90,3	8,2**	1,5 ; 16,1	11,6**	3,3 ; 20,9
Hommes	P = 0,252			P = 0,910					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	94,7	78,3 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	84,8	73,3 ; 95,6	x	;	x	;
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	91,2	85,8 ; 95,8	2,9**	0,5 ; 5,9	5,9**	1,7 ; 10,8
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	84,4	67,4 ; 98,3	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,955					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	70,4	46,4 ; 91,4	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	83,9	77,3 ; 89,9	8,7**	4,1 ; 14,1	7,4**	3,0 ; 12,2
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	81,1	74,6 ; 87,2	9,6*	5,2 ; 14,7	9,3**	4,6 ; 14,5
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	76,4	59,5 ; 91,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,592					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	86,8	79,5 ; 93,0	4,4**	1,4 ; 8,2	8,7**	3,2 ; 15,5
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	84,7	79,8 ; 89,4	9,2*	5,6 ; 13,2	6,1*	3,3 ; 9,6
Obésité	72,3	14,4	13,3	83,0	76,2 ; 89,4	8,4**	3,6 ; 14,4	8,6*	4,7 ; 13,1
Hommes	P = 0,002			P = 0,664					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	x	;	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	90,5	85,2 ; 95,3	5,8**	2,0 ; 10,5	3,6**	0,8 ; 7,1
Obésité	76,0	12,2	11,8	84,1	73,7 ; 94,0	7,8**	0,3 ; 17,5	8,1**	2,5 ; 15,1
Femmes	P = 0,161			P = 0,501					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	83,8	75,1 ; 91,4	5,4**	1,7 ; 10,0	10,7**	4,0 ; 18,7
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	77,9	69,4 ; 85,6	13,0**	6,7 ; 20,2	9,1**	4,0 ; 15,4
Obésité	68,9	16,4	14,7	81,5	73,4 ; 88,4	9,2**	4,4 ; 15,0	9,3**	3,5 ; 15,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
18,1	16,2 ; 20,1	16,8	14,9 ; 18,8	1,9*	1,2 ; 2,6	63,2	60,7 ; 65,6	Ensemble de la population	
P = 0,000									
14,8	12,1 ; 17,4	15,9	13,2 ; 18,7	2,7*	1,5 ; 4,0	66,6	63,4 ; 70,0	Sexe	
21,9	19,2 ; 24,6	17,8	15,2 ; 20,5	1,0**	0,4 ; 1,7	59,4	55,9 ; 62,7	Hommes	
P = 0,001									
10,4*	5,7 ; 15,6	11,8*	6,5 ; 17,7	5,6**	2,2 ; 9,4	72,3	64,7 ; 79,7	Groupe d'âge	
21,2	17,6 ; 24,7	17,0	13,9 ; 20,0	1,1**	0,4 ; 2,0	60,7	56,7 ; 64,8	15-24 ans	
18,9	16,1 ; 21,8	19,9	16,7 ; 23,4	1,2**	0,5 ; 2,1	60,0	56,2 ; 63,7	25-44 ans	
16,7*	11,9 ; 22,1	11,5*	7,3 ; 16,2	x	;	x	;	45-64 ans	
P = 0,164									
5,3**	0,7 ; 11,1	12,0**	4,4 ; 20,6	10,2**	4,0 ; 17,3	72,5	61,8 ; 82,4	Hommes	
16,1*	10,9 ; 21,4	16,0	11,7 ; 20,5	1,4**	0,1 ; 3,0	66,5	61,0 ; 72,6	15-24 ans	
16,7	12,8 ; 20,8	19,0	14,3 ; 23,8	x	;	x	;	25-44 ans	
19,2*	11,5 ; 27,9	8,6**	3,1 ; 14,7	x	;	x	;	45-64 ans	
P = 0,322									
16,5**	7,8 ; 26,8	11,4**	4,3 ; 20,4	x	;	x	;	65 ans et plus	
26,6	21,6 ; 31,5	18,1	13,9 ; 22,4	x	;	x	;	Hommes	
21,7	17,4 ; 25,9	21,0	16,6 ; 25,6	1,5**	0,3 ; 3,0	55,8	50,1 ; 61,4	15-24 ans	
14,2*	8,1 ; 21,0	14,3*	8,1 ; 21,4	x	;	x	;	25-44 ans	
P = 0,076									
x	;	x	;	9,9**	1,3 ; 21,4	79,0	58,0 ; 95,4	Femmes	
7,0	4,9 ; 9,2	11,8	9,4 ; 14,4	3,9*	2,2 ; 5,7	77,3	73,7 ; 80,6	15-24 ans	
21,0	17,9 ; 24,2	19,6	16,4 ; 22,9	x	;	x	;	25-44 ans	
35,1	29,8 ; 40,7	22,9	18,0 ; 27,9	x	;	x	;	45-64 ans	
P = 0,000									
x	;	x	;	x	;	x	;	65 ans et plus	
2,2**	0,5 ; 4,3	5,8**	2,7 ; 8,9	7,1**	3,6 ; 11,0	84,9	80,1 ; 89,7	Hommes	
14,5	10,9 ; 18,2	19,6	15,5 ; 24,1	x	;	x	;	Poids insuffisant	
33,1	25,4 ; 40,7	22,4*	15,5 ; 29,3	x	;	x	;	Poids normal	
P = 0,216									
x	;	x	;	12,2**	1,9 ; 26,7	74,2	51,1 ; 93,8	Embonpoint	
10,8*	7,3 ; 14,6	16,5	12,7 ; 20,8	1,3**	0,3 ; 2,7	71,3	66,1 ; 76,1	Obésité	
32,9	27,1 ; 39,2	19,7	14,5 ; 25,0	x	;	x	;	Hommes	
38,0	30,7 ; 45,5	23,5	16,9 ; 30,5	x	;	x	;	Poids insuffisant	
P = 0,000									
35,7	32,1 ; 39,3	22,0	18,8 ; 25,4	x	;	x	;	Poids normal	
x	;	x	;	24,0**	11,4 ; 40,0	76,0	60,0 ; 88,6	Embonpoint	
5,5	4,0 ; 7,2	13,6	11,2 ; 16,1	2,5*	1,4 ; 3,8	78,4	75,4 ; 81,2	Obésité	
P = 0,000									
35,7	32,1 ; 39,3	22,0	18,8 ; 25,4	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	24,0**	11,4 ; 40,0	76,0	60,0 ; 88,6	Excès de poids	
5,5	4,0 ; 7,2	13,6	11,2 ; 16,1	2,5*	1,4 ; 3,8	78,4	75,4 ; 81,2	Trop maigre	
P = 0,000									
5,5	4,0 ; 7,2	13,6	11,2 ; 16,1	2,5*	1,4 ; 3,8	78,4	75,4 ; 81,2	À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
30,5	25,2 ; 36,2	13,6	9,8 ; 17,7	6,8**	3,4 ; 10,8	49,1	43,1 ; 55,0	Ensemble de la population	
P = 0,371									
32,6	24,1 ; 42,0	12,9*	6,7 ; 19,8	9,9**	2,9 ; 18,0	44,7	34,2 ; 54,9	Sexe	
29,0	22,2 ; 36,1	14,1*	8,8 ; 19,6	4,5**	1,7 ; 7,9	52,4	44,9 ; 60,0	Hommes	
P = 0,926									
28,8**	5,7 ; 57,3	x	;	x	;	44,3**	14,0 ; 71,5	Femmes	
37,5	28,2 ; 47,5	8,6**	3,9 ; 14,6	9,1**	2,4 ; 16,9	44,9	34,8 ; 54,7	Groupe d'âge	
26,9	18,9 ; 34,4	18,2*	11,8 ; 25,2	4,5**	1,3 ; 8,2	50,4	41,6 ; 58,8	15-24 ans	
15,2**	2,9 ; 29,7	x	;	x	;	69,0	51,3 ; 85,8	25-44 ans	
P = 0,997									
x	;	x	;	x	;	x	;	45-64 ans	
35,1*	19,1 ; 54,8	12,4**	2,4 ; 25,6	x	;	x	;	65 ans et plus	
31,9*	19,0 ; 44,6	17,1**	7,4 ; 28,1	x	;	x	;	Hommes	
x	;	x	;	x	;	67,3*	41,9 ; 92,6	15-24 ans	
P = 0,938									
x	;	x	;	x	;	48,1**	9,4 ; 80,0	25-44 ans	
39,0	27,7 ; 50,1	6,1**	1,4 ; 11,5	5,0**	0,4 ; 11,1	49,9	38,4 ; 61,5	Femmes	
22,4*	12,9 ; 32,3	19,3*	10,9 ; 28,9	4,7**	0,5 ; 10,0	53,7	42,1 ; 64,5	15-24 ans	
x	;	x	;	x	;	71,3*	44,1 ; 94,1	25-44 ans	
P = 0,312									
x	;	x	;	x	;	x	;	45-64 ans	
33,6*	20,0 ; 49,1	x	;	x	;	59,0	43,1 ; 73,5	65 ans et plus	
36,0	27,4 ; 44,7	10,5**	5,7 ; 15,9	5,0**	1,5 ; 9,5	48,4	40,1 ; 57,3	Statut pondéral	
25,0*	17,6 ; 34,1	16,5*	9,8 ; 24,4	11,2**	3,5 ; 20,0	47,3	37,0 ; 57,2	Poids insuffisant	
P = 0,882									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids normal	
x	;	x	;	x	;	x	;	Embonpoint	
44,1	30,2 ; 57,2	x	;	x	;	47,2	34,0 ; 61,3	Obésité	
22,0**	11,3 ; 35,6	20,3**	9,7 ; 33,4	15,5**	2,5 ; 29,6	42,3*	25,8 ; 57,2	Hommes	
P = 0,792									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
32,5*	18,3 ; 49,3	x	;	x	;	61,0	42,9 ; 76,4	Poids normal	
29,6*	19,1 ; 41,0	15,6**	7,9 ; 24,2	5,5**	0,6 ; 11,8	49,3	38,1 ; 61,2	Embonpoint	
28,8*	16,8 ; 40,9	11,7**	4,3 ; 20,5	x	;	x	;	Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	81,6	78,3 ; 84,9	9,9	7,1 ; 12,7	8,5	6,4 ; 10,9
Sexe	P = 0,001			P = 0,157					
Hommes	88,9	6,9	4,2	82,2	76,4 ; 87,6	11,5*	6,6 ; 16,6	6,3*	3,4 ; 9,7
Femmes	85,7	7,5	6,8	81,0	76,6 ; 85,3	8,5*	5,6 ; 11,6	10,5*	7,2 ; 14,0
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,895					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	91,4	80,8 ; 99,2	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	79,5	73,2 ; 85,7	11,4**	6,0 ; 17,2	9,1*	5,6 ; 13,2
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	82,0	76,9 ; 86,6	9,7*	6,0 ; 13,9	8,3*	5,0 ; 12,3
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	77,0	65,1 ; 87,9	12,6**	4,0 ; 22,8	10,3**	2,4 ; 19,4
Hommes	P = 0,121			P = 0,998					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	89,8	68,5 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	82,4	71,0 ; 92,9	11,4**	1,5 ; 22,7	6,2**	1,4 ; 12,0
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	80,6	72,3 ; 87,8	12,4**	5,8 ; 19,7	7,0**	2,8 ; 12,1
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	81,6	63,3 ; 97,1	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,947					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	92,5	79,7 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	77,3	69,8 ; 84,3	11,3*	6,2 ; 16,9	11,4*	6,3 ; 17,0
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	83,3	76,6 ; 89,4	7,0**	3,1 ; 11,4	9,7**	4,5 ; 15,6
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	72,7	56,0 ; 88,7	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,005					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	92,5	87,6 ; 96,9	4,5**	1,2 ; 8,4	3,0**	0,3 ; 6,5
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	86,1	81,4 ; 90,1	7,8*	4,7 ; 11,2	6,1*	3,3 ; 9,2
Obésité	82,0	8,7	9,2	69,2	61,5 ; 76,7	15,8*	9,2 ; 22,7	15,0*	10,1 ; 20,4
Hommes	P = 0,002			P = 0,012					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	94,9	80,8 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	89,8	83,9 ; 94,5	7,4**	3,0 ; 12,4	2,9**	0,4 ; 6,2
Obésité	85,2	8,2	6,6*	71,6	60,5 ; 82,8	16,6**	6,2 ; 27,4	11,8**	5,8 ; 19,0
Femmes	P = 0,034			P = 0,069					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	92,0	86,5 ; 96,9	4,4**	0,7 ; 8,6	3,7**	0,4 ; 7,8
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	81,9	74,3 ; 88,8	8,2**	3,6 ; 13,7	9,9**	4,3 ; 15,7
Obésité	79,1	9,2	11,8	66,1	56,2 ; 75,6	14,6*	7,9 ; 22,5	19,3*	11,6 ; 28,2

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	5,6*	3,5 ; 7,9	94,4	92,1 ; 96,5
Sexe	P = 0,024		P = 0,868			
Hommes	6,6	93,4	5,8**	2,1 ; 10,1	94,2	89,9 ; 97,9
Femmes	8,6	91,4	5,4*	3,2 ; 7,8	94,6	92,2 ; 96,8
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,901			
15-24 ans	11,2*	88,8	x	;	x	;
25-44 ans	8,0	92,0	6,7**	2,4 ; 11,7	93,3	88,3 ; 97,6
45-64 ans	7,5	92,5	6,0*	3,3 ; 9,0	94,0	91,0 ; 96,7
65 ans et plus	4,9	95,1	x	;	x	;
Hommes	P = 0,409		P = 0,499			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	9,1**	0,6 ; 20,0	90,9	80,0 ; 99,4
45-64 ans	7,0	93,0	4,6**	1,5 ; 8,6	95,4	91,4 ; 98,5
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,622			
15-24 ans	12,3*	87,7	x	;	x	;
25-44 ans	9,9	90,1	4,8**	1,7 ; 8,5	95,2	91,5 ; 98,3
45-64 ans	7,8	92,2	7,3**	3,3 ; 12,0	92,7	88,0 ; 96,7
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,004			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	x	;	x	;
Embonpoint	6,6	93,4	3,2**	1,4 ; 5,2	96,8	94,8 ; 98,6
Obésité	11,3	88,7	10,3**	4,9 ; 16,2	89,7	83,8 ; 95,1
Hommes	P = 0,000		P = 0,206			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	2,9**	0,5 ; 5,9	97,1	94,1 ; 99,5
Obésité	11,5	88,5	9,5**	1,5 ; 19,0	90,5	81,0 ; 98,5
Femmes	P = 0,032		P = 0,004			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	x	;	x	;
Embonpoint	8,4	91,6	3,4**	0,8 ; 6,7	96,6	93,3 ; 99,2
Obésité	11,1	88,9	11,2**	5,6 ; 17,4	88,8	82,6 ; 94,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	0,4**	0,0 ; 0,8	x	;	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	1,9**	0,4 ; 3,9	x	;	x	;
Rarement	2,8	2,6*	2,9	2,6**	1,3 ; 4,1	3,4**	1,4 ; 6,0	1,8**	0,2 ; 3,9
Jamais	94,8	94,8	94,8	95,2	92,8 ; 97,3	92,9	88,4 ; 97,0	97,2	94,8 ; 99,0
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,564					
Souvent	4,6	4,2	4,9	3,4**	1,5 ; 5,6	3,8**	0,6 ; 8,1	3,1**	1,4 ; 5,1
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	5,7*	3,8 ; 7,5	6,2*	3,3 ; 9,4	5,2*	2,9 ; 7,8
Rarement	5,1	5,5	4,9	7,3*	4,8 ; 9,8	9,2*	5,0 ; 13,7	5,6*	3,0 ; 8,6
Jamais	82,9	81,4	84,0	83,6	80,1 ; 87,1	80,7	74,9 ; 86,9	86,2	82,1 ; 89,8
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,495					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	1,7**	0,3 ; 3,7	3,1**	0,1 ; 7,3	x	;
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	4,3*	2,4 ; 6,4	5,1**	1,8 ; 8,8	x	;
Rarement	4,5	4,3	4,5	2,8**	1,4 ; 4,6	3,4**	1,3 ; 6,2	2,3**	0,5 ; 4,7
Jamais	86,5	87,5	85,7	91,2	88,0 ; 94,1	88,4	82,9 ; 93,6	93,6	90,3 ; 96,4
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	1,5**	0,2 ; 3,2	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	97,9	96,0 ; 99,3	98,4	96,5 ; 99,9	97,5	94,3 ; 99,7
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,3	98,6 ; 99,9	99,7	98,7 ; 100,0	99,1	97,9 ; 99,9
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	1,1**	0,1 ; 2,8	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	97,9	96,1 ; 99,3	99,8	99,1 ; 100,0	96,2	92,9 ; 98,7
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	1,0**	0,2 ; 2,1	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	98,3	97,0 ; 99,3	99,2	97,5 ; 100,0	97,4	95,5 ; 99,1
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	1,5**	0,3 ; 3,3	x	;	1,9**	0,1 ; 4,9
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	x	;	x	;	x	;
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,9	96,1 ; 99,3	98,9	97,1 ; 100,0	97,1	93,8 ; 99,3

Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	0,6**	0,0 ; 1,4	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	97,7	95,6 ; 99,4	97,2	93,2 ; 100,0	98,1	96,5 ; 99,5
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,7	99,1 ; 100,0	99,9	99,3 ; 100,0	99,5	98,5 ; 100,0
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,8	99,2 ; 100,0	x	;	99,6	98,6 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
5,2*	3,3 ; 7,3	38,1	33,9 ; 42,3	43,6	39,2 ; 48,0	13,1	10,4 ; 15,9	Ensemble de la population	
P = 0,000									
8,9*	5,1 ; 13,2	42,8	35,7 ; 49,5	38,5	32,1 ; 45,5	9,8*	6,2 ; 13,5	Sexe	
2,0**	0,6 ; 3,6	33,9	28,8 ; 39,1	48,2	42,5 ; 53,6	16,0	11,9 ; 20,2	Hommes	
								Femmes	
P = 0,853									
x	;	40,3*	21,0 ; 58,3	39,8*	21,8 ; 58,8	x	;	Groupe d'âge	
3,2**	1,1 ; 5,8	34,9	28,2 ; 42,1	43,1	36,0 ; 50,3	18,7	13,6 ; 24,1	15-24 ans	
7,2*	3,9 ; 10,9	38,1	32,2 ; 44,5	45,5	39,1 ; 51,8	9,1*	5,9 ; 12,7	25-44 ans	
x	;	50,9	37,1 ; 63,7	40,7	28,0 ; 53,6	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,970									
x	;	51,8**	20,0 ; 80,7	34,1**	9,0 ; 65,3	x	;	Hommes	
5,6**	1,4 ; 11,1	37,7*	25,7 ; 49,8	42,3	30,8 ; 54,5	14,4**	7,0 ; 22,8	15-24 ans	
11,3**	5,4 ; 18,5	41,3	32,0 ; 50,9	38,4	28,7 ; 48,0	9,0**	4,3 ; 14,4	25-44 ans	
x	;	64,3	44,7 ; 83,7	27,4**	9,4 ; 47,4	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,912									
x	;	31,3**	10,1 ; 56,9	44,2**	18,2 ; 69,2	x	;	Femmes	
x	;	32,8	24,9 ; 40,9	43,8	35,5 ; 51,9	x	;	15-24 ans	
3,1**	0,5 ; 6,2	34,9	27,5 ; 43,1	52,8	44,6 ; 61,0	9,2**	4,6 ; 14,2	25-44 ans	
x	;	37,7*	20,5 ; 55,4	53,8*	36,2 ; 72,4	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,253									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
x	;	48,4	39,2 ; 57,9	37,3	27,6 ; 46,6	x	;	Poids insuffisant	
8,0*	4,2 ; 12,0	32,0	26,4 ; 38,2	47,7	41,1 ; 54,1	12,3*	8,2 ; 16,9	Poids normal	
3,3**	0,8 ; 6,2	38,9	30,8 ; 46,9	43,0	35,4 ; 51,5	14,8*	9,8 ; 20,1	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,787									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	62,5*	37,8 ; 83,5	26,9**	8,1 ; 50,9	x	;	Poids insuffisant	
12,1**	5,5 ; 18,7	34,5	26,0 ; 43,6	45,5	36,0 ; 54,9	7,9**	3,3 ; 12,9	Poids normal	
5,7**	1,4 ; 11,2	48,3	36,0 ; 59,8	32,8*	22,5 ; 44,5	13,1*	6,7 ; 21,0	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,513									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
x	;	45,2	35,2 ; 56,1	39,8	28,7 ; 49,9	x	;	Poids insuffisant	
3,2**	0,4 ; 6,4	29,0	21,0 ; 37,7	50,2	40,9 ; 59,7	17,6*	10,7 ; 25,5	Poids normal	
x	;	26,5*	18,2 ; 35,3	56,5	45,7 ; 66,5	x	;	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,199				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	46,8	42,7 ; 51,5	43,0	36,2 ; 50,3	50,2	44,7 ; 55,7	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	37,7	33,3 ; 42,1	39,3	31,9 ; 46,0	36,4	30,7 ; 41,7	
Non	14,4	15,3	13,7	15,5	12,6 ; 18,7	17,7	12,8 ; 23,3	13,5	10,2 ; 17,0	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,005				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	47,1	42,6 ; 51,3	39,5	32,6 ; 46,2	53,7	48,2 ; 59,1	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	35,9	31,8 ; 40,2	40,4	33,4 ; 47,5	31,9	27,0 ; 37,0	
Non	19,6	22,6	17,4	17,0	14,1 ; 20,2	20,1	15,2 ; 25,9	14,3	10,9 ; 18,1	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,002				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	45,8	41,3 ; 50,0	39,4	32,5 ; 46,2	51,5	45,8 ; 56,8	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	29,8	25,9 ; 33,7	29,6	23,4 ; 36,2	29,9	25,2 ; 34,9	
Non	27,7	32,4	24,3	24,4	20,8 ; 28,3	31,0	24,7 ; 37,8	18,6	14,7 ; 22,8	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,027				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	44,0	39,8 ; 48,4	37,7	31,3 ; 44,3	49,6	43,9 ; 55,1	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	29,2	25,5 ; 33,2	32,5	26,2 ; 38,9	26,4	21,7 ; 31,1	
Non	26,1	27,4	25,1	26,8	23,0 ; 30,6	29,8	23,3 ; 36,2	24,1	19,7 ; 28,5	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	60,9	56,4 ; 65,2	50,4	43,3 ; 57,5	70,2	64,9 ; 75,1	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	20,9	17,4 ; 24,6	26,8	21,1 ; 32,9	15,6	11,7 ; 19,9	
Non	17,4	18,5	16,6	18,2	14,7 ; 21,5	22,8	16,7 ; 28,7	14,1	10,5 ; 18,2	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	58,9	54,7 ; 63,1	49,7	42,9 ; 56,4	67,1	61,8 ; 72,1	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	26,9	23,0 ; 30,9	33,5	26,6 ; 40,3	21,1	16,6 ; 25,8	
Non	12,6	14,0	11,6	14,1	11,1 ; 17,2	16,8*	12,0 ; 22,0	11,7*	8,0 ; 15,8	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,005				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	42,1	37,9 ; 46,2	36,5	30,1 ; 43,1	47,1	41,7 ; 52,5	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	34,1	29,9 ; 38,0	33,8	27,4 ; 40,4	34,3	29,2 ; 39,5	
Non	21,5	24,4	19,4	23,9	20,3 ; 27,6	29,7	23,9 ; 36,4	18,7	14,4 ; 23,2	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,280				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	12,6	10,0 ; 15,5	14,7*	10,4 ; 19,7	10,8	7,6 ; 14,2	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	15,9	12,7 ; 19,4	17,1*	11,7 ; 22,7	14,9	10,8 ; 19,0	
Non	72,0	67,3	75,4	71,5	67,3 ; 75,1	68,2	61,6 ; 74,4	74,3	69,5 ; 79,1	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,099				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	30,4	26,6 ; 34,6	29,8	24,1 ; 36,0	30,9	25,6 ; 36,2	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	18,6	15,0 ; 22,2	22,5	16,2 ; 28,7	15,1	11,5 ; 19,2	
Non	49,9	43,2	54,7	51,0	46,9 ; 55,3	47,7	41,3 ; 54,5	53,9	48,5 ; 59,3	



Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,038				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	48,2	44,1 ; 52,7	43,3	36,7 ; 50,3	52,5	47,1 ; 57,9	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	22,7	18,8 ; 26,5	27,6	20,9 ; 34,1	18,5	14,1 ; 23,0	
Non	29,6	28,8	30,2	29,1	25,3 ; 32,8	29,2	23,5 ; 35,7	29,0	24,4 ; 33,6	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,020				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	35,6	31,4 ; 39,8	29,1	23,2 ; 35,3	41,4	36,0 ; 47,1	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	16,9	13,4 ; 20,7	18,9*	12,7 ; 24,9	15,1	11,1 ; 19,2	
Non	48,5	52,0	45,9	47,5	43,2 ; 51,7	52,1	45,3 ; 58,8	43,4	37,8 ; 49,0	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,062				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	29,3	25,4 ; 33,2	24,2	18,7 ; 30,0	33,8	28,9 ; 39,0	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	25,8	22,1 ; 29,9	28,6	22,1 ; 35,0	23,3	18,8 ; 28,1	
Non	37,5	34,7	39,5	44,9	40,7 ; 49,0	47,2	40,6 ; 53,8	42,9	37,8 ; 48,3	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.  
 2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.  
 \* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.  
 \*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.  
 Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
43,5	41,3 ; 45,9	39,7	37,3 ; 42,2	16,8	14,8 ; 18,7	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
33,6	30,6 ; 36,9	45,4	41,8 ; 49,0	21,0	17,9 ; 24,0	Hommes
54,9	51,5 ; 58,2	33,3	30,3 ; 36,6	11,8	9,1 ; 14,5	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
52,3	36,7 ; 66,1	13,0**	4,0 ; 24,2	34,7*	21,3 ; 49,0	15-17 ans
18,6*	11,2 ; 27,4	33,9	23,9 ; 44,6	47,5	35,5 ; 58,1	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
30,6	22,8 ; 38,5	26,4	19,2 ; 34,3	42,9	33,9 ; 51,4	25-44 ans
27,6	24,0 ; 31,2	52,9	48,8 ; 57,3	19,5	16,1 ; 23,2	45-64 ans
51,5	48,0 ; 55,1	41,2	37,6 ; 44,7	7,2	5,3 ; 9,2	65 ans et plus
93,8	89,7 ; 97,4	x	;	x	;	
		P = 0,087				Hommes
50,8*	31,0 ; 71,0	x	;	40,9*	20,9 ; 60,8	15-17 ans
13,4**	5,2 ; 23,2	41,0*	26,8 ; 56,1	45,6*	31,1 ; 59,6	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
24,5*	15,4 ; 34,4	31,3*	20,2 ; 43,0	44,2	32,8 ; 55,7	25-44 ans
19,9	15,1 ; 24,6	52,4	46,2 ; 58,7	27,6	21,8 ; 33,6	45-64 ans
37,5	32,7 ; 42,6	52,5	46,9 ; 57,7	10,0*	6,9 ; 13,1	65 ans et plus
89,9	82,3 ; 96,6	x	;	x	;	
		P = 0,000				Femmes
53,6*	31,8 ; 73,6	16,9**	3,3 ; 34,1	29,5**	10,8 ; 49,7	15-17 ans
26,5**	11,6 ; 43,8	23,2**	11,3 ; 39,0	50,3*	30,3 ; 68,0	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
38,2*	25,2 ; 51,7	20,5*	11,4 ; 31,7	41,3*	26,7 ; 54,7	25-44 ans
36,0	30,6 ; 41,7	53,4	47,6 ; 59,0	10,7*	7,3 ; 14,4	45-64 ans
68,8	63,7 ; 73,4	27,4	22,8 ; 32,3	3,9**	1,6 ; 6,4	65 ans et plus
97,5	93,7 ; 100,0	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	43,9	50,1	37,9	54,8	52,4 ; 57,0	64,6	61,2 ; 67,7	43,6	40,3 ; 46,9	
Non	56,1	49,9	62,1	45,2	43,0 ; 47,6	35,4	32,3 ; 38,8	56,4	53,1 ; 59,7	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	10,6	14,4	6,8	17,2	15,4 ; 19,1	24,5	21,5 ; 27,6	8,9	7,0 ; 10,8	
Non	89,4	85,6	93,2	82,8	80,9 ; 84,6	75,5	72,4 ; 78,5	91,1	89,2 ; 93,0	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	7,3	9,1	5,5	9,6	8,1 ; 11,1	12,9	10,5 ; 15,5	5,8*	4,0 ; 7,8	
Non	92,7	90,9	94,5	90,4	88,9 ; 91,9	87,1	84,5 ; 89,5	94,2	92,2 ; 96,0	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,000				P = 0,001				
Oui	5,1	6,3	3,9	5,8	4,5 ; 7,2	8,0	5,9 ; 10,0	3,2*	1,8 ; 5,0	
Non	94,9	93,7	96,1	94,2	92,8 ; 95,5	92,0	90,0 ; 94,1	96,8	95,0 ; 98,2	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	12,3	16,1	8,7	18,0	16,0 ; 20,0	26,0	22,6 ; 29,2	8,9	7,0 ; 10,9	
Non	87,7	83,9	91,3	82,0	80,0 ; 84,0	74,0	70,8 ; 77,4	91,1	89,1 ; 93,0	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,071				P = 0,808				
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,4**	0,2 ; 0,8	0,5**	0,1 ; 1,0	x	;	
Non	99,5	99,4	99,6	99,6	99,2 ; 99,8	99,5	99,0 ; 99,9	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,000				P = 0,269				
Oui	0,5	0,8*	0,3*	1,0**	0,5 ; 1,6	1,4**	0,6 ; 2,3	x	;	
Non	99,5	99,2	99,7	99,0	98,4 ; 99,5	98,6	97,7 ; 99,4	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,000				P = 0,497				
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,4**	0,1 ; 0,8	0,5**	0,0 ; 1,2	x	;	
Non	99,2	98,8	99,7	99,6	99,2 ; 99,9	99,5	98,8 ; 100,0	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,179				P = 0,084				
Oui	1,8	1,9	1,6	1,7*	1,0 ; 2,5	2,3**	1,2 ; 3,7	0,9**	0,3 ; 1,8	
Non	98,2	98,1	98,4	98,3	97,5 ; 99,0	97,7	96,3 ; 98,8	99,1	98,2 ; 99,7	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,000				P = 0,051				
Oui	1,6	2,3	0,9	1,9*	1,2 ; 2,7	2,7*	1,5 ; 4,0	1,1**	0,4 ; 1,9	
Non	98,4	97,7	99,1	98,1	97,3 ; 98,8	97,3	96,0 ; 98,5	98,9	98,1 ; 99,6	
<b>Drogues par injection</b>		P = 0,000				P = 0,099				
Oui	0,5	0,7*	0,2*	1,0**	0,5 ; 1,6	1,4**	0,6 ; 2,4	x	;	
Non	99,5	99,3	99,8	99,0	98,4 ; 99,5	98,6	97,6 ; 99,4	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	12,2	16,2	8,3	14,6	12,7 ; 16,5	18,0	15,2 ; 20,8	10,8	8,1 ; 13,4	
Non	87,8	83,8	91,7	85,4	83,5 ; 87,3	82,0	79,2 ; 84,8	89,2	86,6 ; 91,9	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	1,6	2,3	0,8	3,3*	2,3 ; 4,5	5,5*	3,5 ; 7,6	0,9**	0,3 ; 1,7	
Non	98,4	97,7	99,2	96,7	95,5 ; 97,7	94,5	92,4 ; 96,5	99,1	98,3 ; 99,7	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,193				
Oui	1,8	2,4	1,3	2,0*	1,3 ; 3,0	2,6*	1,5 ; 4,0	1,3**	0,4 ; 2,6	
Non	98,2	97,6	98,7	98,0	97,0 ; 98,7	97,4	96,0 ; 98,5	98,7	97,4 ; 99,6	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,166				
Oui	1,4	1,7	1,0	2,1*	1,2 ; 3,1	2,9**	1,5 ; 4,4	1,3**	0,3 ; 2,6	
Non	98,6	98,3	99,0	97,9	96,9 ; 98,8	97,1	95,6 ; 98,5	98,7	97,4 ; 99,7	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,038				
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,9**	0,3 ; 1,5	1,4**	0,4 ; 2,5	x	;	
Non	99,2	98,8	99,6	99,1	98,5 ; 99,7	98,6	97,5 ; 99,6	x	;	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = .				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 'n.d.'				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = .				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,227				
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,4**	0,0 ; 0,9	x	;	x	;	
Non	99,6	99,6	99,7	99,6	99,1 ; 100,0	x	;	x	;	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %, estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	16,8	14,8 ; 18,7	21,0	17,9 ; 24,0	11,8	9,1 ; 14,5
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	34,7*	21,3 ; 49,0	40,9*	20,9 ; 60,8	29,5**	10,8 ; 49,7
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	47,5	35,5 ; 58,1	45,6*	31,1 ; 59,6	50,3*	30,3 ; 68,0
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	19,5	16,1 ; 23,2	27,6	21,8 ; 33,6	10,7*	7,3 ; 14,4
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	7,2	5,3 ; 9,2	10,0*	6,9 ; 13,1	3,9**	1,6 ; 6,4
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	29,9	27,4 ; 32,2	11,4	9,6 ; 13,1	15,3	13,4 ; 17,2
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	30,1	26,8 ; 33,4	14,5	11,7 ; 17,3	21,8	18,8 ; 24,9
Femmes	25,4	6,8	7,4	29,7	26,3 ; 33,2	7,7	5,9 ; 9,5	7,8	5,8 ; 10,0
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	26,9*	15,2 ; 40,1	9,3**	1,6 ; 18,1	11,6**	2,1 ; 22,4
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	39,3	27,2 ; 50,7	16,7**	8,5 ; 26,0	25,4*	16,8 ; 35,3
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	34,9	26,1 ; 43,7	14,0*	8,2 ; 20,6	20,4*	13,7 ; 27,7
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	33,9	30,1 ; 37,7	16,3	13,0 ; 19,7	22,2	18,8 ; 25,5
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	29,9	26,3 ; 33,5	8,3	6,1 ; 10,7	10,2	7,8 ; 12,7
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	5,6**	2,2 ; 9,4	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,127					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	30,4**	13,1 ; 49,3	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	32,3*	18,5 ; 46,8	21,1**	9,0 ; 34,4	33,2*	20,4 ; 47,2
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	31,8*	21,0 ; 43,7	18,8**	9,7 ; 29,0	25,0*	14,9 ; 35,8
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	27,1	21,6 ; 32,6	19,4	14,0 ; 24,9	33,5	27,8 ; 39,3
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	36,5	31,3 ; 41,7	11,5*	7,9 ; 15,5	14,5	10,6 ; 18,6
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	8,9**	2,7 ; 16,3	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,102					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	23,9**	8,4 ; 42,5	x	;	x	;
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	49,9*	28,3 ; 68,2	10,1**	0,9 ; 21,5	13,5**	4,4 ; 25,1
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	38,7*	24,1 ; 53,0	8,2**	2,1 ; 15,7	14,9**	6,4 ; 25,3
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	41,4	35,5 ; 47,0	13,0	9,3 ; 16,6	9,7*	6,5 ; 13,1
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	21,8	17,1 ; 26,7	4,4**	2,2 ; 6,9	5,0**	2,5 ; 7,8
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	83,8	82,0 ; 85,6	85,7	83,3 ; 88,0	81,5	78,8 ; 84,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	51,8	37,4 ; 66,1	52,6*	32,0 ; 72,3	51,2*	30,9 ; 71,1
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	82,3	73,4 ; 90,3	77,5	64,9 ; 88,9	89,5	76,3 ; 99,9
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	71,5	63,7 ; 79,0	70,1	59,2 ; 80,2	73,1	60,1 ; 83,9
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	95,9	94,1 ; 97,6	95,6	93,0 ; 98,0	96,2	93,3 ; 98,5
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	85,3	82,7 ; 87,8	89,0	86,0 ; 91,8	80,9	76,6 ; 85,4
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	71,9	67,5 ; 76,1	78,4	73,3 ; 83,1	63,0	55,2 ; 70,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	87,4	84,1 ; 90,3	86,7	81,7 ; 91,6	88,1	83,3 ; 92,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	91,7	89,1 ; 94,1	92,5	88,8 ; 95,8	90,9	87,0 ; 94,4
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	91,7	88,0 ; 95,0	92,2	85,7 ; 97,4	91,4	86,2 ; 95,7
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	90,4	88,7 ; 92,0	88,3	85,6 ; 90,7	93,0	90,8 ; 94,8
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	8,2	6,6 ; 9,8	9,8	7,5 ; 12,3	6,2*	4,4 ; 8,3
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,4*	0,8 ; 2,1	1,9**	0,9 ; 3,0	0,8**	0,2 ; 1,6
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	45,1	43,9 ; 46,3	x	;	98,9	98,0 ; 99,7
Femmes	51,5	97,5	0,8	54,6	53,4 ; 55,8	99,7	99,2 ; 100,0	x	;
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,3**	0,0 ; 0,7	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	90,4	88,7 ; 92,0	8,2	6,6 ; 9,8	1,4*	0,8 ; 2,1
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,035					
Hommes	86,4	10,7	2,9	88,3	85,6 ; 90,7	9,8	7,5 ; 12,3	1,9**	0,9 ; 3,0
Femmes	91,6	7,4	0,9*	93,0	90,8 ; 94,8	6,2*	4,4 ; 8,3	0,8**	0,2 ; 1,6
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,136					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	67,1	46,7 ; 84,2	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	81,1	71,5 ; 88,9	15,1*	8,1 ; 24,2	3,8**	0,2 ; 8,7
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	77,5	68,5 ; 84,8	19,1*	12,3 ; 27,3	3,4**	0,5 ; 7,1
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	87,6	84,7 ; 90,3	10,6	8,1 ; 13,4	1,8**	0,7 ; 3,1
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	96,9	95,5 ; 98,1	2,7*	1,6 ; 3,9	0,5**	0,1 ; 1,0
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	98,1	94,4 ; 100,0	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,024					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	x	;	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	88,5	85,8 ; 90,9	9,6	7,3 ; 12,1	1,9**	0,9 ; 3,0
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 'n.d.'					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	93,5	91,4 ; 95,2	5,7*	4,1 ; 7,7	0,8**	0,2 ; 1,6
Femmes	92,1	7,9**	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	49,2	45,4 ; 52,8	58,7	53,4 ; 63,7
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000		...	
15-24 ans	87,9	...	82,9	72,3 ; 92,0	...	;
25-44 ans	62,4	...	64,4	58,4 ; 70,6	...	;
45-64 ans	29,9	...	30,9	25,3 ; 36,2	...	;
65 ans et plus	7,3	...	x	;	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...		P = 0,000	
15-24 ans	...	90,0	...	;	71,8	56,0 ; 86,1
25-34 ans	...	71,0	...	;	72,1	64,0 ; 79,2
35-49 ans	...	53,5	...	;	44,8	38,4 ; 51,5
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,000		P = 0,047	
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	36,7	30,0 ; 43,5	55,3	39,4 ; 68,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	52,7	44,8 ; 59,6	50,3	40,6 ; 60,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	55,2	47,7 ; 62,9	64,1	55,8 ; 71,7
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	62,3	50,7 ; 73,8	69,0	58,3 ; 79,1
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,032	
Un partenaire	43,8	64,2	45,6	41,5 ; 49,7	56,8	51,0 ; 62,0
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	74,7	63,7 ; 83,9	73,7	59,0 ; 88,5
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	90,2	71,2 ; 100,0	92,2	59,9 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = .		P = 0,206	
Hommes	x	66,6	x	;	59,0	53,7 ; 64,0
Femmes	47,8	x	49,2	45,4 ; 52,8	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	11,2	9,3 ; 13,3	10,5	8,8 ; 12,4	78,3	76,1 ; 80,6
Sexe	P = 0,093			P = 0,053					
Hommes	14,8	14,9	70,3	13,3	10,5 ; 16,2	11,0	8,3 ; 13,7	75,7	72,6 ; 78,9
Femmes	13,2	14,7	72,1	8,7*	6,1 ; 11,5	9,8	7,4 ; 12,4	81,4	78,4 ; 84,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	55,2*	35,2 ; 75,7	x	;	x	;
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	39,7*	26,7 ; 53,2	16,2**	7,2 ; 26,5	44,2	31,6 ; 56,9
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	43,7	33,4 ; 54,6	23,5*	15,0 ; 32,8	32,8*	22,8 ; 42,7
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	11,0	8,3 ; 14,0	14,8	11,8 ; 17,7	74,3	70,6 ; 77,9
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	1,7**	0,8 ; 2,8	3,0**	1,6 ; 4,7	95,3	93,3 ; 97,0
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,362					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	12,9*	9,0 ; 17,2	8,4*	4,8 ; 12,3	78,7	73,9 ; 83,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	12,5*	8,3 ; 16,9	10,4*	7,3 ; 13,8	77,1	72,5 ; 81,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	7,5*	4,4 ; 10,7	12,0	8,5 ; 15,5	80,6	76,3 ; 84,8
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	12,6*	7,6 ; 18,1	11,8*	7,1 ; 16,8	75,6	68,7 ; 82,0
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	7,8	6,0 ; 9,7	7,4	5,7 ; 9,3	84,8	82,5 ; 87,0
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	40,5	29,9 ; 50,8	39,3	29,6 ; 49,7	20,2*	13,3 ; 28,2
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	59,9*	35,0 ; 81,9	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	13,9	11,9 ; 16,0	16,0	13,1 ; 19,0	11,4	8,6 ; 14,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	77,3	58,4 ; 94,9	96,1	83,5 ; 100,0	61,1*	31,7 ; 92,5
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	43,7	31,3 ; 56,7	52,6*	34,8 ; 70,6	32,3**	12,5 ; 53,5
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	52,4	42,4 ; 63,4	62,3	47,8 ; 76,9	40,9*	24,4 ; 57,9
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	13,6	10,9 ; 16,6	15,6*	11,3 ; 20,5	11,4	8,1 ; 14,9
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	2,8*	1,6 ; 4,1	3,5**	1,8 ; 5,6	1,7**	0,3 ; 3,5
	3,1*	3,9*	1,8**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,010		P = 0,145		P = 0,064	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	16,0	11,6 ; 20,7	18,2	12,8 ; 24,5	12,1**	5,3 ; 19,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	15,6	11,2 ; 20,0	15,9*	9,4 ; 22,5	15,3*	9,0 ; 21,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	7,9*	5,4 ; 10,7	10,5*	6,5 ; 15,0	4,9**	2,2 ; 8,0
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	18,0*	12,2 ; 24,4	23,0*	12,6 ; 34,5	13,7*	7,4 ; 20,8
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	9,9	7,8 ; 11,8	10,7	8,0 ; 13,6	8,8*	6,0 ; 11,8
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	48,9	39,0 ; 58,5	51,8	39,1 ; 64,8	43,4*	27,2 ; 58,9
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	70,6	49,4 ; 89,7	76,9	51,9 ; 96,5	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,038		P = 0,161		P = 0,291	
Hommes	18,7	54,0	17,9	11,3	8,5 ; 14,3	x	;	11,3	8,4 ; 14,2
Femmes	19,2	19,2	x	15,9	13,1 ; 18,9	15,9	13,1 ; 18,9	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	7,3	6,1 ; 8,6	7,3	5,5 ; 9,2	7,3	5,6 ; 9,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,001	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	x	;	x	;	x	;
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,000	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	12,5	9,9 ; 15,4	12,8*	8,9 ; 17,2	12,1	8,5 ; 16,0
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	5,7	4,1 ; 7,4	5,9*	3,6 ; 8,3	5,5*	3,4 ; 7,9
	2,7	3,2*	2,2	2,1**	0,3 ; 4,3	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,057		P = 0,288		P = 0,080	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	4,8*	3,0 ; 6,7	5,7*	3,2 ; 8,7	3,3**	1,2 ; 5,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	7,4*	5,2 ; 9,7	6,1*	3,2 ; 9,5	8,7*	5,4 ; 12,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	8,9*	6,3 ; 11,9	10,2*	5,9 ; 15,1	7,6*	4,2 ; 11,2
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	9,1*	5,4 ; 13,3	8,6**	2,7 ; 15,9	9,4**	5,0 ; 14,7
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,058		P = 0,593		P = 0,010	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	6,8	5,4 ; 8,2	7,1	5,0 ; 9,3	6,5	4,7 ; 8,4
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	12,3*	7,2 ; 18,4	9,6**	3,6 ; 16,8	17,4**	8,0 ; 29,4
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	x	;	x	;	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,926		P = 0,007		P = .	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	7,4	5,6 ; 9,3	x	;	7,3	5,6 ; 9,2
Femmes	7,0	7,0	8,9**	7,3	5,3 ; 9,3	7,3	5,4 ; 9,4	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,003		P = 0,004		P = 0,164	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	40,3**	7,7 ; 72,0	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	7,0	5,8 ; 8,2	6,6	4,9 ; 8,5	7,4	5,7 ; 9,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	20,1*	11,9 ; 29,3	79,9	70,7 ; 88,1
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,002			
15-35 ans	25,6	74,4	21,9*	13,1 ; 32,2	78,1	67,8 ; 86,9
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,410			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	13,6**	1,2 ; 29,6	86,4	70,4 ; 98,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	30,6**	13,6 ; 50,5	69,4	49,5 ; 86,4
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	21,3**	4,5 ; 40,1	78,7	59,9 ; 95,5
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	20,1*	11,9 ; 29,3	79,9	70,7 ; 88,1
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	76,4	73,0 ; 79,6	18,9	16,3 ; 21,8	4,7*	2,7 ; 7,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	74,5	55,0 ; 92,5	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	88,3	84,4 ; 91,9	9,4*	6,2 ; 12,9	2,3**	0,4 ; 4,5
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	66,3	61,5 ; 71,3	30,9	26,2 ; 35,8	2,8**	1,2 ; 4,6
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,177					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	56,0	47,4 ; 64,9	35,8	27,9 ; 44,0	8,2**	1,3 ; 15,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	78,7	72,9 ; 84,5	16,2	11,3 ; 21,3	5,1**	1,8 ; 9,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	83,0	77,7 ; 87,7	13,5*	9,2 ; 18,2	3,5**	0,8 ; 6,6
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	87,5	81,3 ; 93,1	x	;	x	;
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,921					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	76,2	72,8 ; 79,4	19,2	16,6 ; 22,2	4,6*	2,6 ; 6,9
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	69,6**	25,6 ; 100,0	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 11

# **GASPÉSIE—ÎLES-DE-LA-MADELEINE**

---





# 1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
Ensemble de la population		49,4	50,6			49,2	49,2 ; 49,2	50,8	50,8 ; 50,8	
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000				P = 0,000				
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	12,9	12,9 ; 12,9	13,2	13,1 ; 13,2	12,6	12,6 ; 12,6	
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	26,3	26,3 ; 26,3	26,8	26,7 ; 26,8	25,9	25,9 ; 25,9	
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	40,7	40,7 ; 40,7	40,8	40,8 ; 40,9	40,6	40,5 ; 40,6	
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	20,1	20,1 ; 20,1	19,2	19,2 ; 19,3	20,9	20,9 ; 21,0	
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Personne seule	13,4	10,7	16,0	13,5	12,5 ; 14,8	10,8	9,4 ; 12,5	16,1	14,7 ; 18,0	
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	34,8	33,0 ; 36,8	36,9	34,2 ; 39,6	32,9	30,5 ; 35,5	
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	35,9	33,7 ; 37,6	38,9	35,7 ; 41,8	33,0	30,1 ; 35,3	
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	8,0	6,8 ; 9,3	5,8	4,1 ; 7,6	10,2	8,5 ; 12,1	
Autre	6,7	6,5	6,9	7,8	6,3 ; 9,1	7,7	5,5 ; 9,7	7,9	5,9 ; 9,6	
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>		P = 0,256				P = 'n.d.'				
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	98,8	98,2 ; 99,3	98,6	97,6 ; 99,4	99,0	98,3 ; 99,7	
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,3**	0,0 ; 0,6	x	;	x	;	
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	0,9**	0,4 ; 1,4	x	;	x	;	
<b>Langue parlée à la maison</b>		P = 0,912				P = 'n.d.'				
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	91,7	90,5 ; 92,9	90,7	88,8 ; 92,6	92,6	91,0 ; 94,4	
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	8,1	6,9 ; 9,3	x	;	x	;	
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	0,3**	0,0 ; 0,5	x	;	x	;	
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,683				P = 0,192				
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	40,8	38,6 ; 42,8	42,9	39,7 ; 46,0	38,8	36,1 ; 41,5	
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	24,2	22,2 ; 26,2	23,2	20,4 ; 26,1	25,2	22,3 ; 27,8	
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	22,3	20,4 ; 24,2	22,3	19,5 ; 25,0	22,3	19,7 ; 24,9	
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	12,7	11,3 ; 14,1	11,6	9,5 ; 13,7	13,7	11,8 ; 15,8	
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,016				
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	23,0	21,1 ; 24,9	21,2	18,4 ; 24,2	24,6	22,1 ; 27,3	
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	23,1	21,3 ; 25,0	22,3	19,7 ; 25,1	23,8	21,2 ; 26,4	
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	17,6	15,7 ; 19,5	16,1	13,4 ; 18,9	19,0	16,5 ; 21,6	
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	16,3	14,4 ; 18,1	17,9	15,3 ; 20,8	14,6	12,3 ; 16,9	
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	20,1	18,3 ; 22,0	22,4	19,6 ; 25,4	17,9	15,4 ; 20,5	
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000				P = 0,030				
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	25,7	23,7 ; 27,8	27,9	24,8 ; 30,9	23,7	21,1 ; 26,5	
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	59,2	56,9 ; 61,4	57,4	54,1 ; 60,8	60,9	57,8 ; 63,9	
Pauvre	9,4	8,9	9,9	12,0	10,6 ; 13,5	10,9	8,9 ; 13,1	13,1	11,1 ; 15,2	
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	3,1	2,3 ; 3,9	3,8*	2,5 ; 5,2	2,4*	1,5 ; 3,3	
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	54,2	52,4 ; 56,0	57,6	55,1 ; 60,3	50,9	48,6 ; 53,1	
Étudiants	13,1	13,0	13,2	8,6	7,5 ; 9,7	8,3	6,6 ; 10,0	9,0	7,4 ; 10,5	
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	11,7	10,4 ; 13,2	9,0	7,0 ; 11,0	14,4	12,3 ; 16,6	
Retraités	19,6	18,0	21,1	25,4	24,4 ; 26,5	25,1	23,6 ; 26,6	25,8	24,3 ; 27,4	

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	48,0	45,8 ; 50,3	35,9	33,7 ; 38,1	16,1	14,4 ; 17,6
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,041					
Hommes	56,6	33,5	9,9	45,0	41,7 ; 48,4	38,0	34,7 ; 41,3	17,0	14,6 ; 19,6
Femmes	55,5	32,8	11,7	50,8	47,8 ; 53,7	33,9	31,1 ; 36,8	15,3	13,2 ; 17,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	60,0	51,7 ; 68,4	31,9	24,6 ; 39,3	8,1**	3,3 ; 13,5
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	61,7	57,3 ; 66,2	30,8	26,5 ; 35,1	7,5*	4,9 ; 10,1
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	43,3	40,0 ; 46,7	37,7	34,4 ; 40,8	19,0	16,4 ; 21,6
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	29,9	25,7 ; 34,2	42,3	37,7 ; 46,9	27,8	23,7 ; 32,1
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	41,4	37,1 ; 45,8	33,4	29,3 ; 37,7	25,1	21,4 ; 28,8
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	43,3	39,5 ; 46,9	39,5	35,7 ; 43,2	17,2	14,7 ; 19,9
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	57,5	53,2 ; 61,9	32,9	28,8 ; 37,1	9,6	6,9 ; 12,2
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	47,4	39,2 ; 55,6	35,4	27,8 ; 43,4	17,1*	10,5 ; 23,8
Autre	46,0	39,4	14,6	39,9	29,9 ; 50,5	39,2	29,6 ; 49,2	20,8*	12,6 ; 29,1
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	33,2	29,9 ; 36,9	39,4	35,9 ; 43,0	27,3	24,0 ; 30,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	49,4	44,6 ; 54,3	38,8	34,0 ; 43,6	11,8	9,1 ; 14,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	58,9	54,0 ; 63,9	33,8	29,1 ; 38,5	7,3*	5,0 ; 9,7
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	72,4	66,7 ; 77,8	22,1	17,1 ; 27,3	5,5**	2,8 ; 8,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	36,1	31,3 ; 41,0	36,2	31,4 ; 40,8	27,7	23,8 ; 31,9
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	52,6	49,9 ; 55,4	35,6	33,0 ; 38,2	11,7	10,1 ; 13,4
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	21,3	16,7 ; 26,0	39,6	33,8 ; 45,5	39,2	33,4 ; 44,8
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	52,8	50,4 ; 55,4	35,5	33,0 ; 37,8	11,7	10,1 ; 13,2
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	54,1	51,0 ; 57,3	35,5	32,5 ; 38,6	10,4	8,4 ; 12,2
Étudiants	62,7	32,2	5,0	64,2	54,2 ; 73,7	27,0*	18,8 ; 36,2	8,7**	2,3 ; 15,3
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	37,8	31,3 ; 44,8	35,9	29,0 ; 42,7	26,3	20,3 ; 32,4
Retraités	40,2	39,5	20,4	32,3	28,4 ; 36,3	40,6	36,6 ; 44,7	27,0	23,3 ; 30,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	48,0	45,8 ; 50,3	35,9	33,7 ; 38,1	16,1	14,4 ; 17,6
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	42,0	37,7 ; 46,9	36,3	32,0 ; 40,8	21,7	17,7 ; 25,5
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	50,3	47,8 ; 53,1	35,6	33,1 ; 38,1	14,0	12,4 ; 15,8
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	38,9*	21,4 ; 59,0	45,0*	22,3 ; 64,2	16,0**	4,7 ; 31,0
Poids normal	62,6	29,4	8,0	57,2	53,6 ; 61,0	30,6	27,3 ; 34,0	12,1	9,7 ; 14,4
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	41,9	38,8 ; 45,0	39,1	36,2 ; 42,1	19,0	16,6 ; 21,3
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	55,4	52,3 ; 58,6	32,0	29,1 ; 34,8	12,6	10,5 ; 14,8
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	43,3	39,7 ; 47,0	41,4	37,9 ; 44,9	15,3	12,8 ; 17,9
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	24,7*	17,3 ; 32,3	32,4	24,9 ; 40,9	42,8	34,7 ; 51,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	27,9	23,4 ; 32,8	38,3	33,4 ; 43,3	33,8	29,2 ; 38,9
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	54,2	51,6 ; 56,9	35,1	32,6 ; 37,6	10,7	9,2 ; 12,4

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	53,8	51,4 ; 56,1	39,3	37,1 ; 41,6	7,0	5,9 ; 8,1
Sexe	P = 0,097			P = 0,239					
Hommes	47,5	46,6	6,0	55,7	52,2 ; 59,0	37,9	34,6 ; 41,4	6,3	4,8 ; 8,1
Femmes	47,1	45,9	7,0	51,9	48,9 ; 55,0	40,5	37,4 ; 43,6	7,6	6,0 ; 9,2
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,018					
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	63,1	55,1 ; 71,0	34,6	26,5 ; 42,5	2,3**	0,3 ; 4,9
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	52,2	47,6 ; 56,7	41,0	36,8 ; 45,7	6,8*	4,6 ; 9,2
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	50,3	46,8 ; 53,7	40,2	36,8 ; 43,5	9,5	7,5 ; 11,5
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	57,2	52,6 ; 61,8	37,9	33,3 ; 42,3	4,9*	3,3 ; 6,9
Composition du ménage	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	38,2	49,2	12,5	42,3	37,7 ; 46,6	43,3	38,9 ; 48,1	14,4	11,3 ; 17,6
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	57,9	54,1 ; 61,6	36,5	32,8 ; 40,0	5,7*	3,9 ; 7,6
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	53,8	49,7 ; 58,1	41,4	37,1 ; 45,7	4,8*	3,0 ; 6,7
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	51,2	42,5 ; 59,6	40,5	32,6 ; 49,0	8,4**	4,0 ; 13,5
Autre	44,5	46,1	9,4*	54,3	43,7 ; 64,8	35,7	26,3 ; 45,9	10,0**	4,3 ; 16,5
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,212					
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	57,1	53,4 ; 60,8	36,2	32,8 ; 39,7	6,6	4,9 ; 8,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	54,3	49,8 ; 58,8	38,9	34,2 ; 43,4	6,8*	4,5 ; 9,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	49,9	45,3 ; 55,2	42,4	37,2 ; 47,4	7,6*	5,3 ; 10,1
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	49,6	43,3 ; 55,8	44,4	38,4 ; 50,6	6,0*	3,3 ; 9,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	49,0	44,2 ; 54,2	38,6	33,7 ; 43,1	12,4	9,7 ; 15,6
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	55,1	52,3 ; 57,7	39,5	36,8 ; 42,2	5,3	4,2 ; 6,5
Perception de sa situation financière	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	39,1	33,1 ; 45,0	39,9	34,2 ; 45,9	21,0	16,4 ; 25,8
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	56,2	53,6 ; 58,8	39,4	36,9 ; 41,9	4,4	3,5 ; 5,3
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,043					
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	52,7	49,6 ; 55,8	41,4	38,2 ; 44,5	5,9	4,5 ; 7,4
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	59,6	49,9 ; 69,7	38,4	28,7 ; 48,3	x	;
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	51,4	44,0 ; 58,1	33,3	27,3 ; 40,1	15,3*	10,5 ; 20,6
Retraités	51,9	42,8	5,3	55,0	51,1 ; 59,2	38,3	34,4 ; 42,2	6,7	4,9 ; 8,8
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	61,5	58,3 ; 64,8	35,0	31,6 ; 38,2	3,5*	2,3 ; 4,8
Bon	40,5	52,6	6,9	48,2	44,3 ; 51,7	45,5	41,9 ; 49,4	6,3	4,6 ; 8,3
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	43,1	37,2 ; 48,9	38,1	32,7 ; 43,6	18,8	14,6 ; 23,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	27,7	55,6	16,8	32,3	27,4 ; 37,1	45,5	40,4 ; 50,4	22,2	18,3 ; 26,4
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	59,6	56,9 ; 62,2	37,6	35,0 ; 40,2	2,8	2,0 ; 3,6
Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	21,3	49,3	29,4	22,9**	8,4 ; 38,7	41,7*	26,6 ; 58,2	35,3*	20,6 ; 51,6
Non	48,1	46,1	5,8	54,8	52,4 ; 57,2	39,3	37,0 ; 41,7	5,9	5,0 ; 7,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	20,7	18,8 ; 22,6	79,3	77,4 ; 81,2
Sexe	P = 0,000		P = 0,001			
Hommes	18,2	81,8	17,5	15,0 ; 20,0	82,5	80,0 ; 85,0
Femmes	26,0	74,0	23,7	21,0 ; 26,4	76,3	73,6 ; 79,0
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,443			
15-24 ans	24,4	75,6	21,3*	15,1 ; 27,7	78,7	72,3 ; 84,9
25-44 ans	24,3	75,7	20,7	16,9 ; 24,5	79,3	75,5 ; 83,1
45-64 ans	20,6	79,4	21,9	19,2 ; 24,8	78,1	75,2 ; 80,8
65 ans et plus	18,8	81,2	17,4	13,6 ; 21,4	82,6	78,6 ; 86,4
Composition du ménage	P = 0,000		P = 0,003			
Personne seule	25,7	74,3	25,8	22,0 ; 29,8	74,2	70,2 ; 78,0
Couple sans enfant	17,7	82,3	16,4	13,8 ; 19,2	83,6	80,8 ; 86,2
Couple avec enfants	20,8	79,2	20,1	16,8 ; 23,7	79,9	76,3 ; 83,2
Famille monoparentale	32,2	67,8	28,3	20,7 ; 35,9	71,7	64,1 ; 79,3
Autre	29,7	70,3	22,9*	14,7 ; 32,1	77,1	67,9 ; 85,3
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,005			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	24,6	21,6 ; 27,8	75,4	72,2 ; 78,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	19,4	15,8 ; 23,4	80,6	76,6 ; 84,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	18,2	14,3 ; 22,2	81,8	77,8 ; 85,7
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	15,3	10,9 ; 19,9	84,7	80,1 ; 89,1
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	29,1	25,0 ; 33,4	70,9	66,6 ; 75,0
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	17,8	15,6 ; 19,9	82,2	80,1 ; 84,4
Perception de sa situation financière	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	42,5	36,6 ; 48,7	57,5	51,3 ; 63,4
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	16,9	14,9 ; 18,8	83,1	81,2 ; 85,1
Occupation principale	P = 0,000		P = 0,001			
Travailleurs	20,9	79,1	19,1	16,7 ; 21,5	80,9	78,5 ; 83,3
Étudiants	24,8	75,2	25,0*	16,6 ; 33,5	75,0	66,5 ; 83,4
Personnes sans emploi	37,9	62,1	31,6	25,2 ; 38,4	68,4	61,6 ; 74,8
Retraités	18,2	81,8	17,7	14,3 ; 21,2	82,3	78,8 ; 85,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	11,8	9,6 ; 14,0	88,2	86,0 ; 90,4
Bon	26,6	73,4	22,1	19,0 ; 25,5	77,9	74,5 ; 81,0
Passable ou mauvais	48,8	51,2	45,1	39,2 ; 50,8	54,9	49,2 ; 60,8
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	12,3	10,2 ; 14,4	87,7	85,6 ; 89,8
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	23,9	20,8 ; 27,2	76,1	72,8 ; 79,2
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	67,5	59,8 ; 75,1	32,5	24,9 ; 40,2
Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	79,1	64,8 ; 92,3	20,9**	7,7 ; 35,2
Non	20,6	79,4	18,5	16,7 ; 20,4	81,5	79,6 ; 83,3
Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois	P = 0,000		P = .			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	20,2	18,3 ; 22,1	79,8	77,9 ; 81,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,7	1,9 ; 3,6	2,4*	1,4 ; 3,6	2,9*	1,8 ; 4,2
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,227		P = 0,273		P = 0,033	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	5,0**	1,3 ; 9,2	x	;	9,0**	1,7 ; 17,2
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,3**	0,9 ; 3,9	2,5**	0,4 ; 5,2	2,1**	0,3 ; 4,4
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,8*	1,7 ; 4,0	3,5**	1,5 ; 5,7	2,1**	1,1 ; 3,3
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,5**	0,5 ; 2,7	x	;	1,9**	0,4 ; 3,8
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,309		P = 0,254		P = 0,712	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	3,7*	2,1 ; 5,4	4,5**	1,5 ; 7,9	3,1**	1,4 ; 5,1
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	1,5**	0,7 ; 2,5	1,3**	0,1 ; 2,7	1,7**	0,5 ; 3,1
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	2,6**	1,1 ; 4,2	2,4**	0,6 ; 4,5	2,8**	0,5 ; 5,7
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	3,8**	0,4 ; 8,0	x	;	3,2**	0,1 ; 7,4
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	4,9**	0,9 ; 9,9	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,212		P = 0,275		P = 0,076	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	3,6*	2,0 ; 5,2	2,4**	0,7 ; 4,3	4,8**	2,2 ; 7,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,8**	1,2 ; 4,6	4,0**	1,3 ; 7,5	1,6**	0,2 ; 3,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	1,5**	0,5 ; 2,8	x	;	2,3**	0,6 ; 4,4
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	1,8**	0,4 ; 3,6	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,124		P = 0,084		P = 0,742	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	3,5*	1,9 ; 5,3	4,1**	1,3 ; 7,4	3,0**	1,2 ; 5,0
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	2,2*	1,4 ; 3,1	1,8**	0,8 ; 3,0	2,6*	1,4 ; 4,1
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,001	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	7,9*	4,5 ; 11,5	7,2**	2,7 ; 12,6	8,6**	3,6 ; 14,1
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,7*	1,0 ; 2,4	1,3**	0,5 ; 2,3	2,0**	0,9 ; 3,1
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,271		P = 0,735		P = 0,131	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,3*	1,4 ; 3,4	2,7**	1,2 ; 4,3	2,0**	0,8 ; 3,4
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	5,0**	1,9 ; 8,8	x	;	6,4**	1,8 ; 11,8
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,6**	0,7 ; 2,8	1,6**	0,1 ; 3,5	1,6**	0,4 ; 3,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,069		P = 0,003	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,5**	0,5 ; 2,6	x	;	1,4**	0,3 ; 2,8
Bon	2,5	2,7	2,4	2,0**	1,0 ; 3,3	1,8**	0,5 ; 3,5	2,2**	0,7 ; 4,3
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	7,9*	4,5 ; 11,5	6,0**	2,4 ; 10,4	9,7**	4,7 ; 15,3
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,001	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	1,1**	0,4 ; 2,0	0,6**	0,0 ; 1,4	1,6**	0,3 ; 3,3
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,8*	1,5 ; 4,2	3,1**	1,2 ; 5,4	2,5**	0,8 ; 4,6
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	13,9*	7,8 ; 20,1	12,8**	2,3 ; 23,2	14,7*	7,6 ; 23,0
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	10,6*	7,2 ; 14,1	11,3*	5,9 ; 17,5	10,1*	5,9 ; 14,8
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,7**	0,2 ; 1,3	x	;	0,9**	0,2 ; 1,7

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,6**	0,3 ; 1,0	0,5**	0,1 ; 1,0	0,8**	0,2 ; 1,5
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,323		P = 0,189		P = 0,227	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	0,9**	0,2 ; 1,7	x	;	1,4**	0,1 ; 3,0
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,138		P = 0,297		P = 0,278	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	1,3**	0,2 ; 2,7	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,741		P = 0,434		P = 0,414	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	0,5**	0,1 ; 1,1	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,018		P = 0,002		P = 0,038	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	1,8**	0,6 ; 3,4	x	;	2,1**	0,3 ; 4,4
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	x	;	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,007		P = 0,010		P = 0,041	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	2,3**	0,6 ; 4,5	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,3**	0,1 ; 0,7	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,065		P = 0,000		P = 0,762	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	1,9**	0,5 ; 3,7	2,5**	0,3 ; 5,4	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,006		P = 0,006		P = 0,011	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	3,8**	0,5 ; 8,0	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = .		P = .		P = .	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	3,0**	1,3 ; 5,1	2,7**	0,4 ; 5,6	3,2**	0,8 ; 6,3
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,693				
Oui	10,2	10,0	10,3	9,6	8,2 ; 11,0	9,3	7,4 ; 11,4	9,8	8,0 ; 11,9	
Non	89,8	90,0	89,7	90,4	89,0 ; 91,8	90,7	88,6 ; 92,6	90,2	88,1 ; 92,0	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,098				
Oui	4,4	3,5	5,3	4,3	3,4 ; 5,3	3,4*	2,1 ; 4,7	5,1	3,7 ; 6,6	
Non	95,6	96,5	94,7	95,7	94,7 ; 96,6	96,6	95,3 ; 97,9	94,9	93,4 ; 96,3	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	9,8	8,4 ; 11,1	11,4	9,1 ; 13,6	8,1	6,5 ; 9,9
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,071	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	20,4	13,9 ; 27,0	28,3*	16,8 ; 39,8	12,5**	6,0 ; 20,5
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	11,7	8,6 ; 14,9	13,1*	8,5 ; 18,0	10,3*	6,4 ; 14,6
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	7,1	5,4 ; 8,9	8,5*	5,8 ; 11,1	5,8*	3,7 ; 8,1
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	5,7*	3,7 ; 7,8	3,9**	1,5 ; 6,8	7,3*	4,2 ; 10,6
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,001		P = 0,019		P = 0,132	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	8,9	6,4 ; 11,7	10,2*	5,6 ; 15,1	8,1*	5,0 ; 11,5
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	6,2*	4,3 ; 8,1	6,0*	3,3 ; 8,9	6,3*	3,7 ; 9,0
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	13,2	10,1 ; 16,2	17,4	12,6 ; 22,2	8,3*	4,9 ; 11,9
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	14,1*	7,8 ; 21,2	11,5**	0,6 ; 25,3	15,5**	8,2 ; 23,9
Autre	14,9	16,7	13,2*	8,8**	4,1 ; 14,9	8,8**	1,4 ; 18,0	8,8**	2,4 ; 17,6
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,590		P = 0,553		P = 0,716	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	8,8	6,7 ; 10,8	10,5*	7,2 ; 13,9	6,9*	4,6 ; 9,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	11,0*	7,8 ; 14,5	14,3*	8,4 ; 20,2	8,1*	4,6 ; 12,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	10,6	7,5 ; 14,0	12,0*	7,5 ; 17,2	9,3*	5,2 ; 14,0
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	8,9*	5,3 ; 12,9	8,7**	3,4 ; 15,0	9,1*	4,6 ; 13,8
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,147		P = 0,371		P = 0,201	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	12,2*	8,5 ; 15,9	14,0*	7,8 ; 20,3	10,7*	6,3 ; 15,2
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	9,3	7,7 ; 10,9	11,0	8,5 ; 13,4	7,7	5,8 ; 9,6
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,024	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	10,0	8,0 ; 11,8	12,7	9,6 ; 15,8	7,1*	5,0 ; 9,3
Étudiants	17,1	21,4	12,9	19,3*	12,0 ; 27,3	21,7**	8,9 ; 34,6	17,1**	8,1 ; 27,6
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	11,6*	6,9 ; 16,5	18,7**	8,6 ; 29,5	7,2**	3,3 ; 12,0
Retraités	7,5	7,0	7,9	4,9*	3,3 ; 6,8	3,2**	1,2 ; 5,7	6,6*	3,9 ; 9,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Fréquence des blessures</b>										
Une fois	79,1	79,4	78,8	82,3	75,5 ; 88,1	80,7	70,7 ; 89,1	84,4	75,1 ; 92,2	
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	17,7*	11,9 ; 24,5	19,3*	10,9 ; 29,3	15,6**	7,8 ; 24,9	
<b>Activité pratiquée</b>										
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	21,4*	14,7 ; 28,1	26,8*	16,7 ; 36,8	14,1**	6,5 ; 22,8	
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	15,3*	9,8 ; 21,3	18,4*	10,1 ; 27,3	11,2**	4,8 ; 19,2	
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	21,8*	15,3 ; 28,4	26,0*	16,8 ; 35,7	16,1**	7,8 ; 25,0	
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	7,2**	3,6 ; 11,7	x	;	12,0**	5,5 ; 20,4	
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	18,5*	12,7 ; 25,1	15,9**	8,3 ; 24,5	22,1*	12,3 ; 32,0	
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	2,3**	0,4 ; 4,8	x	;	x	;	
Autre	12,1	8,1	17,6	13,5*	9,2 ; 18,4	8,0**	3,3 ; 13,7	x	;	
<b>Saison de la blessure</b>										
Hiver	26,0	25,0	27,4	29,3	22,0 ; 37,0	28,1*	17,8 ; 39,1	31,0*	20,6 ; 41,1	
Printemps	21,2	20,7	21,9	22,1	15,4 ; 28,9	24,4*	14,6 ; 34,3	19,0*	10,6 ; 28,3	
Été	29,1	30,3	27,4	22,6	16,1 ; 29,8	23,0*	14,2 ; 32,7	22,2*	12,8 ; 32,9	
Automne	23,7	24,0	23,3	26,0	18,8 ; 33,6	24,6*	15,0 ; 34,8	27,8*	17,8 ; 38,5	
<b>Lieu de la blessure</b>										
Résidence	39,7	32,0	49,8	43,6	35,8 ; 51,6	37,0	27,2 ; 48,0	52,5	40,9 ; 63,7	
Endroit public	28,1	24,8	32,5	20,9*	14,4 ; 28,2	13,1**	4,6 ; 22,6	31,5*	21,1 ; 42,7	
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	28,1	21,1 ; 35,3	37,8	27,3 ; 48,3	x	;	
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	7,3**	2,8 ; 12,3	12,0**	4,4 ; 20,1	x	;	
<b>Cause de la blessure</b>										
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	7,1**	3,4 ; 11,2	4,7**	0,9 ; 9,2	10,3**	3,3 ; 18,2	
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	2,9**	0,4 ; 5,9	x	;	x	;	
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	6,6**	2,5 ; 11,0	5,3**	0,8 ; 11,0	8,3**	1,6 ; 16,4	
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	10,8*	6,0 ; 16,2	16,9*	9,0 ; 25,9	x	;	
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;	
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	x	;	x	;	x	;	
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	21,0*	14,4 ; 27,4	22,6*	13,5 ; 32,3	18,8*	10,9 ; 27,4	
Chute	34,6	30,5	40,3	37,9	30,0 ; 45,3	34,0*	22,9 ; 44,2	43,1	31,9 ; 54,2	
Autres	13,7	12,5	15,3	10,5*	5,7 ; 15,5	10,8**	4,7 ; 18,0	10,2**	3,5 ; 18,0	
<b>Partie du corps atteinte</b>										
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	2,3**	0,2 ; 5,0	x	;	x	;	
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	29,3	22,5 ; 36,7	33,9*	23,2 ; 44,3	22,9*	13,5 ; 33,1	
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	35,0	26,9 ; 42,8	31,1*	20,5 ; 41,8	40,3	28,6 ; 51,8	
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	5,2**	2,1 ; 9,0	x	;	x	;	
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	17,7*	12,1 ; 24,2	18,3*	10,8 ; 27,3	16,9*	8,8 ; 26,1	
Autre	11,9	10,9	13,2	10,4*	6,1 ; 15,2	10,5**	4,4 ; 17,6	10,3**	3,9 ; 17,5	

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	2,5**	1,2 ; 3,8	x	;	3,9**	1,7 ; 6,4
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,003		P = 0,017		P = 0,019	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	1,0**	0,1 ; 2,1	x	;	x	;
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	5,2**	1,7 ; 8,7	x	;	7,5**	2,1 ; 13,5
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,450		P = 0,701		P = 0,811	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	3,4**	1,0 ; 6,2	x	;	4,4**	1,0 ; 8,1
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	2,2**	0,6 ; 4,2	x	;	3,8**	0,7 ; 7,6
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,355		P = 0,494		P = 0,378	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	2,0**	0,6 ; 3,5	x	;	3,0**	0,7 ; 5,5
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,042		P = .		P = 0,112	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	x	;	x	;	x	;
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	3,1**	1,3 ; 5,1	x	;	4,5**	1,6 ; 7,9
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,376		P = .		P = 0,441	
Oui	5,9	3,6*	7,3	x	;	x	;	x	;
Non	2,7*	2,2**	3,1*	3,1**	1,4 ; 5,0	x	;	4,9**	1,9 ; 8,4
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,331		P = .		P = 0,183	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	x	;	x	;	x	;
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	2,1**	0,8 ; 3,7	x	;	2,8**	0,7 ; 5,3
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,531		P = 0,602		P = 0,462	
Résidence	62,7	52,8	68,6	50,5*	26,4 ; 76,3	x	;	62,4*	31,5 ; 90,3
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	x	;	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	x	;	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	30,6**	5,9 ; 61,6	x	;	30,0**	3,1 ; 64,9
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	49,9**	17,4 ; 78,5	x	;	59,6**	23,2 ; 88,6
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	36,2**	6,4 ; 67,5	x	;	43,7**	8,9 ; 81,3
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	10,5	9,2 ; 12,0	10,3	8,2 ; 12,5	10,7	8,8 ; 12,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,012		P = 0,020	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	11,7*	6,5 ; 17,3	13,6**	5,1 ; 23,1	9,8**	3,6 ; 16,3
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	13,2	10,2 ; 16,2	15,1*	9,9 ; 20,1	11,3*	7,3 ; 15,2
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	11,7	9,6 ; 13,8	9,5	6,7 ; 12,4	13,7	10,7 ; 17,0
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	3,9*	2,3 ; 5,7	3,1**	0,8 ; 5,8	4,5**	2,3 ; 7,1
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,097		P = 0,038		P = 0,962	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	8,4	6,0 ; 10,9	6,3**	2,8 ; 10,2	9,8*	6,7 ; 13,4
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	9,7	7,6 ; 11,9	8,0*	5,3 ; 11,0	11,5	8,2 ; 15,1
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	12,9	10,0 ; 15,9	14,4*	10,1 ; 19,4	11,1*	7,2 ; 14,9
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	12,4*	6,9 ; 18,3	14,6**	2,7 ; 27,8	11,3**	5,6 ; 18,0
Autre	11,4	12,8*	10,2*	6,7**	2,6 ; 11,6	x	;	9,2**	2,2 ; 17,3
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,006		P = 0,068		P = 0,023	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	7,7	5,7 ; 9,8	7,9*	4,9 ; 11,2	7,4*	4,9 ; 10,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	12,1	8,9 ; 15,2	9,1*	5,0 ; 13,6	14,8*	10,4 ; 19,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	14,1	10,8 ; 17,7	15,5*	10,4 ; 21,1	12,9*	8,3 ; 17,5
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	10,7*	6,9 ; 14,8	12,3**	5,5 ; 19,8	9,3*	5,1 ; 14,4
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,130		P = 0,131		P = 0,654	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	8,6	6,2 ; 11,2	7,4*	3,8 ; 11,3	9,6*	6,4 ; 13,1
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	10,9	9,3 ; 12,6	11,3	8,7 ; 14,0	10,6	8,4 ; 13,0
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,575		P = 0,479		P = 0,130	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	11,5*	7,9 ; 15,6	8,4**	3,7 ; 14,3	14,3*	9,0 ; 19,9
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	10,5	9,0 ; 12,1	10,6	8,3 ; 13,2	10,3	8,3 ; 12,4
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,033		P = 0,002	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	13,5	11,4 ; 15,7	12,4	9,4 ; 15,5	14,7	11,4 ; 17,9
Étudiants	9,9	9,7	10,1	9,6**	4,0 ; 15,8	11,8**	2,3 ; 22,5	7,8**	1,3 ; 15,5
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	8,4*	4,6 ; 12,7	12,6**	4,6 ; 22,2	5,8**	2,6 ; 9,9
Retraités	6,9	6,7	7,0	4,7*	3,2 ; 6,5	3,5**	1,4 ; 6,0	5,9*	3,6 ; 8,5

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
Travail rémunéré		P = 0,091				P = 0,877				
Oui	45,2	47,6	42,8	54,4	47,2 ; 61,4	53,8	42,9 ; 64,8	55,0	45,3 ; 63,9	
Non	54,8	52,4	57,2	45,6	38,6 ; 52,8	46,2	35,2 ; 57,1	45,0	36,1 ; 54,7	
Sport ou exercice physique		P = 0,081				P = 0,432				
Oui	25,4	27,6	23,1	15,0*	9,7 ; 20,2	17,3*	9,2 ; 26,0	12,9**	6,4 ; 20,3	
Non	74,6	72,4	76,9	85,0	79,8 ; 90,3	82,7	74,0 ; 90,8	87,1	79,7 ; 93,6	
Tâches ménagères, autre travail ou études		P = 0,037				P = 0,640				
Oui	17,6	15,6	19,6	19,6*	14,1 ; 25,9	18,1*	9,4 ; 27,8	21,1*	14,0 ; 28,9	
Non	82,4	84,4	80,4	80,4	74,1 ; 85,9	81,9	72,2 ; 90,6	78,9	71,1 ; 86,0	
Loisir ou passe-temps		P = 0,172				P = 0,885				
Oui	8,1	7,2	9,0	10,3*	6,2 ; 14,8	10,0**	3,9 ; 17,1	10,7**	5,2 ; 17,2	
Non	91,9	92,8	91,0	89,7	85,2 ; 93,8	90,0	82,9 ; 96,1	89,3	82,8 ; 94,8	
Partie du corps atteinte		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	x	;	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	64,0	57,1 ; 71,1	60,5	49,6 ; 72,0	67,3	58,3 ; 76,5	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	14,0*	9,1 ; 19,4	13,2**	5,9 ; 22,0	14,7*	8,0 ; 22,4	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	x	;	x	;	x	;	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	15,1*	9,5 ; 20,7	19,1*	9,9 ; 28,2	11,3**	5,1 ; 18,2	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	3,5**	0,9 ; 6,8	x	;	3,0**	0,3 ; 6,3	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	32,5	30,5 ; 34,6	29,9	27,0 ; 33,1	35,0	32,2 ; 38,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,267	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	25,6	18,7 ; 33,0	17,9**	8,8 ; 28,0	33,4*	22,7 ; 44,2
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	24,7	21,0 ; 28,8	19,2	14,1 ; 25,1	30,3	25,0 ; 35,9
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	39,1	35,8 ; 42,4	40,6	35,7 ; 45,7	37,6	33,4 ; 42,2
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	33,8	29,7 ; 38,1	30,5	24,7 ; 37,0	36,7	31,2 ; 42,5
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,069		P = 0,164	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	37,7	33,9 ; 42,0	35,9	29,0 ; 42,7	38,9	33,5 ; 44,3
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	36,6	33,1 ; 40,2	35,0	29,9 ; 40,3	38,3	33,3 ; 43,3
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	28,6	24,8 ; 32,6	26,0	20,9 ; 31,4	31,6	26,0 ; 37,3
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	32,4	25,0 ; 40,0	27,7*	14,4 ; 42,3	35,0	26,5 ; 44,2
Autre	34,0	32,4	35,4	25,1*	17,4 ; 33,8	22,9**	11,1 ; 36,1	27,3*	16,1 ; 39,3
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,121		P = 0,484		P = 0,235	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	35,2	32,0 ; 38,5	32,1	27,5 ; 37,1	38,5	33,8 ; 43,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	31,4	27,2 ; 36,0	28,4	22,2 ; 35,4	34,0	28,2 ; 40,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	31,2	26,8 ; 35,6	29,4	23,0 ; 35,7	33,0	27,5 ; 39,3
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	27,8	22,2 ; 33,4	24,7*	16,0 ; 33,5	30,3	23,4 ; 38,0
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,138		P = 0,173		P = 0,609	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	35,7	31,3 ; 40,0	34,6	27,6 ; 41,9	36,5	30,8 ; 42,4
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	32,0	29,6 ; 34,5	29,1	25,6 ; 32,8	34,8	31,6 ; 38,3
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,035		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	45,0	39,3 ; 50,8	37,9	30,0 ; 47,5	51,4	43,5 ; 59,2
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	30,5	28,3 ; 32,9	28,7	25,3 ; 32,3	32,2	29,1 ; 35,6
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,029		P = 0,234		P = 0,107	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	31,0	28,2 ; 33,9	29,2	25,2 ; 33,4	32,9	29,2 ; 37,1
Étudiants	20,7	14,8	26,3	26,8*	18,3 ; 35,8	21,1**	8,9 ; 34,8	31,9*	19,7 ; 44,9
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	40,1	33,4 ; 46,4	33,2*	22,8 ; 44,6	44,4	35,8 ; 52,4
Retraités	34,2	30,5	37,2	34,7	31,1 ; 38,5	34,3	28,9 ; 40,2	35,0	30,2 ; 40,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	21,0	18,5 ; 23,9	18,4	14,5 ; 22,8	23,2	19,6 ; 27,1
Bon	33,9	28,1	39,6	35,1	31,5 ; 38,7	32,1	26,8 ; 37,4	38,1	33,3 ; 43,0
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	60,6	55,1 ; 66,3	55,3	47,3 ; 64,2	66,2	58,9 ; 73,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	54,7	49,6 ; 59,8	51,4	43,1 ; 60,0	56,9	50,4 ; 63,4
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	26,5	24,3 ; 28,8	25,0	21,6 ; 28,4	28,1	25,2 ; 31,3
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,023		P = 0,349		P = 0,018	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	30,8**	12,0 ; 49,9	x	;	34,2**	11,8 ; 57,4
Poids normal	28,3	22,9	32,1	29,1	25,9 ; 32,5	27,6	22,2 ; 33,2	30,0	26,0 ; 34,3
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	32,8	29,4 ; 36,4	29,2	24,4 ; 34,0	37,8	32,6 ; 43,4
Obésité	37,9	30,5	46,1	39,2	34,2 ; 44,3	34,7	27,6 ; 41,8	44,6	37,3 ; 52,1

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,015					
Oui	30,3	25,3	35,2	32,5	30,5 ; 34,6	29,9	27,0 ; 33,1	35,0	32,2 ; 38,0		
Non	69,7	74,7	64,8	67,5	65,4 ; 69,5	70,1	66,9 ; 73,0	65,0	62,0 ; 67,8		
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,005					
Oui	9,5	6,4	12,5	11,6	10,3 ; 13,0	9,6	7,9 ; 11,6	13,6	11,6 ; 15,6		
Non	90,5	93,6	87,5	88,4	87,0 ; 89,7	90,4	88,4 ; 92,1	86,4	84,4 ; 88,4		
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,841					
Oui	14,5	12,2	16,7	16,7	15,1 ; 18,3	16,5	14,1 ; 19,2	16,8	14,7 ; 19,0		
Non	85,5	87,8	83,3	83,3	81,7 ; 84,9	83,5	80,8 ; 85,9	83,2	81,0 ; 85,3		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,009					
Oui	13,5	10,8	16,1	17,2	15,6 ; 18,8	14,9	12,8 ; 17,3	19,3	16,9 ; 21,7		
Non	86,5	89,2	83,9	82,8	81,2 ; 84,4	85,1	82,7 ; 87,2	80,7	78,3 ; 83,1		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,537					
Oui	14,5	11,8	17,2	16,5	15,0 ; 18,2	16,0	13,7 ; 18,4	17,0	14,9 ; 19,2		
Non	85,5	88,2	82,8	83,5	81,8 ; 85,0	84,0	81,6 ; 86,3	83,0	80,8 ; 85,1		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,529					
Oui	17,8	16,0	19,6	19,8	18,1 ; 21,7	20,4	17,9 ; 23,2	19,3	16,9 ; 21,7		
Non	82,2	84,0	80,4	80,2	78,3 ; 81,9	79,6	76,8 ; 82,1	80,7	78,3 ; 83,1		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,001					
Oui	14,2	10,6	17,8	13,8	12,3 ; 15,3	11,0	8,9 ; 13,2	16,5	14,3 ; 18,8		
Non	85,8	89,4	82,2	86,2	84,7 ; 87,7	89,0	86,8 ; 91,1	83,5	81,2 ; 85,7		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	50,7	48,4 ; 53,0	37,0	34,9 ; 39,1	12,3	10,9 ; 13,8
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	52,6	34,1	13,3	45,1	41,8 ; 48,6	39,4	35,9 ; 42,6	15,5	13,1 ; 18,1
Femmes	60,1	29,8	10,1	56,0	53,0 ; 58,8	34,7	32,0 ; 37,5	9,3	7,5 ; 11,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	59,5	51,6 ; 67,1	31,4	24,0 ; 39,0	9,1*	4,7 ; 14,2
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	58,0	53,7 ; 62,5	32,1	27,6 ; 36,3	9,9	7,3 ; 12,7
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	47,6	44,2 ; 51,0	37,9	34,8 ; 41,0	14,6	12,1 ; 17,0
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	40,9	36,1 ; 45,3	46,0	41,2 ; 51,1	13,2	10,0 ; 16,6
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,030					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	45,4	40,9 ; 49,7	40,7	36,4 ; 45,1	13,9	11,0 ; 17,1
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	49,5	45,8 ; 53,0	39,1	35,5 ; 42,6	11,4	9,2 ; 13,8
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	55,1	50,9 ; 59,3	34,7	30,6 ; 38,8	10,2	7,8 ; 12,8
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	52,3	44,1 ; 60,8	29,2	22,0 ; 36,8	18,5*	12,0 ; 25,4
Autre	48,0	34,3	17,7	47,1	36,3 ; 57,8	40,7	30,5 ; 51,6	12,2**	5,4 ; 19,4
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,969					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	50,7	48,4 ; 52,9	36,9	34,8 ; 39,0	12,4	11,0 ; 13,9
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	53,7**	19,8 ; 82,7	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,279					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	50,7	48,3 ; 53,0	36,5	34,3 ; 38,7	12,8	11,3 ; 14,4
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	50,0	40,0 ; 59,2	42,4	32,9 ; 52,0	7,6**	2,7 ; 13,1
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	x	;	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	40,2	36,7 ; 43,9	41,3	37,9 ; 45,2	18,5	15,6 ; 21,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	49,2	44,7 ; 53,7	40,3	35,8 ; 44,6	10,5	7,9 ; 13,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	59,5	54,6 ; 64,1	32,2	27,7 ; 36,8	8,3*	5,9 ; 11,0
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	69,8	64,0 ; 75,7	25,7	20,2 ; 31,1	4,6**	2,2 ; 7,5
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	39,4	34,7 ; 44,2	40,1	35,3 ; 45,3	20,5	16,4 ; 24,7
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	54,5	51,9 ; 57,0	35,6	33,3 ; 38,1	9,9	8,3 ; 11,4
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	32,5	27,3 ; 38,1	37,0	31,6 ; 43,0	30,5	25,0 ; 36,0
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	54,1	51,6 ; 56,5	36,9	34,5 ; 39,3	9,0	7,6 ; 10,4
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	52,5	49,4 ; 55,6	36,4	33,4 ; 39,3	11,2	9,3 ; 13,2
Étudiants	62,8	27,9	9,3	66,0	56,8 ; 75,2	28,9*	19,8 ; 38,3	5,1**	1,3 ; 9,7
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	43,9	36,9 ; 50,8	33,5	27,1 ; 40,0	22,7	17,0 ; 28,7
Retraités	49,7	38,1	12,2	43,2	39,0 ; 47,4	43,6	39,5 ; 48,1	13,1	10,4 ; 16,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	50,7	48,4 ; 53,0	37,0	34,9 ; 39,1	12,3	10,9 ; 13,8
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	41,7	37,3 ; 46,2	37,9	33,6 ; 42,3	20,4	16,9 ; 24,3
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	54,0	51,4 ; 56,5	36,6	34,2 ; 39,2	9,4	7,9 ; 10,9
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	68,0	64,7 ; 71,1	27,7	24,7 ; 30,7	4,3	3,2 ; 5,7
Bon	41,4	42,6	16,0	37,5	33,9 ; 41,2	48,1	44,8 ; 51,9	14,4	11,7 ; 17,0
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	28,7	23,8 ; 33,7	40,1	34,7 ; 45,6	31,2	26,0 ; 36,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	41,3	36,3 ; 46,4	40,2	35,4 ; 45,2	18,5	14,6 ; 22,7
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	53,6	50,9 ; 56,2	36,2	33,8 ; 38,7	10,2	8,7 ; 11,8
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,037					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	47,8	42,7 ; 52,7	42,6	37,9 ; 47,7	9,6*	6,6 ; 12,8
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	51,3	48,7 ; 54,1	35,8	33,4 ; 38,4	12,8	11,2 ; 14,5
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	54,3	51,8 ; 56,8	35,1	32,8 ; 37,6	10,5	9,0 ; 12,1
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	31,9	26,6 ; 37,1	46,4	40,5 ; 52,2	21,7	17,1 ; 26,7
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	59,4	55,1 ; 63,5	32,0	28,2 ; 36,1	8,6	6,3 ; 11,0
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	46,9	43,7 ; 50,4	37,9	34,7 ; 41,1	15,2	12,9 ; 17,5

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	17,8	16,4 ; 19,2	15,7	13,6 ; 17,8	19,7	17,9 ; 21,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	1,9**	0,8 ; 3,2	2,8**	0,6 ; 5,3	1,1**	0,2 ; 2,1
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	18,4	15,9 ; 21,1	17,7	14,0 ; 21,4	19,1	15,8 ; 22,6
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	50,6	46,1 ; 55,0	42,8	35,7 ; 49,7	57,3	51,1 ; 63,2
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,141		P = 0,373		P = 0,095	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	47,1	41,1 ; 53,1	42,4	33,3 ; 51,4	51,5	43,3 ; 59,6
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	55,1	47,7 ; 63,3	41,1	28,5 ; 54,5	66,1	55,7 ; 75,9
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	65,8*	39,2 ; 90,6	x	;	62,1*	30,5 ; 93,8
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	29,8	;	24,6	;	35,2	31,0 ; 39,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	14,1	;	14,5*	;	13,7	10,0 ; 17,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	6,1*	;	5,3**	;	6,8*	4,1 ; 10,0
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	6,2*	;	6,6**	;	5,9**	2,5 ; 9,8
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,002		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	26,4	22,7 ; 30,4	23,0	17,1 ; 29,4	29,1	24,6 ; 34,3
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	14,6	13,0 ; 16,3	13,4	11,0 ; 15,8	15,8	13,6 ; 18,1
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	27,6	22,9 ; 32,6	26,3	19,1 ; 33,8	28,9	22,6 ; 36,1
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	15,4	13,9 ; 16,9	13,6	11,3 ; 15,8	17,2	15,1 ; 19,3

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	84,3	82,8 ; 86,0	13,5	12,0 ; 15,0	2,1	1,5 ; 2,8
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	76,4	73,6 ; 79,2	20,0	17,3 ; 22,7	3,6*	2,4 ; 4,9
Femmes	87,9	11,3	0,7	91,9	90,2 ; 93,4	7,4	5,8 ; 9,0	0,7**	0,3 ; 1,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,092					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	87,4	82,0 ; 92,8	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	89,1	86,2 ; 91,7	9,7	7,1 ; 12,3	1,3**	0,3 ; 2,5
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	85,2	82,8 ; 87,6	12,5	10,4 ; 14,9	2,2*	1,3 ; 3,2
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	73,2	69,0 ; 77,1	22,6	18,8 ; 26,6	4,2*	2,4 ; 6,2
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,487					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	79,7	76,2 ; 83,2	16,2	13,0 ; 19,3	4,1*	2,3 ; 6,1
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	82,4	79,5 ; 85,0	15,5	12,9 ; 18,2	2,2*	1,1 ; 3,2
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	86,1	83,2 ; 89,1	11,9	9,1 ; 14,7	2,0**	0,8 ; 3,3
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	87,7	81,8 ; 92,8	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	88,6	81,8 ; 94,9	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,622					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	82,4	80,6 ; 84,3	15,1	13,4 ; 16,9	2,4*	1,6 ; 3,2
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	91,1	87,2 ; 94,3	x	;	x	;
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	89,3	83,8 ; 94,3	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	85,4	73,4 ; 96,2	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	77,5	74,6 ; 80,5	19,0	16,4 ; 21,9	3,5*	2,2 ; 4,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	87,6	84,4 ; 90,5	11,4	8,4 ; 14,5	1,1**	0,3 ; 1,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	87,0	83,7 ; 90,3	11,0	8,0 ; 14,1	2,0**	0,7 ; 3,4
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	93,9	90,8 ; 96,5	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	79,5	75,3 ; 83,3	16,0	12,6 ; 19,7	4,5*	2,7 ; 6,6
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	86,0	84,2 ; 87,7	12,6	10,9 ; 14,4	1,4*	0,8 ; 2,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	77,6	72,7 ; 82,5	17,9	13,5 ; 22,6	4,4**	2,2 ; 7,2
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	85,6	83,9 ; 87,3	12,7	11,1 ; 14,3	1,7*	1,1 ; 2,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,225					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	86,4	84,2 ; 88,4	12,1	10,1 ; 14,1	1,5*	0,8 ; 2,3
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	87,3	80,0 ; 94,0	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	86,4	81,7 ; 90,6	10,3*	6,6 ; 14,3	3,3**	1,0 ; 6,0
Retraités	72,9	23,2	3,8	77,4	74,0 ; 80,7	19,0	15,9 ; 22,3	3,6*	2,1 ; 5,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	84,3	82,8 ; 86,0	13,5	12,0 ; 15,0	2,1	1,5 ; 2,8
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,286					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	83,7	80,4 ; 86,9	13,3	10,4 ; 16,4	3,0*	1,6 ; 4,6
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	84,6	82,7 ; 86,5	13,6	11,8 ; 15,4	1,8*	1,2 ; 2,5
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	89,6	87,5 ; 91,5	9,1	7,3 ; 11,1	1,3**	0,6 ; 2,0
Bon	75,1	21,2	3,6	82,1	79,3 ; 84,8	15,8	13,3 ; 18,5	2,1*	1,1 ; 3,2
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	74,4	69,2 ; 79,3	20,7	16,2 ; 25,6	4,9*	2,5 ; 7,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,268					
Élevé	77,2	19,2	3,6	82,4	78,5 ; 86,2	15,3	11,7 ; 19,1	2,3**	1,1 ; 3,9
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	85,8	84,1 ; 87,5	12,4	10,8 ; 14,1	1,8*	1,1 ; 2,5
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	71,2	66,8 ; 75,4	23,8	19,8 ; 28,0	5,0*	2,9 ; 7,3
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	87,1	85,5 ; 88,8	11,4	9,8 ; 13,0	1,5*	0,9 ; 2,1
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	94,6	92,6 ; 96,5	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	83,2	80,9 ; 85,5	14,7	12,4 ; 16,9	2,2*	1,3 ; 3,1

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	84,3	82,8 ; 86,0	76,4	73,6 ; 79,2	91,9	90,2 ; 93,4
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	13,5	12,0 ; 15,0	20,0	17,3 ; 22,7	7,4	5,8 ; 9,0
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	2,1	1,5 ; 2,8	3,6*	2,4 ; 4,9	0,7**	0,3 ; 1,3
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	71,2	66,8 ; 75,4	57,3	49,5 ; 65,0	81,6	76,6 ; 86,0
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	23,8	19,8 ; 28,0	34,6	27,2 ; 42,1	15,8	11,4 ; 20,4
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	5,0*	2,9 ; 7,3	8,2**	3,8 ; 12,9	2,7**	0,9 ; 4,9
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	87,1	85,5 ; 88,8	79,9	77,0 ; 82,8	94,4	92,6 ; 95,9
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	11,4	9,8 ; 13,0	17,4	14,8 ; 20,3	x	;
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	1,5*	0,9 ; 2,1	2,7*	1,6 ; 3,9	x	;

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	34,9	32,6 ; 37,5	15,5	13,7 ; 17,5	49,6	47,0 ; 52,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	26,2	22,9 ; 29,8	12,9	10,3 ; 15,6	60,9	57,1 ; 64,4
Femmes	41,7	18,2	40,1	43,6	40,3 ; 47,1	18,2	15,7 ; 20,7	38,2	34,9 ; 41,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,009					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	33,0	25,4 ; 41,5	9,4*	4,8 ; 14,5	57,5	48,8 ; 65,5
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	33,3	29,1 ; 37,6	17,1	13,7 ; 20,8	49,6	45,0 ; 54,0
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	38,5	35,0 ; 42,2	16,8	14,0 ; 19,8	44,6	41,1 ; 48,3
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	28,6	22,7 ; 34,7	14,9*	10,0 ; 19,9	56,6	49,9 ; 62,8
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,025					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	32,2	28,0 ; 36,9	12,5	9,5 ; 15,7	55,3	50,7 ; 59,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	34,5	29,5 ; 39,5	15,8	11,9 ; 19,8	49,7	44,2 ; 55,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	36,9	32,2 ; 41,6	16,6	12,9 ; 20,6	46,5	41,6 ; 51,4
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	37,5	31,1 ; 43,5	20,4	15,1 ; 26,1	42,1	35,9 ; 48,4
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,220					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	34,9	29,0 ; 41,1	12,6*	8,5 ; 17,0	52,5	46,4 ; 58,2
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	34,8	32,3 ; 37,5	16,7	14,5 ; 18,9	48,5	45,6 ; 51,4
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,484					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	36,0	33,1 ; 39,1	16,5	13,9 ; 19,0	47,5	44,4 ; 50,7
Étudiants	28,8	16,3	54,9	32,2	23,4 ; 41,8	14,0*	7,6 ; 21,6	53,8	43,2 ; 62,9
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	35,4	27,8 ; 43,1	11,0*	6,4 ; 16,0	53,7	45,8 ; 61,7
Retraités	38,0	12,4	49,6	33,5	28,2 ; 38,9	14,9	11,0 ; 19,0	51,6	45,9 ; 57,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	39,7	37,5 ; 41,9	2,2*	1,5 ; 2,9	58,1	55,9 ; 60,3
Sexe	P = 0,000			P = 0,044					
Hommes	36,6	3,6	59,9	37,7	34,5 ; 41,1	2,8*	1,8 ; 4,0	59,5	56,1 ; 62,9
Femmes	40,5	2,3	57,1	41,7	38,9 ; 44,6	1,5**	0,8 ; 2,4	56,8	53,8 ; 59,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	17,0*	10,7 ; 23,6	3,0**	0,2 ; 6,5	80,0	72,9 ; 86,7
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	43,0	38,2 ; 47,4	1,5**	0,3 ; 2,9	55,5	51,0 ; 60,2
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	46,5	43,3 ; 49,8	1,9*	1,1 ; 2,7	51,6	48,3 ; 55,0
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	35,4	31,1 ; 39,8	3,2*	1,8 ; 4,8	61,5	56,9 ; 65,8
Hommes	P = 0,000			P = 0,011					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	15,8**	6,5 ; 26,1	x	;	x	;
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	36,3	29,6 ; 43,0	2,8**	0,4 ; 5,5	60,9	54,3 ; 67,5
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	47,4	42,5 ; 52,3	3,0*	1,5 ; 4,7	49,7	44,7 ; 54,6
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	33,4	26,9 ; 40,0	2,1**	0,6 ; 4,2	64,5	57,7 ; 71,0
Femmes	P = 0,000			P = 0,471					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	18,4*	10,0 ; 27,5	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	49,8	43,0 ; 55,6	x	;	x	;
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	45,7	41,3 ; 49,9	0,8**	0,2 ; 1,6	53,5	49,3 ; 58,0
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	37,1	31,6 ; 43,0	4,1**	1,9 ; 6,7	58,8	52,7 ; 64,5
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,001					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	32,4**	12,1 ; 51,3	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	9,8	7,7 ; 12,0	3,4*	2,3 ; 4,7	86,8	84,1 ; 89,1
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	49,6	45,9 ; 53,3	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	84,0	79,9 ; 87,9	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,065					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	5,2*	2,7 ; 7,9	6,6*	4,1 ; 9,6	88,2	84,3 ; 91,6
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	40,9	36,1 ; 46,3	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	79,7	73,4 ; 85,7	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	32,5**	10,0 ; 54,5	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	12,8	9,9 ; 16,1	1,2**	0,5 ; 2,2	85,9	82,6 ; 89,0
Embonpoint	69,6	x	x	61,6	56,3 ; 66,8	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	89,4	84,5 ; 94,1	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	76,8	73,3 ; 80,2	10,4	8,0 ; 13,0	12,8	10,1 ; 15,7
Sexe	P = 0,000			P = 0,914					
Hommes	81,4	10,5	8,0	77,6	71,7 ; 83,0	10,1*	6,5 ; 14,4	12,3*	8,0 ; 16,8
Femmes	74,5	14,1	11,5	76,1	71,9 ; 80,5	10,7*	7,4 ; 13,8	13,2	9,8 ; 17,1
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,721					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	67,4	52,3 ; 81,1	13,3**	1,5 ; 26,0	19,3**	8,7 ; 32,4
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	78,6	72,2 ; 85,0	11,2*	6,7 ; 16,5	10,1*	5,1 ; 15,2
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	77,2	72,4 ; 81,9	10,0*	6,7 ; 13,5	12,8	9,1 ; 16,8
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	78,7	70,4 ; 86,1	8,1**	3,2 ; 13,9	13,2*	6,7 ; 19,9
Hommes	P = 0,252			P = 0,924					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	66,2*	38,1 ; 89,9	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	81,9	71,3 ; 91,6	x	;	x	;
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	78,5	70,6 ; 85,7	9,7*	4,7 ; 15,5	11,8*	6,3 ; 18,2
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	75,0	61,2 ; 87,6	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,857					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	68,3	49,8 ; 86,9	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	76,3	68,0 ; 85,4	10,5**	4,8 ; 16,7	13,2**	6,3 ; 20,6
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	76,2	69,7 ; 82,3	10,1*	6,0 ; 14,7	13,7*	8,8 ; 18,9
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	81,8	71,8 ; 90,6	9,8**	2,9 ; 18,3	8,3**	2,4 ; 15,5
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,006					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	86,4	80,4 ; 91,9	7,3**	3,5 ; 11,5	6,4**	2,4 ; 10,9
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	79,2	73,9 ; 84,3	9,8*	6,0 ; 13,7	11,0*	7,1 ; 15,1
Obésité	72,3	14,4	13,3	69,3	62,4 ; 75,7	12,2*	7,7 ; 17,1	18,5	13,2 ; 24,1
Hommes	P = 0,002			P = 0,563					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	83,1	66,6 ; 96,6	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	83,9	76,5 ; 90,1	7,6**	3,0 ; 13,5	8,5**	3,7 ; 14,0
Obésité	76,0	12,2	11,8	67,8	57,3 ; 77,2	15,8*	8,9 ; 24,6	16,4*	8,3 ; 24,9
Femmes	P = 0,161			P = 0,028					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	87,3	81,1 ; 93,0	8,8**	4,0 ; 14,1	3,9**	0,8 ; 7,9
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	74,1	66,5 ; 81,7	12,2*	6,3 ; 18,0	13,7*	7,9 ; 20,3
Obésité	68,9	16,4	14,7	70,9	62,5 ; 79,8	8,5**	3,5 ; 14,6	20,6*	12,9 ; 28,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
18,2	16,4 ; 20,0	16,9	15,2 ; 18,5	1,7*	1,1 ; 2,4	63,2	60,9 ; 65,4	Ensemble de la population	
P = 0,013									
15,7	13,2 ; 18,3	15,7	13,1 ; 18,2	2,0**	1,0 ; 3,2	66,6	63,2 ; 69,9	Sexe	
20,6	18,1 ; 23,1	18,0	15,8 ; 20,3	1,5**	0,7 ; 2,3	59,9	56,8 ; 62,9	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
14,3*	8,9 ; 20,2	14,8*	9,2 ; 20,5	6,0**	2,0 ; 10,5	65,0	57,2 ; 73,0	Groupe d'âge	
20,9	17,0 ; 24,6	16,4	12,9 ; 19,9	x	;	x	;	15-24 ans	
20,1	17,4 ; 22,9	19,1	16,4 ; 21,9	1,1**	0,5 ; 1,9	59,6	56,1 ; 62,8	25-44 ans	
13,1	9,9 ; 16,2	13,9	10,7 ; 17,4	2,0**	0,9 ; 3,2	71,1	66,6 ; 75,3	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,162									
10,2**	3,0 ; 18,8	13,8**	5,4 ; 22,9	8,3**	2,0 ; 15,9	67,8	55,6 ; 79,8	Hommes	
16,5*	11,5 ; 21,8	14,2*	9,4 ; 19,2	x	;	x	;	15-24 ans	
19,2	15,0 ; 23,4	17,0	13,3 ; 21,1	1,5**	0,4 ; 2,9	62,2	57,2 ; 67,3	25-44 ans	
10,4*	6,2 ; 15,0	16,1*	11,1 ; 21,9	1,4**	0,0 ; 3,2	72,0	65,2 ; 78,5	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,563									
18,4*	10,3 ; 27,4	15,8*	7,9 ; 24,7	x	;	x	;	Femmes	
25,1	19,7 ; 30,8	18,5	14,0 ; 23,3	x	;	x	;	15-24 ans	
21,0	17,4 ; 24,7	21,2	17,6 ; 25,1	0,8**	0,2 ; 1,5	57,0	52,3 ; 61,4	25-44 ans	
15,3	10,9 ; 19,8	12,0*	8,4 ; 16,0	2,4**	0,8 ; 4,3	70,3	64,6 ; 75,7	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,000									
x	;	x	;	28,2**	10,0 ; 47,9	60,6*	40,2 ; 81,7	Statut pondéral	
6,7	4,9 ; 8,7	14,8	12,4 ; 17,5	2,4**	1,2 ; 3,7	76,1	73,0 ; 79,1	Poids insuffisant	
19,7	16,8 ; 22,7	17,8	15,0 ; 20,6	0,8**	0,1 ; 1,8	61,7	58,1 ; 65,4	Poids normal	
40,0	34,9 ; 45,0	19,7	15,7 ; 24,1	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,111									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
2,3**	0,5 ; 4,3	9,9*	6,3 ; 13,9	4,1**	1,6 ; 7,0	83,7	79,0 ; 88,2	Poids insuffisant	
15,9	12,1 ; 20,0	18,1	14,3 ; 22,2	1,3**	0,1 ; 3,0	64,7	59,6 ; 69,9	Poids normal	
35,6	28,2 ; 43,0	19,2*	13,5 ; 25,4	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,001									
x	;	x	;	35,0**	11,4 ; 58,1	59,4*	37,2 ; 83,1	Femmes	
9,7	6,8 ; 12,7	18,0	14,8 ; 21,6	1,2**	0,3 ; 2,3	71,1	66,8 ; 75,0	Poids insuffisant	
24,9	20,2 ; 29,6	17,3	13,4 ; 21,4	x	;	x	;	Poids normal	
45,5	38,3 ; 52,8	20,4	14,9 ; 26,6	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
37,9	34,2 ; 41,4	21,6	18,7 ; 24,8	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	30,8*	15,6 ; 47,3	67,3	50,9 ; 82,2	Excès de poids	
5,7	4,4 ; 7,2	14,1	12,0 ; 16,2	1,9*	1,0 ; 2,9	78,3	75,7 ; 80,8	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
29,3	24,3 ; 34,4	11,2*	7,7 ; 15,0	8,9*	5,7 ; 12,1	50,7	44,8 ; 56,2	Ensemble de la population	
P = 0,243									
26,0	18,3 ; 34,2	11,8**	5,8 ; 19,0	12,7*	6,4 ; 19,4	49,6	39,9 ; 58,9	Sexe	
31,7	25,1 ; 38,3	10,7*	6,8 ; 15,3	6,1*	3,0 ; 9,5	51,5	44,4 ; 58,7	Hommes	
								Femmes	
P = 0,771									
26,2**	8,3 ; 48,5	18,6**	2,1 ; 39,2	x		x		Groupe d'âge	
35,2	25,2 ; 45,5	9,3**	3,6 ; 16,0	10,1**	3,8 ; 17,0	45,3	34,6 ; 55,9	15-24 ans	
29,7	22,1 ; 37,6	12,0*	7,0 ; 17,6	5,3**	2,6 ; 8,4	53,1	44,4 ; 61,3	25-44 ans	
16,3**	8,0 ; 26,5	7,4**	0,7 ; 15,9	12,9**	3,1 ; 23,1	63,4	49,4 ; 76,2	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,970									
x		x		x		x		Hommes	
30,9**	15,7 ; 49,5	x		20,8**	5,3 ; 37,0	x		15-24 ans	
32,6*	21,2 ; 44,9	13,6**	5,4 ; 24,0	3,7**	0,2 ; 8,3	50,1	37,2 ; 62,0	25-44 ans	
x		x		x		68,6*	44,9 ; 91,5	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,966									
41,7**	14,5 ; 71,2	x		x		43,9**	15,2 ; 71,4	Femmes	
38,0*	24,8 ; 51,4	13,7**	4,9 ; 24,0	3,5**	0,2 ; 8,1	44,8	31,3 ; 57,8	15-24 ans	
27,0*	16,8 ; 36,5	10,5**	4,6 ; 17,0	6,8**	2,7 ; 11,9	55,8	45,2 ; 66,8	25-44 ans	
23,4**	10,7 ; 39,1	x		x		60,3	41,9 ; 76,7	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,629									
x		x		x		x		Statut pondéral	
35,8*	21,6 ; 50,5	x		x		54,1	38,9 ; 68,8	Poids insuffisant	
33,8	25,4 ; 42,4	10,0**	5,1 ; 15,7	6,4**	2,4 ; 11,1	49,8	40,9 ; 58,7	Poids normal	
23,0	16,4 ; 29,9	14,6*	8,6 ; 21,2	11,4*	6,1 ; 17,2	51,0	42,3 ; 59,7	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,839									
x		x		x		x		Hommes	
x		x		x		x		Poids insuffisant	
37,7*	24,0 ; 51,6	x		x		51,0	36,5 ; 65,0	Poids normal	
17,8**	8,8 ; 28,3	18,4**	8,1 ; 30,1	16,7**	6,5 ; 27,5	47,1	32,9 ; 61,1	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,865									
x		x		x		x		Femmes	
40,1*	23,9 ; 56,3	x		x		51,9	36,2 ; 68,1	Poids insuffisant	
30,3*	19,6 ; 41,4	14,0**	6,3 ; 23,0	7,0**	1,9 ; 13,6	48,7	36,9 ; 60,5	Poids normal	
28,1*	17,8 ; 38,5	10,9**	4,1 ; 18,8	6,2**	2,0 ; 11,3	54,8	43,6 ; 65,8	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	87,3	84,7 ; 89,8	6,9	5,1 ; 9,0	5,8*	4,0 ; 7,6
Sexe	P = 0,001			P = 0,280					
Hommes	88,9	6,9	4,2	86,5	81,8 ; 90,7	6,1**	3,3 ; 9,5	7,4*	4,1 ; 10,9
Femmes	85,7	7,5	6,8	88,0	84,7 ; 91,0	7,5*	5,0 ; 10,5	4,5*	2,5 ; 6,6
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,630					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	81,5	69,0 ; 92,7	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	91,8	87,5 ; 95,6	5,2**	2,2 ; 8,6	3,0**	0,6 ; 5,9
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	85,1	81,1 ; 89,0	7,1*	4,5 ; 10,3	7,7*	4,7 ; 11,0
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	89,7	83,9 ; 94,8	5,4**	2,1 ; 9,7	4,9**	1,3 ; 9,5
Hommes	P = 0,121			P = 0,984					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	84,3	61,6 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	94,7	88,1 ; 99,8	x	;	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	80,7	72,9 ; 87,6	7,9**	3,4 ; 13,6	11,4*	5,5 ; 17,3
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	91,9	82,6 ; 99,2	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,932					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	79,5	62,1 ; 94,4	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	89,9	83,7 ; 94,9	x	;	x	;
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	88,8	84,4 ; 93,1	6,4*	3,4 ; 9,9	4,7**	1,8 ; 8,0
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	87,8	79,3 ; 94,8	5,6**	1,1 ; 11,0	6,6**	1,2 ; 13,3
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,293					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	92,6	87,8 ; 96,8	4,3**	1,2 ; 8,2	3,1**	0,3 ; 6,7
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	87,5	83,2 ; 91,2	8,3*	5,1 ; 12,1	4,2**	1,8 ; 7,0
Obésité	82,0	8,7	9,2	83,3	78,1 ; 88,3	7,4*	4,2 ; 11,3	9,2*	5,3 ; 13,3
Hommes	P = 0,002			P = 0,917					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	88,5	73,7 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	87,7	81,1 ; 93,6	6,9**	2,8 ; 12,4	5,3**	1,3 ; 10,0
Obésité	85,2	8,2	6,6*	84,7	76,9 ; 91,8	6,7**	1,8 ; 12,7	8,6**	3,2 ; 14,5
Femmes	P = 0,034			P = 0,448					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	93,8	88,7 ; 97,8	x	;	x	;
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	87,1	81,4 ; 92,5	9,8**	5,0 ; 15,6	3,0**	0,7 ; 6,0
Obésité	79,1	9,2	11,8	81,9	74,6 ; 88,8	8,2**	3,7 ; 13,7	9,9**	4,5 ; 16,2

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	6,4*	4,4 ; 8,4	93,6	91,6 ; 95,6
Sexe	P = 0,024		P = 0,697			
Hommes	6,6	93,4	6,9*	3,7 ; 10,2	93,1	89,8 ; 96,3
Femmes	8,6	91,4	6,0*	3,7 ; 8,7	94,0	91,3 ; 96,3
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,031			
15-24 ans	11,2*	88,8	7,6**	0,9 ; 16,0	92,4	84,0 ; 99,1
25-44 ans	8,0	92,0	3,5**	1,0 ; 6,6	96,5	93,4 ; 99,0
45-64 ans	7,5	92,5	9,4*	6,1 ; 13,0	90,6	87,0 ; 93,9
65 ans et plus	4,9	95,1	x	;	x	;
Hommes	P = 0,409		P = 0,024			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	x	;	x	;
45-64 ans	7,0	93,0	11,0**	5,4 ; 17,0	89,0	83,0 ; 94,6
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,264			
15-24 ans	12,3*	87,7	x	;	x	;
25-44 ans	9,9	90,1	4,3**	0,8 ; 8,4	95,7	91,6 ; 99,2
45-64 ans	7,8	92,2	8,0**	4,0 ; 12,8	92,0	87,2 ; 96,0
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,027			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	5,9**	2,2 ; 10,2	94,1	89,8 ; 97,8
Embonpoint	6,6	93,4	3,8**	1,6 ; 6,5	96,2	93,5 ; 98,4
Obésité	11,3	88,7	9,7*	5,6 ; 14,3	90,3	85,7 ; 94,4
Hommes	P = 0,000		P = 0,032			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	3,6**	0,6 ; 7,4	96,4	92,6 ; 99,4
Obésité	11,5	88,5	8,1**	2,7 ; 14,6	91,9	85,4 ; 97,3
Femmes	P = 0,032		P = 0,081			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	4,0**	0,8 ; 8,2	96,0	91,8 ; 99,2
Embonpoint	8,4	91,6	4,0**	0,9 ; 7,9	96,0	92,1 ; 99,1
Obésité	11,1	88,9	11,2**	5,3 ; 18,2	88,8	81,8 ; 94,7

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 0,777					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	0,8**	0,2 ; 1,6	x	;	1,0**	0,1 ; 2,2
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	1,8**	0,7 ; 3,0	2,4**	0,2 ; 5,1	1,2**	0,2 ; 2,6
Rarement	2,8	2,6*	2,9	2,3**	1,0 ; 3,6	3,4**	1,0 ; 5,9	1,4**	0,3 ; 2,9
Jamais	94,8	94,8	94,8	95,2	93,3 ; 96,9	93,7	90,4 ; 97,1	96,4	94,3 ; 98,1
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,637					
Souvent	4,6	4,2	4,9	4,0*	2,5 ; 5,7	4,1**	1,5 ; 6,9	4,0**	2,2 ; 6,2
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	9,2	6,9 ; 11,5	10,0*	6,3 ; 14,1	8,6*	5,7 ; 11,5
Rarement	5,1	5,5	4,9	5,2*	3,5 ; 6,9	6,4*	3,6 ; 9,5	4,2**	2,0 ; 6,7
Jamais	82,9	81,4	84,0	81,6	78,5 ; 84,7	79,5	74,4 ; 84,5	83,2	79,3 ; 87,1
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,195					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	1,7**	0,7 ; 2,9	2,1**	0,4 ; 4,2	1,5**	0,3 ; 2,9
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	5,7*	3,7 ; 7,8	8,6*	5,0 ; 12,5	3,5**	1,5 ; 5,7
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,2*	2,7 ; 6,0	4,1**	1,9 ; 6,8	4,3*	2,2 ; 6,7
Jamais	86,5	87,5	85,7	88,3	85,6 ; 90,9	85,2	80,4 ; 89,7	90,8	87,3 ; 93,9
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	0,6**	0,0 ; 1,5	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,9	98,0 ; 99,6	98,9	97,2 ; 100,0	99,0	97,8 ; 99,9
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,1	98,1 ; 99,8	98,7	96,8 ; 100,0	99,3	98,3 ; 100,0
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,5	97,4 ; 99,5	99,5	98,2 ; 100,0	97,8	95,9 ; 99,3
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,5	98,9 ; 100,0	99,4	98,1 ; 100,0	99,6	98,8 ; 100,0
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	0,7**	0,1 ; 1,6	x	;	0,8**	0,0 ; 1,7
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	x	;	x	;	x	;
Jamais	97,3	98,6	96,3	98,8	97,8 ; 99,6	99,2	97,4 ; 100,0	98,5	97,3 ; 99,6



Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Commencer ou recommencer à fumer	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	0,8**	0,1 ; 1,6	x	;	0,9**	0,1 ; 2,0
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	98,5	97,5 ; 99,4	98,7	97,1 ; 99,9	98,4	97,0 ; 99,6
Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,8	99,5 ; 100,0	x	;	99,6	99,0 ; 100,0
Se faire vomir	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,6	99,0 ; 100,0	x	;	99,3	98,3 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
6,5*	4,4 ; 8,5	34,8	31,2 ; 38,8	43,0	39,1 ; 46,9	15,8	12,9 ; 18,7	Ensemble de la population	
P = 0,000									
8,8*	5,1 ; 12,6	42,0	35,5 ; 48,4	38,2	31,8 ; 44,5	11,1*	7,1 ; 15,3	Sexe	
4,7*	2,7 ; 6,7	29,3	24,7 ; 33,9	46,6	41,6 ; 51,8	19,4	15,3 ; 23,8	Hommes	
								Femmes	
P = 0,528									
x	;	39,4*	23,5 ; 54,9	32,5*	18,7 ; 47,3	x	;	Groupe d'âge	
7,6**	3,2 ; 12,2	31,2	24,5 ; 38,5	43,9	36,5 ; 51,3	17,3*	11,8 ; 23,5	15-24 ans	
5,6*	3,1 ; 8,6	36,2	31,2 ; 42,0	42,4	36,7 ; 47,9	15,7	11,4 ; 19,8	25-44 ans	
8,0**	2,8 ; 13,4	33,6	24,1 ; 42,4	51,5	42,3 ; 61,2	6,9**	2,6 ; 12,4	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,989									
x	;	49,0**	20,1 ; 75,5	36,3**	9,4 ; 63,5	x	;	Hommes	
11,2**	2,4 ; 20,8	44,3	31,1 ; 57,3	32,4*	21,0 ; 45,1	12,1**	3,9 ; 22,3	15-24 ans	
7,5**	3,2 ; 12,8	40,9	32,7 ; 49,8	38,3	29,7 ; 47,2	13,2*	7,0 ; 19,7	25-44 ans	
x	;	35,5*	20,3 ; 50,7	50,7	35,2 ; 67,0	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,589									
x	;	32,6**	13,5 ; 52,3	29,8**	13,8 ; 48,4	x	;	Femmes	
5,0**	1,3 ; 9,5	22,1*	13,8 ; 30,8	52,0	41,7 ; 61,8	21,0*	13,0 ; 29,1	15-24 ans	
4,1**	1,3 ; 7,2	32,4	26,2 ; 39,1	45,8	38,8 ; 53,0	17,8*	12,0 ; 23,6	25-44 ans	
6,9**	0,9 ; 13,8	32,1*	20,7 ; 44,2	52,1	39,2 ; 63,9	8,9**	3,0 ; 16,4	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,905									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
7,7**	3,6 ; 12,1	29,9	22,7 ; 37,4	45,8	37,7 ; 54,0	16,6*	10,3 ; 22,9	Poids insuffisant	
5,4**	2,6 ; 8,3	35,7	29,9 ; 41,6	41,6	35,5 ; 47,9	17,3	12,9 ; 22,0	Poids normal	
7,1**	3,3 ; 11,3	36,1	29,4 ; 43,2	43,3	36,2 ; 50,4	13,5*	8,5 ; 18,8	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,845									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
12,9**	1,2 ; 27,5	26,4**	10,9 ; 44,2	46,2*	27,2 ; 65,8	14,5**	1,6 ; 28,8	Poids insuffisant	
7,0**	2,5 ; 11,9	44,0	34,7 ; 53,3	38,3	29,3 ; 47,3	10,6**	5,4 ; 16,7	Poids normal	
9,8**	3,1 ; 17,3	44,9	33,8 ; 56,1	35,2	24,9 ; 46,7	10,0**	3,3 ; 17,7	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,629									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
6,2**	2,3 ; 10,7	30,8	22,7 ; 39,0	45,7	36,8 ; 55,1	17,2*	10,0 ; 24,7	Poids insuffisant	
3,7**	1,0 ; 6,9	26,4	19,1 ; 34,0	45,1	36,6 ; 54,2	24,9	17,6 ; 32,6	Poids normal	
4,3**	0,8 ; 8,7	27,2	19,4 ; 35,8	51,5	41,8 ; 60,5	17,0*	10,0 ; 24,7	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,631				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	46,5	42,7 ; 50,5	44,4	38,2 ; 50,5	48,0	43,2 ; 52,9	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	37,6	33,9 ; 41,3	38,6	32,6 ; 44,6	36,8	31,9 ; 41,7	
Non	14,4	15,3	13,7	15,9	13,2 ; 18,7	16,9	12,5 ; 21,6	15,2	11,6 ; 18,6	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,022				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	44,8	40,8 ; 48,5	38,9	32,8 ; 45,2	49,3	44,3 ; 54,1	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	37,2	33,5 ; 40,9	39,9	33,7 ; 46,1	35,1	30,7 ; 39,7	
Non	19,6	22,6	17,4	18,1	15,1 ; 21,1	21,2	16,0 ; 26,6	15,6	12,2 ; 19,1	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,142				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	40,2	36,5 ; 44,0	35,8	29,8 ; 42,0	43,6	38,5 ; 48,5	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	28,5	25,1 ; 32,2	31,4	25,4 ; 37,5	26,3	21,9 ; 30,9	
Non	27,7	32,4	24,3	31,2	27,5 ; 34,9	32,7	27,0 ; 39,0	30,1	25,5 ; 34,6	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,321				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	42,4	38,5 ; 46,1	39,5	33,1 ; 45,5	44,7	39,6 ; 49,7	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	31,9	28,3 ; 35,8	32,4	26,9 ; 38,1	31,6	26,9 ; 36,3	
Non	26,1	27,4	25,1	25,6	22,5 ; 29,0	28,1	23,0 ; 33,6	23,8	19,9 ; 27,8	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	63,5	59,9 ; 67,1	54,9	48,7 ; 61,0	70,2	66,0 ; 74,4	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	20,6	17,3 ; 24,1	28,8	22,9 ; 34,7	14,3	11,1 ; 17,9	
Non	17,4	18,5	16,6	15,8	13,2 ; 18,6	16,3	11,9 ; 21,0	15,5	12,1 ; 19,0	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	62,4	58,8 ; 66,3	52,5	46,7 ; 59,3	70,1	65,4 ; 74,3	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	25,4	21,9 ; 28,8	32,4	26,3 ; 38,1	19,9	15,8 ; 24,3	
Non	12,6	14,0	11,6	12,2	9,7 ; 14,8	15,1	10,6 ; 19,6	10,0	7,3 ; 13,1	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	49,3	45,6 ; 53,2	38,7	33,0 ; 44,6	57,4	52,4 ; 62,2	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	27,9	24,6 ; 31,4	30,5	24,9 ; 36,1	26,0	22,0 ; 30,4	
Non	21,5	24,4	19,4	22,8	19,5 ; 26,2	30,8	24,7 ; 36,9	16,6	13,0 ; 20,5	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,013				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	12,1	9,7 ; 14,6	11,6*	7,9 ; 15,4	12,5	9,2 ; 16,1	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	14,2	11,5 ; 17,1	19,0	13,9 ; 24,4	10,5	7,5 ; 13,8	
Non	72,0	67,3	75,4	73,7	70,0 ; 77,0	69,4	63,5 ; 75,0	77,0	72,4 ; 81,2	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,022				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	32,4	28,9 ; 35,8	31,6	25,9 ; 37,1	33,1	28,3 ; 37,7	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	21,2	17,9 ; 24,6	26,3	20,2 ; 32,2	17,2	13,4 ; 21,1	
Non	49,9	43,2	54,7	46,4	42,6 ; 50,2	42,1	36,0 ; 48,5	49,7	44,8 ; 54,6	

Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,004				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	53,9	50,2 ; 57,9	51,9	45,8 ; 58,3	55,5	50,5 ; 60,5	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	20,9	17,7 ; 24,0	26,7	20,9 ; 32,3	16,5	12,9 ; 20,2	
Non	29,6	28,8	30,2	25,1	21,7 ; 28,5	21,4	16,6 ; 27,0	28,0	23,5 ; 32,7	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	36,4	32,9 ; 40,1	27,3	21,8 ; 33,2	43,3	38,4 ; 48,1	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	15,9	13,0 ; 18,8	20,2	14,9 ; 25,6	12,6	9,5 ; 16,0	
Non	48,5	52,0	45,9	47,7	43,7 ; 51,6	52,5	46,2 ; 58,8	44,1	39,2 ; 49,0	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,086				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	34,0	30,3 ; 37,6	30,3	24,7 ; 36,2	36,8	31,9 ; 41,5	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	26,0	22,4 ; 29,5	29,7	24,1 ; 35,7	23,1	18,9 ; 27,4	
Non	37,5	34,7	39,5	40,0	36,2 ; 43,8	40,0	33,9 ; 45,9	40,1	35,3 ; 44,8	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
58,5	56,4 ; 60,5	29,8	27,8 ; 31,9	11,7	10,2 ; 13,3	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
51,3	48,0 ; 54,4	32,8	29,7 ; 36,1	15,9	13,3 ; 18,4	Hommes
65,4	62,6 ; 68,0	26,9	24,3 ; 29,7	7,7	6,0 ; 9,4	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
59,5	47,5 ; 71,8	13,6**	5,1 ; 23,0	26,9*	16,0 ; 38,5	15-17 ans
28,2*	17,6 ; 39,1	36,5	26,5 ; 48,4	35,3*	24,4 ; 45,9	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
41,4	33,1 ; 49,5	26,9	20,3 ; 34,5	31,7	23,9 ; 39,5	25-44 ans
35,7	31,3 ; 39,8	44,9	40,6 ; 50,0	19,4	15,8 ; 22,9	45-64 ans
62,8	59,5 ; 66,0	32,0	28,9 ; 35,1	5,3	3,8 ; 6,9	65 ans et plus
95,5	93,3 ; 97,4	x	;	x	;	
		P = 0,003				Hommes
63,6	45,7 ; 81,3	x	;	x	;	15-17 ans
26,1**	9,9 ; 43,5	27,9**	12,5 ; 46,2	45,9*	27,7 ; 63,7	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
42,2	30,2 ; 55,7	17,5**	8,0 ; 28,1	40,3*	27,7 ; 52,6	25-44 ans
27,4	21,5 ; 33,4	44,5	37,8 ; 51,7	28,1	21,9 ; 34,4	45-64 ans
52,8	48,0 ; 57,8	40,9	36,1 ; 45,6	6,3*	4,0 ; 8,9	65 ans et plus
93,2	88,9 ; 96,6	x	;	x	;	
		P = 0,000				Femmes
55,4*	38,0 ; 74,2	23,9**	8,5 ; 40,9	20,7**	6,4 ; 36,9	15-17 ans
30,2*	15,3 ; 44,7	44,7*	30,6 ; 60,6	25,1**	12,3 ; 38,6	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
40,6	29,8 ; 51,8	36,1	25,8 ; 47,0	23,3*	14,1 ; 33,5	25-44 ans
43,9	37,9 ; 49,9	45,4	39,2 ; 52,0	10,7*	7,2 ; 14,5	45-64 ans
72,5	68,6 ; 76,6	23,2	19,2 ; 27,1	4,2*	2,4 ; 6,2	65 ans et plus
97,5	95,5 ; 99,2	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	40,1	38,1 ; 42,1	47,8	44,6 ; 51,0	32,7	30,1 ; 35,4
Non	56,1	49,9	62,1	59,9	57,9 ; 61,9	52,2	49,0 ; 55,4	67,3	64,6 ; 69,9
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	9,6	8,3 ; 11,0	13,7	11,3 ; 16,1	5,7	4,3 ; 7,3
Non	89,4	85,6	93,2	90,4	89,0 ; 91,7	86,3	83,9 ; 88,7	94,3	92,7 ; 95,7
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,034					
Oui	7,3	9,1	5,5	4,8	3,7 ; 5,8	6,0	4,3 ; 7,8	3,6*	2,3 ; 4,9
Non	92,7	90,9	94,5	95,2	94,2 ; 96,3	94,0	92,2 ; 95,7	96,4	95,1 ; 97,7
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,061					
Oui	5,1	6,3	3,9	2,5*	1,7 ; 3,3	3,4*	2,1 ; 4,8	1,7**	0,8 ; 2,7
Non	94,9	93,7	96,1	97,5	96,7 ; 98,3	96,6	95,2 ; 97,9	98,3	97,3 ; 99,2
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	12,3	16,1	8,7	10,0	8,6 ; 11,4	14,0	11,5 ; 16,4	6,1	4,5 ; 7,7
Non	87,7	83,9	91,3	90,0	88,6 ; 91,4	86,0	83,6 ; 88,5	93,9	92,3 ; 95,5
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = 0,259					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,4**	0,1 ; 0,7	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	99,6	99,3 ; 99,9	99,4	98,8 ; 99,9	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,271					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,7**	0,3 ; 1,1	0,9**	0,2 ; 1,7	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,3	98,9 ; 99,7	99,1	98,3 ; 99,8	x	;
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,036					
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,4**	0,1 ; 0,7	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;
Non	99,2	98,8	99,7	99,6	99,3 ; 99,9	99,4	98,7 ; 99,9	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,128					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,6*	1,0 ; 2,2	2,1*	1,2 ; 3,2	1,0**	0,3 ; 1,9
Non	98,2	98,1	98,4	98,4	97,8 ; 99,0	97,9	96,8 ; 98,8	99,0	98,1 ; 99,7
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,509					
Oui	1,6	2,3	0,9	1,1**	0,6 ; 1,6	1,3**	0,5 ; 2,2	0,8**	0,2 ; 1,7
Non	98,4	97,7	99,1	98,9	98,4 ; 99,4	98,7	97,8 ; 99,5	99,2	98,3 ; 99,8
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,3**	0,1 ; 0,7	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,7	99,3 ; 99,9	99,4	98,7 ; 99,9	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,2	16,2	8,3	10,9	9,4 ; 12,4	14,7	12,2 ; 17,2	7,2	5,6 ; 8,8
Non	87,8	83,8	91,7	89,1	87,6 ; 90,6	85,3	82,8 ; 87,8	92,8	91,2 ; 94,4
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,253			
Oui	1,6	2,3	0,8	1,7*	1,0 ; 2,4	2,2**	1,0 ; 3,4	1,2**	0,5 ; 2,1
Non	98,4	97,7	99,2	98,3	97,6 ; 99,0	97,8	96,6 ; 99,0	98,8	97,9 ; 99,5
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,709			
Oui	1,8	2,4	1,3	1,4*	0,7 ; 2,0	1,2**	0,4 ; 2,2	1,5**	0,6 ; 2,5
Non	98,2	97,6	98,7	98,6	98,0 ; 99,3	98,8	97,8 ; 99,6	98,5	97,5 ; 99,4
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,818			
Oui	1,4	1,7	1,0	1,0**	0,4 ; 1,6	0,9**	0,1 ; 1,8	1,0**	0,3 ; 2,0
Non	98,6	98,3	99,0	99,0	98,4 ; 99,6	99,1	98,2 ; 99,9	99,0	98,0 ; 99,7
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,172			
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,7**	0,3 ; 1,2	x	;	1,0**	0,3 ; 1,9
Non	99,2	98,8	99,6	99,3	98,8 ; 99,7	x	;	99,0	98,1 ; 99,7
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = .			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = .			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,603			
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,9**	0,4 ; 1,5	1,1**	0,4 ; 1,9	0,8**	0,1 ; 1,6
Non	99,6	99,6	99,7	99,1	98,5 ; 99,6	98,9	98,1 ; 99,6	99,2	98,4 ; 99,9
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = 'n.d.'			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	11,7	10,2 ; 13,3	15,9	13,3 ; 18,4	7,7	6,0 ; 9,4
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	26,9*	16,0 ; 38,5	32,9*	15,5 ; 50,4	20,7**	6,4 ; 36,9
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	35,3*	24,4 ; 45,9	45,9*	27,7 ; 63,7	25,1**	12,3 ; 38,6
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	19,4	15,8 ; 22,9	28,1	21,9 ; 34,4	10,7*	7,2 ; 14,5
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	5,3	3,8 ; 6,9	6,3*	4,0 ; 8,9	4,2*	2,4 ; 6,2
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	26,6	24,6 ; 28,8	7,5	6,2 ; 8,8	7,5	6,2 ; 8,7
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	28,7	25,8 ; 32,1	8,8	6,7 ; 11,0	11,1	8,9 ; 13,4
Femmes	25,4	6,8	7,4	24,5	21,8 ; 27,3	6,2	4,7 ; 7,7	3,9*	2,7 ; 5,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	31,1*	19,1 ; 43,0	x	;	4,5**	0,3 ; 10,1
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	36,9	27,3 ; 48,5	22,5*	13,1 ; 32,4	12,4**	5,1 ; 20,6
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,4	8,4	15,9	34,4	27,0 ; 43,1	15,1*	9,1 ; 21,2	9,1**	4,4 ; 14,1
45-64 ans	29,9	12,3	16,1	37,2	33,1 ; 41,9	11,9	9,0 ; 14,9	15,2	11,9 ; 18,4
65 ans et plus	29,0	7,1	7,2	27,0	24,0 ; 30,2	5,3	3,8 ; 6,9	4,9*	3,4 ; 6,5
Hommes	P = 0,000			P = 0,013					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	32,8*	15,5 ; 50,1	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	29,3*	14,7 ; 45,0	33,4*	16,2 ; 50,0	11,2**	0,5 ; 23,6
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,0	8,7	18,3	30,8*	19,7 ; 42,5	19,1**	8,7 ; 29,6	7,9**	1,5 ; 15,4
45-64 ans	29,0	13,5	21,1	37,3	31,0 ; 44,2	12,7*	8,2 ; 17,4	22,6	16,6 ; 28,3
65 ans et plus	32,2	9,0	10,0	32,1	27,3 ; 37,1	6,4*	4,0 ; 9,1	8,7*	6,0 ; 11,7
Femmes	P = 0,000			P = 0,064					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	29,4**	11,9 ; 46,9	x	;	x	;
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	44,2*	29,8 ; 59,9	12,1**	3,9 ; 23,3	13,6**	3,5 ; 26,1
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,8	8,1	13,5	38,1	27,3 ; 49,8	11,1**	4,5 ; 18,8	10,2**	3,8 ; 18,2
45-64 ans	30,8	11,0	11,0	37,1	31,2 ; 43,2	11,1*	7,4 ; 15,0	7,9*	4,8 ; 11,4
65 ans et plus	25,9	5,3	4,5	22,1	18,2 ; 26,0	4,2*	2,6 ; 6,1	1,1**	0,2 ; 2,4

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	79,6	77,8 ; 81,1	84,4	82,1 ; 86,7	74,9	72,6 ; 77,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	56,5	44,2 ; 67,7	51,6*	34,1 ; 68,1	61,5	43,0 ; 77,6
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	91,6	84,1 ; 98,1	89,3	76,5 ; 99,7	93,8	84,0 ; 100,0
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	76,9	69,8 ; 83,1	73,3	62,6 ; 82,8	80,5	70,6 ; 88,8
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	93,2	90,8 ; 95,4	93,5	89,9 ; 96,9	92,8	89,5 ; 95,5
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	85,7	83,4 ; 87,9	90,3	87,3 ; 93,2	81,2	77,7 ; 84,4
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	66,6	63,3 ; 69,9	74,2	69,5 ; 78,6	58,8	54,0 ; 63,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	86,3	83,3 ; 89,0	91,2	87,7 ; 94,4	81,8	77,1 ; 86,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	90,0	87,1 ; 92,6	92,4	88,1 ; 96,3	87,7	83,6 ; 91,1
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	89,0	85,2 ; 92,2	90,6	84,6 ; 95,8	87,6	82,7 ; 91,8
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	89,9	88,3 ; 91,5	87,5	85,0 ; 89,9	92,5	90,5 ; 94,4
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	8,8	7,4 ; 10,3	11,1	8,8 ; 13,5	6,3	4,6 ; 8,1
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,3**	0,6 ; 2,1	1,3**	0,6 ; 2,3	1,2**	0,2 ; 2,5
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	48,4	47,2 ; 49,6	1,2**	0,4 ; 2,0	99,3	98,5 ; 99,9
Femmes	51,5	97,5	0,8	51,3	50,1 ; 52,5	98,6	97,7 ; 99,4	0,4**	0,0 ; 0,8
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,3**	0,0 ; 0,7	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	89,9	88,3 ; 91,5	8,8	7,4 ; 10,3	1,3**	0,6 ; 2,1
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,088					
Hommes	86,4	10,7	2,9	87,5	85,0 ; 89,9	11,1	8,8 ; 13,5	1,3**	0,6 ; 2,3
Femmes	91,6	7,4	0,9*	92,5	90,5 ; 94,4	6,3	4,6 ; 8,1	1,2**	0,2 ; 2,5
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,056					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	59,8	41,6 ; 76,9	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	58,6	46,8 ; 70,6	x	;	x	;
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	59,0	49,0 ; 68,4	35,9	27,3 ; 45,5	5,0**	0,7 ; 10,1
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	90,5	87,6 ; 93,1	8,5*	6,0 ; 11,2	1,0**	0,2 ; 2,1
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	96,3	95,0 ; 97,5	3,1*	2,0 ; 4,3	0,7**	0,2 ; 1,3
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	98,4	96,8 ; 99,7	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,517					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	91,1	69,6 ; 100,0	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	87,7	85,2 ; 90,1	11,0	8,7 ; 13,4	1,3**	0,5 ; 2,3
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 'n.d.'					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	92,9	90,9 ; 94,7	5,9	4,3 ; 7,7	1,2**	0,2 ; 2,5
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	40,0	36,6 ; 43,6	63,9	58,6 ; 68,9
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000		...	
15-24 ans	87,9	...	85,5	73,6 ; 95,2	...	;
25-44 ans	62,4	...	54,0	47,3 ; 61,4	...	;
45-64 ans	29,9	...	29,4	24,3 ; 34,0	...	;
65 ans et plus	7,3	...	4,5**	1,1 ; 8,9	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...		P = 0,000	
15-24 ans	...	90,0	...	;	84,0	73,1 ; 93,5
25-34 ans	...	71,0	...	;	70,4	61,0 ; 79,5
35-49 ans	...	53,5	...	;	52,3	45,6 ; 59,0
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,000		P = 0,639	
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	28,0	22,4 ; 33,8	59,4	47,9 ; 71,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	46,2	38,6 ; 53,5	64,2	55,4 ; 73,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	49,4	42,0 ; 56,7	63,6	54,4 ; 72,4
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	43,5	33,0 ; 54,9	69,1	58,3 ; 79,8
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,055	
Un partenaire	43,8	64,2	35,8	32,0 ; 39,7	62,1	57,0 ; 67,3
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	73,3	61,3 ; 84,8	84,5	70,9 ; 95,8
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	46,3**	11,7 ; 79,2	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = .		P = .	
Hommes	x	66,6	x	;	64,3	59,2 ; 69,2
Femmes	47,8	x	39,9	36,5 ; 43,5	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	11,2	9,5 ; 12,9	10,3	8,8 ; 12,0	78,5	76,6 ; 80,4
Sexe	P = 0,093			P = 0,015					
Hommes	14,8	14,9	70,3	13,3	10,7 ; 15,9	9,0	6,9 ; 11,4	77,7	75,0 ; 80,4
Femmes	13,2	14,7	72,1	8,8	6,7 ; 11,1	11,7	9,5 ; 14,2	79,5	76,6 ; 82,2
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	59,2	42,9 ; 76,2	27,0**	11,7 ; 42,9	13,9**	1,6 ; 27,2
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	32,8*	20,9 ; 44,0	36,6	25,7 ; 48,2	30,5*	20,7 ; 41,4
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	40,9	31,3 ; 50,1	33,7	25,0 ; 43,0	25,4*	17,7 ; 33,5
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	9,9	7,5 ; 12,7	13,4	10,5 ; 16,8	76,7	72,7 ; 80,2
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	5,8*	4,0 ; 7,8	3,6*	2,3 ; 5,2	90,5	88,1 ; 92,7
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	1,3**	0,1 ; 2,9	1,2**	0,1 ; 2,7	97,5	95,5 ; 99,1
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,048					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	13,0	9,7 ; 16,5	8,6*	6,0 ; 11,5	78,4	74,3 ; 82,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	14,2	10,3 ; 18,0	10,5*	7,2 ; 14,4	75,3	70,7 ; 79,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	8,3*	5,2 ; 11,6	12,7	9,0 ; 16,5	79,1	74,5 ; 83,5
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	6,8*	3,7 ; 10,4	9,8*	6,0 ; 14,3	83,4	78,1 ; 88,0
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	8,1	6,5 ; 9,8	6,6	5,3 ; 8,2	85,2	83,2 ; 87,2
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	35,6	25,9 ; 46,1	44,0	34,2 ; 54,3	20,4*	13,3 ; 27,8
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	54,6*	20,8 ; 79,3	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	13,7	12,0 ; 15,5	16,0	13,3 ; 18,6	11,2	8,8 ; 13,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	68,5	51,8 ; 84,6	83,4	59,7 ; 100,0	55,7*	30,7 ; 81,4
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	41,5	30,5 ; 52,7	60,9	40,5 ; 78,8	22,9**	11,8 ; 36,0
	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	53,6	58,8	48,5	49,8	40,8 ; 58,8	67,6	51,8 ; 80,8	33,4*	22,1 ; 46,6
25-44 ans	21,0	22,1	19,8	13,0	10,2 ; 16,3	12,3*	8,0 ; 17,0	13,8*	9,8 ; 18,2
45-64 ans	8,3	8,9	7,7	6,9	5,0 ; 8,9	9,2*	6,2 ; 12,5	4,3*	2,4 ; 6,6
65 ans et plus	3,1*	3,9*	1,8**	1,3**	0,1 ; 2,9	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,105		P = 0,517		P = 0,204	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	14,9	11,4 ; 18,4	16,0	11,1 ; 20,8	13,4*	8,4 ; 18,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	16,7	12,9 ; 20,9	19,6*	12,9 ; 26,2	13,8*	9,3 ; 19,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	11,7*	8,2 ; 15,6	14,9*	9,2 ; 21,1	8,3**	4,4 ; 12,9
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	9,4*	5,5 ; 13,8	11,5**	4,4 ; 19,0	7,6**	3,5 ; 12,5
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	9,7	8,1 ; 11,5	9,9	7,4 ; 12,5	9,6	7,4 ; 12,0
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	51,1	41,6 ; 61,2	58,9	46,3 ; 71,4	36,0*	20,9 ; 52,3
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	35,8**	10,1 ; 68,2	58,1**	20,2 ; 85,3	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,440		P = 0,318	
Hommes	18,7	54,0	17,9	11,1	8,8 ; 13,5	x	;	11,1	8,7 ; 13,5
Femmes	19,2	19,2	x	15,9	13,1 ; 18,5	15,9	13,1 ; 18,5	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	60,7**	12,1 ; 100,0	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	6,2	5,1 ; 7,3	5,4	4,0 ; 7,0	6,8	5,4 ; 8,4
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,014		P = 0,000	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	x	;	x	;	x	;
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,014		P = 0,000	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	10,7	8,0 ; 13,7	8,8*	5,1 ; 13,3	12,5*	8,8 ; 16,7
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	6,9	5,4 ; 8,7	6,7*	4,4 ; 9,2	7,1*	4,9 ; 9,7
	2,7	3,2*	2,2	0,8**	0,1 ; 1,7	x	;	1,2**	0,1 ; 2,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,003	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	2,7*	1,5 ; 4,0	1,3**	0,3 ; 2,8	4,0*	2,0 ; 6,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	5,8*	3,8 ; 8,0	5,6**	2,8 ; 9,1	6,0*	3,4 ; 9,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	8,7	6,3 ; 11,5	8,8*	5,0 ; 13,5	8,6*	5,4 ; 12,5
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	12,4*	8,4 ; 16,7	11,4**	5,2 ; 18,2	13,2*	7,9 ; 18,9
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,133		P = 0,004		P = 0,105	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	6,2	5,0 ; 7,6	5,2*	3,5 ; 7,0	7,3	5,6 ; 9,2
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	7,3**	3,5 ; 11,9	3,9**	0,5 ; 8,4	13,8**	5,1 ; 24,9
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	17,6**	2,2 ; 39,9	32,1**	5,7 ; 65,4	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,033		P = 0,001		P = 0,054	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	7,9	6,2 ; 9,8	x	;	7,6	5,8 ; 9,4
Femmes	7,0	7,0	8,9**	5,1*	3,6 ; 6,9	5,0*	3,5 ; 6,7	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,859		P = .		P = .	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	x	;	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	6,2	5,2 ; 7,4	5,4	3,9 ; 7,0	6,9	5,5 ; 8,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	27,4*	18,9 ; 36,7	72,6	63,3 ; 81,1
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,724			
15-35 ans	25,6	74,4	28,2*	19,1 ; 38,2	71,8	61,8 ; 80,9
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,130			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	32,7**	14,9 ; 55,5	67,3	44,5 ; 85,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	40,0*	19,2 ; 60,4	60,0*	39,6 ; 80,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	20,9**	8,0 ; 35,2	79,1	64,8 ; 92,0
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	x	;	x	;
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	27,6*	19,1 ; 37,2	72,4	62,8 ; 80,9
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	73,3	70,3 ; 76,2	18,3	15,7 ; 20,8	8,4	6,4 ; 10,4
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,165					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	73,2	59,2 ; 87,6	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	80,4	75,5 ; 85,6	12,2*	7,8 ; 16,8	7,4*	4,2 ; 10,8
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	69,4	65,6 ; 73,1	24,5	20,7 ; 28,2	6,1	4,4 ; 8,2
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,009					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	65,6	59,8 ; 71,5	23,7	18,5 ; 29,0	10,8*	7,0 ; 15,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	71,8	65,4 ; 77,8	16,9	12,2 ; 21,8	11,2*	6,7 ; 16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	76,1	69,9 ; 82,2	18,5	13,0 ; 24,2	5,4**	2,1 ; 9,0
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	84,9	78,7 ; 90,1	12,3*	7,4 ; 18,1	2,9**	0,6 ; 5,7
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,902					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	73,4	70,3 ; 76,4	18,4	15,9 ; 20,9	8,2	6,2 ; 10,1
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	81,4**	24,6 ; 100,0	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 12

# CHAUDIÈRE-APPALACHES

---



# 1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes	Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
Ensemble de la population		49,4	50,6			50,6	50,6 ; 50,6	49,4	49,4 ; 49,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	15,3	15,3 ; 15,3	15,6	15,6 ; 15,6	15,0	15,0 ; 15,0
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	31,6	31,6 ; 31,6	32,6	32,6 ; 32,6	30,6	30,6 ; 30,6
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	37,1	37,0 ; 37,1	37,0	37,0 ; 37,0	37,1	37,1 ; 37,1
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	16,0	16,0 ; 16,0	14,8	14,7 ; 14,8	17,3	17,3 ; 17,3
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,011					
Personne seule	13,4	10,7	16,0	12,5	11,6 ; 13,8	10,2	8,9 ; 11,9	14,9	13,4 ; 16,7
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	32,9	31,1 ; 34,8	33,9	31,2 ; 36,6	31,9	29,5 ; 34,4
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	43,2	41,0 ; 45,1	45,3	42,2 ; 48,3	41,1	38,2 ; 43,7
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	7,2	6,1 ; 8,4	6,5	5,0 ; 8,2	7,9	6,3 ; 9,7
Autre	6,7	6,5	6,9	4,2	3,1 ; 5,2	4,1*	2,6 ; 5,7	4,2*	3,0 ; 5,6
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,256			P = 'n.d.'					
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	98,5	97,9 ; 99,1	98,7	98,0 ; 99,4	98,3	97,3 ; 99,1
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	x	;	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,912			P = 'n.d.'					
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	99,4	99,0 ; 99,8	99,6	99,1 ; 99,9	99,3	98,7 ; 99,8
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	0,3**	0,1 ; 0,6	x	;	x	;
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	0,3**	0,0 ; 0,6	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,683			P = 0,190					
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	30,5	28,6 ; 32,3	31,0	28,2 ; 33,7	30,0	27,7 ; 32,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	26,4	24,3 ; 28,5	28,1	25,1 ; 31,2	24,7	21,8 ; 27,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	26,2	24,1 ; 28,2	24,6	21,7 ; 27,5	27,9	25,1 ; 30,7
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	16,9	15,1 ; 18,6	16,3	13,9 ; 18,8	17,4	15,1 ; 19,8
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	17,6	16,0 ; 19,3	13,0	10,9 ; 15,1	22,4	19,8 ; 25,0
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	21,1	19,3 ; 23,1	22,2	19,4 ; 25,1	20,0	17,6 ; 22,5
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	23,0	21,1 ; 24,8	22,0	19,1 ; 24,8	24,0	21,3 ; 26,7
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	20,4	18,6 ; 22,3	22,3	19,4 ; 25,1	18,6	16,0 ; 21,1
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	17,9	16,0 ; 19,9	20,6	18,0 ; 23,6	15,0	12,5 ; 17,6
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,032					
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	28,0	25,8 ; 30,2	30,9	27,7 ; 34,2	25,1	22,3 ; 27,9
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	60,5	58,2 ; 62,8	57,9	54,6 ; 61,2	63,0	59,8 ; 66,2
Pauvre	9,4	8,9	9,9	10,1	8,8 ; 11,5	9,9	8,2 ; 11,9	10,4	8,6 ; 12,3
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,4*	0,9 ; 1,9	1,2**	0,6 ; 2,1	1,5*	0,9 ; 2,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	62,5	60,8 ; 64,1	70,9	68,7 ; 73,2	53,8	51,2 ; 56,3
Étudiants	13,1	13,0	13,2	10,5	9,3 ; 11,6	9,1	7,5 ; 10,8	11,9	10,2 ; 13,5
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	7,2	6,2 ; 8,3	2,3*	1,5 ; 3,3	12,3	10,3 ; 14,4
Retraités	19,6	18,0	21,1	19,8	18,9 ; 20,9	17,6	16,3 ; 18,9	22,1	20,6 ; 23,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	56,5	54,3 ; 58,7	34,1	31,9 ; 36,3	9,4	8,3 ; 10,7
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,378					
Hommes	56,6	33,5	9,9	57,0	53,7 ; 60,1	34,5	31,4 ; 37,8	8,5	7,0 ; 10,2
Femmes	55,5	32,8	11,7	56,1	53,0 ; 59,2	33,6	30,6 ; 36,5	10,3	8,6 ; 12,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	63,8	57,0 ; 70,6	31,1	24,6 ; 37,7	5,2**	2,0 ; 8,9
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	67,4	63,5 ; 71,3	28,0	24,2 ; 31,7	4,7*	3,0 ; 6,5
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	53,7	49,9 ; 57,2	35,9	32,5 ; 39,6	10,4	8,6 ; 12,4
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	32,9	28,3 ; 37,5	45,7	40,7 ; 50,5	21,4	17,9 ; 25,1
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	42,9	38,4 ; 47,5	39,1	34,9 ; 43,8	18,0	14,8 ; 21,2
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	51,9	48,2 ; 55,7	36,5	32,6 ; 40,3	11,7	9,4 ; 14,0
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	65,2	61,4 ; 68,9	29,9	26,3 ; 33,6	4,9*	3,3 ; 6,7
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	55,6	46,8 ; 64,8	34,1	25,9 ; 42,5	10,3**	4,9 ; 16,8
Autre	46,0	39,4	14,6	52,6	38,6 ; 67,2	37,2*	23,6 ; 51,7	10,2**	4,0 ; 17,5
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	40,6	36,3 ; 44,5	43,2	39,5 ; 47,4	16,2	13,7 ; 18,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	58,0	53,4 ; 62,7	33,1	28,5 ; 37,4	8,9*	6,3 ; 11,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	65,5	61,3 ; 69,8	28,8	24,9 ; 32,7	5,7*	3,8 ; 7,6
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	68,5	62,9 ; 73,9	27,8	22,5 ; 33,2	3,7**	1,7 ; 6,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	39,6	33,9 ; 45,0	42,3	37,2 ; 47,9	18,0	14,4 ; 21,8
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	60,4	57,8 ; 62,9	32,2	29,8 ; 34,7	7,4	6,2 ; 8,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	33,9	27,6 ; 40,1	40,1	34,2 ; 46,7	26,0	20,8 ; 31,5
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	60,0	57,6 ; 62,4	32,9	30,6 ; 35,2	7,2	6,0 ; 8,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	63,5	60,7 ; 66,4	31,0	28,3 ; 33,8	5,4	4,3 ; 6,7
Étudiants	62,7	32,2	5,0	63,2	54,4 ; 72,2	31,5	23,1 ; 40,0	5,2**	1,3 ; 10,3
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	38,3	30,1 ; 46,6	38,2	30,8 ; 46,3	23,4	17,3 ; 30,6
Retraités	40,2	39,5	20,4	36,6	32,4 ; 41,1	43,8	39,2 ; 48,4	19,6	16,5 ; 23,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	56,5	54,3 ; 58,7	34,1	31,9 ; 36,3	9,4	8,3 ; 10,7
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	47,1	42,2 ; 51,9	39,5	34,9 ; 44,4	13,4	10,3 ; 16,6
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	59,5	56,9 ; 62,0	32,3	29,9 ; 34,8	8,2	7,0 ; 9,5
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	51,5*	33,3 ; 70,2	26,8**	13,5 ; 42,8	21,7**	5,8 ; 39,8
Poids normal	62,6	29,4	8,0	63,7	60,5 ; 66,7	28,9	25,9 ; 31,9	7,4	5,9 ; 9,1
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	49,6	46,4 ; 52,8	39,4	36,1 ; 42,8	10,9	9,2 ; 12,7
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	66,4	63,3 ; 69,6	27,9	24,8 ; 31,0	5,7	4,4 ; 7,1
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	49,6	46,3 ; 52,9	39,5	36,2 ; 42,7	10,9	9,0 ; 13,0
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	39,0	29,5 ; 48,7	34,8	25,5 ; 43,9	26,3	19,4 ; 34,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	36,9	31,9 ; 41,8	39,9	34,9 ; 45,0	23,2	19,2 ; 27,4
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	62,5	59,9 ; 64,9	32,0	29,6 ; 34,5	5,5	4,5 ; 6,6

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	46,9	44,6 ; 49,1	48,0	45,7 ; 50,3	5,1	4,2 ; 6,1
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,508		
Hommes	47,5	46,6	6,0	45,7	42,3 ; 48,9	49,3	46,1 ; 52,7	5,0	3,6 ; 6,5
Femmes	47,1	45,9	7,0	48,1	45,0 ; 51,4	46,6	43,4 ; 49,8	5,3	4,1 ; 6,6
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,303		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	52,1	45,4 ; 59,2	46,1	39,1 ; 52,8	1,9**	0,2 ; 4,3
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	45,1	41,1 ; 49,0	49,6	45,5 ; 53,8	5,3*	3,5 ; 7,1
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	45,1	41,2 ; 48,8	49,1	45,3 ; 52,8	5,9	4,4 ; 7,6
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	50,2	45,5 ; 55,0	43,5	38,8 ; 48,2	6,3*	4,2 ; 8,8
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	38,9	34,3 ; 43,2	48,0	43,6 ; 52,4	13,2	10,4 ; 16,6
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	52,3	48,5 ; 56,1	45,0	41,3 ; 48,9	2,6*	1,6 ; 3,8
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	47,9	44,0 ; 51,8	48,0	44,1 ; 52,0	4,1*	2,6 ; 5,6
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	39,5	30,8 ; 48,4	50,8	41,5 ; 59,7	9,7**	4,5 ; 15,4
Autre	44,5	46,1	9,4*	24,8*	14,1 ; 37,3	69,2	55,6 ; 80,5	6,0**	0,5 ; 13,1
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,028		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	46,6	42,6 ; 50,5	46,2	42,3 ; 50,4	7,2	5,4 ; 9,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	43,2	38,8 ; 47,9	53,0	48,0 ; 57,5	3,8*	2,4 ; 5,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	50,7	46,1 ; 55,2	45,3	41,0 ; 49,7	4,0*	2,3 ; 5,9
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	46,9	40,7 ; 53,0	47,7	41,7 ; 53,9	5,4*	3,1 ; 8,2
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	40,2	35,1 ; 45,6	49,5	43,8 ; 54,7	10,3*	7,5 ; 13,7
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	48,2	45,7 ; 50,9	47,8	45,2 ; 50,4	3,9	3,0 ; 4,9
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	27,8	22,5 ; 33,1	54,2	48,0 ; 60,5	18,0	13,4 ; 23,1
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	49,3	46,9 ; 51,7	47,2	44,8 ; 49,6	3,5	2,7 ; 4,3
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,137		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	47,1	44,1 ; 49,9	48,5	45,6 ; 51,5	4,4	3,3 ; 5,6
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	51,5	43,0 ; 60,6	x	;	x	;
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	38,9	31,3 ; 47,0	47,1	39,0 ; 55,1	13,9*	8,9 ; 19,8
Retraités	51,9	42,8	5,3	46,7	42,6 ; 51,2	47,6	43,1 ; 51,9	5,7*	3,8 ; 7,8
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	54,7	51,5 ; 57,8	41,8	38,7 ; 45,0	3,5*	2,4 ; 4,7
Bon	40,5	52,6	6,9	38,7	34,9 ; 42,4	56,0	52,2 ; 59,8	5,3*	3,6 ; 7,0
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	28,8	23,1 ; 35,0	56,6	49,5 ; 62,7	14,6*	10,7 ; 19,2
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	24,8	20,7 ; 29,2	61,0	55,9 ; 65,6	14,3	11,4 ; 17,7
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	52,6	50,0 ; 55,2	44,7	42,2 ; 47,4	2,6*	1,9 ; 3,6
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	21,3	49,3	29,4	18,9**	8,3 ; 30,9	51,6	37,4 ; 65,1	29,4*	17,9 ; 43,3
Non	48,1	46,1	5,8	47,7	45,4 ; 50,0	47,8	45,5 ; 50,2	4,4	3,6 ; 5,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	20,6	18,7 ; 22,4	79,4	77,6 ; 81,3
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,046			
Hommes	18,2	81,8	18,7	16,2 ; 21,3	81,3	78,7 ; 83,8
Femmes	26,0	74,0	22,5	19,8 ; 25,1	77,5	74,9 ; 80,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,698			
15-24 ans	24,4	75,6	23,2	16,6 ; 29,6	76,8	70,4 ; 83,4
25-44 ans	24,3	75,7	20,3	17,1 ; 23,5	79,7	76,5 ; 82,9
45-64 ans	20,6	79,4	19,9	17,2 ; 22,8	80,1	77,2 ; 82,8
65 ans et plus	18,8	81,2	20,4	16,4 ; 24,5	79,6	75,5 ; 83,6
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,001			
Personne seule	25,7	74,3	26,5	22,6 ; 30,6	73,5	69,4 ; 77,4
Couple sans enfant	17,7	82,3	19,0	16,0 ; 22,0	81,0	78,0 ; 84,0
Couple avec enfants	20,8	79,2	17,6	14,7 ; 20,6	82,4	79,4 ; 85,3
Famille monoparentale	32,2	67,8	32,1	24,0 ; 41,1	67,9	58,9 ; 76,0
Autre	29,7	70,3	20,7**	9,8 ; 32,6	79,3	67,4 ; 90,2
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,001			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	24,5	21,1 ; 28,2	75,5	71,8 ; 78,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	22,9	18,7 ; 26,9	77,1	73,1 ; 81,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	19,0	15,6 ; 22,6	81,0	77,4 ; 84,4
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	12,9	9,3 ; 16,7	87,1	83,3 ; 90,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,001			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	27,7	23,1 ; 32,8	72,3	67,2 ; 76,9
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	19,0	16,9 ; 21,0	81,0	79,0 ; 83,1
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	39,1	32,6 ; 45,2	60,9	54,8 ; 67,4
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	18,2	16,2 ; 20,1	81,8	79,9 ; 83,8
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,469			
Travailleurs	20,9	79,1	19,8	17,5 ; 22,1	80,2	77,9 ; 82,5
Étudiants	24,8	75,2	23,9*	16,0 ; 32,0	76,1	68,0 ; 84,0
Personnes sans emploi	37,9	62,1	23,4	18,1 ; 29,8	76,6	70,2 ; 81,9
Retraités	18,2	81,8	20,1	16,6 ; 23,7	79,9	76,3 ; 83,4
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	13,3	11,1 ; 15,6	86,7	84,4 ; 88,9
Bon	26,6	73,4	24,4	21,2 ; 27,8	75,6	72,2 ; 78,8
Passable ou mauvais	48,8	51,2	52,0	44,7 ; 59,2	48,0	40,8 ; 55,3
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	10,8	8,8 ; 13,0	89,2	87,0 ; 91,2
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	26,0	23,2 ; 29,0	74,0	71,0 ; 76,8
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	58,3	48,5 ; 68,0	41,7	32,0 ; 51,5
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	80,2	69,6 ; 90,2	19,8*	9,8 ; 30,4
Non	20,6	79,4	18,7	16,8 ; 20,5	81,3	79,5 ; 83,2
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = .			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	20,3	18,4 ; 22,1	79,7	77,9 ; 81,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,5	1,9 ; 3,2	2,9*	1,8 ; 4,0	2,2*	1,4 ; 3,2
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,469		P = 0,543		P = 0,628	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	3,2**	0,8 ; 5,9	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,5*	1,4 ; 3,8	3,3**	1,5 ; 5,4	1,6**	0,4 ; 3,3
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,9*	1,8 ; 4,1	3,2**	1,6 ; 5,3	2,5**	1,2 ; 4,0
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,1**	0,2 ; 2,4	x	;	1,5**	0,1 ; 3,4
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,237		P = 0,365		P = 0,204	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	4,4*	2,6 ; 6,4	5,8**	2,6 ; 9,4	3,5**	1,4 ; 5,9
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	2,4**	1,2 ; 3,9	1,8**	0,4 ; 3,7	3,1**	1,2 ; 5,3
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,8**	0,9 ; 2,9	2,8**	1,2 ; 4,8	0,7**	0,0 ; 1,5
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	3,3**	0,5 ; 6,5	x	;	x	;
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,476		P = 0,215		P = 0,913	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	3,1*	1,7 ; 4,6	3,3**	1,3 ; 5,8	2,8**	1,2 ; 4,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	3,2**	1,8 ; 4,9	4,2**	1,9 ; 7,0	2,0**	0,6 ; 3,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	2,3**	1,1 ; 3,6	2,5**	0,8 ; 4,6	2,1**	0,6 ; 4,1
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	1,1**	0,0 ; 2,6	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,035		P = 0,051		P = 0,300	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	4,4**	2,2 ; 6,9	6,4**	1,9 ; 11,9	3,2**	1,3 ; 5,7
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	2,2*	1,6 ; 3,0	2,4*	1,5 ; 3,6	2,0**	1,0 ; 3,1
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,011	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	7,1*	4,0 ; 10,6	8,8**	3,4 ; 15,3	5,4**	2,1 ; 9,4
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	2,0*	1,4 ; 2,7	2,2*	1,2 ; 3,2	1,8*	0,9 ; 2,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,173		P = 0,037		P = 0,465	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,4*	1,6 ; 3,4	2,8*	1,7 ; 4,2	2,0**	0,9 ; 3,3
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	3,3**	0,2 ; 6,8	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	5,2**	2,5 ; 8,6	13,9**	2,8 ; 27,8	3,6**	1,0 ; 6,8
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,3**	0,3 ; 2,5	x	;	1,2**	0,1 ; 2,6
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,074		P = 0,002	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,4**	0,7 ; 2,2	1,8**	0,6 ; 3,1	1,0**	0,3 ; 1,9
Bon	2,5	2,7	2,4	3,3*	1,9 ; 4,7	4,0**	2,0 ; 6,2	2,5**	0,9 ; 4,6
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	7,0*	3,9 ; 10,8	6,0**	1,8 ; 11,1	7,9**	3,7 ; 13,1
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,003	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	1,0**	0,4 ; 1,8	1,2**	0,2 ; 2,4	0,9**	0,1 ; 1,8
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,7*	1,7 ; 3,9	2,7**	1,3 ; 4,4	2,8**	1,3 ; 4,5
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	14,8*	8,7 ; 21,7	20,4**	10,1 ; 32,8	9,4**	2,9 ; 17,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	10,1	7,2 ; 13,3	12,0*	7,4 ; 17,5	8,6*	5,0 ; 12,5
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,6**	0,3 ; 1,0	0,9**	0,3 ; 1,5	0,4**	0,0 ; 0,8

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,2**	0,1 ; 0,4	x	;	0,3**	0,0 ; 0,6
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,815		P = 0,169		P = 0,309	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	0,4**	0,0 ; 0,9	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	0,3**	0,0 ; 0,7	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,206		P = 0,346		P = 0,034	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,462		P = 0,054		P = 0,913	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,027		P = 0,001		P = 0,187	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	0,8**	0,1 ; 1,8	x	;	0,7**	0,0 ; 1,7
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	x	;	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,001		P = .		P = 0,023	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	1,5**	0,3 ; 3,1	x	;	1,6**	0,0 ; 3,5
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,075		P = 0,749		P = 0,009	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	1,4**	0,2 ; 3,0	x	;	2,4**	0,2 ; 5,3
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,038		P = 0,044		P = 0,146	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	1,2**	0,0 ; 2,7	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = .		P = .		P = .	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	1,2**	0,3 ; 2,2	x	;	1,4**	0,2 ; 2,9
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,469				
Oui	10,2	10,0	10,3	11,1	9,5 ; 12,6	10,5	8,5 ; 12,6	11,6	9,3 ; 13,8	
Non	89,8	90,0	89,7	88,9	87,4 ; 90,5	89,5	87,4 ; 91,5	88,4	86,2 ; 90,7	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,028				
Oui	4,4	3,5	5,3	3,6	2,8 ; 4,4	2,7*	1,9 ; 3,7	4,4	3,3 ; 5,7	
Non	95,6	96,5	94,7	96,4	95,6 ; 97,2	97,3	96,3 ; 98,1	95,6	94,3 ; 96,7	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	11,1	9,7 ; 12,5	11,9	9,9 ; 14,2	10,2	8,1 ; 12,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,020	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	20,3	14,7 ; 26,2	22,7*	15,1 ; 30,8	17,7*	9,8 ; 26,1
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	9,2	6,9 ; 11,6	10,7*	7,4 ; 14,5	7,5*	4,6 ; 10,8
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	10,5	8,2 ; 12,9	11,1*	7,8 ; 14,8	9,8*	6,7 ; 13,3
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	7,5*	5,2 ; 10,0	5,4**	2,3 ; 8,9	9,4*	6,1 ; 13,3
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,327		P = 0,277		P = 0,770	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	11,9	9,1 ; 15,0	11,2*	7,1 ; 15,8	12,3*	8,8 ; 16,6
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	8,5	6,4 ; 10,7	8,5*	5,5 ; 11,6	8,6*	5,6 ; 11,8
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	11,8	9,2 ; 14,4	13,0	9,6 ; 16,9	10,5*	7,0 ; 14,2
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	13,8*	8,0 ; 20,3	18,3**	7,9 ; 30,6	10,1**	3,8 ; 17,4
Autre	14,9	16,7	13,2*	12,1**	2,9 ; 22,7	10,1**	0,0 ; 23,6	14,1**	0,4 ; 31,2
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,044		P = 0,103		P = 0,067	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	10,2	7,8 ; 12,9	10,1*	6,4 ; 14,0	10,4*	7,2 ; 13,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	13,8	10,4 ; 17,2	13,3*	9,0 ; 17,9	14,5*	9,2 ; 20,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	11,5	8,7 ; 14,5	15,4*	10,6 ; 20,7	7,9*	4,7 ; 11,4
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	7,2*	4,7 ; 10,3	7,1**	3,2 ; 12,1	7,3**	3,9 ; 11,4
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,152		P = 0,956		P = 0,030	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	13,4	9,5 ; 17,4	11,5**	5,5 ; 18,3	14,5*	9,7 ; 19,7
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	10,4	8,8 ; 11,9	11,7	9,5 ; 14,1	8,9	6,6 ; 11,2
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,017	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	10,5	8,6 ; 12,3	11,5	9,1 ; 14,1	9,1	6,5 ; 11,8
Étudiants	17,1	21,4	12,9	21,9*	14,9 ; 29,4	25,5*	14,4 ; 37,3	19,0*	9,7 ; 29,4
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	7,3**	3,9 ; 11,5	8,6**	0,3 ; 19,7	7,0**	3,3 ; 11,6
Retraités	7,5	7,0	7,9	7,5	5,5 ; 9,9	5,5**	2,6 ; 8,9	9,2*	6,1 ; 12,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	77,0	70,5 ; 83,0	75,5	66,5 ; 84,3	78,8	69,8 ; 87,0
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	23,0	17,0 ; 29,5	24,5*	15,7 ; 33,5	21,2*	13,0 ; 30,2
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	23,4	17,5 ; 29,5	31,0	22,0 ; 39,9	14,3*	7,5 ; 22,1
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	10,0*	6,6 ; 14,0	9,8**	4,9 ; 15,9	10,2**	5,3 ; 16,1
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	22,8	16,9 ; 28,9	28,3	19,9 ; 36,3	16,4**	7,8 ; 25,3
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	11,1*	6,8 ; 15,9	5,9**	1,8 ; 11,2	17,2*	9,2 ; 26,0
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	18,9	13,4 ; 24,8	18,3*	10,8 ; 26,4	19,7*	11,9 ; 28,6
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	4,3**	1,3 ; 7,8	x	;	7,8**	2,0 ; 15,1
Autre	12,1	8,1	17,6	9,5*	6,0 ; 13,5	x	;	14,5*	7,8 ; 21,7
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	28,2	21,7 ; 34,6	29,2*	20,0 ; 38,7	27,0*	17,1 ; 37,7
Printemps	21,2	20,7	21,9	22,4	17,0 ; 28,8	22,1*	14,1 ; 31,0	22,7*	14,6 ; 32,7
Été	29,1	30,3	27,4	26,8	20,3 ; 33,3	27,6*	18,7 ; 37,3	25,9*	17,5 ; 35,4
Automne	23,7	24,0	23,3	22,6	17,1 ; 28,9	21,1*	13,5 ; 29,9	24,4*	15,5 ; 33,7
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	36,9	30,3 ; 44,0	26,9*	18,4 ; 36,1	48,5	38,0 ; 59,4
Endroit public	28,1	24,8	32,5	29,4	22,6 ; 36,7	28,4*	19,0 ; 38,5	30,6*	20,9 ; 41,1
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	23,7	17,5 ; 30,3	28,9*	19,3 ; 38,7	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	10,0*	5,9 ; 14,3	15,8*	9,5 ; 22,6	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	11,3*	7,3 ; 16,0	11,7**	6,3 ; 18,3	10,9**	5,2 ; 17,6
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	5,3**	1,9 ; 9,3	8,8**	2,8 ; 16,1	x	;
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	4,0**	1,6 ; 7,0	5,3**	1,3 ; 10,3	2,4**	0,2 ; 5,6
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	7,1**	3,2 ; 11,5	5,1**	1,5 ; 9,9	9,5**	2,2 ; 18,1
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	x	;	x	;	4,8**	0,9 ; 10,6
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	18,9	13,6 ; 25,0	22,1*	13,8 ; 31,1	15,1*	8,6 ; 23,5
Chute	34,6	30,5	40,3	36,4	29,2 ; 43,1	34,0	24,2 ; 43,4	39,2	28,6 ; 49,2
Autres	13,7	12,5	15,3	13,2*	8,8 ; 18,0	10,0**	4,7 ; 16,2	17,0*	9,5 ; 25,4
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	4,6**	1,8 ; 8,1	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	27,0	20,8 ; 34,2	23,4*	15,4 ; 32,9	31,4*	21,5 ; 42,1
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	34,2	27,1 ; 40,6	26,5*	17,5 ; 35,3	43,3	32,6 ; 53,3
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	3,2**	0,9 ; 6,4	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	19,5	13,7 ; 25,1	24,3*	15,9 ; 32,8	13,8**	6,6 ; 21,9
Autre	11,9	10,9	13,2	11,4*	7,1 ; 15,9	15,5*	8,6 ; 22,6	6,6**	2,7 ; 11,7

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	3,4*	1,8 ; 5,2	3,1**	0,6 ; 6,2	3,6**	1,8 ; 5,8
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,779		P = 0,800		P = 0,601	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	3,2**	1,3 ; 5,5	3,6**	0,6 ; 7,6	2,8**	0,4 ; 5,7
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	4,0**	1,1 ; 7,8	x	;	4,8**	1,3 ; 9,2
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,114		P = 0,812		P = 0,105	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	5,3**	2,4 ; 9,0	x	;	6,6**	2,6 ; 11,5
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	2,2**	0,6 ; 4,1	2,4**	0,1 ; 5,5	2,0**	0,1 ; 4,5
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,493		P = 0,209		P = 0,148	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	4,5**	0,8 ; 9,1	x	;	7,6**	1,0 ; 16,1
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	3,1**	1,4 ; 5,2	3,1**	0,3 ; 6,8	3,0**	1,0 ; 5,5
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,636		P = 0,076		P = 0,776	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	2,9**	0,2 ; 6,7	x	;	x	;
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	3,9**	1,8 ; 6,3	4,3**	0,6 ; 8,7	3,5**	1,3 ; 6,3
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,153		P = 0,021		P = 0,974	
Oui	5,9	3,6*	7,3	4,8**	1,7 ; 8,7	6,1**	0,4 ; 13,7	3,8**	0,9 ; 7,4
Non	2,7*	2,2**	3,1*	2,2**	0,8 ; 3,8	x	;	3,7**	1,1 ; 6,8
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,996		P = 0,662		P = 0,952	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	3,0**	0,5 ; 6,2	x	;	3,8**	0,2 ; 8,4
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	3,0**	1,5 ; 4,8	1,8**	0,1 ; 4,1	4,0**	1,4 ; 7,0
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,432		P = 0,732		P = 0,331	
Résidence	62,7	52,8	68,6	47,9*	27,0 ; 67,6	64,3**	13,6 ; 94,0	38,8**	18,5 ; 64,2
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	64,2**	9,0 ; 100,0	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	22,1**	0,9 ; 46,3	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	x	;	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	49,4**	22,4 ; 73,7	x	;	44,1**	15,5 ; 76,5
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	15,3**	0,1 ; 37,1	x	;	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	24,2**	6,7 ; 49,1	x	;	30,6**	5,7 ; 63,3
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	9,6	8,3 ; 10,9	9,4	7,5 ; 11,4	9,8	8,0 ; 11,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,080		P = 0,001	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	8,4*	5,1 ; 12,4	11,2**	5,5 ; 18,0	5,5**	1,5 ; 10,6
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	9,4	7,0 ; 12,0	10,8*	7,2 ; 14,7	7,8*	4,9 ; 11,3
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	12,6	10,1 ; 15,3	9,8*	6,8 ; 13,2	15,6	11,7 ; 19,3
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	3,9*	2,2 ; 5,9	3,1**	1,0 ; 5,9	4,7**	2,1 ; 7,6
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,667		P = 0,092		P = 0,590	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	8,0	5,7 ; 10,5	7,0*	3,6 ; 10,8	8,7*	5,6 ; 12,2
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	9,1	7,1 ; 11,4	6,2*	3,6 ; 9,1	12,2	8,8 ; 15,7
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	10,0	7,8 ; 12,4	10,9*	7,5 ; 14,3	9,1*	5,9 ; 12,5
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	12,2*	6,7 ; 18,5	15,1**	6,5 ; 25,0	9,6**	2,9 ; 18,1
Autre	11,4	12,8*	10,2*	7,3**	1,1 ; 15,1	x	;	6,0**	0,0 ; 14,6
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,260		P = 0,491		P = 0,472	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	8,5	6,6 ; 10,8	8,8*	5,9 ; 12,2	8,3*	5,4 ; 11,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	11,8	8,9 ; 14,8	11,6*	7,7 ; 15,9	11,9*	7,7 ; 16,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	8,3	6,0 ; 10,8	7,8*	4,4 ; 11,8	8,7*	5,5 ; 12,2
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	9,6*	6,0 ; 13,3	7,5**	2,7 ; 13,1	11,5*	6,3 ; 17,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,212		P = 0,314		P = 0,376	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	7,6*	5,2 ; 10,5	6,6**	2,9 ; 11,1	8,2*	5,0 ; 12,0
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	9,8	8,3 ; 11,4	9,4	7,3 ; 11,6	10,2	8,1 ; 12,6
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,196		P = 0,545		P = 0,240	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	11,7*	7,8 ; 16,0	10,6**	4,9 ; 17,1	12,7*	7,5 ; 18,8
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	9,2	7,8 ; 10,7	8,8	6,9 ; 10,9	9,6	7,7 ; 11,7
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,006		P = 0,052		P = 0,115	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	10,9	9,1 ; 12,8	10,5	8,1 ; 13,1	11,4	8,6 ; 14,4
Étudiants	9,9	9,7	10,1	7,4**	3,4 ; 12,2	10,1**	3,2 ; 19,3	5,3**	0,8 ; 11,2
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	12,3*	7,4 ; 17,6	x	;	12,9*	7,4 ; 19,0
Retraités	6,9	6,7	7,0	5,1*	3,4 ; 7,1	2,9**	1,1 ; 5,3	6,8*	4,2 ; 9,9

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,597				
Oui	45,2	47,6	42,8	50,4	43,0 ; 57,6	52,4	41,3 ; 63,1	48,3	37,9 ; 58,5	
Non	54,8	52,4	57,2	49,6	42,4 ; 57,0	47,6	36,9 ; 58,7	51,7	41,5 ; 62,1	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,002				
Oui	25,4	27,6	23,1	19,2*	13,1 ; 25,7	28,0*	17,9 ; 39,2	9,9**	4,5 ; 16,1	
Non	74,6	72,4	76,9	80,8	74,3 ; 86,9	72,0	60,8 ; 82,1	90,1	83,9 ; 95,5	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,005				
Oui	17,6	15,6	19,6	17,5*	11,7 ; 23,5	8,9**	3,2 ; 15,5	26,5*	17,0 ; 36,4	
Non	82,4	84,4	80,4	82,5	76,5 ; 88,3	91,1	84,5 ; 96,8	73,5	63,6 ; 83,0	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,306				
Oui	8,1	7,2	9,0	5,0**	2,1 ; 8,3	3,1**	0,0 ; 7,7	6,9**	2,5 ; 12,4	
Non	91,9	92,8	91,0	95,0	91,7 ; 97,9	96,9	92,3 ; 100,0	93,1	87,6 ; 97,5	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	1,6**	0,0 ; 3,8	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	61,8	54,2 ; 69,4	57,4	46,6 ; 68,7	66,0	55,7 ; 75,7	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	15,2*	10,1 ; 21,2	15,7**	7,8 ; 24,9	14,7*	8,2 ; 22,0	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	2,7**	0,7 ; 5,1	3,1**	0,0 ; 7,2	x	;	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	16,7*	10,7 ; 23,1	21,7*	12,0 ; 31,8	11,9**	4,6 ; 20,1	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	2,1**	0,4 ; 4,3	x	;	3,5**	0,4 ; 7,9	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	30,5	28,4 ; 32,5	27,7	24,9 ; 30,6	33,3	30,4 ; 36,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,007		P = 0,091	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	26,1	19,7 ; 32,6	23,0*	14,7 ; 32,2	29,3*	19,6 ; 39,7
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	25,1	21,6 ; 28,6	21,8	17,0 ; 26,7	28,7	23,8 ; 33,9
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	35,4	32,1 ; 39,0	33,4	28,7 ; 38,7	37,4	32,9 ; 42,3
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	34,1	29,6 ; 38,4	31,4	25,4 ; 37,7	36,4	30,0 ; 42,9
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,048		P = 0,155		P = 0,232	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	31,8	27,9 ; 36,0	30,2	23,9 ; 37,0	32,9	27,9 ; 38,1
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	32,7	29,2 ; 36,2	28,1	23,3 ; 32,9	37,6	32,6 ; 42,6
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	26,9	23,6 ; 30,5	24,2	19,9 ; 29,1	29,8	24,6 ; 35,4
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	33,6	25,3 ; 42,1	36,1*	22,8 ; 48,8	31,6*	21,2 ; 43,2
Autre	34,0	32,4	35,4	39,9*	26,3 ; 52,5	39,2*	18,6 ; 59,7	40,5*	22,1 ; 58,3
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,021		P = 0,028		P = 0,076	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	32,9	29,3 ; 36,5	29,4	24,6 ; 34,7	36,6	31,3 ; 41,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	32,8	28,4 ; 37,1	33,4	27,6 ; 39,4	32,1	25,6 ; 38,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	24,8	21,0 ; 28,6	21,5	16,3 ; 26,9	27,8	22,7 ; 33,3
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	31,4	26,1 ; 37,1	23,9*	16,4 ; 32,6	38,6	31,5 ; 46,2
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,004		P = 0,058		P = 0,062	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	36,9	31,7 ; 42,3	34,5	26,4 ; 43,6	38,2	31,6 ; 45,3
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	28,8	26,5 ; 31,0	26,4	23,4 ; 29,5	31,6	28,2 ; 35,2
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,005		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	43,7	37,3 ; 50,2	38,5	29,7 ; 48,0	48,6	39,9 ; 57,4
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	28,7	26,5 ; 30,9	26,1	23,2 ; 29,3	31,3	28,2 ; 34,7
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,015		P = 0,135		P = 0,222	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	29,2	26,6 ; 31,9	26,8	23,3 ; 30,4	32,4	28,3 ; 36,6
Étudiants	20,7	14,8	26,3	23,7*	15,9 ; 31,3	20,3**	9,2 ; 32,0	26,3*	15,2 ; 37,7
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	35,6	28,3 ; 43,3	38,7*	20,4 ; 58,3	35,1	27,2 ; 43,8
Retraités	34,2	30,5	37,2	36,3	32,1 ; 40,7	33,6	27,7 ; 39,7	38,4	32,7 ; 44,4
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	22,4	19,7 ; 25,2	20,9	17,2 ; 24,7	24,0	20,0 ; 28,1
Bon	33,9	28,1	39,6	34,3	30,9 ; 38,1	32,3	26,9 ; 37,8	36,5	31,4 ; 41,8
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	66,1	59,7 ; 72,2	56,0	45,8 ; 66,1	74,3	66,5 ; 81,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	52,3	47,3 ; 57,2	49,4	42,2 ; 57,2	54,7	47,9 ; 61,5
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	24,6	22,4 ; 26,8	22,5	19,5 ; 25,6	26,8	23,3 ; 30,0
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,080		P = 0,001	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	45,7*	24,0 ; 64,9	x	;	48,0*	23,9 ; 69,5
Poids normal	28,3	22,9	32,1	28,7	25,7 ; 32,0	26,4	21,6 ; 31,4	30,4	26,3 ; 34,7
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	28,2	24,9 ; 31,6	26,3	22,1 ; 30,8	31,6	26,3 ; 37,3
Obésité	37,9	30,5	46,1	42,8	36,8 ; 48,5	36,3	28,6 ; 44,3	50,7	41,8 ; 59,6

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,006					
Oui	30,3	25,3	35,2	30,5	28,4 ; 32,5	27,7	24,9 ; 30,6	33,3	30,4 ; 36,5		
Non	69,7	74,7	64,8	69,5	67,5 ; 71,6	72,3	69,4 ; 75,1	66,7	63,5 ; 69,6		
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	9,5	6,4	12,5	10,2	8,9 ; 11,6	7,6	6,0 ; 9,5	12,8	10,7 ; 15,0		
Non	90,5	93,6	87,5	89,8	88,4 ; 91,1	92,4	90,5 ; 94,0	87,2	85,0 ; 89,3		
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,020					
Oui	14,5	12,2	16,7	14,3	12,8 ; 15,8	12,5	10,6 ; 14,8	16,1	13,9 ; 18,4		
Non	85,5	87,8	83,3	85,7	84,2 ; 87,2	87,5	85,2 ; 89,4	83,9	81,6 ; 86,1		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,200					
Oui	13,5	10,8	16,1	13,9	12,4 ; 15,4	12,9	10,7 ; 15,0	14,9	12,7 ; 17,2		
Non	86,5	89,2	83,9	86,1	84,6 ; 87,6	87,1	85,0 ; 89,3	85,1	82,8 ; 87,3		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,039					
Oui	14,5	11,8	17,2	15,0	13,5 ; 16,6	13,3	11,2 ; 15,5	16,7	14,5 ; 19,1		
Non	85,5	88,2	82,8	85,0	83,4 ; 86,5	86,7	84,5 ; 88,8	83,3	80,9 ; 85,5		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,802					
Oui	17,8	16,0	19,6	18,8	17,1 ; 20,6	18,6	16,1 ; 21,1	19,0	16,6 ; 21,7		
Non	82,2	84,0	80,4	81,2	79,4 ; 82,9	81,4	78,9 ; 83,9	81,0	78,3 ; 83,4		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,008					
Oui	14,2	10,6	17,8	13,2	11,7 ; 14,8	11,1	9,0 ; 13,3	15,4	13,2 ; 17,6		
Non	85,8	89,4	82,2	86,8	85,2 ; 88,3	88,9	86,7 ; 91,0	84,6	82,4 ; 86,8		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	54,2	51,8 ; 56,4	35,6	33,5 ; 37,8	10,2	8,9 ; 11,6
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	52,6	34,1	13,3	50,3	47,1 ; 53,6	36,8	33,6 ; 39,9	12,9	10,7 ; 15,1
Femmes	60,1	29,8	10,1	58,0	55,1 ; 61,1	34,5	31,4 ; 37,4	7,5	5,9 ; 9,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	57,9	50,5 ; 64,7	33,2	26,3 ; 40,5	8,8*	5,2 ; 13,0
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	59,9	55,8 ; 64,1	29,4	25,7 ; 33,3	10,7	8,1 ; 13,5
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	52,0	48,4 ; 55,4	38,4	35,0 ; 41,9	9,6	7,6 ; 11,9
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	43,4	38,5 ; 48,3	44,6	39,7 ; 49,5	12,0	9,2 ; 15,3
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,587					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	49,9	45,1 ; 54,3	37,9	33,6 ; 42,4	12,2	9,5 ; 15,2
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	54,9	51,2 ; 58,6	35,6	32,1 ; 39,1	9,5	7,2 ; 11,9
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	56,4	52,5 ; 60,3	34,4	30,6 ; 38,2	9,3	7,1 ; 11,7
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	48,5	39,1 ; 57,3	38,9	30,5 ; 47,7	12,5*	7,6 ; 18,1
Autre	48,0	34,3	17,7	50,8	36,7 ; 65,5	35,9*	22,2 ; 50,3	13,3**	3,3 ; 24,4
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,916					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	54,5	52,1 ; 56,8	35,5	33,3 ; 37,7	10,0	8,7 ; 11,5
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	42,2*	22,5 ; 64,6	46,4*	23,7 ; 66,8	11,4**	0,6 ; 26,8
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,547					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	54,3	52,0 ; 56,6	35,5	33,4 ; 37,7	10,2	8,8 ; 11,6
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	x	;	48,2**	5,9 ; 100,0	x	;
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	x	;	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	40,7	36,7 ; 44,6	43,6	39,6 ; 47,5	15,7	12,8 ; 18,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	53,2	48,2 ; 57,7	37,2	32,9 ; 42,0	9,6	6,9 ; 12,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	59,4	54,7 ; 64,0	34,2	29,9 ; 38,8	6,4*	4,3 ; 8,7
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	71,5	65,8 ; 77,1	21,7	16,4 ; 27,0	6,8*	3,7 ; 10,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	37,2	31,9 ; 42,4	47,4	41,9 ; 53,2	15,4	11,8 ; 19,6
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	58,1	55,6 ; 60,7	33,0	30,6 ; 35,4	8,9	7,4 ; 10,4
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	37,5	31,3 ; 43,5	38,9	32,9 ; 45,0	23,7	18,3 ; 29,4
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	56,7	54,3 ; 59,2	34,9	32,6 ; 37,2	8,4	7,1 ; 9,8
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,003					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	56,7	53,9 ; 59,5	32,7	29,9 ; 35,3	10,7	8,8 ; 12,6
Étudiants	62,8	27,9	9,3	57,5	47,7 ; 66,6	38,5	29,8 ; 48,1	3,9**	0,9 ; 7,7
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	50,5	41,9 ; 58,0	37,5	29,8 ; 45,2	12,1*	7,7 ; 17,5
Retraités	49,7	38,1	12,2	45,6	41,3 ; 50,2	43,4	39,0 ; 47,6	11,0	8,3 ; 14,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	54,2	51,8 ; 56,4	35,6	33,5 ; 37,8	10,2	8,9 ; 11,6
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	42,3	37,3 ; 47,0	38,1	33,4 ; 43,1	19,6	15,8 ; 23,5
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	57,8	55,4 ; 60,3	34,8	32,3 ; 37,2	7,4	6,1 ; 8,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	67,6	64,7 ; 70,5	26,9	24,2 ; 29,6	5,5	4,2 ; 6,9
Bon	41,4	42,6	16,0	37,3	33,6 ; 41,0	47,0	43,3 ; 51,0	15,7	12,7 ; 18,7
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	34,0	27,4 ; 40,6	47,1	40,1 ; 53,9	18,9	14,4 ; 23,8
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	40,2	35,3 ; 45,4	44,3	39,2 ; 49,4	15,5	11,9 ; 19,3
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	58,5	55,9 ; 60,9	33,0	30,6 ; 35,4	8,5	7,1 ; 10,1
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,011					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	55,8	50,5 ; 61,1	38,4	33,6 ; 43,5	5,7*	3,6 ; 8,2
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	53,9	51,3 ; 56,5	35,2	32,8 ; 37,6	10,9	9,4 ; 12,5
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	59,0	56,4 ; 61,5	34,0	31,5 ; 36,5	7,0	5,8 ; 8,4
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	38,3	33,5 ; 43,0	41,0	36,4 ; 45,6	20,7	16,9 ; 24,8
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,005					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	57,4	52,4 ; 62,2	35,8	31,1 ; 40,7	6,8*	4,7 ; 9,2
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	52,7	49,7 ; 55,7	35,0	32,3 ; 37,8	12,4	10,5 ; 14,4

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	13,4	12,1 ; 14,7	10,5	8,8 ; 12,3	16,3	14,7 ; 18,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	0,8**	0,1 ; 1,5	x	;	0,9**	0,0 ; 2,1
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	17,1	14,5 ; 20,0	13,4	9,6 ; 17,3	21,0	17,3 ; 25,0
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	44,4	40,0 ; 49,3	38,5	32,0 ; 45,7	49,2	43,2 ; 55,6
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,014		P = 0,000	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	34,8	29,3 ; 40,7	30,4	22,8 ; 39,1	39,0	31,1 ; 47,3
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	56,9	48,4 ; 65,5	52,0	37,5 ; 67,3	60,0	49,6 ; 70,4
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	75,3	56,8 ; 91,4	65,8*	27,6 ; 96,3	82,4	60,8 ; 99,0
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	26,7	23,7 ; 30,1	22,3	18,0 ; 27,1	31,1	27,0 ; 35,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	9,9	7,6 ; 12,4	7,5*	4,5 ; 10,9	12,6*	9,1 ; 16,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	8,0	5,7 ; 10,3	5,7**	2,9 ; 9,1	10,0*	6,7 ; 13,5
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	4,1**	2,2 ; 6,7	1,6**	0,0 ; 3,8	6,6**	3,1 ; 11,1
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,002		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	23,8	20,4 ; 28,0	17,4*	11,7 ; 24,1	27,6	23,2 ; 32,9
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	10,8	9,3 ; 12,3	9,3	7,4 ; 11,3	12,5	10,5 ; 14,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	23,9	19,1 ; 28,8	18,8*	12,1 ; 26,1	28,8	22,0 ; 36,1
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	11,7	10,4 ; 13,1	9,0	7,2 ; 10,9	14,5	12,7 ; 16,6

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,9	75,0 ; 78,7	20,3	18,5 ; 22,2	2,8	2,1 ; 3,6
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	66,7	63,5 ; 69,7	28,4	25,6 ; 31,6	4,8	3,5 ; 6,4
Femmes	87,9	11,3	0,7	87,2	85,1 ; 89,3	12,1	10,1 ; 14,1	0,7**	0,2 ; 1,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,064					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	79,9	73,9 ; 84,9	17,8	12,8 ; 23,4	2,3**	0,5 ; 4,4
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	79,8	76,2 ; 83,2	17,6	14,3 ; 21,1	2,6**	1,2 ; 4,2
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	76,2	73,1 ; 79,1	21,1	18,2 ; 23,9	2,7*	1,6 ; 4,0
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	69,4	65,1 ; 73,6	26,8	22,6 ; 30,9	3,9*	2,2 ; 5,8
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,944					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	77,6	73,7 ; 81,2	19,8	16,4 ; 23,5	2,6**	1,2 ; 4,4
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	74,8	71,5 ; 78,0	22,0	18,9 ; 25,2	3,2*	1,9 ; 4,7
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	77,6	74,1 ; 80,9	19,9	16,8 ; 23,4	2,5*	1,3 ; 3,9
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	78,2	71,0 ; 84,9	19,7*	13,4 ; 26,6	2,0**	0,1 ; 4,9
Autre	75,5	19,3	5,3*	79,3	67,8 ; 88,6	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,913					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	76,6	74,4 ; 78,8	20,6	18,6 ; 22,8	2,8*	2,0 ; 3,7
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	78,0	72,3 ; 83,7	18,7	13,4 ; 24,1	3,3**	1,0 ; 6,3
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	79,8	74,3 ; 85,3	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	69,3	57,0 ; 81,2	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	69,9	66,3 ; 73,4	25,1	21,7 ; 28,6	5,0*	3,4 ; 6,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	76,1	72,2 ; 79,9	21,0	17,3 ; 24,8	2,9**	1,2 ; 4,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	79,1	75,2 ; 82,6	19,1	15,6 ; 22,8	1,9**	0,8 ; 3,1
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	86,9	82,9 ; 90,6	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,017					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	72,9	68,2 ; 77,7	21,9	17,7 ; 26,4	5,1**	2,7 ; 7,9
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	77,7	75,6 ; 79,8	20,0	18,1 ; 22,2	2,2*	1,5 ; 3,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,012					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	69,7	63,9 ; 75,4	25,7	20,1 ; 31,2	4,6*	2,3 ; 7,2
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	77,9	75,8 ; 79,8	19,6	17,8 ; 21,6	2,5*	1,7 ; 3,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,571					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	77,4	74,8 ; 79,8	19,8	17,4 ; 22,3	2,9*	1,9 ; 4,0
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	82,2	75,3 ; 88,7	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	76,3	69,2 ; 82,6	19,9*	13,8 ; 26,4	3,8**	1,3 ; 6,8
Retraités	72,9	23,2	3,8	72,1	68,1 ; 75,9	25,0	21,4 ; 28,8	2,9*	1,6 ; 4,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,9	75,0 ; 78,7	20,3	18,5 ; 22,2	2,8	2,1 ; 3,6
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,002					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	74,4	70,1 ; 78,6	20,2	16,2 ; 24,3	5,4*	3,2 ; 7,8
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	77,7	75,6 ; 79,7	20,3	18,4 ; 22,3	2,0*	1,3 ; 2,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	81,2	78,7 ; 83,7	16,4	14,2 ; 18,9	2,4*	1,4 ; 3,4
Bon	75,1	21,2	3,6	71,9	68,3 ; 75,4	24,7	21,5 ; 28,1	3,4*	2,1 ; 4,8
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	69,4	62,9 ; 75,3	27,6	21,6 ; 33,8	3,0**	1,3 ; 5,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,136					
Élevé	77,2	19,2	3,6	73,7	69,3 ; 78,4	22,5	18,0 ; 26,8	3,8*	2,2 ; 5,7
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	78,0	75,9 ; 80,0	19,6	17,6 ; 21,7	2,4*	1,6 ; 3,3
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,066					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	72,2	67,6 ; 76,9	23,7	19,2 ; 28,1	4,1*	2,3 ; 6,4
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	77,6	75,6 ; 79,6	19,8	17,9 ; 21,9	2,6*	1,8 ; 3,5
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,012					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	90,3	87,6 ; 92,8	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	72,6	70,0 ; 75,2	23,9	21,5 ; 26,8	3,4*	2,4 ; 4,6

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	76,9	75,0 ; 78,7	66,7	63,5 ; 69,7	87,2	85,1 ; 89,3
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	20,3	18,5 ; 22,2	28,4	25,6 ; 31,6	12,1	10,1 ; 14,1
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	2,8	2,1 ; 3,6	4,8	3,5 ; 6,4	0,7**	0,2 ; 1,3
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	72,2	67,6 ; 76,9	57,0	47,5 ; 66,1	82,0	77,4 ; 86,2
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	23,7	19,2 ; 28,1	34,5	25,7 ; 43,8	16,8	12,6 ; 21,4
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	4,1*	2,3 ; 6,4	8,5**	4,1 ; 14,2	1,2**	0,2 ; 2,5
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	77,6	75,6 ; 79,6	67,8	64,4 ; 71,1	88,3	86,1 ; 90,6
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	19,8	17,9 ; 21,9	27,8	24,7 ; 31,2	11,1	8,8 ; 13,4
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	2,6*	1,8 ; 3,5	4,4*	3,0 ; 6,0	0,6**	0,1 ; 1,3

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	28,2	25,9 ; 30,4	17,7	15,9 ; 19,8	54,1	51,5 ; 56,6
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	20,7	17,8 ; 23,8	15,1	12,6 ; 17,8	64,1	60,5 ; 67,6
Femmes	41,7	18,2	40,1	36,3	32,8 ; 39,6	20,6	17,7 ; 23,7	43,1	39,6 ; 46,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,009					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	26,3	19,9 ; 32,9	15,8*	10,9 ; 21,0	57,8	50,6 ; 64,7
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	26,3	22,8 ; 29,8	22,2	18,7 ; 25,8	51,6	47,4 ; 55,5
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	31,5	27,2 ; 35,4	16,0	13,2 ; 19,3	52,6	48,7 ; 56,8
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	26,8	21,0 ; 32,9	10,6*	6,5 ; 15,0	62,6	56,2 ; 68,9
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	26,6	22,3 ; 31,2	12,9	9,7 ; 16,3	60,5	55,5 ; 65,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	28,4	23,8 ; 33,3	15,5	12,0 ; 19,2	56,1	50,9 ; 61,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	25,7	21,7 ; 29,8	20,4	16,6 ; 24,2	53,9	49,3 ; 58,8
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	33,5	27,4 ; 39,4	23,6	18,4 ; 29,3	43,0	36,9 ; 49,2
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,002					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	24,5	18,9 ; 30,6	11,4*	7,8 ; 15,5	64,1	57,4 ; 70,3
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	28,7	26,2 ; 31,3	19,2	17,1 ; 21,6	52,1	49,2 ; 54,9
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,201					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	26,9	24,0 ; 29,6	18,7	16,4 ; 21,2	54,5	51,3 ; 57,5
Étudiants	28,8	16,3	54,9	28,2*	19,7 ; 36,8	19,6*	12,9 ; 27,2	52,2	43,2 ; 61,6
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	35,9	25,5 ; 46,2	17,7*	11,1 ; 25,5	46,4	36,6 ; 56,5
Retraités	38,0	12,4	49,6	31,5	25,8 ; 37,1	11,7*	8,2 ; 15,6	56,9	51,2 ; 62,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
1,6*	1,0 ; 2,3	49,4	47,1 ; 51,7	35,8	33,6 ; 37,9	13,2	11,7 ; 14,8	Ensemble de la population	
P = 0,000									
0,4**	0,1 ; 0,9	40,2	37,0 ; 43,5	45,1	41,7 ; 48,4	14,2	12,1 ; 16,6	Sexe	
2,8*	1,7 ; 4,1	59,1	56,0 ; 62,0	26,0	23,4 ; 28,7	12,1	10,3 ; 14,2	Hommes	
P = 0,004									
x	;	72,5	59,7 ; 83,8	20,4**	10,1 ; 32,0	x	;	Femmes	
3,8**	0,7 ; 7,7	67,8	59,8 ; 76,0	22,5*	15,3 ; 29,9	5,9**	2,3 ; 10,1	Groupe d'âge	
P = 0,000									
3,4**	1,1 ; 6,4	69,3	62,9 ; 75,7	21,9	16,1 ; 27,5	5,5**	2,6 ; 8,6	15-17 ans	
1,1**	0,4 ; 1,9	52,0	47,7 ; 56,4	34,7	30,8 ; 38,7	12,2	9,6 ; 14,9	18-24 ans	
1,1**	0,3 ; 2,1	42,6	38,9 ; 46,2	40,1	36,5 ; 43,9	16,2	13,5 ; 19,0	15-24 ans	
2,2**	1,0 ; 3,7	40,8	36,4 ; 45,6	41,5	36,7 ; 46,3	15,5	12,0 ; 19,1	25-44 ans	
P = 0,122									
x	;	71,9	55,1 ; 86,3	22,1**	8,2 ; 38,3	x	;	45-64 ans	
x	;	61,8	49,7 ; 73,4	31,1*	19,6 ; 42,8	x	;	65 ans et plus	
P = 0,000									
x	;	64,9	55,2 ; 74,3	28,3*	19,2 ; 37,5	x	;	Hommes	
x	;	40,2	34,4 ; 46,1	46,8	40,4 ; 52,9	x	;	15-17 ans	
x	;	32,9	27,7 ; 38,0	49,0	43,2 ; 54,9	x	;	18-24 ans	
x	;	32,6	26,1 ; 39,6	49,3	41,6 ; 56,5	x	;	25-44 ans	
P = 0,678									
x	;	73,2	53,2 ; 89,9	18,5**	3,6 ; 36,9	x	;	45-64 ans	
6,8**	0,7 ; 14,5	74,4	63,0 ; 85,1	13,0**	5,3 ; 21,8	5,7**	0,8 ; 12,3	65 ans et plus	
P = 0,013									
5,4**	0,8 ; 11,2	74,1	64,5 ; 82,9	14,7*	8,0 ; 22,0	5,8**	1,5 ; 11,0	Femmes	
2,3**	0,9 ; 4,0	65,9	60,3 ; 71,4	20,6	16,3 ; 25,2	11,2*	7,7 ; 15,1	15-24 ans	
2,1**	0,6 ; 4,2	52,9	47,7 ; 57,7	30,7	26,2 ; 35,3	14,3	10,9 ; 17,8	25-44 ans	
3,0**	1,1 ; 5,4	47,6	41,3 ; 54,1	35,0	28,8 ; 41,0	14,3*	10,0 ; 19,2	45-64 ans	
P = 0,292									
2,2*	1,2 ; 3,3	44,8	40,8 ; 48,8	37,4	33,6 ; 41,3	15,6	13,0 ; 18,3	65 ans et plus	
1,1**	0,4 ; 2,1	53,9	49,2 ; 58,4	33,3	29,3 ; 37,7	11,6	9,1 ; 14,6	Niveau de scolarité	
1,4**	0,3 ; 2,8	50,9	46,2 ; 55,6	34,6	30,3 ; 38,9	13,1	10,2 ; 16,2	Niveau inférieur au DES	
1,8**	0,2 ; 3,9	47,1	40,9 ; 53,1	39,5	33,2 ; 45,8	11,5*	7,6 ; 16,0	Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 0,669									
0,5**	0,0 ; 1,3	41,6	35,8 ; 47,2	42,2	36,6 ; 47,8	15,7	12,0 ; 19,8	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
1,0**	0,1 ; 2,2	42,5	36,0 ; 49,2	43,4	36,5 ; 49,9	13,1*	9,4 ; 17,5	Diplôme d'études universitaires	
x	;	37,6	31,2 ; 44,6	47,3	40,4 ; 54,1	x	;	Hommes	
x	;	37,0	28,2 ; 45,9	51,2	41,8 ; 60,8	x	;	Niveau inférieur au DES	
P = 0,037									
3,9**	1,9 ; 6,1	48,2	42,8 ; 53,8	32,4	27,3 ; 37,8	15,5	11,9 ; 19,3	Diplôme d'études secondaires (DES)	
1,3**	0,1 ; 2,9	67,6	60,9 ; 73,6	21,3	16,5 ; 26,6	9,8*	6,4 ; 14,1	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
2,6**	0,5 ; 5,4	63,8	57,4 ; 70,0	22,3	17,5 ; 27,6	11,2*	7,3 ; 15,1	Diplôme d'études universitaires	
3,6**	0,5 ; 7,8	57,4	49,3 ; 65,5	27,7	20,7 ; 34,7	11,2*	6,5 ; 17,1	Indice du niveau de revenu du ménage	
P = 0,047									
2,9**	1,1 ; 5,0	50,0	44,5 ; 55,5	31,4	26,6 ; 36,5	15,7	12,3 ; 19,5	Quintile 1 (faible)	
1,3*	0,7 ; 1,9	49,0	46,4 ; 51,6	37,0	34,5 ; 39,5	12,7	11,1 ; 14,5	Quintile 2 et suivants	
P = 0,866									
x	;	39,2	30,2 ; 48,8	43,3	34,1 ; 52,4	x	;	Hommes	
0,4**	0,1 ; 0,9	40,2	36,8 ; 43,8	45,4	41,6 ; 49,0	13,9	11,5 ; 16,6	Quintile 1 (faible)	
P = 0,216									
4,2**	1,5 ; 7,6	56,4	49,7 ; 62,9	24,4	19,1 ; 29,8	15,0	10,9 ; 19,8	Quintile 2 et suivants	
2,2**	1,1 ; 3,5	59,7	56,1 ; 63,2	26,8	23,5 ; 30,1	11,3	9,2 ; 13,5		

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	36,9	34,8 ; 39,1	1,4*	0,9 ; 1,9	61,7	59,5 ; 63,9
Sexe	P = 0,000			P = 0,043					
Hommes	36,6	3,6	59,9	34,8	31,7 ; 38,0	1,7*	1,0 ; 2,6	63,5	60,3 ; 66,6
Femmes	40,5	2,3	57,1	39,1	36,2 ; 42,1	1,0*	0,6 ; 1,6	59,9	56,9 ; 62,7
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	15,8*	11,0 ; 20,9	1,3**	0,0 ; 2,7	82,9	77,9 ; 88,1
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	36,2	32,4 ; 40,3	0,7**	0,1 ; 1,5	63,0	59,0 ; 66,9
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	46,1	42,6 ; 49,9	1,5**	0,7 ; 2,5	52,3	48,6 ; 55,9
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	36,5	31,8 ; 41,4	2,6*	1,4 ; 4,0	60,9	56,0 ; 65,6
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	10,8**	5,3 ; 16,9	2,4**	0,1 ; 5,2	86,8	80,5 ; 92,7
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	34,8	29,1 ; 40,8	0,8**	0,0 ; 1,9	64,4	58,2 ; 70,0
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	44,4	39,2 ; 50,0	2,5**	1,0 ; 4,2	53,1	47,7 ; 58,4
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	35,9	28,8 ; 43,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,007					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	21,3*	13,5 ; 29,7	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	37,9	32,4 ; 43,5	x	;	x	;
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	47,9	43,0 ; 53,1	0,5**	0,0 ; 1,3	51,6	46,2 ; 56,5
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	37,1	30,9 ; 43,0	3,9**	2,0 ; 6,2	59,0	52,9 ; 65,1
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,001					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	16,4**	6,6 ; 29,8	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	10,2	8,3 ; 12,2	2,2*	1,4 ; 3,1	87,6	85,5 ; 89,6
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	56,2	52,2 ; 60,2	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	89,3	85,5 ; 92,9	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,010					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	40,5**	0,6 ; 86,7	59,5**	13,3 ; 99,4
Poids normal	4,7	6,8	88,5	5,0*	2,8 ; 7,3	3,9*	2,1 ; 5,9	91,1	88,2 ; 94,0
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	46,8	41,6 ; 52,1	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	83,1	76,7 ; 89,4	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	12,7**	3,3 ; 24,9	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	14,0	11,2 ; 17,1	1,0**	0,3 ; 1,9	85,0	81,9 ; 87,9
Embonpoint	69,6	x	x	73,3	68,1 ; 78,2	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	96,8	94,1 ; 98,9	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	80,9	77,8 ; 83,8	11,6	9,2 ; 14,2	7,5	5,6 ; 9,6
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	81,4	10,5	8,0	89,2	85,3 ; 92,7	4,6**	2,1 ; 7,7	6,2*	3,5 ; 9,4
Femmes	74,5	14,1	11,5	75,1	70,8 ; 79,5	16,5	12,7 ; 20,5	8,4	6,0 ; 11,2
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,529					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	82,8	70,1 ; 92,8	10,1**	2,0 ; 20,4	7,1**	0,7 ; 15,7
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	78,0	72,4 ; 83,5	16,2*	11,4 ; 21,1	5,8**	2,9 ; 9,3
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	81,7	77,1 ; 86,1	10,1*	6,6 ; 14,1	8,1*	5,5 ; 11,2
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	84,7	77,4 ; 91,5	5,0**	0,9 ; 10,0	10,3**	4,6 ; 16,6
Hommes	P = 0,252			P = 0,932					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	88,7	68,2 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	84,8	75,9 ; 92,0	9,0**	3,1 ; 15,9	6,2**	1,6 ; 12,2
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	91,0	85,1 ; 95,7	2,0**	0,0 ; 5,5	7,0**	2,9 ; 12,5
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	96,4	91,5 ; 100,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,702					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	80,0	63,3 ; 93,1	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	72,7	65,0 ; 81,1	21,8*	14,4 ; 28,9	5,5**	1,9 ; 10,1
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	75,5	68,5 ; 82,1	15,6*	9,9 ; 21,9	8,9*	5,3 ; 12,8
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	75,8	64,5 ; 87,5	7,6**	0,6 ; 15,7	16,6**	7,1 ; 27,0
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,052					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	82,4	76,6 ; 87,8	11,5*	6,7 ; 16,8	6,1**	3,4 ; 9,6
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	82,8	77,9 ; 86,9	12,0*	8,0 ; 16,4	5,2*	3,1 ; 7,7
Obésité	72,3	14,4	13,3	75,1	68,0 ; 81,6	11,4*	6,9 ; 16,4	13,6*	8,1 ; 19,2
Hommes	P = 0,002			P = 0,616					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	91,2	82,0 ; 97,9	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	89,3	83,6 ; 94,5	6,5**	2,1 ; 11,7	4,2**	1,3 ; 7,9
Obésité	76,0	12,2	11,8	87,8	79,5 ; 94,7	2,5**	0,1 ; 5,7	9,7**	3,2 ; 17,4
Femmes	P = 0,161			P = 0,017					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	80,2	72,9 ; 86,9	13,9*	7,9 ; 20,4	6,0**	2,8 ; 9,9
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	75,4	67,7 ; 82,0	18,2*	11,8 ; 25,3	6,4**	3,1 ; 10,1
Obésité	68,9	16,4	14,7	61,1	50,6 ; 71,8	21,0*	12,2 ; 30,3	17,8*	9,5 ; 26,9

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
17,2	15,5 ; 19,0	17,4	15,7 ; 19,1	2,8	2,0 ; 3,7	62,6	60,4 ; 64,7	Ensemble de la population	
P = 0,000									
13,2	11,0 ; 15,5	15,0	12,6 ; 17,5	3,8*	2,5 ; 5,3	68,1	64,8 ; 71,2	Sexe	
21,4	18,8 ; 23,9	19,7	17,2 ; 22,3	1,9*	1,1 ; 2,8	57,0	54,0 ; 60,2	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
11,4*	7,0 ; 15,9	10,8*	6,5 ; 15,8	9,5*	5,7 ; 13,9	68,3	61,5 ; 74,9	Groupe d'âge	
18,1	15,2 ; 21,3	19,2	16,0 ; 22,5	2,2**	1,0 ; 3,8	60,5	56,5 ; 64,1	15-24 ans	
20,2	17,2 ; 23,3	19,6	16,6 ; 22,8	1,0**	0,3 ; 1,9	59,2	55,5 ; 62,7	25-44 ans	
14,0	10,8 ; 17,5	14,5	11,1 ; 17,8	1,7**	0,7 ; 2,8	69,8	65,3 ; 74,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,001									
8,1**	3,4 ; 13,3	5,5**	0,6 ; 10,9	14,6*	8,2 ; 22,2	71,9	63,0 ; 80,4	Hommes	
13,3	9,7 ; 17,3	18,0	13,3 ; 22,8	2,2**	0,4 ; 4,9	66,4	60,5 ; 72,0	15-24 ans	
15,1*	10,9 ; 19,6	16,6	12,6 ; 20,6	1,6**	0,3 ; 3,1	66,7	61,4 ; 72,0	25-44 ans	
13,1*	8,3 ; 18,3	14,5*	8,9 ; 20,6	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,013									
14,8*	7,8 ; 22,5	16,5*	8,7 ; 24,9	4,1**	0,3 ; 9,0	64,6	54,4 ; 74,5	Femmes	
23,4	18,7 ; 28,7	20,5	16,1 ; 24,9	2,2**	0,7 ; 4,1	53,9	48,1 ; 59,5	15-24 ans	
25,3	21,0 ; 30,1	22,8	18,5 ; 27,2	0,5**	0,0 ; 1,1	51,4	46,2 ; 56,6	25-44 ans	
14,8*	10,2 ; 19,6	14,6	10,3 ; 19,4	2,2**	0,8 ; 4,0	68,4	62,7 ; 73,8	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,002									
x	;	x	;	22,1**	8,2 ; 38,0	77,2	61,6 ; 91,1	Statut pondéral	
8,4	6,5 ; 10,4	15,3	12,9 ; 17,9	4,0*	2,7 ; 5,6	72,2	69,2 ; 75,5	Poids insuffisant	
21,3	18,3 ; 24,5	20,5	17,4 ; 24,0	1,0**	0,2 ; 2,0	57,2	53,5 ; 60,9	Poids normal	
42,7	36,8 ; 48,7	18,2	13,6 ; 23,0	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,013									
x	;	x	;	x	;	81,0*	42,8 ; 100,0	Hommes	
3,8**	1,8 ; 5,9	7,8*	4,9 ; 10,9	7,2*	4,3 ; 10,4	81,3	76,9 ; 85,7	Poids insuffisant	
13,8	10,6 ; 17,5	20,4	16,2 ; 24,7	1,5**	0,3 ; 3,1	64,2	59,2 ; 69,0	Poids normal	
38,1	29,5 ; 47,1	19,4*	13,0 ; 26,5	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
x	;	x	;	22,6**	7,4 ; 40,5	76,6	58,8 ; 91,9	Femmes	
11,8	8,9 ; 14,8	20,8	17,2 ; 24,6	1,7**	0,7 ; 3,1	65,7	61,3 ; 70,1	Poids insuffisant	
34,9	29,2 ; 41,1	20,7	16,2 ; 25,6	x	;	x	;	Poids normal	
48,4	39,7 ; 57,4	16,8*	9,8 ; 23,9	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,212									
35,7	32,3 ; 39,4	21,8	18,7 ; 25,0	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	34,7*	18,8 ; 51,1	64,5	48,2 ; 80,8	Excès de poids	
6,9	5,3 ; 8,4	15,1	12,9 ; 17,3	3,5*	2,4 ; 4,8	74,5	71,8 ; 77,3	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
32,6	27,6 ; 37,7	14,1	10,2 ; 18,2	4,3*	2,5 ; 6,4	48,9	43,5 ; 54,7	Ensemble de la population	
P = 0,093									
Sexe									
28,1*	20,0 ; 36,6	10,0**	5,2 ; 15,8	5,2**	1,6 ; 9,7	56,8	47,3 ; 66,0	Hommes	
35,5	29,0 ; 42,3	16,7*	11,4 ; 22,1	3,8**	1,9 ; 6,1	44,0	37,2 ; 51,0	Femmes	
P = 0,375									
Groupe d'âge									
27,9**	10,8 ; 47,9	22,1**	4,1 ; 40,6	x	;	x	;	15-24 ans	
48,8	39,2 ; 58,5	13,5*	7,2 ; 20,8	x	;	x	;	25-44 ans	
26,0	19,3 ; 33,6	13,3*	8,0 ; 19,2	5,1**	2,2 ; 8,5	55,7	46,8 ; 64,0	45-64 ans	
15,6**	6,7 ; 26,2	12,2**	3,8 ; 22,7	7,8**	0,7 ; 17,0	64,4	50,9 ; 77,2	65 ans et plus	
P = 0,975									
Hommes									
x	;	x	;	x	;	47,8**	13,6 ; 84,7	15-24 ans	
45,8*	29,8 ; 62,7	11,3**	2,5 ; 22,6	x	;	x	;	25-44 ans	
17,3**	8,3 ; 29,6	9,7**	2,0 ; 19,2	5,5**	0,2 ; 13,2	67,5	52,3 ; 80,0	45-64 ans	
18,8**	4,4 ; 36,8	x	;	x	;	68,1	46,2 ; 84,4	65 ans et plus	
P = 0,840									
Femmes									
28,4**	7,0 ; 56,4	29,8**	3,5 ; 56,6	x	;	x	;	15-24 ans	
50,6	38,6 ; 62,2	14,9**	5,9 ; 25,4	x	;	x	;	25-44 ans	
31,3*	22,5 ; 41,4	15,5*	8,4 ; 23,1	4,8**	1,7 ; 8,7	48,4	38,4 ; 58,1	45-64 ans	
13,4**	2,0 ; 27,3	14,4**	1,7 ; 29,8	x	;	x	;	65 ans et plus	
P = 0,775									
Statut pondéral									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
33,9*	23,4 ; 45,6	17,7**	8,2 ; 28,3	x	;	x	;	Poids normal	
31,7	24,3 ; 39,8	11,5*	6,7 ; 16,6	5,3**	2,3 ; 9,1	51,6	43,2 ; 59,4	Embonpoint	
32,1	23,0 ; 41,2	15,6*	8,6 ; 23,4	6,0**	2,1 ; 10,8	46,3	36,2 ; 56,8	Obésité	
P = 0,987									
Hommes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
14,8**	0,7 ; 37,3	x	;	x	;	71,5*	39,0 ; 92,5	Poids normal	
30,1*	18,2 ; 42,8	8,9**	3,3 ; 15,8	5,2**	0,2 ; 12,4	55,8	41,5 ; 68,8	Embonpoint	
28,9*	16,6 ; 42,6	11,2**	2,4 ; 22,2	x	;	x	;	Obésité	
P = 0,832									
Femmes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
38,2*	26,1 ; 51,8	19,3**	8,1 ; 31,1	x	;	x	;	Poids normal	
32,8*	22,9 ; 43,5	13,3**	6,3 ; 20,8	5,3**	1,6 ; 9,8	48,5	37,7 ; 59,0	Embonpoint	
35,3*	22,7 ; 47,1	19,9**	9,5 ; 31,7	6,3**	1,5 ; 12,7	38,5*	26,6 ; 51,9	Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	88,0	85,2 ; 90,7	6,5	4,7 ; 8,6	5,4*	3,6 ; 7,6
Sexe	P = 0,001			P = 0,177					
Hommes	88,9	6,9	4,2	89,0	84,2 ; 93,6	4,3**	1,9 ; 7,3	6,7**	2,8 ; 11,2
Femmes	85,7	7,5	6,8	87,4	84,0 ; 90,5	8,0*	5,5 ; 10,8	4,6*	2,8 ; 6,7
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,932					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	85,4	73,0 ; 95,7	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	89,8	85,5 ; 93,5	6,1**	3,1 ; 9,4	4,1**	1,8 ; 7,0
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	86,9	82,4 ; 91,1	6,8*	4,2 ; 9,9	6,3**	2,8 ; 10,1
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	89,3	83,2 ; 94,8	4,4**	0,8 ; 8,9	6,3**	2,0 ; 11,2
Hommes	P = 0,121			P = 0,786					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	86,1	61,8 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	91,0	84,2 ; 96,6	x	;	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	86,1	77,3 ; 94,6	3,8**	0,1 ; 8,8	10,1**	2,1 ; 18,6
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	94,4	86,8 ; 99,9	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,791					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	85,1	69,8 ; 96,7	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	88,8	82,8 ; 93,7	6,0**	2,1 ; 10,4	5,3**	1,8 ; 9,5
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	87,4	82,4 ; 91,8	8,9*	5,2 ; 13,2	3,7**	1,5 ; 6,7
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	85,4	76,0 ; 93,9	5,6**	0,3 ; 12,1	9,0**	2,1 ; 17,4
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,013					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	93,7	89,7 ; 96,9	x	;	x	;
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	87,8	83,1 ; 92,1	7,3*	4,5 ; 10,5	4,9**	2,0 ; 8,5
Obésité	82,0	8,7	9,2	81,1	74,1 ; 87,6	6,2**	2,8 ; 10,4	12,6*	6,7 ; 18,9
Hommes	P = 0,002			P = 0,835					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	97,4	91,8 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	90,0	83,1 ; 96,3	3,9**	0,7 ; 8,0	6,1**	1,0 ; 12,3
Obésité	85,2	8,2	6,6*	82,7	72,2 ; 93,0	6,7**	1,1 ; 13,6	10,6**	1,5 ; 20,1
Femmes	P = 0,034			P = 0,024					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	92,8	88,1 ; 96,7	x	;	x	;
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	85,3	79,2 ; 90,7	11,2*	6,4 ; 16,4	3,5**	1,0 ; 6,9
Obésité	79,1	9,2	11,8	79,5	70,0 ; 87,8	5,7**	1,7 ; 10,5	14,9**	7,3 ; 23,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	5,6	4,0 ; 7,3	94,4	92,7 ; 96,0
Sexe	P = 0,024		P = 0,885			
Hommes	6,6	93,4	5,4*	2,9 ; 8,3	94,6	91,7 ; 97,1
Femmes	8,6	91,4	5,7*	3,7 ; 7,9	94,3	92,1 ; 96,3
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,075			
15-24 ans	11,2*	88,8	10,4**	2,3 ; 19,9	89,6	80,1 ; 97,7
25-44 ans	8,0	92,0	4,5**	2,0 ; 7,4	95,5	92,6 ; 98,0
45-64 ans	7,5	92,5	4,1**	2,1 ; 6,4	95,9	93,6 ; 97,9
65 ans et plus	4,9	95,1	10,1**	5,0 ; 15,9	89,9	84,1 ; 95,0
Hommes	P = 0,409		P = 0,280			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	2,9**	0,0 ; 7,1	97,1	92,9 ; 100,0
45-64 ans	7,0	93,0	5,3**	1,4 ; 10,2	94,7	89,8 ; 98,6
65 ans et plus	6,5*	93,5	12,1**	3,3 ; 22,0	87,9	78,0 ; 96,7
Femmes	P = 0,003		P = 0,219			
15-24 ans	12,3*	87,7	11,7**	0,8 ; 24,9	88,3	75,1 ; 99,2
25-44 ans	9,9	90,1	5,8**	2,1 ; 10,0	94,2	90,0 ; 97,9
45-64 ans	7,8	92,2	3,2**	1,3 ; 5,5	96,8	94,5 ; 98,7
65 ans et plus	3,8*	96,2	8,6**	2,3 ; 16,6	91,4	83,4 ; 97,7
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,267			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	5,4**	2,8 ; 8,4	94,6	91,6 ; 97,2
Embonpoint	6,6	93,4	4,6**	2,2 ; 7,3	95,4	92,7 ; 97,8
Obésité	11,3	88,7	8,3**	4,3 ; 12,9	91,7	87,1 ; 95,7
Hommes	P = 0,000		P = 0,511			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	5,2**	1,6 ; 9,5	94,8	90,5 ; 98,4
Obésité	11,5	88,5	7,3**	2,3 ; 13,6	92,7	86,4 ; 97,7
Femmes	P = 0,032		P = 0,296			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	6,1**	2,9 ; 9,6	93,9	90,4 ; 97,1
Embonpoint	8,4	91,6	3,8**	1,0 ; 7,2	96,2	92,8 ; 99,0
Obésité	11,1	88,9	9,3**	3,4 ; 16,7	90,7	83,3 ; 96,6

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 0,841					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	0,9**	0,2 ; 1,8	x	;	1,1**	0,2 ; 2,3
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	0,9**	0,3 ; 1,7	x	;	0,9**	0,1 ; 1,8
Rarement	2,8	2,6*	2,9	1,3**	0,6 ; 2,1	2,0**	0,6 ; 3,8	0,8**	0,1 ; 1,7
Jamais	94,8	94,8	94,8	96,9	95,5 ; 98,1	96,4	93,9 ; 98,5	97,3	95,5 ; 98,7
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,140					
Souvent	4,6	4,2	4,9	3,0*	1,8 ; 4,5	4,0**	1,7 ; 6,6	2,4**	1,1 ; 3,9
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	4,8*	3,4 ; 6,3	6,7*	4,0 ; 9,8	3,4*	1,9 ; 5,1
Rarement	5,1	5,5	4,9	3,3*	2,1 ; 4,7	3,1**	1,3 ; 5,4	3,5*	1,8 ; 5,4
Jamais	82,9	81,4	84,0	88,9	86,5 ; 91,0	86,2	82,0 ; 90,1	90,7	87,9 ; 93,3
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,525					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	1,4**	0,6 ; 2,3	x	;	1,8**	0,6 ; 3,1
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	5,5*	3,7 ; 7,3	x	;	6,4*	4,0 ; 9,0
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,9*	3,3 ; 6,6	5,6*	2,9 ; 8,6	4,4*	2,5 ; 6,4
Jamais	86,5	87,5	85,7	88,3	85,8 ; 90,8	89,5	85,5 ; 93,1	87,4	84,1 ; 90,7
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	0,9**	0,2 ; 1,8
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	0,4**	0,0 ; 0,9	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,9	98,2 ; 99,5	99,6	98,9 ; 100,0	98,5	97,3 ; 99,5
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	0,5**	0,1 ; 1,1	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,0	98,3 ; 99,6	99,4	98,4 ; 100,0	98,7	97,6 ; 99,6
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	1,1**	0,4 ; 1,9	x	;	1,3**	0,3 ; 2,5
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,0	96,9 ; 99,0	98,8	97,6 ; 99,8	97,4	95,8 ; 98,8
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,3	98,4 ; 99,9	99,9	99,4 ; 100,0	98,9	97,5 ; 99,8
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,2**	0,5 ; 2,1	1,2**	0,0 ; 2,7	1,2**	0,3 ; 2,4
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,1	95,7 ; 98,3	98,5	96,9 ; 99,7	96,1	93,8 ; 97,9

Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Commencer ou recommencer à fumer	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	0,4**	0,0 ; 1,0	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	99,2	98,5 ; 99,7	99,2	98,1 ; 100,0	99,2	98,2 ; 99,9
Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	0,8**	0,2 ; 1,6	x	;	1,4**	0,3 ; 2,7
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	98,8	97,9 ; 99,5	x	;	97,9	96,4 ; 99,2
Se faire vomir	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,9	99,7 ; 100,0	x	;	99,9	99,4 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
4,4*	2,9 ; 6,2	34,2	30,6 ; 38,1	45,8	41,7 ; 49,8	15,5	12,8 ; 18,6	Ensemble de la population	
P = 0,001									
7,5*	4,2 ; 11,3	40,2	33,6 ; 46,6	40,6	34,1 ; 47,3	11,7*	7,3 ; 16,4	Sexe	
2,3**	1,1 ; 3,8	30,1	25,7 ; 34,8	49,4	44,2 ; 54,3	18,2	14,5 ; 22,3	Hommes	
								Femmes	
P = 0,772									
x	;	29,7*	16,6 ; 44,5	51,8	36,0 ; 67,2	x	;	Groupe d'âge	
4,6**	1,8 ; 8,3	30,2	24,0 ; 36,4	46,7	39,9 ; 53,4	18,4	13,7 ; 23,8	15-24 ans	
4,4**	2,3 ; 7,1	36,5	30,6 ; 42,3	44,0	38,2 ; 49,9	15,1	11,0 ; 19,7	25-44 ans	
5,6**	1,4 ; 10,6	41,9	32,2 ; 52,1	44,4	35,1 ; 53,9	8,0**	2,7 ; 14,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,964									
x	;	14,6**	0,6 ; 34,5	57,2*	26,2 ; 84,3	x	;	Hommes	
7,4**	1,5 ; 14,6	37,4	26,7 ; 49,0	42,1	30,7 ; 53,6	13,1**	6,8 ; 20,4	15-24 ans	
8,4**	3,5 ; 14,3	45,3	34,7 ; 56,0	35,6	25,7 ; 45,8	10,7**	4,3 ; 18,5	25-44 ans	
x	;	47,2*	31,6 ; 63,1	42,6*	27,2 ; 57,9	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,623									
x	;	36,7**	19,0 ; 56,6	49,3*	28,6 ; 67,9	x	;	Femmes	
2,5**	0,2 ; 5,6	24,6	17,6 ; 32,1	50,3	41,6 ; 58,6	22,6*	15,8 ; 30,0	15-24 ans	
1,8**	0,2 ; 4,0	30,5	23,6 ; 37,4	49,7	42,6 ; 57,1	18,0	12,9 ; 23,8	25-44 ans	
6,1**	0,7 ; 12,7	37,8*	25,7 ; 50,8	45,9	33,6 ; 58,5	10,2**	1,3 ; 19,7	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,336									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
2,7**	1,0 ; 4,8	35,7	29,0 ; 42,6	48,8	41,5 ; 56,0	12,7*	8,6 ; 17,2	Poids insuffisant	
6,4*	3,3 ; 9,9	35,1	29,4 ; 41,1	43,5	37,4 ; 49,8	15,0*	10,6 ; 19,7	Poids normal	
3,2**	0,6 ; 6,4	30,1	22,9 ; 37,8	46,8	38,1 ; 54,7	19,9*	13,8 ; 26,6	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,828									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
5,4**	0,1 ; 12,4	46,5*	29,7 ; 62,0	x	;	x	;	Poids insuffisant	
9,2**	3,8 ; 15,4	41,1	32,2 ; 50,2	39,3	30,2 ; 48,1	10,4**	4,4 ; 17,4	Poids normal	
5,6**	0,8 ; 11,7	34,5*	24,0 ; 46,5	42,6	29,7 ; 53,7	17,4*	9,1 ; 26,9	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,737									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
2,0**	0,3 ; 4,2	32,9	25,6 ; 41,1	50,7	42,0 ; 58,3	14,4*	9,7 ; 19,6	Poids insuffisant	
3,3**	0,7 ; 6,7	28,4	21,6 ; 36,0	48,2	39,7 ; 56,6	20,1*	13,7 ; 27,4	Poids normal	
x	;	25,3*	15,9 ; 35,2	51,5	40,2 ; 63,2	x	;	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,001				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	49,1	45,1 ; 53,1	45,6	39,3 ; 52,4	51,5	46,6 ; 56,3	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	34,6	30,8 ; 38,3	31,2	25,4 ; 37,0	37,0	32,3 ; 41,7	
Non	14,4	15,3	13,7	16,3	13,6 ; 19,2	23,1	17,5 ; 28,8	11,5	8,9 ; 14,6	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,172				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	40,1	36,2 ; 44,0	36,3	30,1 ; 42,4	42,8	37,9 ; 47,7	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	40,2	36,3 ; 44,0	41,0	34,8 ; 47,4	39,6	34,7 ; 44,4	
Non	19,6	22,6	17,4	19,7	16,4 ; 23,2	22,7	17,4 ; 28,3	17,6	13,5 ; 21,9	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,008				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	43,9	39,8 ; 47,9	37,3	30,6 ; 43,5	48,5	43,4 ; 53,5	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	29,0	25,6 ; 32,7	29,9	24,2 ; 35,9	28,4	24,1 ; 33,1	
Non	27,7	32,4	24,3	27,1	23,7 ; 30,5	32,8	26,9 ; 38,7	23,1	18,9 ; 27,2	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,113				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	44,9	41,0 ; 48,7	39,7	33,6 ; 46,2	48,4	43,4 ; 53,4	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	29,2	25,6 ; 32,9	32,0	26,1 ; 38,3	27,3	22,8 ; 31,7	
Non	26,1	27,4	25,1	25,9	22,6 ; 29,2	28,3	22,6 ; 33,7	24,3	20,1 ; 28,7	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	63,1	59,5 ; 66,6	50,4	43,4 ; 56,6	72,0	67,6 ; 76,4	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	19,8	16,9 ; 22,6	25,7	20,6 ; 31,1	15,8	12,3 ; 19,3	
Non	17,4	18,5	16,6	17,1	14,2 ; 20,1	24,0	18,4 ; 30,2	12,2	9,3 ; 15,4	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	65,0	61,2 ; 68,7	51,7	45,2 ; 58,3	74,1	69,7 ; 78,5	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	22,7	19,4 ; 26,0	31,2	25,2 ; 37,3	16,8	13,2 ; 20,5	
Non	12,6	14,0	11,6	12,4	9,9 ; 15,0	17,1	12,6 ; 22,2	9,1*	6,3 ; 12,1	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	50,7	46,7 ; 54,5	42,1	35,4 ; 48,6	56,7	51,8 ; 61,6	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	29,5	25,9 ; 33,0	31,6	25,4 ; 38,1	28,0	23,7 ; 32,5	
Non	21,5	24,4	19,4	19,9	16,8 ; 23,0	26,4	20,8 ; 32,1	15,4	12,0 ; 19,2	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,926				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	12,2	9,8 ; 15,0	11,7*	7,6 ; 16,2	12,6	9,6 ; 15,8	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	14,8	12,0 ; 17,7	14,5*	10,5 ; 19,3	15,0	11,6 ; 18,9	
Non	72,0	67,3	75,4	73,0	69,5 ; 76,3	73,8	68,1 ; 78,9	72,5	67,8 ; 76,7	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,178				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	34,6	30,7 ; 38,5	36,2	30,0 ; 42,7	33,5	28,8 ; 38,1	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	17,0	14,3 ; 20,0	19,5	14,7 ; 25,0	15,3	11,9 ; 18,7	
Non	49,9	43,2	54,7	48,4	44,5 ; 52,2	44,3	38,1 ; 50,8	51,3	46,5 ; 56,1	



Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,044				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	54,8	50,8 ; 58,9	49,0	42,7 ; 55,5	58,9	54,1 ; 63,7	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	15,8	13,1 ; 19,0	18,3	13,7 ; 23,4	14,1	10,4 ; 18,0	
Non	29,6	28,8	30,2	29,4	25,7 ; 32,9	32,8	26,4 ; 38,8	27,0	22,8 ; 31,3	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	38,6	35,0 ; 42,7	27,5	21,7 ; 33,4	46,5	41,7 ; 51,4	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	14,1	11,5 ; 17,0	16,9	12,4 ; 22,0	12,2	9,2 ; 15,4	
Non	48,5	52,0	45,9	47,2	43,2 ; 51,2	55,6	49,2 ; 61,8	41,4	36,4 ; 46,4	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,006				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	34,2	30,3 ; 38,0	31,2	25,2 ; 37,4	36,4	31,4 ; 41,2	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	27,4	23,9 ; 30,9	34,2	27,9 ; 40,3	22,7	18,8 ; 26,9	
Non	37,5	34,7	39,5	38,3	34,6 ; 41,9	34,6	28,8 ; 40,6	40,9	36,2 ; 45,8	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
56,3	54,1 ; 58,4	32,3	30,2 ; 34,4	11,4	10,0 ; 13,0	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
50,3	47,0 ; 53,5	34,3	31,1 ; 37,6	15,4	13,1 ; 18,0	Hommes
62,4	59,3 ; 65,5	30,2	27,4 ; 33,2	7,4	5,7 ; 9,1	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
62,2	48,9 ; 74,5	14,5**	5,5 ; 24,3	23,4*	13,0 ; 35,3	15-17 ans
34,1	25,8 ; 42,6	32,0	24,1 ; 40,4	33,9	26,1 ; 41,6	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
43,2	35,8 ; 50,2	26,3	20,3 ; 32,8	30,5	24,3 ; 36,9	25-44 ans
37,6	33,7 ; 41,5	46,8	42,5 ; 51,0	15,6	12,8 ; 18,5	45-64 ans
63,1	59,5 ; 66,5	33,2	29,7 ; 36,9	3,7*	2,3 ; 5,4	65 ans et plus
95,8	93,8 ; 97,5	3,3*	1,9 ; 5,0	1,0**	0,1 ; 2,1	
		P = 0,000				Hommes
64,3	46,4 ; 79,7	13,8**	1,8 ; 28,4	21,9**	9,2 ; 37,9	15-17 ans
31,7*	20,3 ; 43,5	27,3*	17,2 ; 38,4	41,0	29,4 ; 52,2	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
42,6	32,7 ; 52,6	22,8*	14,7 ; 31,6	34,6	25,4 ; 43,6	25-44 ans
33,9	28,1 ; 39,6	43,5	37,4 ; 49,9	22,6	17,8 ; 27,5	45-64 ans
53,6	47,9 ; 59,5	40,7	34,9 ; 46,6	5,6**	3,0 ; 8,7	65 ans et plus
94,1	90,1 ; 97,1	x	;	x	;	
		P = 0,000				Femmes
59,7*	37,7 ; 80,0	15,2**	2,2 ; 31,9	25,1**	7,9 ; 45,0	15-17 ans
36,6*	23,8 ; 49,8	36,7*	24,6 ; 49,8	26,7*	16,3 ; 37,9	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
43,8	32,6 ; 54,1	30,0*	20,6 ; 40,7	26,2*	17,3 ; 35,3	25-44 ans
41,7	36,0 ; 47,7	50,4	44,1 ; 56,2	8,0*	5,1 ; 11,3	45-64 ans
72,5	67,8 ; 77,0	25,6	21,4 ; 30,3	1,8**	0,8 ; 3,1	65 ans et plus
97,1	95,2 ; 98,7	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	42,4	40,3 ; 44,6	48,4	45,2 ; 51,6	36,3	33,2 ; 39,3
Non	56,1	49,9	62,1	57,6	55,4 ; 59,7	51,6	48,4 ; 54,8	63,7	60,7 ; 66,8
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	9,7	8,2 ; 11,2	14,2	11,7 ; 16,7	5,1	3,7 ; 6,6
Non	89,4	85,6	93,2	90,3	88,8 ; 91,8	85,8	83,3 ; 88,3	94,9	93,4 ; 96,3
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Oui	7,3	9,1	5,5	7,7	6,4 ; 9,0	9,7	7,6 ; 11,9	5,7	4,2 ; 7,3
Non	92,7	90,9	94,5	92,3	91,0 ; 93,6	90,3	88,1 ; 92,4	94,3	92,7 ; 95,8
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,557					
Oui	5,1	6,3	3,9	3,9	2,9 ; 4,9	4,2*	2,8 ; 5,7	3,6*	2,3 ; 5,1
Non	94,9	93,7	96,1	96,1	95,1 ; 97,1	95,8	94,3 ; 97,2	96,4	94,9 ; 97,7
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	12,3	16,1	8,7	11,7	10,2 ; 13,3	16,1	13,8 ; 18,8	7,2	5,7 ; 8,8
Non	87,7	83,9	91,3	88,3	86,7 ; 89,8	83,9	81,2 ; 86,2	92,8	91,2 ; 94,3
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = .					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	x	;	x	;	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	x	;	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,6**	0,2 ; 0,9	1,0**	0,3 ; 1,7	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,4	99,1 ; 99,8	99,0	98,3 ; 99,7	x	;
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,094					
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,6**	0,3 ; 1,1	1,0**	0,3 ; 1,8	x	;
Non	99,2	98,8	99,7	99,4	98,9 ; 99,7	99,0	98,2 ; 99,7	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,438					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,6*	1,1 ; 2,2	1,9*	1,1 ; 2,8	1,4*	0,7 ; 2,1
Non	98,2	98,1	98,4	98,4	97,8 ; 98,9	98,1	97,2 ; 98,9	98,6	97,9 ; 99,3
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,010					
Oui	1,6	2,3	0,9	1,5*	1,0 ; 2,1	2,3*	1,3 ; 3,3	0,7**	0,3 ; 1,3
Non	98,4	97,7	99,1	98,5	97,9 ; 99,0	97,7	96,7 ; 98,7	99,3	98,7 ; 99,7
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,462					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,2**	0,1 ; 0,4	0,3**	0,0 ; 0,6	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,8	99,6 ; 99,9	99,7	99,4 ; 100,0	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,2	16,2	8,3	10,6	9,2 ; 12,0	14,6	12,3 ; 17,1	6,4	4,9 ; 8,1
Non	87,8	83,8	91,7	89,4	88,0 ; 90,8	85,4	82,9 ; 87,7	93,6	91,9 ; 95,1
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,003			
Oui	1,6	2,3	0,8	2,4*	1,6 ; 3,2	3,6*	2,3 ; 5	1,1**	0,5 ; 1,9
Non	98,4	97,7	99,2	97,6	96,8 ; 98,4	96,4	95,0 ; 97,7	98,9	98,1 ; 99,5
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,461			
Oui	1,8	2,4	1,3	2,3*	1,6 ; 3,1	2,6*	1,6 ; 3,8	2,0**	1,1 ; 3,1
Non	98,2	97,6	98,7	97,7	96,9 ; 98,4	97,4	96,2 ; 98,4	98,0	96,9 ; 98,9
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,330			
Oui	1,4	1,7	1,0	1,2**	0,6 ; 1,7	1,5**	0,6 ; 2,4	0,8**	0,2 ; 1,6
Non	98,6	98,3	99,0	98,8	98,3 ; 99,4	98,5	97,6 ; 99,4	99,2	98,4 ; 99,8
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = .			
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,3**	0,1 ; 0,6	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;
Non	99,2	98,8	99,6	99,7	99,4 ; 99,9	99,4	98,8 ; 99,9	x	;
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = .			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = .			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,501			
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,3**	0,1 ; 0,6	0,4**	0,0 ; 0,9	x	;
Non	99,6	99,6	99,7	99,7	99,4 ; 99,9	99,6	99,1 ; 100,0	x	;
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = .			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	11,4	10,0 ; 13,0	15,4	13,1 ; 18,0	7,4	5,7 ; 9,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	23,4*	13,0 ; 35,3	21,9**	9,2 ; 37,9	25,1**	7,9 ; 45,0
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	33,9	26,1 ; 41,6	41,0	29,4 ; 52,2	26,7*	16,3 ; 37,9
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	15,6	12,8 ; 18,5	22,6	17,8 ; 27,5	8,0*	5,1 ; 11,3
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	3,7*	2,3 ; 5,4	5,6**	3,0 ; 8,7	1,8**	0,8 ; 3,1
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	1,0**	0,1 ; 2,1	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	26,6	24,6 ; 28,7	8,0	6,7 ; 9,4	9,2	7,9 ; 10,7
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	27,1	24,2 ; 30,2	10,4	8,2 ; 12,7	12,5	10,2 ; 15,0
Femmes	25,4	6,8	7,4	26,0	23,3 ; 29,1	5,6	4,1 ; 7,3	5,9	4,4 ; 7,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	19,5*	10,5 ; 30,4	8,4**	1,2 ; 17,6	9,9**	2,5 ; 18,9
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	31,8	24,0 ; 39,7	13,3*	7,6 ; 19,5	20,9*	14,3 ; 27,9
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	27,8	21,8 ; 34,2	11,7*	7,2 ; 16,6	17,4*	12,2 ; 23,0
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	36,4	32,3 ; 40,4	12,5	9,7 ; 15,4	13,5	10,8 ; 16,5
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	26,3	23,1 ; 29,8	5,3*	3,7 ; 7,2	5,5*	3,9 ; 7,3
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	3,4*	1,9 ; 5,2	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,183					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	24,5**	11,6 ; 40,8	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	32,7*	22,3 ; 44,1	12,1**	5,3 ; 20,2	23,7*	13,5 ; 34,4
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	30,0	21,5 ; 39,0	9,7**	4,3 ; 15,4	18,0*	10,5 ; 25,5
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	31,2	25,8 ; 36,7	15,2*	10,7 ; 20,0	19,8	15,2 ; 24,7
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	29,6	24,4 ; 35,0	9,5*	6,5 ; 13,0	7,7*	4,9 ; 10,9
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	5,0**	2,2 ; 8,6	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,002					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	13,9**	2,1 ; 29,6	x	;	13,8**	1,6 ; 30,8
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	30,9*	19,6 ; 43,3	14,4**	5,9 ; 24,4	18,1*	9,2 ; 28,6
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	25,6*	17,0 ; 35,5	13,8**	6,4 ; 22,0	16,8*	9,6 ; 25,3
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	42,1	36,2 ; 48,0	9,6*	6,3 ; 13,0	6,6*	4,0 ; 9,5
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	23,0	18,9 ; 27,8	1,2**	0,3 ; 2,2	3,3**	1,8 ; 5,2
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	2,2**	0,9 ; 3,7	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	80,6	78,9 ; 82,2	83,2	80,9 ; 85,6	77,9	75,5 ; 80,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	42,8*	29,6 ; 56,3	40,5*	21,7 ; 58,0	45,3*	24,5 ; 67,9
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	82,9	75,5 ; 89,5	80,7	70,2 ; 90,5	85,1	74,5 ; 94,1
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	70,1	63,5 ; 76,9	67,4	58,0 ; 77,0	72,9	62,6 ; 83,1
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	96,6	95,1 ; 98,0	95,6	93,0 ; 97,9	97,7	96,1 ; 99,1
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	84,8	82,2 ; 87,0	87,6	84,0 ; 91,0	81,8	78,3 ; 84,9
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	64,4	60,5 ; 67,9	69,6	64,1 ; 74,7	59,1	53,8 ; 64,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	85,7	82,3 ; 88,7	88,1	83,9 ; 91,8	82,7	77,3 ; 87,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	89,0	86,1 ; 91,8	90,1	85,7 ; 94,4	88,0	83,8 ; 91,8
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	88,2	84,5 ; 91,5	88,7	82,6 ; 94,1	87,7	83,0 ; 91,7
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	91,6	90,1 ; 93,0	89,7	87,3 ; 91,8	93,8	91,8 ; 95,6
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	6,9	5,5 ; 8,3	8,3	6,4 ; 10,5	5,3*	3,6 ; 7,1
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,5*	0,9 ; 2,2	2,1*	1,1 ; 3,2	0,9**	0,2 ; 1,8
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	47,9	46,8 ; 49,1	0,7**	0,1 ; 1,5	99,0	98,2 ; 99,7
Femmes	51,5	97,5	0,8	51,7	50,6 ; 52,8	99,2	98,4 ; 99,8	x	;
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,4**	0,1 ; 0,7	x	;	0,6**	0,1 ; 1,3

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	91,6	90,1 ; 93,0	6,9	5,5 ; 8,3	1,5*	0,9 ; 2,2
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,042					
Hommes	86,4	10,7	2,9	89,7	87,3 ; 91,8	8,3	6,4 ; 10,5	2,1*	1,1 ; 3,2
Femmes	91,6	7,4	0,9*	93,8	91,8 ; 95,6	5,3*	3,6 ; 7,1	0,9**	0,2 ; 1,8
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,116					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	76,6	57,7 ; 92,2	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	74,0	64,9 ; 82,8	19,6*	11,9 ; 27,9	6,5**	1,9 ; 11,9
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	74,5	66,6 ; 82,2	19,2*	12,4 ; 26,5	6,3**	2,4 ; 11,1
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	91,9	89,5 ; 94,0	7,1*	5,1 ; 9,4	1,0**	0,3 ; 1,8
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	95,8	94,1 ; 97,3	3,6*	2,2 ; 5,1	0,6**	0,0 ; 1,3
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	98,0	95,7 ; 99,7	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	x	;	76,3**	12,6 ; 100,0	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	90,2	87,9 ; 92,4	7,8	5,9 ; 9,9	2,0**	1,0 ; 3,1
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,413					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	94,4	92,4 ; 96,1	4,9*	3,3 ; 6,8	0,7**	0,0 ; 1,6
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	48,9	45,6 ; 52,3	65,1	61,0 ; 69,5
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000		...	
15-24 ans	87,9	...	85,9	76,9 ; 94,2	...	;
25-44 ans	62,4	...	63,1	56,9 ; 69,3	...	;
45-64 ans	29,9	...	32,8	27,1 ; 38,5	...	;
65 ans et plus	7,3	...	8,7**	3,6 ; 14,5	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...		P = 0,000	
15-24 ans	...	90,0	...	;	89,4	82,2 ; 95,3
25-34 ans	...	71,0	...	;	69,1	61,0 ; 76,6
35-49 ans	...	53,5	...	;	52,0	45,2 ; 58,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,000		P = 0,795	
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	37,8	31,6 ; 44,4	60,2	47,7 ; 71,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	59,0	52,2 ; 65,5	65,1	55,8 ; 73,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	54,4	47,6 ; 62,0	65,2	57,7 ; 72,9
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	39,1	29,3 ; 49,2	68,0	58,4 ; 77,6
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,053	
Un partenaire	43,8	64,2	46,2	42,6 ; 50,0	63,4	59,0 ; 68,1
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	71,3	58,5 ; 83,5	84,4	69,5 ; 95,7
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	83,8	62,5 ; 98,7	77,5*	26,0 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = .		P = 0,307	
Hommes	x	66,6	x	;	65,3	61,2 ; 69,8
Femmes	47,8	x	49,0	45,6 ; 52,4	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	9,3	7,9 ; 10,9	14,5	12,6 ; 16,3	76,2	74,0 ; 78,3
Sexe	P = 0,093			P = 0,209					
Hommes	14,8	14,9	70,3	10,7	8,5 ; 13,2	14,6	11,9 ; 17,3	74,7	71,6 ; 77,6
Femmes	13,2	14,7	72,1	7,9	5,9 ; 10,0	14,3	11,7 ; 16,9	77,8	74,8 ; 80,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	51,4*	31,1 ; 73,9	x	;	x	;
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	19,3*	12,5 ; 27,0	42,3	32,2 ; 51,3	38,5	29,5 ; 48,2
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	25,3	18,6 ; 32,6	41,6	32,8 ; 50,0	33,1	25,2 ; 41,6
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	11,9	9,2 ; 14,9	18,0	14,8 ; 21,5	70,1	66,0 ; 73,8
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	3,1*	1,9 ; 4,5	4,6*	3,1 ; 6,4	92,2	90,0 ; 94,2
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	1,7**	0,2 ; 3,7	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,101					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	12,1	8,6 ; 15,7	10,7*	7,3 ; 14,2	77,2	72,9 ; 81,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	8,6*	6,0 ; 11,8	17,2	13,1 ; 21,2	74,3	69,8 ; 78,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	8,5*	5,9 ; 11,4	16,4	12,8 ; 20,3	75,0	70,4 ; 79,2
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	8,4*	4,9 ; 12,3	11,9*	8,1 ; 16,2	79,7	74,4 ; 84,8
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	8,0	6,5 ; 9,5	10,5	8,7 ; 12,2	81,5	79,4 ; 83,7
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	24,4*	16,2 ; 33,5	55,2	44,5 ; 65,3	20,3*	12,9 ; 29,0
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	20,7**	2,3 ; 42,2	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	14,3	12,7 ; 16,2	16,4	13,8 ; 19,3	12,1	9,8 ; 14,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	71,0	51,0 ; 91,5	97,6	87,4 ; 100,0	46,5**	20,2 ; 82,2
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	31,1	22,9 ; 40,2	40,5*	27,5 ; 53,9	22,1**	11,4 ; 34,8
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	38,5	30,8 ; 47,0	51,1	39,2 ; 63,2	26,8*	16,8 ; 38,0
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	18,8	15,7 ; 22,1	21,7	17,0 ; 27,1	15,7	11,6 ; 19,9
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	4,4*	3,0 ; 6,1	3,4*	1,7 ; 5,2	5,6**	3,0 ; 8,6
	3,1*	3,9*	1,8**	2,3**	0,5 ; 4,4	3,8**	0,7 ; 7,8	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,690		P = 0,272		P = 0,921	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	15,9	11,9 ; 19,9	19,4*	13,4 ; 25,4	11,6*	7,0 ; 16,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	14,0	10,4 ; 17,6	15,4*	10,4 ; 20,5	12,2*	7,3 ; 17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	14,9	11,5 ; 18,8	18,5*	12,8 ; 24,6	11,5*	7,5 ; 16,2
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	12,4*	8,3 ; 16,7	11,0**	4,8 ; 17,8	13,8*	8,1 ; 19,8
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	11,2	9,5 ; 13,1	12,6	10,0 ; 15,4	9,7	7,5 ; 12,1
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	45,7	35,7 ; 56,5	45,0	31,5 ; 58,1	47,0*	30,9 ; 65,1
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	61,0*	36,5 ; 85,8	61,9*	32,0 ; 90,8	58,5**	8,8 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,181		P = 0,000	
Hommes	18,7	54,0	17,9	12,0	9,7 ; 14,6	54,7**	0,0 ; 98,9	11,7	9,4 ; 14,3
Femmes	19,2	19,2	x	16,2	13,7 ; 19,2	16,2	13,7 ; 19,2	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	7,1	5,9 ; 8,4	6,3	4,8 ; 8,1	7,9	6,1 ; 9,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,009		P = 0,026	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	3,8**	0,8 ; 7,2	x	;	7,7**	1,6 ; 14,9
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,009		P = 0,042	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	4,9**	1,5 ; 9,1	x	;	9,9**	3,0 ; 18,2
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	11,1	8,5 ; 13,9	10,3*	6,8 ; 14,5	11,9*	8,2 ; 15,8
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	6,4	4,7 ; 8,4	6,7*	4,2 ; 9,8	6,0*	3,7 ; 8,9
	2,7	3,2*	2,2	1,9**	0,7 ; 3,5	x	;	2,7**	0,7 ; 5,4
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,007		P = 0,539		P = 0,015	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	4,3*	2,6 ; 6,2	5,1**	2,4 ; 8,3	3,4**	1,4 ; 5,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	7,7*	5,3 ; 10,3	6,9*	4,1 ; 10,5	8,6*	4,7 ; 13,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	6,9*	4,7 ; 9,2	5,4**	2,5 ; 8,8	8,2*	5,0 ; 12,0
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	11,0*	7,5 ; 14,9	8,6**	3,9 ; 14,1	13,2*	8,1 ; 19,1
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,003		P = 0,081	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	6,4	5,1 ; 7,9	5,2*	3,7 ; 7,1	7,6	5,6 ; 9,8
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	17,7*	9,8 ; 26,3	18,0**	7,3 ; 29,5	17,1**	5,0 ; 31,5
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	21,6**	3,4 ; 42,3	x	;	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,045		P = 0,000		P = 0,054	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	8,1	6,0 ; 10,3	x	;	8,1	6,1 ; 10,4
Femmes	7,0	7,0	8,9**	6,5	4,8 ; 8,6	6,6	4,8 ; 8,6	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,298		P = .		P = 0,026	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	x	;	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	7,2	6,0 ; 8,5	6,4	4,8 ; 8,3	8,0	6,1 ; 9,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	29,0*	20,4 ; 38,0	71,0	62,0 ; 79,6
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,102			
15-35 ans	25,6	74,4	31,4*	21,9 ; 40,9	68,6	59,1 ; 78,1
36-49 ans	10,5*	89,5	11,0**	0,3 ; 29,1	89,0	70,9 ; 99,7
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,014			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	59,4*	32,3 ; 84,2	40,6**	15,8 ; 67,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	42,3**	21,4 ; 64,5	57,7*	35,5 ; 78,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	13,8**	4,7 ; 24,4	86,2	75,6 ; 95,3
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	19,3**	3,8 ; 37,7	80,7	62,3 ; 96,2
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	29,4*	20,7 ; 38,5	70,6	61,5 ; 79,3
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	72,8	69,9 ; 75,5	14,2	12,1 ; 16,2	13,1	10,7 ; 15,5
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,011					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	71,3	58,9 ; 82,8	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	83,4	79,3 ; 87,4	6,5*	4,0 ; 9,2	10,1*	6,9 ; 13,6
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	65,5	61,4 ; 69,5	22,9	19,4 ; 26,4	11,6	8,6 ; 14,7
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	61,3	54,6 ; 67,8	22,2	17,1 ; 27,6	16,5*	10,9 ; 22,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	67,2	60,1 ; 74,2	14,9	10,4 ; 19,6	17,9*	12,3 ; 24,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	76,7	71,1 ; 82,0	11,6	8,2 ; 15,4	11,6*	7,3 ; 16,4
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	85,7	80,0 ; 90,7	8,7*	4,9 ; 13,6	5,6**	2,6 ; 9,3
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,905					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	72,6	69,7 ; 75,4	14,4	12,4 ; 16,5	13,0	10,6 ; 15,5
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	77,7*	44,8 ; 100,0	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 13

**LAVAL**

---





## 1

## CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population		49,4	50,6			48,8	48,8 ; 48,8	51,2	51,2 ; 51,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	15,9	15,9 ; 16,0	16,7	16,6 ; 16,7	15,2	15,2 ; 15,3
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	33,5	33,5 ; 33,5	34,2	34,2 ; 34,3	32,8	32,7 ; 32,8
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	33,7	33,7 ; 33,7	33,8	33,7 ; 33,9	33,6	33,5 ; 33,6
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	16,9	16,9 ; 16,9	15,3	15,2 ; 15,4	18,4	18,4 ; 18,5
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	13,4	10,7	16,0	10,6	9,6 ; 11,7	7,3	6,0 ; 8,8	13,8	12,3 ; 15,4
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	23,5	21,8 ; 25,2	24,7	22,0 ; 27,3	22,4	20,2 ; 24,8
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	49,8	47,3 ; 52,0	54,3	50,6 ; 57,7	45,5	42,0 ; 48,6
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	8,2	6,9 ; 9,6	6,7	4,8 ; 8,9	9,5	7,7 ; 11,6
Autre	6,7	6,5	6,9	7,9	6,2 ; 9,7	7,0*	4,7 ; 9,5	8,8	6,5 ; 11,6
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,256			P = 0,577					
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	76,8	74,7 ; 79,2	77,2	73,9 ; 80,6	76,5	73,4 ; 79,6
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	2,2*	1,4 ; 3,1	2,6**	1,3 ; 4,1	1,8**	0,8 ; 3,0
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	20,9	18,9 ; 23,1	20,2	17,1 ; 23,4	21,7	18,8 ; 24,6
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,912			P = 0,596					
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	78,5	76,5 ; 80,6	78,9	75,6 ; 82,0	78,2	75,2 ; 81,1
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	11,9	10,2 ; 13,6	12,4	9,7 ; 15,0	11,4	9,0 ; 13,8
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	9,6	7,9 ; 11,2	8,8	6,4 ; 11,1	10,4	8,0 ; 12,8
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,683			P = 0,068					
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	19,4	17,5 ; 21,3	19,8	16,8 ; 22,8	19,0	16,6 ; 21,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	27,2	25,0 ; 29,5	24,3	21,3 ; 27,6	29,9	26,7 ; 33,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	25,9	23,6 ; 28,3	26,1	22,7 ; 29,5	25,7	22,6 ; 28,8
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	27,6	25,4 ; 29,8	29,8	26,4 ; 33,3	25,4	22,5 ; 28,4
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	20,4	18,3 ; 22,5	15,7	12,9 ; 18,6	24,8	21,8 ; 27,8
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	22,2	20,1 ; 24,3	19,6	16,5 ; 22,6	24,7	21,7 ; 27,6
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	20,0	17,9 ; 22,1	21,2	18,1 ; 24,5	18,9	16,2 ; 21,7
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	22,7	20,4 ; 24,9	25,9	22,5 ; 29,5	19,6	16,8 ; 22,7
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	14,7	13,0 ; 16,5	17,5	14,7 ; 20,2	12,1	9,9 ; 14,4
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,089					
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	36,0	33,3 ; 38,4	39,1	35,2 ; 42,9	33,0	29,5 ; 36,2
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	53,5	51,0 ; 56,2	51,0	47,0 ; 55,1	55,9	52,6 ; 59,4
Pauvre	9,4	8,9	9,9	9,1	7,6 ; 10,7	8,2	6,1 ; 10,6	9,9	7,9 ; 12,0
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,4*	0,8 ; 2,1	1,7**	0,7 ; 2,8	1,2**	0,5 ; 2,0
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	61,0	59,2 ; 62,8	66,2	63,6 ; 68,8	56,0	53,4 ; 58,6
Étudiants	13,1	13,0	13,2	13,8	12,4 ; 15,1	13,8	11,7 ; 15,9	13,7	11,9 ; 15,6
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	5,9	4,8 ; 7,1	1,8**	0,8 ; 3,0	9,9	7,9 ; 11,9
Retraités	19,6	18,0	21,1	19,3	18,3 ; 20,3	18,2	16,6 ; 19,8	20,4	18,9 ; 21,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	56,9	54,3 ; 59,3	33,5	31,2 ; 36,0	9,6	8,2 ; 11,0
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,019					
Hommes	56,6	33,5	9,9	58,7	54,9 ; 62,4	33,9	30,3 ; 37,6	7,4	5,7 ; 9,3
Femmes	55,5	32,8	11,7	55,2	51,6 ; 58,4	33,1	30,1 ; 36,5	11,7	9,6 ; 13,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	63,0	55,0 ; 70,5	32,3	25,2 ; 39,8	4,7**	1,2 ; 8,5
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	65,2	60,8 ; 69,6	30,3	26,1 ; 34,8	4,5*	2,8 ; 6,4
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	52,2	47,9 ; 56,4	37,5	33,3 ; 41,7	10,3	7,9 ; 12,8
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	43,3	37,8 ; 48,9	32,9	28,3 ; 38,2	23,7	19,1 ; 28,3
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	46,0	41,1 ; 51,1	31,9	27,5 ; 36,7	22,1	17,9 ; 26,2
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	55,9	51,3 ; 60,6	30,9	26,7 ; 35,2	13,2	10,0 ; 16,5
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	61,1	57,1 ; 64,9	34,4	30,8 ; 38,4	4,5*	2,8 ; 6,3
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	57,0	47,9 ; 65,6	34,5	25,9 ; 43,2	8,5**	3,9 ; 14,4
Autre	46,0	39,4	14,6	51,1	39,5 ; 62,6	34,8*	24,3 ; 45,8	14,1**	6,5 ; 22,2
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	43,7	37,3 ; 49,4	35,9	30,5 ; 41,7	20,4	16,0 ; 25,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	52,5	47,4 ; 57,7	37,8	32,9 ; 42,6	9,8	7,0 ; 12,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	61,0	55,9 ; 66,1	32,0	27,2 ; 37,0	7,0*	4,5 ; 9,7
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	66,2	61,6 ; 70,9	29,2	24,7 ; 33,6	4,6*	2,7 ; 6,8
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	42,2	36,5 ; 48,3	37,1	31,7 ; 42,3	20,7	16,3 ; 25,0
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	61,0	58,1 ; 63,8	32,3	29,7 ; 35,2	6,7	5,4 ; 8,1
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	27,2	20,1 ; 34,9	45,9	37,4 ; 54,2	26,9	20,2 ; 33,9
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	60,6	57,9 ; 63,2	31,8	29,4 ; 34,5	7,5	6,2 ; 8,9
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	61,6	58,3 ; 64,9	32,6	29,5 ; 35,7	5,8	4,3 ; 7,4
Étudiants	62,7	32,2	5,0	63,0	54,3 ; 71,0	32,1	24,5 ; 40,2	4,9**	1,4 ; 8,9
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	33,2	23,7 ; 43,5	44,2	33,8 ; 55,3	22,6*	14,0 ; 31,7
Retraités	40,2	39,5	20,4	44,9	39,8 ; 49,8	34,3	29,7 ; 38,9	20,8	16,5 ; 24,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	56,9	54,3 ; 59,3	33,5	31,2 ; 36,0	9,6	8,2 ; 11,0
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	47,5	42,0 ; 53,3	37,9	32,7 ; 43,3	14,5	10,7 ; 18,5
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	59,5	56,7 ; 62,3	32,2	29,6 ; 34,9	8,3	6,9 ; 9,8
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,008					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	48,8*	27,8 ; 69,1	34,4**	17,0 ; 55,4	16,7**	2,9 ; 33,3
Poids normal	62,6	29,4	8,0	64,2	60,4 ; 67,9	28,8	25,2 ; 32,4	7,0	5,2 ; 8,9
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	51,0	47,5 ; 54,5	37,2	33,8 ; 40,6	11,8	9,7 ; 14,0
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	64,4	60,7 ; 68,0	28,5	25,2 ; 32,1	7,1	5,3 ; 9,0
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	52,5	48,6 ; 56,5	37,9	34,1 ; 41,7	9,5	7,5 ; 11,8
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	35,7	26,7 ; 44,7	36,5	27,4 ; 45,4	27,9	20,1 ; 36,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	44,6	39,0 ; 50,0	37,5	32,5 ; 42,7	17,9	14,3 ; 22,0
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	61,6	58,7 ; 64,4	31,6	29,0 ; 34,6	6,7	5,4 ; 8,1

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	47,8	45,1 ; 50,4	45,2	42,5 ; 47,7	7,0	5,9 ; 8,4
<b>Sexe</b>		<b>P = 0,097</b>					<b>P = 0,233</b>		
Hommes	47,5	46,6	6,0	49,2	45,3 ; 53,1	44,8	40,9 ; 48,7	6,0	4,2 ; 7,9
Femmes	47,1	45,9	7,0	46,4	42,9 ; 50,0	45,5	41,9 ; 48,9	8,0	6,4 ; 9,9
<b>Groupe d'âge</b>		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,264</b>		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	51,1	43,3 ; 59,0	x	;	x	;
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	44,9	40,3 ; 49,7	47,0	42,3 ; 51,6	8,2	5,9 ; 10,7
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	45,7	41,3 ; 50,1	46,0	41,6 ; 50,3	8,3	6,2 ; 10,6
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	55,0	49,6 ; 60,1	38,3	33,3 ; 43,5	6,7*	4,5 ; 9,2
<b>Composition du ménage</b>		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,000</b>		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	36,8	31,9 ; 41,8	46,3	41,2 ; 51,3	17,0	13,3 ; 20,9
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	55,3	50,6 ; 59,9	39,7	35,4 ; 44,2	5,0*	2,9 ; 7,3
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	47,9	43,8 ; 52,3	46,5	42,3 ; 50,5	5,6*	3,7 ; 7,5
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	40,4	31,7 ; 49,5	50,5	41,3 ; 59,4	9,1**	4,6 ; 14,4
Autre	44,5	46,1	9,4*	45,1	33,0 ; 57,4	47,7	35,4 ; 59,4	7,2**	2,0 ; 13,3
<b>Niveau de scolarité</b>		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,799</b>		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	51,1	44,7 ; 57,1	41,4	35,3 ; 47,6	7,5*	4,8 ; 10,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	47,1	41,9 ; 52,3	45,5	40,4 ; 50,7	7,4*	5,1 ; 9,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	45,5	40,3 ; 50,9	47,9	42,6 ; 53,0	6,5*	4,2 ; 8,9
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	47,6	43,0 ; 52,7	45,7	40,5 ; 50,1	6,7*	4,3 ; 9,4
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,000</b>		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	40,1	34,6 ; 45,7	45,9	40,1 ; 51,8	14,0	10,2 ; 18,0
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	49,0	46,1 ; 52,2	45,6	42,5 ; 48,5	5,3	4,1 ; 6,7
<b>Perception de sa situation financière</b>		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,000</b>		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	34,9	26,5 ; 43,1	43,2	35,4 ; 51,5	21,9*	15,6 ; 29,3
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	49,3	46,6 ; 52,2	45,4	42,6 ; 48,1	5,2	4,1 ; 6,4
<b>Occupation principale</b>		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,350</b>		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	45,8	42,5 ; 49,2	46,8	43,3 ; 50,0	7,4	5,9 ; 9,2
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	52,5	44,4 ; 61,1	45,9	37,5 ; 54,1	x	;
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	31,4*	21,4 ; 41,7	51,5	40,7 ; 62,3	17,1*	9,4 ; 26,0
Retraités	51,9	42,8	5,3	55,2	50,1 ; 60,1	38,8	33,8 ; 43,7	6,1*	4,1 ; 8,2
<b>Perception de l'état de santé</b>		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,000</b>		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	54,0	50,5 ; 57,7	41,6	38,0 ; 45,2	4,4*	3,0 ; 5,9
Bon	40,5	52,6	6,9	40,9	36,2 ; 45,5	51,5	46,9 ; 55,9	7,7	5,5 ; 10,0
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	35,0	27,4 ; 42,2	44,8	36,9 ; 52,5	20,2	14,6 ; 26,3
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,000</b>		
Élevé	27,7	55,6	16,8	29,5	24,7 ; 35,0	50,8	45,0 ; 56,2	19,7	16,0 ; 24,1
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	53,9	50,7 ; 56,8	42,9	40,0 ; 46,0	3,2*	2,2 ; 4,2
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		<b>P = 0,000</b>					<b>P = 0,001</b>		
Oui	21,3	49,3	29,4	34,3**	15,4 ; 53,7	37,6*	19,8 ; 55,4	28,2**	12,5 ; 45,8
Non	48,1	46,1	5,8	48,4	45,7 ; 51,1	45,1	42,4 ; 47,7	6,5	5,3 ; 7,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	24,2	22,1 ; 26,7	75,8	73,3 ; 77,9
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Hommes	18,2	81,8	19,4	16,2 ; 22,6	80,6	77,4 ; 83,8
Femmes	26,0	74,0	28,8	25,7 ; 32,1	71,2	67,9 ; 74,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,003			
15-24 ans	24,4	75,6	28,0	21,5 ; 35,5	72,0	64,5 ; 78,5
25-44 ans	24,3	75,7	28,5	24,1 ; 32,7	71,5	67,3 ; 75,9
45-64 ans	20,6	79,4	21,3	18,0 ; 24,8	78,7	75,2 ; 82,0
65 ans et plus	18,8	81,2	17,6	13,6 ; 21,8	82,4	78,2 ; 86,4
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,003			
Personne seule	25,7	74,3	28,0	23,7 ; 32,5	72,0	67,5 ; 76,3
Couple sans enfant	17,7	82,3	18,0	14,5 ; 21,9	82,0	78,1 ; 85,5
Couple avec enfants	20,8	79,2	23,5	20,1 ; 27,1	76,5	72,9 ; 79,9
Famille monoparentale	32,2	67,8	36,2	27,4 ; 45,6	63,8	54,4 ; 72,6
Autre	29,7	70,3	27,5*	17,2 ; 38,7	72,5	61,3 ; 82,8
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,009			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	29,2	23,7 ; 35,1	70,8	64,9 ; 76,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	28,0	23,4 ; 32,9	72,0	67,1 ; 76,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	21,0	16,6 ; 25,3	79,0	74,7 ; 83,4
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	20,2	16,0 ; 24,3	79,8	75,7 ; 84,0
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	35,0	29,6 ; 41,0	65,0	59,0 ; 70,4
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	21,8	19,3 ; 24,4	78,2	75,6 ; 80,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	50,2	41,8 ; 58,5	49,8	41,5 ; 58,2
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	20,8	18,6 ; 23,2	79,2	76,8 ; 81,4
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,001			
Travailleurs	20,9	79,1	24,0	21,2 ; 27,0	76,0	73,0 ; 78,8
Étudiants	24,8	75,2	28,5	21,1 ; 36,4	71,5	63,6 ; 78,9
Personnes sans emploi	37,9	62,1	39,5	28,7 ; 50,0	60,5	50,0 ; 71,3
Retraités	18,2	81,8	17,1	13,4 ; 21,0	82,9	79,0 ; 86,6
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	18,8	16,0 ; 21,8	81,2	78,2 ; 84,0
Bon	26,6	73,4	27,5	23,4 ; 31,7	72,5	68,3 ; 76,6
Passable ou mauvais	48,8	51,2	46,0	38,4 ; 54,4	54,0	45,6 ; 61,6
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	14,9	12,3 ; 17,9	85,1	82,1 ; 87,7
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	27,4	23,9 ; 31,1	72,6	68,9 ; 76,1
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	66,5	57,4 ; 75,0	33,5	25,0 ; 42,6
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	80,6	65,6 ; 92,8	19,4**	7,2 ; 34,4
Non	20,6	79,4	22,7	20,6 ; 25,1	77,3	74,9 ; 79,4
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = .			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	24,0	21,8 ; 26,4	76,0	73,6 ; 78,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,1*	1,4 ; 3,0	2,6*	1,3 ; 4,0	1,7*	0,9 ; 2,7
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,828		P = 0,307		P = 0,763	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	3,0**	0,4 ; 6,3	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,2**	0,9 ; 3,7	3,1**	0,7 ; 5,8	1,3**	0,1 ; 2,9
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	1,8**	0,8 ; 2,9	1,5**	0,2 ; 3,1	2,0**	0,7 ; 3,7
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,9**	0,3 ; 4,1	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,071		P = 0,125		P = 0,006	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	3,9**	2,0 ; 6,2	6,0**	1,5 ; 11,6	2,9**	1,2 ; 4,9
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,9**	0,7 ; 3,2	3,0**	1,0 ; 5,4	x	;
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	3,6**	0,9 ; 7,1	x	;	5,7**	1,2 ; 11,1
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,298		P = 0,374		P = 0,477	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	3,2**	1,0 ; 5,7	x	;	2,3**	0,4 ; 4,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,5**	1,0 ; 4,3	2,4**	0,3 ; 5,2	2,5**	0,5 ; 5,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	2,5**	1,0 ; 4,3	3,8**	1,1 ; 7,1	1,3**	0,2 ; 2,8
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	0,8**	0,1 ; 1,8	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,068		P = 0,175		P = 0,171	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	3,9**	1,7 ; 6,5	5,3**	1,0 ; 11,0	3,0**	0,8 ; 6,1
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	1,8*	1,0 ; 2,7	2,2**	0,9 ; 3,6	1,4**	0,5 ; 2,4
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,032		P = 0,002	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	7,4**	3,4 ; 12,3	7,6**	1,8 ; 15,1	7,2**	1,7 ; 14,1
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,6*	0,9 ; 2,3	2,1**	0,8 ; 3,4	1,1**	0,5 ; 1,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,521		P = 0,035		P = 0,521	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,2*	1,2 ; 3,3	3,1**	1,4 ; 5,1	1,3**	0,4 ; 2,3
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	4,4**	0,9 ; 9,0	x	;	3,4**	0,0 ; 7,8
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,8**	0,4 ; 3,7	x	;	2,5**	0,3 ; 6,0
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,595		P = 0,000	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	2,0*	1,0 ; 3,2	2,9**	1,1 ; 4,9	1,2**	0,3 ; 2,2
Bon	2,5	2,7	2,4	1,2**	0,5 ; 2,0	1,7**	0,3 ; 3,4	0,7**	0,0 ; 1,4
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	6,1**	2,2 ; 10,8	x	;	7,2**	1,9 ; 13,9
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,014		P = 0,112	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	1,5**	0,6 ; 2,7	1,8**	0,3 ; 3,5	1,3**	0,1 ; 3,1
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	1,8**	0,8 ; 2,9	2,2**	0,5 ; 4,3	1,4**	0,5 ; 2,5
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	8,7**	3,7 ; 14,7	12,8**	2,8 ; 25,4	5,9**	1,3 ; 11,9
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	7,4*	4,5 ; 10,5	11,1**	4,9 ; 17,3	5,0**	2,2 ; 8,3
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,6**	0,2 ; 1,0	0,6**	0,0 ; 1,5	0,5**	0,1 ; 0,9

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,3**	0,1 ; 0,6	x	;	0,5**	0,1 ; 1,1
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,358		P = .		P = 0,121	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	0,3**	0,0 ; 0,7	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,053		P = .		P = 0,135	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	1,1**	0,1 ; 2,2	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,016		P = 0,885		P = 0,033	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	1,2**	0,1 ; 2,8	x	;	2,3**	0,2 ; 5,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,031		P = .		P = 0,255	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	0,9**	0,2 ; 1,9	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	x	;	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,076		P = 0,000		P = 0,177	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	1,1**	0,0 ; 2,4	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,161		P = .		P = 0,416	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	x	;	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,083		P = 0,001		P = 0,244	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = .		P = .		P = .	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	1,3**	0,3 ; 2,7	x	;	1,8**	0,2 ; 3,9
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,123				
Oui	10,2	10,0	10,3	9,9	8,3 ; 11,4	11,1	8,5 ; 13,6	8,8	7,1 ; 10,7	
Non	89,8	90,0	89,7	90,1	88,6 ; 91,7	88,9	86,4 ; 91,5	91,2	89,3 ; 92,9	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,169				
Oui	4,4	3,5	5,3	3,4	2,5 ; 4,3	2,7*	1,5 ; 4,0	4,0*	2,8 ; 5,3	
Non	95,6	96,5	94,7	96,6	95,7 ; 97,5	97,3	96,0 ; 98,5	96,0	94,7 ; 97,2	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	11,0	9,4 ; 12,7	13,4	10,7 ; 16,2	8,8	6,9 ; 10,9
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,046	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	19,6*	13,3 ; 26,0	24,7*	15,3 ; 35,2	14,1**	6,6 ; 22,0
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	10,9	8,0 ; 13,9	15,2*	10,4 ; 20,1	6,6**	3,5 ; 10,5
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	10,0	7,6 ; 12,7	9,4*	5,8 ; 13,5	10,6*	7,3 ; 14,0
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	5,2*	3,2 ; 7,4	5,5**	2,3 ; 9,2	5,0**	2,4 ; 7,9
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,124		P = 0,128		P = 0,875	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	7,5*	5,0 ; 10,3	8,2**	3,4 ; 14,0	7,2*	4,3 ; 10,2
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	8,4*	5,7 ; 11,2	8,8*	5,1 ; 13,3	7,9*	4,7 ; 11,5
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	12,7	10,1 ; 15,7	15,4	11,3 ; 19,9	9,7*	6,2 ; 13,6
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	13,4*	7,9 ; 19,5	21,2**	8,9 ; 35,3	8,2**	3,6 ; 13,7
Autre	14,9	16,7	13,2*	12,8**	5,4 ; 21,4	18,4**	4,7 ; 35,3	8,7**	1,2 ; 18,0
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,480		P = 0,601		P = 0,716	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	12,3*	8,3 ; 16,5	14,0*	7,8 ; 21,0	10,6*	5,5 ; 16,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	12,4	8,8 ; 16,3	16,1*	9,5 ; 22,9	9,5*	5,5 ; 14,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	10,7	7,6 ; 14,2	13,2*	8,3 ; 18,9	8,2*	4,4 ; 12,4
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	9,1*	6,3 ; 12,2	10,9*	6,3 ; 15,6	7,1*	3,9 ; 10,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,363		P = 0,706		P = 0,638	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	9,7*	6,2 ; 13,5	12,4**	5,7 ; 19,5	8,1**	4,1 ; 12,7
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	11,7	9,7 ; 13,7	13,9	10,9 ; 17,2	9,3	7,0 ; 11,7
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000		P = 0,006		P = 0,175	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	10,2	8,2 ; 12,4	12,6	9,4 ; 16,0	7,6*	5,3 ; 10,4
Étudiants	17,1	21,4	12,9	19,9*	13,1 ; 26,7	25,5*	15,0 ; 37,2	14,6**	6,3 ; 23,8
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	10,8**	4,8 ; 17,4	x	;	10,0**	4,2 ; 16,7
Retraités	7,5	7,0	7,9	7,3*	4,8 ; 10,0	7,1**	3,5 ; 11,2	7,5*	3,9 ; 11,2

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	75,2	68,2 ; 82,0	76,0	66,0 ; 85,0	74,1	63,0 ; 84,2
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	24,8	18,0 ; 31,8	24,0*	15,0 ; 34,0	25,9*	15,8 ; 37,0
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	33,4	25,5 ; 41,5	36,3	25,7 ; 47,3	29,2*	18,1 ; 41,3
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	12,5*	7,6 ; 17,8	15,6*	8,3 ; 24,1	7,9**	2,5 ; 14,5
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	11,9*	7,0 ; 17,2	17,2*	9,6 ; 25,9	4,0**	0,6 ; 8,4
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	10,0**	4,9 ; 15,6	6,5**	0,9 ; 13,2	15,0**	6,2 ; 24,8
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	17,8*	11,6 ; 24,2	15,3*	7,8 ; 23,5	21,4*	11,4 ; 32,5
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	2,7**	0,8 ; 5,1	x	;	5,2**	1,1 ; 10,4
Autre	12,1	8,1	17,6	11,8*	7,1 ; 17,1	x	;	17,4**	8,6 ; 27,3
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	23,6*	16,6 ; 30,6	25,7*	16,1 ; 36,0	20,5*	11,5 ; 30,3
Printemps	21,2	20,7	21,9	27,2	19,7 ; 34,8	26,8*	16,9 ; 37,9	27,7*	16,9 ; 39,5
Été	29,1	30,3	27,4	27,4	20,2 ; 34,7	26,6*	16,8 ; 37,0	28,5*	17,7 ; 39,8
Automne	23,7	24,0	23,3	21,9*	14,9 ; 29,4	20,9*	11,7 ; 30,8	23,3*	12,5 ; 35,9
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	36,6	28,7 ; 44,5	30,8*	20,7 ; 41,4	44,6	31,7 ; 57,3
Endroit public	28,1	24,8	32,5	31,0	23,4 ; 39,1	29,6*	19,3 ; 41,2	32,9*	21,5 ; 45,4
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	x	;	x	;	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	x	;	x	;	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	7,6**	3,3 ; 12,6	7,1**	1,7 ; 13,5	8,4**	1,8 ; 16,8
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	4,5**	1,2 ; 8,4	6,7**	1,4 ; 12,9	x	;
Heurt/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	6,8**	2,3 ; 11,5	8,0**	1,9 ; 15,1	5,0**	0,1 ; 11,9
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	7,4**	2,5 ; 13,2	7,3**	1,5 ; 14,6	x	;
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	x	;	x	;	x	;
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	21,8	15,5 ; 28,2	28,9*	19,4 ; 39,3	11,5**	5,7 ; 18,3
Chute	34,6	30,5	40,3	36,5	28,9 ; 44,2	26,3*	16,5 ; 36,5	51,2	39,2 ; 63,7
Autres	13,7	12,5	15,3	12,7*	7,6 ; 18,6	11,9**	4,9 ; 20,3	13,8**	6,4 ; 22,4
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	x	;	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	27,2	19,8 ; 34,7	31,9*	21,6 ; 42,6	20,4**	10,1 ; 31,1
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	42,4	33,8 ; 50,4	36,8	26,1 ; 47,7	50,4	38,4 ; 63,0
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	x	;	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	12,2*	7,6 ; 17,3	13,7*	7,3 ; 21,4	9,9**	3,8 ; 17,1
Autre	11,9	10,9	13,2	13,0*	8,0 ; 18,6	13,9**	6,4 ; 22,6	11,8**	5,1 ; 19,4

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	3,1*	1,6 ; 4,7	2,8**	0,8 ; 5,3	3,3**	1,3 ; 5,5
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,806		P = 0,403		P = 0,495	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	2,9**	1,2 ; 5,1	3,6**	0,6 ; 7,4	2,4**	0,3 ; 5,0
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	3,5**	0,8 ; 7,0	x	;	4,7**	0,3 ; 10,1
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,064		P = 0,085		P = 0,268	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	5,8**	2,8 ; 9,2	x	;	5,1**	1,8 ; 8,9
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	2,1**	0,4 ; 4,1	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,850		P = 0,769		P = 0,648	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	3,2**	1,5 ; 5,2	3,2**	0,7 ; 6,2	3,3**	1,0 ; 6,0
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,007		P = 0,420		P = 0,005	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	7,4**	2,3 ; 13,3	x	;	9,0**	2,0 ; 17,4
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	1,8**	0,6 ; 3,2	2,6**	0,4 ; 5,4	x	;
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,789		P = 0,962		P = 0,707	
Oui	5,9	3,6*	7,3	3,5**	0,8 ; 6,8	x	;	4,0**	0,1 ; 8,8
Non	2,7*	2,2**	3,1*	3,0**	1,1 ; 5,1	2,9**	0,2 ; 6,1	3,0**	0,6 ; 6,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,057		P = 0,140		P = 0,186	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	7,2**	1,5 ; 14,0	x	;	6,9**	0,4 ; 15,2
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	2,3**	0,8 ; 4,1	2,1**	0,1 ; 4,8	2,4**	0,3 ; 5,1
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,604		P = 0,501		P = .	
Résidence	62,7	52,8	68,6	57,4*	32,7 ; 83,5	53,8**	11,0 ; 100,0	59,9*	26,7 ; 93,8
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	24,0**	4,0 ; 49,0	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	29,6**	6,1 ; 55,3	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	35,4**	10,8 ; 62,9	x	;	x	;
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	x	;	x	;	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	64,6*	37,4 ; 88,6	54,7**	12,0 ; 100,0	71,2*	34,7 ; 97,8
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	11,2	9,6 ; 12,8	10,0	7,8 ; 12,4	12,3	10,2 ; 14,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,020		P = 0,171		P = 0,136	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	8,2**	3,9 ; 13,0	6,1**	0,9 ; 11,9	10,4**	3,9 ; 18,0
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	11,7	8,8 ; 14,6	11,4*	7,1 ; 15,7	12,0*	8,2 ; 16,0
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	14,4	11,6 ; 17,5	12,8*	8,6 ; 17,3	16,0	12,2 ; 20,0
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	6,6*	4,3 ; 9,1	5,4**	2,2 ; 9,0	7,6*	4,4 ; 11,3
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,021		P = 0,089		P = 0,062	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	14,0	10,4 ; 17,8	17,0*	10,0 ; 24,4	12,5*	8,5 ; 16,7
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	10,1	7,3 ; 13,0	7,9*	4,5 ; 11,5	12,4*	8,2 ; 16,8
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	10,9	8,4 ; 13,6	10,2*	6,7 ; 13,8	11,8*	8,3 ; 15,6
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	20,4*	12,8 ; 28,0	15,9**	3,4 ; 29,5	23,5*	13,8 ; 33,5
Autre	11,4	12,8*	10,2*	3,7**	0,0 ; 9,2	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,529		P = 0,991		P = 0,321	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	11,4*	7,8 ; 15,1	9,9*	5,2 ; 15,3	12,8*	8,0 ; 18,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	9,7	7,0 ; 12,6	9,9*	5,4 ; 15,2	9,6*	6,3 ; 13,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	11,9	8,6 ; 15,4	10,6*	5,8 ; 16,0	13,2*	8,6 ; 18,2
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	12,9	9,6 ; 16,5	10,8*	6,1 ; 15,8	15,3*	10,5 ; 20,6
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,039		P = 0,563		P = 0,015	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	8,4*	5,7 ; 11,4	9,0**	3,6 ; 14,9	8,1*	5,2 ; 11,5
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	12,5	10,5 ; 14,5	11,0	8,3 ; 13,7	14,1	11,3 ; 17,1
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,247		P = 0,525		P = 0,373	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	14,1*	9,2 ; 19,6	12,7**	4,9 ; 21,4	15,3*	9,0 ; 22,5
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	11,2	9,5 ; 13,0	10,1	7,6 ; 12,7	12,2	9,9 ; 14,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,041		P = 0,066		P = 0,283	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	13,2	11,0 ; 15,5	11,9	8,8 ; 15,1	14,6	11,5 ; 17,9
Étudiants	9,9	9,7	10,1	7,6**	3,1 ; 12,8	x	;	9,8**	2,8 ; 18,2
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	15,8*	8,9 ; 23,7	30,9**	3,2 ; 64,4	13,2**	6,9 ; 20,6
Retraités	6,9	6,7	7,0	7,2*	5,0 ; 9,7	6,0**	2,9 ; 9,6	8,2*	5,1 ; 11,8

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,989				
Oui	45,2	47,6	42,8	42,6	34,8 ; 50,2	42,5*	28,4 ; 55,4	42,7	32,9 ; 52,7	
Non	54,8	52,4	57,2	57,4	49,8 ; 65,2	57,5	44,6 ; 71,6	57,3	47,3 ; 67,1	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,065				
Oui	25,4	27,6	23,1	27,8	20,5 ; 35,7	36,7*	24,4 ; 49,6	20,7*	11,7 ; 30,6	
Non	74,6	72,4	76,9	72,2	64,3 ; 79,5	63,3	50,4 ; 75,6	79,3	69,4 ; 88,3	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,004				
Oui	17,6	15,6	19,6	17,4*	12,0 ; 23,6	8,2**	2,8 ; 15,0	24,8*	16,5 ; 34,5	
Non	82,4	84,4	80,4	82,6	76,4 ; 88,0	91,8	85,0 ; 97,2	75,2	65,5 ; 83,5	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,447				
Oui	8,1	7,2	9,0	8,3*	4,8 ; 11,9	6,6**	1,4 ; 13,0	9,6*	5,0 ; 15,0	
Non	91,9	92,8	91,0	91,7	88,1 ; 95,2	93,4	87,0 ; 98,6	90,4	85,0 ; 95,0	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	x	;	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	60,9	53,6 ; 68,3	53,2	41,1 ; 65,6	67,0	57,5 ; 75,8	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	18,9*	13,1 ; 25,4	24,5*	14,1 ; 35,3	14,6**	7,8 ; 22,8	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	x	;	x	;	3,3**	0,5 ; 6,7	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	13,2*	8,3 ; 18,9	14,8**	6,5 ; 24,9	12*	6,4 ; 18,4	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	1,9**	0,3 ; 3,9	x	;	x	;	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	29,6	27,2 ; 31,9	26,2	22,7 ; 29,8	32,9	29,6 ; 36,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,074		P = 0,016	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	19,9*	13,7 ; 26,3	19,9*	11,3 ; 29,6	19,9*	11,2 ; 29,1
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	28,4	24,3 ; 32,7	22,8	17,3 ; 29,1	34,0	27,8 ; 40,1
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	33,4	29,5 ; 37,5	29,5	23,6 ; 35,7	37,2	31,8 ; 42,6
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	33,6	28,6 ; 38,6	33,4	25,7 ; 42,1	33,7	27,9 ; 40,1
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,008		P = 0,596		P = 0,050	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	41,5	36,6 ; 46,7	35,4	26,9 ; 44,5	44,5	38,4 ; 50,5
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	28,3	24,1 ; 32,6	25,5	19,1 ; 31,9	31,1	25,6 ; 37,0
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	26,9	23,2 ; 30,4	24,7	19,7 ; 29,6	29,4	24,1 ; 34,6
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	33,0	24,7 ; 41,4	26,9**	12,7 ; 42,6	37,1	27,0 ; 47,8
Autre	34,0	32,4	35,4	32,1*	21,6 ; 43,1	29,5**	13,8 ; 48,0	34,1*	19,2 ; 49,1
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,047		P = 0,109		P = 0,534	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	32,8	27,5 ; 38,3	28,8	20,6 ; 36,6	36,8	29,5 ; 44,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	32,2	27,4 ; 36,8	29,5	22,3 ; 37,4	34,3	28,1 ; 40,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	30,6	25,6 ; 35,4	28,4	21,3 ; 35,8	32,7	26,1 ; 39,2
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	24,3	20,0 ; 28,4	19,5	13,7 ; 25,4	29,6	23,5 ; 35,9
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,046		P = 0,379		P = 0,174	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	34,5	29,1 ; 39,8	29,7*	20,7 ; 39,1	37,3	30,5 ; 43,9
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	28,6	25,9 ; 31,2	25,5	21,7 ; 29,4	31,9	27,9 ; 35,6
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,010		P = 0,001	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	46,1	37,9 ; 54,6	40,9*	28,8 ; 54,3	50,6	39,4 ; 61,3
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	27,7	25,2 ; 30,1	24,3	20,7 ; 28,2	31,0	27,5 ; 34,4
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,063		P = 0,019	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	29,3	26,2 ; 32,3	26,0	21,8 ; 30,4	33,0	28,6 ; 37,3
Étudiants	20,7	14,8	26,3	20,0*	13,1 ; 27,3	15,3**	6,3 ; 25,2	24,4*	14,5 ; 34,5
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	46,1	35,2 ; 56,8	41,7**	8,6 ; 76,3	46,8	35,9 ; 58,5
Retraités	34,2	30,5	37,2	32,3	27,9 ; 37,0	32,9	25,5 ; 40,5	31,8	26,3 ; 37,9
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	23,2	20,1 ; 26,1	20,7	16,1 ; 25,2	25,7	21,4 ; 29,7
Bon	33,9	28,1	39,6	32,7	28,6 ; 37,2	29,4	23,4 ; 35,9	36,0	30,1 ; 41,9
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	58,1	50,2 ; 66,0	57,4	45,1 ; 70,0	58,6	48,4 ; 68,9
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	48,3	42,7 ; 53,7	39,7	30,5 ; 49,1	53,8	47,0 ; 60,2
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	23,3	20,8 ; 25,9	22,4	18,7 ; 26,0	24,4	21,0 ; 27,9
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,025		P = 0,237		P = 0,087	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	34,6**	15,0 ; 54,8	x	;	36,0**	14,0 ; 59,0
Poids normal	28,3	22,9	32,1	26,5	23,0 ; 30,0	22,5	17,3 ; 28,4	29,4	25,0 ; 33,8
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	30,5	26,5 ; 34,6	27,0	21,9 ; 32,6	35,6	29,5 ; 41,9
Obésité	37,9	30,5	46,1	37,8	31,8 ; 44,2	33,4	24,9 ; 42,2	42,7	33,9 ; 51,7

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,005					
Oui	30,3	25,3	35,2	29,6	27,2 ; 31,9	26,2	22,7 ; 29,8	32,9	29,6 ; 36,0		
Non	69,7	74,7	64,8	70,4	68,1 ; 72,8	73,8	70,2 ; 77,3	67,1	64,0 ; 70,4		
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,001					
Oui	9,5	6,4	12,5	8,9	7,6 ; 10,3	6,3	4,5 ; 8,4	11,3	9,3 ; 13,5		
Non	90,5	93,6	87,5	91,1	89,7 ; 92,4	93,7	91,6 ; 95,5	88,7	86,5 ; 90,7		
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,015					
Oui	14,5	12,2	16,7	14,1	12,3 ; 15,8	11,7	9,2 ; 14,4	16,3	13,8 ; 18,7		
Non	85,5	87,8	83,3	85,9	84,2 ; 87,7	88,3	85,6 ; 90,8	83,7	81,3 ; 86,2		
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,000					
Oui	13,5	10,8	16,1	13,0	11,4 ; 14,7	9,7	7,4 ; 11,9	16,2	13,7 ; 18,7		
Non	86,5	89,2	83,9	87,0	85,3 ; 88,6	90,3	88,1 ; 92,6	83,8	81,3 ; 86,3		
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,008					
Oui	14,5	11,8	17,2	13,6	11,9 ; 15,3	11,2	8,8 ; 13,6	16,0	13,5 ; 18,5		
Non	85,5	88,2	82,8	86,4	84,7 ; 88,1	88,8	86,4 ; 91,2	84,0	81,5 ; 86,5		
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,170					
Oui	17,8	16,0	19,6	16,4	14,4 ; 18,3	15,1	12,2 ; 17,8	17,6	15,1 ; 20,2		
Non	82,2	84,0	80,4	83,6	81,7 ; 85,6	84,9	82,2 ; 87,8	82,4	79,8 ; 84,9		
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,016					
Oui	14,2	10,6	17,8	13,7	12,0 ; 15,5	11,5	9,0 ; 14,1	15,9	13,4 ; 18,3		
Non	85,8	89,4	82,2	86,3	84,5 ; 88,0	88,5	85,9 ; 91,0	84,1	81,7 ; 86,6		

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	57,4	55,1 ; 59,9	31,4	29,2 ; 33,7	11,2	9,5 ; 12,9
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,947					
Hommes	52,6	34,1	13,3	57,5	53,6 ; 61,3	31,6	28,0 ; 35,2	10,9	8,5 ; 13,4
Femmes	60,1	29,8	10,1	57,4	54,1 ; 60,8	31,2	28,1 ; 34,3	11,4	9,2 ; 13,8
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,010					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	63,5	56,0 ; 71,8	26,8	19,2 ; 33,9	9,7**	4,9 ; 15,2
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	61,2	56,9 ; 65,8	28,9	25,0 ; 33,0	9,8	7,0 ; 12,7
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	56,4	52,3 ; 60,5	31,4	27,7 ; 35,4	12,2	9,6 ; 15,1
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	45,7	40,2 ; 50,8	41,1	35,9 ; 46,5	13,2	9,9 ; 16,8
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	49,6	44,7 ; 54,8	36,2	31,2 ; 41,0	14,2	10,5 ; 18,0
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	57,2	52,5 ; 61,6	33,0	28,6 ; 37,6	9,8	7,2 ; 12,6
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	61,0	57,1 ; 64,9	30,3	26,6 ; 34,2	8,7	6,4 ; 11,2
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	67,0	58,7 ; 74,4	24,3	17,5 ; 32,0	8,7*	4,5 ; 13,5
Autre	48,0	34,3	17,7	42,8	31,6 ; 55,2	32,2*	20,8 ; 43,9	25,0*	14,8 ; 35,1
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	61,6	58,9 ; 64,4	29,3	26,7 ; 31,9	9,0	7,3 ; 10,7
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	35,2**	16,4 ; 56,1	34,9**	17,3 ; 56,1	29,9**	7,9 ; 50,8
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	45,3	39,1 ; 51,2	38,7	32,9 ; 44,4	16,1	11,9 ; 20,3
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,030					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	58,7	56,1 ; 61,4	31,4	29,0 ; 34,1	9,8	8,1 ; 11,6
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	58,1	48,9 ; 67,0	30,9	22,8 ; 39,0	10,9*	5,7 ; 16,9
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	47,8	37,6 ; 57,8	32,0	23,6 ; 41,3	20,2*	12,9 ; 27,9
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	44,3	38,4 ; 50,3	36,3	30,6 ; 42,0	19,4	14,7 ; 24,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	57,0	52,0 ; 62,2	32,0	27,4 ; 36,8	11,0	7,7 ; 14,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	60,9	56,1 ; 66,0	30,2	25,4 ; 35,0	9,0*	6,4 ; 11,9
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	64,0	59,2 ; 68,6	28,8	24,3 ; 33,4	7,2*	4,9 ; 9,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	42,3	36,6 ; 48,1	38,3	32,9 ; 44,3	19,3	14,9 ; 23,9
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	61,5	58,7 ; 64,4	29,5	26,8 ; 32,2	9,0	7,2 ; 10,8
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	38,6	30,8 ; 46,6	33,6	25,9 ; 41,6	27,8	21,0 ; 34,6
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	60,3	57,7 ; 63,1	30,8	28,3 ; 33,3	8,9	7,3 ; 10,6
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	60,3	57,1 ; 63,6	30,2	27,2 ; 33,3	9,5	7,5 ; 11,5
Étudiants	62,8	27,9	9,3	64,0	56,0 ; 72,8	25,6	17,9 ; 33,0	10,4**	5,0 ; 16,3
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	39,6	29,7 ; 50,4	38,4	27,9 ; 49,3	22,0*	13,6 ; 31,3
Retraités	49,7	38,1	12,2	49,9	44,9 ; 54,7	37,4	32,6 ; 42,6	12,7	9,5 ; 15,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	57,4	55,1 ; 59,9	31,4	29,2 ; 33,7	11,2	9,5 ; 12,9
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	52,3	46,4 ; 57,9	27,5	22,8 ; 32,3	20,2	15,6 ; 24,7
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	59,0	56,3 ; 61,8	32,5	29,9 ; 35,2	8,5	6,9 ; 10,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	69,6	66,4 ; 72,9	24,8	21,8 ; 27,9	5,6	3,9 ; 7,3
Bon	41,4	42,6	16,0	44,3	40,0 ; 48,9	41,3	37,2 ; 45,7	14,4	11,0 ; 17,6
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	31,6	24,7 ; 38,6	35,2	27,3 ; 42,7	33,2	25,9 ; 40,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	48,9	43,5 ; 54,4	36,3	31,0 ; 41,4	14,9	11,4 ; 18,7
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	60,9	58,2 ; 63,9	29,7	27,1 ; 32,4	9,3	7,4 ; 11,2
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,112					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	50,1	42,7 ; 57,1	38,3	31,8 ; 45,7	11,7*	6,7 ; 16,5
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	58,1	55,6 ; 60,9	30,7	28,3 ; 33,2	11,1	9,4 ; 12,9
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	60,6	58,0 ; 63,4	29,4	26,9 ; 32,0	9,9	8,1 ; 11,7
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	46,1	40,0 ; 52,0	38,7	33,0 ; 44,3	15,2	11,2 ; 19,5
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,002					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	64,7	60,2 ; 69,2	27,4	23,3 ; 31,6	7,8*	5,3 ; 10,6
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	55,2	51,8 ; 58,6	32,2	29,1 ; 35,3	12,7	10,4 ; 15,0

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	8,5	7,4 ; 9,6	6,8	5,3 ; 8,4	10,1	8,6 ; 11,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	9,0	7,1 ; 11,4	7,6*	4,9 ; 10,9	10,4	7,5 ; 13,6
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	32,1	27,3 ; 36,9	26,2	18,9 ; 33,8	36,8	30,4 ; 43,3
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,033		P = 0,073		P = 0,318	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	28,6	23,0 ; 34,6	23,3*	15,0 ; 31,9	33,1	25,0 ; 41,5
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	33,7	25,3 ; 42,7	25,1**	12,1 ; 39,6	39,9	29,3 ; 51,3
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	59,8*	33,7 ; 83,1	71,5**	21,4 ; 100,0	52,5**	22,3 ; 80,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	21,5	17,7 ; 25,5	17,1*	11,9 ; 23,0	25,9	20,5 ; 32,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	8,9	6,6 ; 11,5	7,2**	3,8 ; 11,5	10,2*	7,2 ; 13,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	5,3*	3,5 ; 7,3	3,5**	1,3 ; 6,0	7,0*	4,1 ; 10,3
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	2,0**	0,9 ; 3,3	1,9**	0,4 ; 3,7	2,2**	0,6 ; 4,1
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	16,6	13,3 ; 20,6	15,0*	8,8 ; 22,1	17,6	13,5 ; 22,2
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	6,4	5,3 ; 7,7	4,9	3,5 ; 6,5	7,9	6,3 ; 9,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,019		P = 0,005		P = 0,572	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	12,5*	8,2 ; 17,6	14,2**	7,1 ; 22,8	11,1*	6,2 ; 17,2
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	7,8	6,7 ; 9,0	6,0	4,6 ; 7,7	9,6	7,9 ; 11,3

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	78,2	76,0 ; 80,2	19,4	17,4 ; 21,6	2,4*	1,6 ; 3,3
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	67,9	64,0 ; 71,6	28,0	24,5 ; 31,7	4,1*	2,7 ; 5,8
Femmes	87,9	11,3	0,7	88,0	85,7 ; 90,2	11,2	9,0 ; 13,5	0,8**	0,1 ; 1,6
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,579					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	78,7	71,7 ; 85,3	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	81,3	77,6 ; 84,8	16,9	13,6 ; 20,5	1,8**	0,6 ; 3,4
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	77,5	73,9 ; 80,8	19,8	16,4 ; 23,3	2,7*	1,4 ; 4,2
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	72,7	68,1 ; 77,0	24,6	20,2 ; 29,2	2,7**	1,2 ; 4,4
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,515					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	75,4	70,8 ; 79,7	21,3	17,1 ; 25,6	3,3**	1,5 ; 5,3
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	75,2	71,2 ; 79,0	22,1	18,5 ; 26,0	2,7**	1,2 ; 4,4
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	80,8	77,4 ; 83,9	17,5	14,5 ; 20,9	1,6**	0,6 ; 2,8
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	80,0	72,1 ; 87,2	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	68,9	57,0 ; 80,9	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,680					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	75,9	73,1 ; 78,6	21,2	18,6 ; 23,7	2,9*	1,9 ; 4,2
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	86,2	81,0 ; 91,0	x	;	x	;
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	79,1	73,6 ; 84,8	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	83,1	71,9 ; 93,3	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,012					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	70,0	64,3 ; 75,6	26,1	20,5 ; 31,4	4,0**	2,0 ; 6,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	78,2	73,7 ; 82,5	19,2	15,1 ; 23,4	2,6**	0,9 ; 4,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	79,4	75,1 ; 83,3	18,5	14,5 ; 22,8	2,1**	0,7 ; 3,7
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	83,2	79,4 ; 86,9	15,8	12,2 ; 19,5	1,0**	0,2 ; 2,0
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,045					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	73,2	67,8 ; 78,6	22,7	17,5 ; 28,0	4,1**	2,1 ; 6,3
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	79,2	76,7 ; 81,6	18,8	16,5 ; 21,2	2,0*	1,1 ; 3,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,418					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	73,6	65,4 ; 81,1	23,0*	15,8 ; 30,7	3,3**	0,9 ; 6,5
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	78,5	76,0 ; 80,7	19,3	17,1 ; 21,7	2,2*	1,4 ; 3,2
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,046					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	78,1	75,1 ; 80,8	19,1	16,5 ; 21,9	2,7*	1,6 ; 4,0
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	83,8	77,1 ; 90,3	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	86,3	77,2 ; 93,9	9,6**	2,8 ; 17,9	4,0**	0,5 ; 8,8
Retraités	72,9	23,2	3,8	71,4	66,8 ; 75,6	25,8	21,5 ; 30,2	2,8**	1,3 ; 4,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	78,2	76,0 ; 80,2	19,4	17,4 ; 21,6	2,4*	1,6 ; 3,3
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	70,8	65,1 ; 75,9	23,6	18,6 ; 28,8	5,6**	2,9 ; 8,8
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	80,2	78,0 ; 82,5	18,2	16,0 ; 20,5	1,6*	0,9 ; 2,4
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	82,0	79,3 ; 84,6	16,6	14,0 ; 19,3	1,4**	0,6 ; 2,5
Bon	75,1	21,2	3,6	74,6	70,4 ; 78,3	21,5	17,8 ; 25,5	3,9**	2,1 ; 5,9
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	68,2	60,4 ; 75,8	28,6	20,8 ; 36,5	3,2**	1,2 ; 5,9
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,937					
Élevé	77,2	19,2	3,6	78,3	73,1 ; 83,0	19,2	14,7 ; 24,0	2,5**	0,9 ; 4,4
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	78,2	75,7 ; 80,5	19,6	17,3 ; 22,1	2,2*	1,4 ; 3,1
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	70,2	63,6 ; 76,3	22,1	16,3 ; 28,0	7,8*	4,2 ; 11,8
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	78,9	76,5 ; 81,1	19,2	17,0 ; 21,4	1,9*	1,1 ; 2,8
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,150					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	91,0	88,1 ; 93,6	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	73,6	70,4 ; 76,3	24,2	21,4 ; 27,2	2,2*	1,3 ; 3,3

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	78,2	76,0 ; 80,2	67,9	64,0 ; 71,6	88,0	85,7 ; 90,2
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	19,4	17,4 ; 21,6	28,0	24,5 ; 31,7	11,2	9,0 ; 13,5
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	2,4*	1,6 ; 3,3	4,1*	2,7 ; 5,8	0,8**	0,1 ; 1,6
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,034					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	70,2	63,6 ; 76,3	45,7	33,7 ; 58,1	85,8	79,7 ; 91,5
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	22,1	16,3 ; 28,0	36,6*	24,4 ; 49,0	x	;
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	7,8*	4,2 ; 11,8	17,7**	8,9 ; 27,6	x	;
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	78,9	76,5 ; 81,1	69,5	65,4 ; 73,2	88,3	85,8 ; 90,7
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	19,2	17,0 ; 21,4	27,4	23,8 ; 31,3	11,0	8,7 ; 13,5
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	1,9*	1,1 ; 2,8	3,1*	1,7 ; 4,8	0,7**	0,1 ; 1,6

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	32,8	30,3 ; 35,3	19,6	17,3 ; 21,9	47,5	44,8 ; 50,3
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	25,0	21,4 ; 28,5	19,0	15,8 ; 22,5	56,0	52,0 ; 60,1
Femmes	41,7	18,2	40,1	40,3	36,8 ; 44,0	20,3	17,1 ; 23,4	39,4	35,8 ; 43,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,002					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	27,5	20,6 ; 34,7	15,4*	9,7 ; 21,5	57,2	49,6 ; 64,8
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	30,8	26,4 ; 35,0	21,7	17,9 ; 25,5	47,6	42,9 ; 52,4
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	36,6	32,6 ; 40,9	22,2	18,4 ; 26,0	41,2	36,7 ; 45,5
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	36,0	29,4 ; 42,4	12,2*	8,1 ; 16,8	51,8	45,5 ; 58,1
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,009					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	32,2	26,0 ; 38,8	11,3*	7,2 ; 16,0	56,4	49,2 ; 63,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	34,8	29,9 ; 40,1	17,2	13,2 ; 21,3	48,0	42,5 ; 53,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	31,0	26,0 ; 36,0	22,7	17,9 ; 27,5	46,3	41,1 ; 51,4
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	32,5	27,9 ; 37,1	23,5	19,0 ; 27,7	44,0	39,0 ; 49,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,495					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	34,7	28,7 ; 41,1	17,1*	12,3 ; 22,4	48,3	41,6 ; 55,1
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	32,1	29,2 ; 34,8	20,5	17,9 ; 23,1	47,5	44,4 ; 50,5
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,068					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	32,0	28,8 ; 35,1	22,3	19,4 ; 25,1	45,7	42,3 ; 49,2
Étudiants	28,8	16,3	54,9	31,3	23,3 ; 39,5	16,4*	10,3 ; 22,9	52,3	43,9 ; 60,9
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	31,7*	20,8 ; 43,4	19,9*	10,8 ; 29,2	48,4	36,9 ; 60,3
Retraités	38,0	12,4	49,6	38,0	31,9 ; 43,6	12,2*	8,4 ; 16,3	49,8	44,0 ; 55,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
2,4*	1,5 ; 3,3	45,0	42,5 ; 47,7	36,2	33,6 ; 38,5	16,4	14,4 ; 18,4	Ensemble de la population	
P = 0,000									
1,0**	0,2 ; 2,0	38,9	35,3 ; 42,6	42,7	38,9 ; 46,5	17,4	14,5 ; 20,3	Sexe	
3,8*	2,3 ; 5,5	51,1	47,7 ; 54,6	29,6	26,5 ; 32,6	15,5	12,9 ; 18,1	Hommes	
P = 0,008									
x	;	77,7	66,4 ; 88,5	11,6**	3,2 ; 20,9	x	;	Femmes	
6,7**	1,6 ; 12,8	71,0	61,1 ; 80,5	15,4*	8,2 ; 23,2	6,8**	1,9 ; 12,8	Groupe d'âge	
P = 0,000									
6,9**	2,8 ; 11,7	73,6	66,5 ; 80,6	14,0*	8,4 ; 19,7	5,6**	2,1 ; 9,6	15-17 ans	
2,6**	1,0 ; 4,3	43,3	38,6 ; 48,1	38,3	33,8 ; 43,1	15,8	12,2 ; 19,2	18-24 ans	
0,6**	0,0 ; 1,4	36,0	31,9 ; 40,2	41,6	37,5 ; 45,9	21,8	18,1 ; 25,4	15-24 ans	
1,4**	0,4 ; 2,8	40,7	35,2 ; 46,1	41,3	35,9 ; 46,7	16,6	13,0 ; 20,7	25-44 ans	
P = 0,439									
x	;	79,4	62,0 ; 93,8	x	;	x	;	45-64 ans	
x	;	70,6	55,5 ; 84,1	19,2**	7,8 ; 32,4	x	;	65 ans et plus	
P = 0,134									
x	;	74,1	63,9 ; 83,9	14,2**	6,4 ; 22,9	x	;	Hommes	
x	;	35,3	28,7 ; 42,1	47,9	41,1 ; 55,1	x	;	15-17 ans	
x	;	28,0	22,0 ; 34,2	50,0	43,3 ; 56,6	x	;	18-24 ans	
x	;	34,8	26,9 ; 42,9	44,6	36,2 ; 52,9	x	;	25-44 ans	
P = 0,477									
x	;	75,6	57,0 ; 92,5	17,4**	1,7 ; 34,7	x	;	45-64 ans	
x	;	71,4	57,3 ; 84,6	11,6**	3,2 ; 21,2	x	;	65 ans et plus	
P = 0,187									
x	;	73,0	62,0 ; 83,1	13,8**	6,3 ; 22,1	x	;	Femmes	
4,4**	1,5 ; 7,7	52,0	45,8 ; 58,8	27,8	21,9 ; 34,1	15,8	11,0 ; 20,7	15-17 ans	
x	;	43,9	38,6 ; 49,7	33,4	28,1 ; 38,7	x	;	18-24 ans	
1,9**	0,3 ; 3,9	45,4	38,7 ; 52,5	38,6	31,3 ; 45,4	14,1*	9,9 ; 19,0	25-44 ans	
P = 0,373									
5,7**	2,7 ; 8,8	43,9	38,1 ; 49,9	31,2	25,9 ; 36,6	19,2	14,8 ; 23,8	45-64 ans	
2,7**	0,9 ; 4,7	46,0	40,9 ; 51,2	34,2	29,4 ; 38,8	17,1	13,1 ; 21,1	65 ans et plus	
x	;	43,0	37,7 ; 48,5	37,2	31,8 ; 42,3	x	;	Niveau de scolarité	
1,0**	0,1 ; 2,2	47,1	41,9 ; 52,1	39,7	34,7 ; 44,9	12,2	9,0 ; 15,6	Niveau inférieur au DES	
P = 0,514									
x	;	44,1	34,9 ; 52,8	31,1	23,5 ; 39,4	x	;	Diplôme d'études secondaires (DES)	
x	;	41,7	33,7 ; 50,0	39,5	31,8 ; 47,4	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
x	;	32,7	25,2 ; 39,9	48,6	40,6 ; 56,9	x	;	Diplôme d'études universitaires	
x	;	38,7	31,5 ; 45,8	47,7	40,6 ; 55,0	x	;		
P = 0,689									
7,5**	3,3 ; 12,3	43,8	35,5 ; 51,8	31,4	23,4 ; 38,6	17,3*	12,3 ; 23,6	Femmes	
4,4**	1,4 ; 8,0	49,4	42,8 ; 56,0	30,1	24,0 ; 36,2	16,2	11,3 ; 21,3	Niveau inférieur au DES	
x	;	53,4	46,0 ; 61,0	25,6	19,7 ; 32,1	x	;	Diplôme d'études secondaires (DES)	
x	;	57,2	49,8 ; 64,2	30,1	23,8 ; 36,7	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
P = 0,128									
2,7**	1,0 ; 4,8	39,0	33,4 ; 45,1	38,1	32,0 ; 43,8	20,2	15,6 ; 25,1	Diplôme d'études universitaires	
2,4*	1,4 ; 3,6	46,7	43,7 ; 49,7	35,1	32,1 ; 38,0	15,8	13,7 ; 18,0	Indice du niveau de revenu du ménage	
P = 0,875									
x	;	35,7	26,2 ; 45,9	43,3	32,9 ; 54,0	x	;	Hommes	
0,9**	0,0 ; 2,0	39,3	35,1 ; 43,5	42,2	38,0 ; 46,4	17,5	14,5 ; 20,7	Quintile 1 (faible)	
P = 0,009									
3,4**	1,0 ; 6,3	41,0	34,2 ; 48,3	34,9	27,6 ; 42,0	20,7	15,2 ; 27,0	Quintile 2 et suivants	
4,1*	2,2 ; 6,2	54,8	50,7 ; 58,9	27,2	23,4 ; 30,8	13,9	11,2 ; 16,7		

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	38,7	36,3 ; 41,1	3,3*	2,4 ; 4,4	57,9	55,5 ; 60,4
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	36,6	3,6	59,9	33,5	30,1 ; 36,9	4,4*	2,7 ; 6,2	62,1	58,5 ; 65,6
Femmes	40,5	2,3	57,1	43,9	40,5 ; 47,1	2,3*	1,3 ; 3,5	53,8	50,5 ; 57,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	14,5*	9,1 ; 20,3	5,9**	2,2 ; 10,4	79,6	72,9 ; 85,8
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	37,9	33,5 ; 42,2	3,8**	2,0 ; 6,0	58,3	54,0 ; 62,6
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	50,2	45,8 ; 54,4	1,8**	0,7 ; 3,1	48,0	43,8 ; 52,4
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	39,7	34,6 ; 45,0	3,1**	1,5 ; 5,1	57,2	51,7 ; 62,3
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	14,7**	7,2 ; 23,2	9,3**	2,8 ; 17,4	76,0	65,9 ; 85,5
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	29,2	23,6 ; 35,0	4,4**	1,4 ; 7,8	66,4	60,4 ; 72,4
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	45,5	38,9 ; 52,0	2,1**	0,5 ; 4,1	52,4	45,9 ; 58,7
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	36,4	28,5 ; 44,8	4,3**	1,3 ; 8,1	59,3	50,6 ; 66,9
Femmes	P = 0,000			P = 0,178					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	14,4**	6,9 ; 23,0	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	47,1	40,4 ; 53,2	3,2**	1,0 ; 5,8	49,8	43,4 ; 56,4
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	54,7	49,1 ; 60,1	x	;	x	;
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	42,2	35,5 ; 49,2	2,2**	0,5 ; 4,5	55,6	48,7 ; 62,2
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	30,0**	12,6 ; 49,4	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	11,8	9,4 ; 14,2	5,0**	3,3 ; 6,9	83,2	80,3 ; 85,9
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	52,1	47,7 ; 56,4	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	88,8	84,4 ; 92,8	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	77,4**	24,2 ; 100,0
Poids normal	4,7	6,8	88,5	4,4**	2,0 ; 7,4	9,1*	5,3 ; 13,0	86,5	81,8 ; 90,9
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	40,6	34,7 ; 46,4	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	83,9	76,7 ; 90,8	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	31,8**	12,4 ; 54,2	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	17,4	13,8 ; 21,1	2,0**	0,6 ; 3,8	80,6	76,8 ; 84,4
Embonpoint	69,6	x	x	68,6	62,3 ; 74,5	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	94,3	89,7 ; 98,0	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	75,5	71,9 ; 78,9	12,9	10,3 ; 15,8	11,6	9,1 ; 14,5
Sexe	P = 0,000			P = 0,279					
Hommes	81,4	10,5	8,0	78,7	73,2 ; 84,0	10,3*	6,6 ; 14,3	11,1*	7,1 ; 15,7
Femmes	74,5	14,1	11,5	73,3	68,3 ; 77,9	14,8	11,2 ; 18,6	12,0*	8,5 ; 15,8
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,957					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	75,0	59,8 ; 89,3	14,1**	3,1 ; 27,6	10,9**	1,2 ; 21,9
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	75,3	68,8 ; 81,2	11,6*	7,5 ; 16,1	13,1*	8,5 ; 18,2
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	75,5	69,8 ; 81,1	14,2*	9,9 ; 18,7	10,3*	6,3 ; 14,6
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	76,5	69,0 ; 83,7	11,6**	6,1 ; 17,5	11,9*	6,1 ; 17,9
Hommes	P = 0,252			P = 0,853					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	97,3	87,9 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	77,2	67,3 ; 86,4	12,3**	5,1 ; 20,0	10,6**	3,8 ; 18,5
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	75,8	66,6 ; 84,6	10,8**	4,8 ; 17,6	13,4**	6,0 ; 21,8
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	77,0	62,4 ; 90,0	8,7**	1,0 ; 18,2	14,3**	2,7 ; 27,6
Femmes	P = 0,004			P = 0,537					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	58,5*	35,5 ; 82,2	22,5**	3,8 ; 44,0	19,0**	2,3 ; 37,6
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	73,9	65,7 ; 81,7	11,1*	6,0 ; 17,0	15,1*	8,4 ; 22,4
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	75,3	67,7 ; 82,3	16,6*	10,9 ; 23,5	8,0**	4,0 ; 13,0
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	76,1	66,6 ; 85,3	13,4**	5,7 ; 21,8	10,5**	4,7 ; 17,2
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,439					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	76,2	68,7 ; 83,1	11,2**	6,7 ; 16,5	12,6*	7,1 ; 18,8
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	75,2	69,9 ; 80,5	15,5	11,2 ; 20,0	9,3*	6,1 ; 12,9
Obésité	72,3	14,4	13,3	73,7	66,6 ; 80,6	11,9*	7,1 ; 17,5	14,4*	8,6 ; 20,5
Hommes	P = 0,002			P = 0,395					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	73,4	55,9 ; 89,6	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	81,2	74,0 ; 87,9	12,6*	6,9 ; 18,8	6,1**	2,1 ; 10,7
Obésité	76,0	12,2	11,8	76,4	65,3 ; 86,5	8,3**	2,6 ; 15,2	15,3**	6,5 ; 25,3
Femmes	P = 0,161			P = 0,647					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	76,9	68,3 ; 84,2	12,7*	7,1 ; 19,1	10,4**	4,7 ; 17,1
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	68,5	60,7 ; 76,7	18,6*	11,9 ; 25,8	12,8*	7,7 ; 18,9
Obésité	68,9	16,4	14,7	71,0	60,4 ; 80,6	15,5**	8,0 ; 24,9	13,5**	6,3 ; 21,7

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
19,8	17,8 ; 21,9	18,3	16,3 ; 20,3	3,3*	2,4 ; 4,4	58,6	56,0 ; 61,2	Ensemble de la population	
P = 0,000									
15,3	12,7 ; 18,1	17,2	14,3 ; 20,0	4,4*	2,7 ; 6,2	63,2	59,4 ; 66,9	Sexe	
24,1	21,1 ; 27,1	19,3	16,7 ; 22,1	2,3*	1,3 ; 3,5	54,2	50,8 ; 57,5	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
10,0*	5,7 ; 14,8	13,4*	7,9 ; 18,9	11,8*	7,1 ; 17,2	64,7	57,1 ; 72,1	Groupe d'âge	
24,1	20,2 ; 28,0	17,8	14,2 ; 21,6	2,6**	1,1 ; 4,4	55,5	51,1 ; 60,0	15-24 ans	
22,6	19,2 ; 26,1	21,8	18,4 ; 25,3	0,7**	0,1 ; 1,5	54,9	50,7 ; 59,2	25-44 ans	
14,8	11,6 ; 18,3	16,8	13,0 ; 20,8	1,8**	0,6 ; 3,4	66,6	61,8 ; 71,4	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,074									
3,9**	0,4 ; 8,4	15,8**	8,0 ; 24,6	17,6*	9,6 ; 27,2	62,6	51,1 ; 73,4	Hommes	
17,3*	12,3 ; 22,7	17,9*	12,6 ; 23,7	3,1**	0,6 ; 6,1	61,7	54,9 ; 68,4	15-24 ans	
19,8	14,8 ; 24,8	18,0	13,3 ; 22,7	x	;	x	;	25-44 ans	
13,0*	7,8 ; 19,0	15,2*	9,7 ; 21,6	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,009									
16,3**	8,4 ; 25,2	10,9**	4,1 ; 18,4	5,9**	1,1 ; 11,9	66,9	56,3 ; 77,6	Femmes	
30,8	25,2 ; 36,7	17,7	12,8 ; 23,2	2,2**	0,5 ; 4,1	49,3	43,0 ; 55,6	15-24 ans	
25,2	20,4 ; 30,3	25,5	20,5 ; 30,7	x	;	x	;	25-44 ans	
16,1	11,6 ; 20,7	18,0	13,0 ; 23,4	1,8**	0,3 ; 3,7	64,1	57,7 ; 70,2	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,452									
x	;	x	;	x	;	77,8	59,4 ; 95,0	Statut pondéral	
10,4	8,0 ; 12,9	14,5	11,7 ; 17,2	6,2*	4,2 ; 8,2	68,9	65,1 ; 72,7	Poids insuffisant	
23,9	20,2 ; 27,7	24,2	20,3 ; 28,1	x	;	x	;	Poids normal	
41,0	34,9 ; 47,3	17,7	12,9 ; 22,7	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,173									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
2,8**	0,7 ; 5,5	9,9*	6,4 ; 13,7	10,3*	6,4 ; 14,6	77,0	71,3 ; 82,3	Poids insuffisant	
18,0	13,7 ; 22,8	24,4	19,3 ; 29,6	x	;	x	;	Poids normal	
38,8	30,2 ; 47,4	17,4*	10,7 ; 24,8	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,582									
x	;	x	;	x	;	72,2	50,1 ; 92,8	Femmes	
16,2	12,3 ; 20,1	18,0	14,1 ; 22,0	3,1**	1,4 ; 5,0	62,7	58,0 ; 67,6	Poids insuffisant	
32,3	26,3 ; 38,5	24,0	18,6 ; 29,6	x	;	x	;	Poids normal	
43,4	34,7 ; 52,6	18,1*	11,5 ; 25,4	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
38,6	34,7 ; 42,6	22,0	18,8 ; 25,5	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	27,6*	14,3 ; 42,4	65,0	48,4 ; 79,0	Excès de poids	
8,6	6,6 ; 10,7	16,8	14,2 ; 19,6	4,2*	2,8 ; 5,8	70,4	67,1 ; 73,7	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
33,5	28,1 ; 39,0	17,7	13,5 ; 22,3	7,5*	4,5 ; 11,1	41,3	36,0 ; 47,0	Ensemble de la population	
P = 0,820									
33,2	24,2 ; 42,5	20,5*	12,6 ; 28,9	6,5**	1,9 ; 12,2	39,8	30,0 ; 49,8	Sexe	
33,6	26,9 ; 40,7	16,1*	10,8 ; 21,8	8,1**	4,0 ; 12,8	42,2	35,2 ; 49,2	Hommes	
								Femmes	
P = 0,757									
39,5**	15,3 ; 67,2	x	;	x	;	34,1**	10,3 ; 59,8	Groupe d'âge	
35,9	27,1 ; 44,9	19,4*	12,4 ; 27,0	8,3**	3,4 ; 14,0	36,4	27,7 ; 45,6	15-24 ans	
34,0	25,4 ; 42,2	14,8*	8,6 ; 22,0	6,8**	1,8 ; 13,4	44,4	35,8 ; 53,7	25-44 ans	
19,1**	8,8 ; 30,5	15,5**	7,1 ; 25,2	12,1**	3,6 ; 21,5	53,3	39,3 ; 66,9	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,999									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
31,5*	16,1 ; 47,3	23,2**	9,8 ; 38,3	x	;	x	;	15-24 ans	
37,3*	23,4 ; 51,8	18,1**	5,6 ; 31,6	7,6**	0,3 ; 17,1	36,9*	23,6 ; 51,6	25-44 ans	
27,8**	6,8 ; 52,5	19,6**	3,5 ; 40,3	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,852									
43,8**	14,9 ; 79,1	x	;	x	;	x	;	Femmes	
38,2	27,1 ; 49,5	17,4**	8,5 ; 26,9	9,1**	2,6 ; 16,8	35,2	25,0 ; 46,4	15-24 ans	
31,6*	21,3 ; 42,9	12,4**	5,9 ; 20,3	x	;	x	;	25-44 ans	
13,4**	2,7 ; 26,9	12,8**	3,9 ; 24,7	16,9**	4,4 ; 30,9	56,9	40,2 ; 73,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,836									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
38,6*	27,4 ; 51,2	20,6**	9,3 ; 32,6	x	;	x	;	Poids insuffisant	
31,3	22,6 ; 40,1	17,1*	11,3 ; 24,0	8,0**	3,3 ; 13,4	43,7	35,0 ; 53,1	Poids normal	
34,3	24,7 ; 44,4	15,9*	8,8 ; 24,0	9,9**	3,3 ; 17,7	39,8	30,3 ; 49,4	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,903									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	x	;	x	;	50,3**	8,5 ; 100,0	Poids insuffisant	
33,9*	21,1 ; 48,1	16,4**	7,3 ; 27,2	x	;	x	;	Poids normal	
35,3*	20,8 ; 49,9	23,1**	10,8 ; 35,9	9,2**	0,4 ; 19,8	32,4*	18,8 ; 46,6	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,745									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
41,5	29,3 ; 55,3	18,9**	7,4 ; 30,7	x	;	x	;	Poids insuffisant	
29,2*	17,9 ; 41,4	17,7*	9,7 ; 27,3	10,2**	3,1 ; 18,5	43,0	31,6 ; 55,4	Poids normal	
33,4*	20,8 ; 47,2	9,1**	1,2 ; 19,6	10,6**	1,9 ; 22,7	46,9	32,9 ; 60,4	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	86,8	84,0 ; 89,4	7,8	5,8 ; 9,9	5,4*	3,5 ; 7,5
<b>Sexe</b>	P = 0,001			P = 0,690					
Hommes	88,9	6,9	4,2	86,8	82,4 ; 91,0	8,5*	5,3 ; 12,0	4,6**	2,0 ; 7,7
Femmes	85,7	7,5	6,8	86,8	83,0 ; 90,2	7,2*	4,8 ; 10,0	6,0*	3,5 ; 8,8
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,018			P = 0,805					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	82,4	69,1 ; 93,4	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	88,2	83,1 ; 92,9	6,4**	3,3 ; 10,1	5,4**	1,8 ; 9,6
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	86,1	82,0 ; 90,1	7,5*	4,5 ; 11,0	6,4*	3,4 ; 9,6
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	87,9	81,9 ; 93,4	8,3**	3,9 ; 13,3	3,8**	0,5 ; 8,0
<b>Hommes</b>	P = 0,121			P = 0,901					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	91,5	75,0 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	91,2	84,0 ; 97,2	x	;	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	84,0	75,8 ; 91,2	8,2**	3,2 ; 14,0	7,8**	2,3 ; 14,4
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	78,9	64,9 ; 91,5	x	;	x	;
<b>Femmes</b>	P = 0,017			P = 0,749					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	75,6	53,6 ; 93,6	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	86,0	78,5 ; 92,6	6,3**	2,5 ; 10,9	7,6**	2,2 ; 14,2
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	87,7	82,7 ; 92,1	7,0**	3,5 ; 11,2	5,3**	2,3 ; 8,7
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	93,7	88,7 ; 97,8	x	;	x	;
<b>Statut pondéral</b>	P = 0,005			P = 0,344					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	88,0	82,5 ; 92,7	7,0**	3,5 ; 11,2	5,0**	1,7 ; 9,0
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	88,5	84,2 ; 92,3	7,0*	4,3 ; 10,1	4,6**	1,7 ; 7,9
Obésité	82,0	8,7	9,2	80,7	74,2 ; 86,8	11,3*	6,3 ; 17,2	7,9**	4,0 ; 12,4
<b>Hommes</b>	P = 0,002			P = 0,672					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	81,7	66,5 ; 95,3	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	92,8	88,3 ; 96,6	x	;	x	;
Obésité	85,2	8,2	6,6*	78,0	67,6 ; 88,1	13,2**	5,3 ; 22,2	8,8**	2,3 ; 16,4
<b>Femmes</b>	P = 0,034			P = 0,752					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	89,7	84,1 ; 94,6	5,9**	2,2 ; 10,4	4,4**	1,1 ; 8,3
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	83,8	76,6 ; 90,4	8,6**	4,3 ; 13,6	7,6**	2,3 ; 13,8
Obésité	79,1	9,2	11,8	83,5	74,6 ; 91,0	9,5**	3,2 ; 17,1	7,1**	2,5 ; 12,6

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	8,3	6,2 ; 10,5	91,7	89,5 ; 93,8
Sexe	P = 0,024		P = 0,273			
Hommes	6,6	93,4	6,9*	3,9 ; 10,1	93,1	89,9 ; 96,1
Femmes	8,6	91,4	9,3*	6,5 ; 12,4	90,7	87,6 ; 93,5
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,690			
15-24 ans	11,2*	88,8	x	;	x	;
25-44 ans	8,0	92,0	9,9*	5,8 ; 14,5	90,1	85,5 ; 94,2
45-64 ans	7,5	92,5	7,7*	4,7 ; 11,0	92,3	89,0 ; 95,3
65 ans et plus	4,9	95,1	7,7**	3,0 ; 13,4	92,3	86,6 ; 97,0
Hommes	P = 0,409		P = 0,575			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	5,3**	0,7 ; 11,6	94,7	88,4 ; 99,3
45-64 ans	7,0	93,0	7,9**	2,7 ; 13,6	92,1	86,4 ; 97,3
65 ans et plus	6,5*	93,5	11,1**	2,0 ; 22,1	88,9	77,9 ; 98,0
Femmes	P = 0,003		P = 0,250			
15-24 ans	12,3*	87,7	x	;	x	;
25-44 ans	9,9	90,1	13,2*	7,4 ; 20,1	86,8	79,9 ; 92,6
45-64 ans	7,8	92,2	7,6**	3,9 ; 11,8	92,4	88,2 ; 96,1
65 ans et plus	3,8*	96,2	5,5**	0,6 ; 11,5	94,5	88,5 ; 99,4
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,133			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	8,7*	4,8 ; 13,1	91,3	86,9 ; 95,2
Embonpoint	6,6	93,4	7,2*	4,3 ; 10,4	92,8	89,6 ; 95,7
Obésité	11,3	88,7	9,9**	5,5 ; 15,4	90,1	84,6 ; 94,5
Hommes	P = 0,000		P = 0,509			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	7,6**	0,2 ; 16,8	92,4	83,2 ; 99,8
Embonpoint	5,1*	94,9	5,3**	1,8 ; 9,5	94,7	90,5 ; 98,2
Obésité	11,5	88,5	9,6**	2,4 ; 17,9	90,4	82,1 ; 97,6
Femmes	P = 0,032		P = 0,288			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	9,0**	4,5 ; 14,4	91,0	85,6 ; 95,5
Embonpoint	8,4	91,6	9,4**	5,0 ; 14,2	90,6	85,8 ; 95,0
Obésité	11,1	88,9	10,3**	4,1 ; 17,4	89,7	82,6 ; 95,9

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 0,842					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	1,6**	0,7 ; 2,7	x	;	1,9**	0,6 ; 3,5
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	2,3**	1,1 ; 3,6	x	;	1,9**	0,4 ; 3,6
Rarement	2,8	2,6*	2,9	2,5**	1,2 ; 4,1	3,0**	0,7 ; 5,8	2,1**	0,7 ; 4,1
Jamais	94,8	94,8	94,8	93,6	91,4 ; 95,6	92,9	89,3 ; 96,2	94,1	91,3 ; 96,5
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,739					
Souvent	4,6	4,2	4,9	4,8*	3,3 ; 6,6	4,1**	1,8 ; 6,9	5,4*	3,3 ; 7,6
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	7,1*	5,0 ; 9,5	6,0*	3,0 ; 9,2	7,8*	4,8 ; 11,4
Rarement	5,1	5,5	4,9	7,0*	4,9 ; 9,4	7,5*	4,4 ; 11,2	6,7*	3,9 ; 9,7
Jamais	82,9	81,4	84,0	81,1	77,7 ; 84,3	82,4	77,3 ; 87,2	80,1	75,5 ; 84,5
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,753					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	2,2**	1,1 ; 3,4	x	;	2,7**	1,1 ; 4,5
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	5,8	4,0 ; 7,7	x	;	6,2*	3,9 ; 8,7
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,4*	2,8 ; 6,1	5,0**	2,5 ; 8,0	3,9**	2,0 ; 6,1
Jamais	86,5	87,5	85,7	87,7	85,0 ; 90,1	88,4	84,0 ; 92,3	87,2	83,6 ; 90,5
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	1,2**	0,4 ; 2,3	x	;	1,3**	0,2 ; 2,7
Jamais	98,2	98,5	98,0	97,9	96,7 ; 99,0	98,9	97,0 ; 100,0	97,2	95,5 ; 98,8
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,2	98,4 ; 99,9	98,8	96,9 ; 100,0	99,5	98,7 ; 100,0
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	0,5**	0,0 ; 1,0	x	;	0,8**	0,1 ; 1,7
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,8	97,8 ; 99,6	99,4	97,7 ; 100,0	98,3	97,1 ; 99,4
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,2	98,5 ; 99,8	98,8	97,3 ; 100,0	99,4	98,7 ; 100,0
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,5**	0,6 ; 2,6	x	;	1,7**	0,4 ; 3,3
Jamais	97,3	98,6	96,3	96,9	95,5 ; 98,2	97,3	94,7 ; 99,4	96,7	94,8 ; 98,3



Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	98,9	97,7 ; 99,7	99,5	98,5 ; 100,0	98,5	96,6 ; 99,8
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,4	98,7 ; 100,0	x	;	99,0	97,9 ; 99,9
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,6	98,7 ; 100,0	x	;	99,3	97,8 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
5,5*	3,6 ; 7,6	33,6	29,7 ; 37,4	46,8	42,4 ; 50,8	14,2	11,4 ; 17,1	Ensemble de la population	
P = 0,299									
6,2**	3,2 ; 9,7	37,0	30,4 ; 43,6	45,2	38,3 ; 52,0	11,6*	7,5 ; 16,1	Sexe	
4,9*	2,6 ; 7,5	31,2	25,8 ; 36,0	47,9	42,5 ; 53,3	15,9	12,3 ; 19,7	Hommes	
								Femmes	
P = 0,622									
x	;	41,3*	24,8 ; 57,4	49,0*	32,6 ; 66,3	x	;	Groupe d'âge	
3,3**	0,9 ; 6,1	36,0	29,0 ; 42,9	45,5	38,0 ; 52,8	15,2	10,5 ; 20,2	15-24 ans	
8,5*	4,6 ; 12,9	28,8	23,2 ; 34,8	47,3	40,9 ; 53,8	15,4*	11,0 ; 20,3	25-44 ans	
6,9**	2,8 ; 11,9	35,0	26,1 ; 43,8	47,2	38,1 ; 57,2	10,9**	5,3 ; 17,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,887									
x	;	63,3*	35,2 ; 88,4	25,5**	3,1 ; 51,4	x	;	Hommes	
x	;	39,9	28,5 ; 51,5	41,9	30,1 ; 53,5	14,0**	6,6 ; 22,6	15-24 ans	
9,6**	3,5 ; 16,8	27,8*	18,9 ; 37,8	50,8	39,8 ; 61,2	11,7**	5,6 ; 18,6	25-44 ans	
x	;	36,5*	20,6 ; 53,8	53,8	36,7 ; 70,5	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,802									
x	;	25,7**	6,3 ; 45,8	65,5	43,6 ; 86,9	x	;	Femmes	
x	;	33,2	23,5 ; 42,2	48,1	38,6 ; 58,0	x	;	15-24 ans	
7,6**	2,9 ; 13,3	29,6	22,0 ; 37,6	44,7	36,5 ; 52,7	18,1*	11,9 ; 24,6	25-44 ans	
7,1**	1,9 ; 13,5	34,2*	23,3 ; 45,2	43,6	32,6 ; 55,8	15,0**	6,8 ; 24,0	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,100									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
4,5**	1,4 ; 8,1	39,3	31,2 ; 47,3	39,5	31,7 ; 47,2	16,6*	10,8 ; 22,9	Poids insuffisant	
5,1**	2,6 ; 8,1	33,6	27,2 ; 39,8	49,9	43,5 ; 56,3	11,4	8,0 ; 15,1	Poids normal	
6,6**	2,3 ; 12,0	26,6	19,8 ; 33,5	50,2	41,6 ; 58,3	16,7*	10,5 ; 23,1	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,832									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	47,4*	30,2 ; 65,8	38,4*	20,8 ; 56,9	x	;	Poids insuffisant	
8,5**	3,7 ; 14,2	39,2	30,1 ; 48,8	41,7	32,3 ; 50,9	10,6*	5,3 ; 16,3	Poids normal	
x	;	28,2*	17,1 ; 39,9	54,1	41,3 ; 66,3	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,012									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
4,4**	1,5 ; 8,2	37,0	27,8 ; 46,0	39,9	31,6 ; 48,8	18,7*	11,4 ; 26,3	Poids insuffisant	
1,7**	0,1 ; 3,8	27,8*	19,7 ; 36,1	58,4	49,5 ; 67,0	12,1*	7,6 ; 17,4	Poids normal	
10,5**	2,0 ; 20,3	24,8*	15,6 ; 34,5	45,9	34,6 ; 57,7	18,8*	10,0 ; 28,7	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,082				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	44,4	40,2 ; 48,6	49,8	43,1 ; 56,8	40,6	35,3 ; 45,7	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	37,0	33,0 ; 41,0	33,6	27,2 ; 40,3	39,3	34,3 ; 44,4	
Non	14,4	15,3	13,7	18,6	15,5 ; 21,7	16,6	11,7 ; 21,7	20,1	16,1 ; 24,5	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,077				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	40,3	36,5 ; 44,2	36,1	29,9 ; 42,4	43,3	38,3 ; 48,5	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	40,0	36,0 ; 44,0	40,0	33,3 ; 46,4	40,0	34,9 ; 45,1	
Non	19,6	22,6	17,4	19,7	16,5 ; 23,2	23,9	18,0 ; 29,9	16,7	12,8 ; 20,9	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,195				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	37,3	33,4 ; 41,4	32,9	26,8 ; 39,1	40,5	35,4 ; 45,8	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	32,8	28,8 ; 36,8	34,9	28,4 ; 41,0	31,3	26,3 ; 36,3	
Non	27,7	32,4	24,3	29,9	25,9 ; 33,6	32,2	26,1 ; 38,5	28,2	23,3 ; 33,3	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,102				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	39,0	35,3 ; 42,9	33,7	27,6 ; 39,7	42,8	37,7 ; 48,2	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	33,7	29,6 ; 37,6	36,0	29,5 ; 42,6	32,1	27,0 ; 37,1	
Non	26,1	27,4	25,1	27,3	23,6 ; 31,0	30,3	24,3 ; 36,5	25,1	20,6 ; 30,1	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,003				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	65,5	61,5 ; 69,2	60,3	53,7 ; 66,6	69,1	64,1 ; 74,0	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	16,3	13,2 ; 19,4	22,5	17,0 ; 28,0	11,9	8,4 ; 15,4	
Non	17,4	18,5	16,6	18,2	15,2 ; 21,5	17,2	12,5 ; 22,4	18,9	14,7 ; 23,3	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,011				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	64,1	60,0 ; 68,0	56,9	50,3 ; 63,3	69,2	64,4 ; 74,4	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	23,3	19,7 ; 27,0	28,0	22,4 ; 34,6	19,9	15,4 ; 24,5	
Non	12,6	14,0	11,6	12,7	10,0 ; 15,5	15,1*	10,5 ; 20,3	10,9*	7,7 ; 14,4	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,102				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	49,0	44,8 ; 53,4	45,1	38,1 ; 52,0	51,8	46,4 ; 57,4	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	25,5	21,8 ; 29,2	24,7	18,8 ; 30,8	26,1	21,3 ; 30,8	
Non	21,5	24,4	19,4	25,4	21,9 ; 29,2	30,2	24,1 ; 36,5	22,1	17,9 ; 26,8	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,002				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	12,1	9,3 ; 15,2	14,1*	9,0 ; 19,5	10,7*	7,4 ; 14,1	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	13,4	10,8 ; 16,2	19,2	14,3 ; 24,7	9,3*	6,7 ; 12,1	
Non	72,0	67,3	75,4	74,5	70,8 ; 78,1	66,7	60,4 ; 73,2	80,0	75,7 ; 84,1	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,121				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	35,3	31,4 ; 39,3	38,2	31,9 ; 44,9	33,2	28,2 ; 38,4	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	14,9	11,7 ; 18,1	16,9*	11,9 ; 22,4	13,4	9,6 ; 17,2	
Non	49,9	43,2	54,7	49,9	45,6 ; 54,1	44,9	38,2 ; 51,3	53,4	48,2 ; 58,7	

Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	54,9	50,8 ; 59,1	49,7	43,2 ; 56,7	58,5	53,0 ; 63,8	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	13,2	10,4 ; 16,1	20,3	14,8 ; 25,8	8,2*	5,5 ; 11,2	
Non	29,6	28,8	30,2	31,9	28,2 ; 35,7	30,0	24,3 ; 36,1	33,2	28,3 ; 38,4	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,051				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	38,3	34,4 ; 42,3	32,8	26,5 ; 39,4	42,1	37,3 ; 47,2	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	13,4	10,5 ; 16,4	16,3*	10,9 ; 21,8	11,3	8,0 ; 14,8	
Non	48,5	52,0	45,9	48,4	44,3 ; 52,4	50,9	44,1 ; 57,8	46,6	41,7 ; 51,8	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,904				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	38,7	34,5 ; 42,8	38,3	31,8 ; 44,9	39,0	33,8 ; 44,6	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	24,6	20,8 ; 28,3	25,6	19,8 ; 31,4	23,9	19,3 ; 28,6	
Non	37,5	34,7	39,5	36,7	33,0 ; 40,6	36,2	30,1 ; 42,7	37,1	32,4 ; 42,2	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
61,7	59,1 ; 64,1	28,2	25,9 ; 30,5	10,1	8,5 ; 11,9	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
54,5	50,4 ; 58,3	31,5	28,2 ; 35,1	13,9	11,1 ; 16,8	Hommes
68,3	64,9 ; 71,4	25,1	22,2 ; 28,2	6,6	4,9 ; 8,5	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
57,1	42,2 ; 69,7	10,7**	3,2 ; 19,6	32,2*	20,4 ; 46,2	15-17 ans
44,8	34,5 ; 54,8	24,9*	16,9 ; 33,5	30,3*	21,1 ; 40,2	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
49,3	40,8 ; 57,1	19,7	13,9 ; 25,7	31,0	23,8 ; 38,7	25-44 ans
55,0	50,4 ; 59,6	35,6	31,1 ; 40,0	9,4	6,9 ; 12,1	45-64 ans
60,3	56,5 ; 64,4	34,7	30,8 ; 38,5	4,9*	3,1 ; 6,9	65 ans et plus
92,0	88,6 ; 95,1	x	;	x	;	
		P = 0,029				Hommes
57,3*	37,8 ; 76,4	x	;	x	;	15-17 ans
41,9*	26,5 ; 58,8	17,9**	7,5 ; 30,0	40,2*	24,8 ; 55,8	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
48,1	36,3 ; 60,4	14,5*	7,4 ; 22,6	37,4*	25,3 ; 49,8	25-44 ans
46,8	39,8 ; 53,5	39,0	32,3 ; 45,9	14,2*	9,5 ; 18,9	45-64 ans
50,5	44,1 ; 57,0	41,7	35,4 ; 47,8	7,8*	4,4 ; 11,4	65 ans et plus
91,1	85,9 ; 95,5	x	;	x	;	
		P = 0,094				Femmes
56,8*	36,1 ; 75,1	12,1**	0,9 ; 26,3	31,1**	14,6 ; 50,3	15-17 ans
47,4	33,1 ; 61,7	31,0*	18,8 ; 43,4	21,6**	10,7 ; 33,8	18-24 ans
		P = 0,071				15-24 ans
50,5	38,4 ; 61,3	24,8*	15,7 ; 34,5	24,7*	15,9 ; 34,8	25-44 ans
63,0	57,0 ; 69,0	32,2	26,5 ; 38,1	4,8**	2,5 ; 7,6	45-64 ans
69,6	64,4 ; 74,5	28,1	23,4 ; 33,4	2,3**	0,7 ; 4,2	65 ans et plus
92,7	88,0 ; 96,8	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	36,8	34,4 ; 39,3	43,7	40,1 ; 47,6	30,2	27,2 ; 33,5
Non	56,1	49,9	62,1	63,2	60,7 ; 65,6	56,3	52,4 ; 59,9	69,8	66,5 ; 72,8
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	7,1	5,8 ; 8,4	10,1	7,9 ; 12,5	4,2	3,0 ; 5,5
Non	89,4	85,6	93,2	92,9	91,6 ; 94,2	89,9	87,5 ; 92,1	95,8	94,5 ; 97,0
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Oui	7,3	9,1	5,5	5,9	4,6 ; 7,1	7,9	5,9 ; 10,1	3,9*	2,5 ; 5,4
Non	92,7	90,9	94,5	94,1	92,9 ; 95,4	92,1	89,9 ; 94,1	96,1	94,6 ; 97,5
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,076					
Oui	5,1	6,3	3,9	3,8	2,7 ; 4,8	4,8*	3,1 ; 6,6	2,8*	1,7 ; 4,1
Non	94,9	93,7	96,1	96,2	95,2 ; 97,3	95,2	93,4 ; 96,9	97,2	95,9 ; 98,3
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	12,3	16,1	8,7	8,4	6,9 ; 9,9	12,9	10,3 ; 15,7	4,0*	2,8 ; 5,5
Non	87,7	83,9	91,3	91,6	90,1 ; 93,1	87,1	84,3 ; 89,7	96,0	94,5 ; 97,2
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = 0,031					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,6**	0,2 ; 1,0	1,0**	0,3 ; 1,9	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	99,4	99,0 ; 99,8	99,0	98,1 ; 99,7	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,198					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,3**	0,0 ; 0,6	x	;	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,7	99,4 ; 100,0	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,007					
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,3**	0,0 ; 0,5	0,5**	0,0 ; 1,0	x	;
Non	99,2	98,8	99,7	99,7	99,5 ; 100,0	99,5	99,0 ; 100,0	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,166					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,5*	0,9 ; 2,2	1,9**	0,9 ; 3,0	1,1**	0,5 ; 1,9
Non	98,2	98,1	98,4	98,5	97,8 ; 99,1	98,1	97,0 ; 99,1	98,9	98,1 ; 99,5
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,011					
Oui	1,6	2,3	0,9	1,2*	0,6 ; 1,8	2,0**	1,0 ; 3,3	0,4**	0,0 ; 0,8
Non	98,4	97,7	99,1	98,8	98,2 ; 99,4	98,0	96,7 ; 99,0	99,6	99,2 ; 100,0
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,008					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,3**	0,1 ; 0,7	x	;	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,7	99,3 ; 99,9	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	12,2	16,2	8,3	9,5	7,9 ; 11,1	13,4	10,7 ; 16,2	5,9	4,3 ; 7,8	
Non	87,8	83,8	91,7	90,5	88,9 ; 92,1	86,6	83,8 ; 89,3	94,1	92,2 ; 95,7	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,330				
Oui	1,6	2,3	0,8	0,7**	0,3 ; 1,2	1,0**	0,3 ; 1,8	0,5**	0,0 ; 1,1	
Non	98,4	97,7	99,2	99,3	98,8 ; 99,7	99,0	98,2 ; 99,7	99,5	98,9 ; 100,0	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,296				
Oui	1,8	2,4	1,3	1,0**	0,5 ; 1,6	1,3**	0,5 ; 2,3	0,6**	0,1 ; 1,3	
Non	98,2	97,6	98,7	99,0	98,4 ; 99,5	98,7	97,7 ; 99,5	99,4	98,7 ; 99,9	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,604				
Oui	1,4	1,7	1,0	1,1**	0,5 ; 1,8	1,3**	0,4 ; 2,5	0,9**	0,2 ; 1,9	
Non	98,6	98,3	99,0	98,9	98,2 ; 99,5	98,7	97,5 ; 99,6	99,1	98,1 ; 99,8	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,003				
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,7**	0,2 ; 1,3	1,3**	0,3 ; 2,6	x	;	
Non	99,2	98,8	99,6	99,3	98,7 ; 99,8	98,7	97,4 ; 99,7	x	;	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 'n.d.'				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = 'n.d.'				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,042				
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,3**	0,0 ; 0,7	x	;	x	;	
Non	99,6	99,6	99,7	99,7	99,3 ; 100,0	x	;	x	;	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %, estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	10,1	8,5 ; 11,9	13,9	11,1 ; 16,8	6,6	4,9 ; 8,5
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	32,2*	20,4 ; 46,2	33,2**	14,5 ; 52,4	31,1**	14,6 ; 50,3
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	30,3*	21,1 ; 40,2	40,2*	24,8 ; 55,8	21,6**	10,7 ; 33,8
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	9,4	6,9 ; 12,1	14,2*	9,5 ; 18,9	4,8**	2,5 ; 7,6
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	4,9*	3,1 ; 6,9	7,8*	4,4 ; 11,4	2,3**	0,7 ; 4,2
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	24,2	22,0 ; 26,5	7,0	5,6 ; 8,4	7,2	5,8 ; 8,5
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	26,1	22,5 ; 29,9	8,7	6,4 ; 11,1	10,7	8,3 ; 13,2
Femmes	25,4	6,8	7,4	22,4	19,5 ; 25,4	5,4*	3,8 ; 7,1	3,9*	2,6 ; 5,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,073					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	29,8*	17,3 ; 42,7	x	;	6,4**	1,4 ; 12,4
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	27,8	18,9 ; 37,0	15,3*	8,6 ; 23,6	12,1**	6,1 ; 19,6
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,022					
25-44 ans	33,4	8,4	15,9	28,5	21,5 ; 35,7	12,2*	7,2 ; 18,1	10,0*	5,8 ; 15,2
45-64 ans	29,9	12,3	16,1	27,3	23,2 ; 31,6	7,5*	5,1 ; 10,2	10,2	7,6 ; 12,9
65 ans et plus	29,0	7,1	7,2	26,7	23,1 ; 30,5	7,0*	4,9 ; 9,3	5,9*	4,0 ; 8,0
Hommes	7,1	0,5**	0,4**	7,5*	4,5 ; 10,7	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,648					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	28,1**	10,5 ; 47,2	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	29,9*	16,8 ; 44,3	12,9**	3,3 ; 24,9	15,3**	5,4 ; 27,2
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,213					
25-44 ans	33,0	8,7	18,3	29,2*	18,1 ; 40,1	11,1**	3,8 ; 19,8	11,6**	5,1 ; 19,3
45-64 ans	29,0	13,5	21,1	29,6	23,2 ; 36,4	8,5*	4,7 ; 12,9	15,1*	10,1 ; 20,1
65 ans et plus	32,2	9,0	10,0	28,4	22,6 ; 34,3	11,1*	7,1 ; 15,5	10,1*	6,4 ; 14,2
Femmes	10,0	0,8**	0,6**	8,2**	3,8 ; 13,1	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,298					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	31,9**	15,2 ; 51,2	x	;	x	;
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	25,9*	14,3 ; 38,3	17,4**	7,8 ; 29,1	9,3**	1,8 ; 18,1
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,036					
25-44 ans	33,8	8,1	13,5	27,9*	18,5 ; 37,9	13,2**	6,4 ; 21,7	8,4**	2,7 ; 14,9
45-64 ans	30,8	11,0	11,0	25,0	19,5 ; 30,5	6,6*	3,7 ; 9,9	5,4*	3,1 ; 8,2
65 ans et plus	25,9	5,3	4,5	25,2	20,5 ; 30,4	3,2**	1,5 ; 5,1	2,0**	0,6 ; 3,5
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	6,9**	2,9 ; 11,5	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	76,9	74,8 ; 78,9	83,0	80,1 ; 85,8	71,0	68,1 ; 73,8
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	47,0	33,1 ; 60,4	50,7*	30,1 ; 69,1	42,6*	24,7 ; 63,1
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	76,4	66,8 ; 85,6	78,1	63,4 ; 92,1	74,8	61,6 ; 87,2
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	65,4	57,5 ; 73,3	67,0	55,3 ; 78,1	63,8	52,4 ; 74,8
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	91,1	88,1 ; 93,8	91,5	87,2 ; 95,5	90,6	86,3 ; 94,4
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	83,4	80,5 ; 86,1	91,7	88,3 ; 94,8	75,5	70,9 ; 79,6
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	57,6	51,7 ; 63,5	67,2	58,1 ; 75,5	47,7	39,8 ; 55,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	77,0	72,6 ; 81,1	83,8	77,5 ; 89,9	71,7	65,9 ; 77,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	79,8	75,7 ; 84,0	86,9	80,9 ; 92,5	73,0	66,8 ; 79,1
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	87,1	83,8 ; 90,2	89,5	85,4 ; 93,6	84,4	79,0 ; 89,0
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	90,8	89,1 ; 92,4	88,2	85,3 ; 90,9	93,7	91,6 ; 95,5
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	7,8	6,2 ; 9,5	9,6	7,1 ; 12,4	5,7*	4,0 ; 7,8
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,4**	0,7 ; 2,2	2,2**	0,9 ; 3,6	0,6**	0,1 ; 1,2
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	46,9	45,4 ; 48,3	0,9**	0,2 ; 1,8	98,8	97,8 ; 99,5
Femmes	51,5	97,5	0,8	52,5	51,1 ; 53,9	98,8	97,6 ; 99,7	x	;
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,6**	0,2 ; 1,1	x	;	0,9**	0,2 ; 1,8

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	90,8	89,1 ; 92,4	7,8	6,2 ; 9,5	1,4**	0,7 ; 2,2
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,013					
Hommes	86,4	10,7	2,9	88,2	85,3 ; 90,9	9,6	7,1 ; 12,4	2,2**	0,9 ; 3,6
Femmes	91,6	7,4	0,9*	93,7	91,6 ; 95,5	5,7*	4,0 ; 7,8	0,6**	0,1 ; 1,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,093					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	78,5	60,2 ; 93,8	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	74,9	65,5 ; 84,6	19,3*	10,7 ; 28,3	5,8**	1,1 ; 11,6
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	75,8	68,1 ; 83,9	18,9*	11,4 ; 26,6	5,2**	1,6 ; 9,7
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	89,8	86,6 ; 92,7	9,2*	6,4 ; 12,4	1,0**	0,2 ; 2,0
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	95,8	94,0 ; 97,5	3,3*	1,9 ; 4,9	0,8**	0,0 ; 1,8
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	96,9	93,5 ; 99,5	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	68,1**	18,5 ; 100,0	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	88,7	85,8 ; 91,3	9,4	6,9 ; 12,3	1,9**	0,7 ; 3,3
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,227					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	94,5	92,5 ; 96,3	x	;	x	;
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	48,0	43,9 ; 52,0	62,8	57,5 ; 68,0
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000		P = 0,000			
15-24 ans	87,9	...	91,5	82,2 ; 99,0	...	;
25-44 ans	62,4	...	58,3	51,3 ; 65,6	...	;
45-64 ans	29,9	...	35,0	28,3 ; 41,7	...	;
65 ans et plus	7,3	...	4,1**	0,5 ; 8,5	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000		...	P = 0,003	
15-24 ans	...	90,0	...	;	81,0	69,6 ; 91,9
25-34 ans	...	71,0	...	;	64,2	54,3 ; 73,9
35-49 ans	...	53,5	...	;	54,8	47,4 ; 62,0
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,009		P = 0,554	
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	45,6	34,5 ; 56,2	59,8	39,6 ; 79,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	52,3	43,5 ; 61,2	59,9	49,0 ; 70,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	44,7	36,0 ; 53,3	64,5	55,1 ; 73,6
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	50,5	42,7 ; 58,4	65,0	56,4 ; 73,9
Nombre de partenaires	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,002	
Un partenaire	43,8	64,2	45,1	41,0 ; 49,5	60,5	55,0 ; 66,2
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	65,4	49,5 ; 80,3	84,7	70,4 ; 95,1
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	92,5	71,0 ; 100,0	82,5*	32,4 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433		P = 0,566		P = .	
Hommes	x	66,6	x	;	62,6	57,3 ; 67,8
Femmes	47,8	x	47,8	43,7 ; 51,8	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	78,1*	30,1 ; 100,0

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	15,8	13,6 ; 18,1	13,6	11,5 ; 15,7	70,5	67,9 ; 73,1
Sexe	P = 0,093			P = 0,017					
Hommes	14,8	14,9	70,3	18,2	14,8 ; 21,7	14,7	11,9 ; 17,9	67,0	63,3 ; 70,6
Femmes	13,2	14,7	72,1	13,1	10,2 ; 16,4	12,3	9,6 ; 15,1	74,5	70,8 ; 78,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	64,4	45,4 ; 82,3	25,3**	9,6 ; 43,6	10,2**	0,7 ; 23,0
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	35,8	24,9 ; 47,0	27,6*	17,7 ; 36,9	36,7	26,5 ; 47,2
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	43,4	33,9 ; 53,0	27,0*	18,9 ; 35,7	29,6	21,4 ; 38,5
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	18,2	14,3 ; 22,2	18,9	15,4 ; 22,8	62,9	58,3 ; 67,4
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	6,4*	4,1 ; 8,9	6,0*	3,9 ; 8,5	87,6	84,3 ; 90,5
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	x	;	x	;	96,5	93,2 ; 99,1
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,472					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	20,5*	13,0 ; 27,8	10,8*	6,0 ; 16,1	68,8	61,3 ; 76,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	17,8	12,8 ; 23,0	13,7*	9,5 ; 18,0	68,5	63,0 ; 74,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	12,7*	8,8 ; 16,6	14,0	10,1 ; 18,4	73,4	68,1 ; 78,5
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	15,3	11,2 ; 19,5	14,6	10,9 ; 18,6	70,0	65,0 ; 74,9
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	12,8	10,5 ; 15,2	10,7	8,8 ; 12,8	76,5	73,8 ; 79,2
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	43,9	31,5 ; 55,8	40,7	29,2 ; 52,5	15,3*	8,4 ; 23,3
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	45,7**	15,9 ; 71,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	20,8	18,3 ; 23,3	23,2	19,6 ; 26,9	18,0	14,7 ; 21,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	77,9	60,1 ; 92,9	87,6	65,3 ; 100,0	64,1*	33,8 ; 90,4
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	44,0	33,0 ; 55,5	54,6	37,8 ; 71,2	33,9*	18,5 ; 49,5
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	53,1	43,6 ; 62,7	64,7	50,8 ; 78,3	40,7*	27,5 ; 54,3
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	24,7	20,5 ; 29,0	26,8	20,3 ; 33,3	22,5	16,9 ; 28,7
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	8,9*	6,2 ; 11,9	10,4*	6,3 ; 15,1	7,1*	4,0 ; 10,7
	3,1*	3,9*	1,8**	3,0**	0,6 ; 5,9	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,215		P = 0,026		P = 0,590	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	26,1*	18,3 ; 33,7	34,1*	22,7 ; 44,4	14,4**	6,0 ; 24,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	22,1	16,9 ; 27,6	28,2*	19,8 ; 36,9	16,5*	10,3 ; 23,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	16,8	12,1 ; 21,5	16,2*	9,8 ; 22,8	17,6*	10,9 ; 24,7
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	21,3	16,8 ; 25,9	21,0*	14,4 ; 27,5	21,7	15,7 ; 28,1
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	16,5	14,0 ; 19,0	17,3	13,7 ; 20,8	15,6	12,2 ; 19,1
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	59,0	47,4 ; 69,7	63,7	48,9 ; 77,5	50,2*	31,5 ; 67,3
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	76,2	51,1 ; 93,1	85,8	61,2 ; 100,0	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,076		P = 0,060		P = 0,882	
Hommes	18,7	54,0	17,9	18,4	15,2 ; 21,9	x	;	17,9	14,7 ; 21,4
Femmes	19,2	19,2	x	22,7	19,0 ; 26,3	22,7	19,0 ; 26,3	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	6,5	5,3 ; 7,7	7,4	5,6 ; 9,4	5,6	4,2 ; 7,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,013		P = 0,074	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	2,7**	0,3 ; 5,7	x	;	x	;
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,006		P = 0,046	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	2,0**	0,2 ; 4,3	x	;	x	;
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	8,5	6,1 ; 11,1	10,0*	6,1 ; 14,2	6,9*	4,1 ; 10,2
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	8,4	6,2 ; 10,7	9,2*	5,8 ; 13,1	7,5*	4,8 ; 10,4
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,791		P = 0,677		P = 0,628	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	5,4*	2,9 ; 8,5	6,9**	2,8 ; 12,2	3,9**	1,1 ; 7,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	6,8*	4,4 ; 9,2	9,2*	5,0 ; 13,8	5,0**	2,6 ; 7,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	7,3*	4,8 ; 10,1	8,1**	4,2 ; 12,6	6,5*	3,4 ; 9,9
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	6,3*	4,2 ; 8,7	5,9**	2,7 ; 9,5	6,8*	3,9 ; 10,4
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,088		P = 0,768		P = 0,001	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	6,5	5,1 ; 8,0	7,2	5,1 ; 9,6	5,7*	3,8 ; 7,7
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	9,1**	3,5 ; 15,6	9,2**	1,6 ; 18,5	8,9**	1,1 ; 18,7
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	20,1**	4,1 ; 44,1	x	;	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,349		P = .		P = 0,014	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	6,0*	4,3 ; 8,0	x	;	6,1*	4,3 ; 8,0
Femmes	7,0	7,0	8,9**	7,7	5,6 ; 9,9	7,6	5,5 ; 9,8	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,660		P = .		P = .	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	x	;	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	6,4	5,2 ; 7,6	7,2	5,4 ; 9,2	5,5	4,1 ; 7,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 9 COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	26,2*	16,6 ; 36,3	73,8	63,7 ; 83,4
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,005			
15-35 ans	25,6	74,4	32,7*	20,9 ; 45,1	67,3	54,9 ; 79,1
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,015			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	24,0**	6,3 ; 43,6	76,0	56,4 ; 93,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	24,2**	7,2 ; 44,2	75,8	55,8 ; 92,8
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	x	;	x	;
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = 0,108			
Né au Canada	24,8	75,2	29,8*	18,5 ; 41,3	70,2	58,7 ; 81,5
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Laval et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	73,0	69,6 ; 76,2	15,3	12,8 ; 18,0	11,7	9,2 ; 14,5
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,067					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	61,0	46,7 ; 74,6	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	80,1	74,6 ; 84,8	8,5*	5,4 ; 12,1	11,4*	7,4 ; 16,0
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	70,1	65,3 ; 74,6	24,3	20,0 ; 28,8	5,6*	3,3 ; 8,2
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,006					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	57,9	46,5 ; 68,0	29,8*	21,0 ; 39,8	12,3**	5,9 ; 19,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	68,7	61,7 ; 75,5	15,3*	10,5 ; 20,9	16,0*	10,5 ; 21,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	78,0	71,6 ; 84,3	11,4*	7,4 ; 15,7	10,5**	5,3 ; 16,2
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	77,9	71,7 ; 83,6	12,9*	8,4 ; 17,9	9,3*	5,2 ; 14,3
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,001					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	73,8	69,8 ; 77,8	17,3	14,3 ; 20,8	8,8*	6,1 ; 11,8
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	62,0*	23,7 ; 90,7	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	71,5	63,7 ; 78,8	9,4*	5,3 ; 14,4	19,0*	12,4 ; 26,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 14  
**LANAUDIÈRE**

---



# 1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes	Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
Ensemble de la population		49,4	50,6			50,1	50,1 ; 50,2	49,9	49,8 ; 49,9
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000				P = 0,000			
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	15,9	15,9 ; 15,9	16,6	16,5 ; 16,6	15,2	15,2 ; 15,3
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	32,8	32,8 ; 32,8	32,9	32,8 ; 32,9	32,7	32,7 ; 32,8
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	37,0	37,0 ; 37,0	36,8	36,7 ; 36,8	37,2	37,2 ; 37,3
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	14,3	14,3 ; 14,3	13,8	13,7 ; 13,8	14,8	14,8 ; 14,8
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,376			
Personne seule	13,4	10,7	16,0	9,5	8,6 ; 10,6	9,0	7,6 ; 10,6	10,1	8,8 ; 11,7
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	28,5	26,7 ; 30,4	28,5	25,9 ; 31,2	28,6	26,3 ; 31,0
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	48,5	46,2 ; 50,6	50,2	46,7 ; 53,5	46,8	44,0 ; 49,5
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	7,6	6,4 ; 9,0	6,6	4,9 ; 8,7	8,7	6,9 ; 10,6
Autre	6,7	6,5	6,9	5,8	4,4 ; 7,1	5,7*	3,9 ; 7,8	5,8	4,0 ; 7,5
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>		P = 0,256				P = 0,442			
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	96,1	95,1 ; 97,1	96,4	94,9 ; 97,8	95,8	94,3 ; 97,2
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,6**	0,1 ; 1,1	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	3,3	2,4 ; 4,3	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>		P = 0,912				P = 0,469			
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	98,2	97,4 ; 98,8	98,7	97,8 ; 99,5	97,6	96,3 ; 98,7
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	0,9**	0,5 ; 1,4	x	;	1,0**	0,4 ; 1,8
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	1,0**	0,4 ; 1,5	x	;	1,4**	0,5 ; 2,4
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,683				P = 0,113			
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	28,9	26,8 ; 31,0	30,6	27,5 ; 34,0	27,2	24,5 ; 30,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	29,2	27,1 ; 31,3	27,1	24,0 ; 30,4	31,4	28,4 ; 34,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	24,9	22,9 ; 27,0	26,2	22,8 ; 29,4	23,7	20,9 ; 26,4
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	17,0	15,1 ; 18,8	16,2	13,6 ; 18,9	17,7	15,4 ; 20,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,001			
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	16,3	14,6 ; 18,2	13,4	10,9 ; 16,0	19,3	16,8 ; 21,8
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	19,9	17,9 ; 21,9	20,3	17,2 ; 23,3	19,6	16,9 ; 22,2
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	20,7	18,6 ; 22,7	19,9	16,9 ; 23,0	21,5	18,8 ; 24,2
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	23,4	21,3 ; 25,7	23,6	20,5 ; 27,1	23,2	20,3 ; 26,3
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	19,6	17,6 ; 21,7	22,8	19,7 ; 26,0	16,4	13,8 ; 19,0
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000				P = 0,005			
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	34,8	32,4 ; 37,2	37,5	34,0 ; 41,1	32,1	28,9 ; 35,2
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	55,6	53,2 ; 58,0	55,1	51,2 ; 58,4	56,2	53,0 ; 59,6
Pauvre	9,4	8,9	9,9	8,2	6,9 ; 9,6	6,1	4,4 ; 7,9	10,4	8,4 ; 12,4
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,4*	0,9 ; 2,0	1,4**	0,6 ; 2,4	1,3*	0,7 ; 2,1
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	62,1	60,3 ; 63,8	68,4	66,0 ; 70,8	55,7	52,9 ; 58,4
Étudiants	13,1	13,0	13,2	11,4	10,2 ; 12,6	11,4	9,6 ; 13,2	11,3	9,7 ; 13,0
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	7,8	6,6 ; 9,1	2,7*	1,5 ; 3,9	13,0	10,8 ; 15,2
Retraités	19,6	18,0	21,1	18,7	17,7 ; 19,7	17,5	16,0 ; 18,8	20,0	18,5 ; 21,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	59,3	56,9 ; 61,7	31,4	29,2 ; 33,8	9,3	8,0 ; 10,6
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,676					
Hommes	56,6	33,5	9,9	60,1	56,6 ; 63,6	30,5	27,1 ; 33,9	9,4	7,6 ; 11,3
Femmes	55,5	32,8	11,7	58,4	55,3 ; 61,6	32,4	29,4 ; 35,3	9,2	7,5 ; 11,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	64,6	57,9 ; 71,4	32,8	25,8 ; 39,6	2,6**	0,6 ; 4,9
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	71,4	67,1 ; 75,5	24,4	20,5 ; 28,5	4,2*	2,5 ; 6,2
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	54,7	50,8 ; 58,3	33,6	30,2 ; 37,0	11,7	9,4 ; 14,2
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	36,2	31,1 ; 41,9	41,0	35,7 ; 46,4	22,8	18,1 ; 27,5
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	47,8	42,7 ; 53,2	33,8	28,9 ; 38,8	18,4	14,4 ; 22,4
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	52,8	48,7 ; 57,1	34,6	30,6 ; 38,6	12,5	9,9 ; 15,2
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	68,1	64,4 ; 71,9	27,8	24,2 ; 31,5	4,0*	2,5 ; 5,8
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	48,9	40,0 ; 58,2	37,5	28,6 ; 46,4	13,6*	7,6 ; 20,5
Autre	46,0	39,4	14,6	49,2	36,9 ; 61,3	39,0	27,4 ; 51,7	11,8**	4,9 ; 19,5
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	45,4	40,6 ; 49,8	38,7	34,4 ; 43,1	15,9	13,0 ; 19,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	56,5	51,9 ; 61,0	33,9	29,8 ; 38,3	9,6	7,1 ; 12,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	70,6	65,8 ; 75,0	25,4	21,2 ; 29,9	4,0*	2,2 ; 6,1
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	71,5	66,0 ; 76,7	23,5	18,5 ; 28,5	4,9**	2,5 ; 7,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	39,2	33,3 ; 45,5	41,2	35,1 ; 47,4	19,6	15,3 ; 24,4
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	63,7	61,1 ; 66,2	29,4	26,9 ; 32,1	6,9	5,6 ; 8,2
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	33,2	25,6 ; 40,6	43,5	35,6 ; 51,2	23,4	17,4 ; 30,2
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	62,4	59,9 ; 64,9	30,0	27,6 ; 32,5	7,6	6,3 ; 8,9
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	64,8	61,5 ; 67,8	29,0	26,2 ; 32,1	6,2	4,9 ; 7,8
Étudiants	62,7	32,2	5,0	68,2	59,9 ; 76,6	x	;	x	;
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	44,4	35,1 ; 53,5	39,0	30,6 ; 47,8	16,6*	10,4 ; 23,6
Retraités	40,2	39,5	20,4	41,4	36,7 ; 46,5	38,2	33,8 ; 42,8	20,4	16,6 ; 24,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	59,3	56,9 ; 61,7	31,4	29,2 ; 33,8	9,3	8,0 ; 10,6
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	49,5	44,5 ; 54,1	37,0	32,6 ; 41,7	13,6	10,5 ; 16,8
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	63,2	60,5 ; 66,0	29,3	26,6 ; 32,0	7,5	6,2 ; 8,9
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	49,0*	30,1 ; 67,3	37,2*	19,4 ; 54,7	13,9**	4,3 ; 25,5
Poids normal	62,6	29,4	8,0	65,4	61,8 ; 68,9	26,9	23,5 ; 30,2	7,7	5,9 ; 9,7
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	54,7	51,3 ; 57,9	34,6	31,4 ; 38,0	10,7	8,8 ; 12,6
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	66,5	63,2 ; 69,8	26,3	23,2 ; 29,4	7,2	5,6 ; 9,0
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	53,2	49,3 ; 56,9	36,7	33,1 ; 40,4	10,2	8,1 ; 12,4
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	45,0	34,0 ; 55,3	34,9	25,6 ; 45,5	20,0*	13,1 ; 28,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	39,2	34,2 ; 44,5	41,9	36,4 ; 47,2	18,8	15,0 ; 22,7
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	65,0	62,3 ; 67,7	28,5	26,0 ; 31,0	6,5	5,3 ; 7,9

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	50,9	48,4 ; 53,4	43,5	41,1 ; 46,0	5,6	4,5 ; 6,7
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,944		
Hommes	47,5	46,6	6,0	51,1	47,4 ; 54,7	43,2	39,5 ; 46,9	5,7*	4,0 ; 7,5
Femmes	47,1	45,9	7,0	50,7	47,5 ; 54,0	43,9	40,6 ; 47,1	5,4	4,1 ; 6,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,176		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	56,3	49,1 ; 63,2	40,0	33,2 ; 47,1	3,8**	1,0 ; 7,3
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	45,8	41,2 ; 50,4	49,1	44,3 ; 53,9	5,1*	3,2 ; 7,2
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	52,6	48,8 ; 56,3	41,1	37,4 ; 44,7	6,3	4,7 ; 8,1
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	52,5	46,6 ; 58,2	40,9	35,4 ; 46,5	6,6*	4,0 ; 9,7
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	42,8	37,6 ; 48,2	45,2	40,0 ; 50,6	12,0	8,6 ; 15,5
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	52,6	48,6 ; 57,0	44,0	39,7 ; 48,0	3,4*	1,9 ; 5,0
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	54,0	49,8 ; 58,1	41,8	37,8 ; 46,1	4,2*	2,6 ; 5,9
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	37,4	29,0 ; 46,2	50,2	41,4 ; 59,0	12,4*	6,3 ; 19,0
Autre	44,5	46,1	9,4*	44,6	33,0 ; 56,2	47,6	36,0 ; 59,6	7,8**	1,8 ; 15,4
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,733		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	53,4	48,5 ; 58,0	41,3	36,9 ; 45,9	5,3*	3,6 ; 7,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	51,5	47,1 ; 56,0	43,0	38,6 ; 47,5	5,5*	3,5 ; 7,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	49,8	44,6 ; 55,1	44,2	38,8 ; 49,2	6,0*	3,6 ; 8,5
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	46,6	40,5 ; 52,3	47,7	42,2 ; 54,1	5,6*	2,9 ; 8,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,002		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	45,3	39,1 ; 51,7	44,4	38,3 ; 50,7	10,3*	6,9 ; 14,3
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	51,6	48,8 ; 54,4	43,5	40,7 ; 46,3	4,9	3,7 ; 6,1
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	38,5	30,9 ; 45,9	49,9	42,3 ; 57,7	11,6*	7,3 ; 16,3
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	51,9	49,3 ; 54,6	43,2	40,6 ; 46,0	4,9	3,8 ; 6,1
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,358		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	49,5	46,3 ; 52,6	44,9	41,8 ; 48,2	5,6	4,1 ; 7,2
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	58,8	50,2 ; 67,3	x	;	x	;
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	45,3	36,4 ; 53,7	44,3	35,4 ; 53,2	10,4*	5,9 ; 15,6
Retraités	51,9	42,8	5,3	52,9	48,1 ; 57,6	41,4	36,7 ; 46,3	5,7*	3,4 ; 8,1
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	56,9	53,5 ; 60,3	38,9	35,6 ; 42,2	4,2*	2,8 ; 5,6
Bon	40,5	52,6	6,9	42,7	38,4 ; 47,2	51,1	46,5 ; 55,3	6,2*	4,2 ; 8,4
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	39,9	32,0 ; 47,1	48,1	40,8 ; 56,0	12,1*	7,8 ; 16,7
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	34,5	29,3 ; 39,8	54,1	48,6 ; 59,5	11,4	8,5 ; 14,7
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	55,2	52,4 ; 58,0	41,0	38,2 ; 43,7	3,8	2,6 ; 4,9
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,005		
Oui	21,3	49,3	29,4	33,8**	15,9 ; 51,4	45,1*	29,2 ; 63,1	21,1**	7,1 ; 37,4
Non	48,1	46,1	5,8	51,4	48,9 ; 54	43,4	40,9 ; 46	5,2	4,1 ; 6,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	21,0	19,0 ; 23,0	79,0	77,0 ; 81,0
Sexe	P = 0,000		P = 0,000			
Hommes	18,2	81,8	15,9	13,3 ; 18,6	84,1	81,4 ; 86,7
Femmes	26,0	74,0	26,0	23,0 ; 28,8	74,0	71,2 ; 77,0
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,061			
15-24 ans	24,4	75,6	27,4	21,0 ; 33,8	72,6	66,2 ; 79,0
25-44 ans	24,3	75,7	19,8	16,4 ; 23,5	80,2	76,5 ; 83,6
45-64 ans	20,6	79,4	19,3	16,3 ; 22,3	80,7	77,7 ; 83,7
65 ans et plus	18,8	81,2	20,6	16,2 ; 25,7	79,4	74,3 ; 83,8
Composition du ménage	P = 0,000		P = 0,000			
Personne seule	25,7	74,3	24,4	19,8 ; 29,0	75,6	71,0 ; 80,2
Couple sans enfant	17,7	82,3	18,0	14,8 ; 21,5	82,0	78,5 ; 85,2
Couple avec enfants	20,8	79,2	18,9	15,9 ; 22,2	81,1	77,8 ; 84,1
Famille monoparentale	32,2	67,8	38,7	29,7 ; 47,6	61,3	52,4 ; 70,3
Autre	29,7	70,3	22,9*	13,0 ; 33,6	77,1	66,4 ; 87,0
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,001			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	24,8	20,8 ; 29,0	75,2	71,0 ; 79,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	23,8	20,0 ; 28,0	76,2	72,0 ; 80,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	19,2	15,1 ; 23,2	80,8	76,8 ; 84,9
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	13,0*	9,0 ; 17,4	87,0	82,6 ; 91,0
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	33,9	28,1 ; 39,9	66,1	60,1 ; 71,9
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	18,7	16,4 ; 20,9	81,3	79,1 ; 83,6
Perception de sa situation financière	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	38,5	31,3 ; 46,3	61,5	53,7 ; 68,7
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	19,3	17,2 ; 21,4	80,7	78,6 ; 82,8
Occupation principale	P = 0,000		P = 0,001			
Travailleurs	20,9	79,1	19,1	16,5 ; 21,6	80,9	78,4 ; 83,5
Étudiants	24,8	75,2	26,3	19,1 ; 34,1	73,7	65,9 ; 80,9
Personnes sans emploi	37,9	62,1	33,8	25,2 ; 41,9	66,2	58,1 ; 74,8
Retraités	18,2	81,8	18,7	15,2 ; 22,5	81,3	77,5 ; 84,8
Perception de l'état de santé	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	13,8	11,7 ; 16,1	86,2	83,9 ; 88,3
Bon	26,6	73,4	28,0	24,0 ; 32,3	72,0	67,7 ; 76,0
Passable ou mauvais	48,8	51,2	43,3	36,0 ; 51,1	56,7	48,9 ; 64,0
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	14,2	11,7 ; 16,7	85,8	83,3 ; 88,3
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	25,9	22,5 ; 29,2	74,1	70,8 ; 77,5
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	44,6	34,5 ; 55,5	55,4	44,5 ; 65,5
Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	53,0*	35,0 ; 70,5	47,0*	29,5 ; 65,0
Non	20,6	79,4	20,1	18,1 ; 22,1	79,9	77,9 ; 81,9
Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	20,8	18,9 ; 22,8	79,2	77,2 ; 81,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,2*	1,5 ; 3,0	2,5*	1,4 ; 3,8	1,9*	1,0 ; 2,8
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,775		P = 0,360		P = 0,899	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	1,8**	0,8 ; 3,0	2,1**	0,5 ; 4,2	1,5**	0,2 ; 3,0
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,7*	1,5 ; 4,1	3,6**	1,6 ; 6,1	1,7**	0,5 ; 3,3
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,7**	0,4 ; 3,3	x	;	2,3**	0,3 ; 4,8
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,130		P = 0,176		P = 0,076	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	2,6**	1,1 ; 4,5	2,6**	0,3 ; 5,3	2,7**	0,7 ; 5,2
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	1,6**	0,6 ; 2,8	1,7**	0,2 ; 3,5	1,6**	0,3 ; 3,2
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	1,5**	0,6 ; 2,6	1,8**	0,4 ; 3,5	1,2**	0,1 ; 2,6
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	5,5**	1,6 ; 10,2	x	;	6,3**	0,8 ; 13,1
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,049		P = 0,021		P = 0,887	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	0,9**	0,3 ; 1,7	x	;	1,3**	0,2 ; 2,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	3,8**	2,1 ; 5,9	5,5**	2,4 ; 9,4	2,3**	0,5 ; 4,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	1,5**	0,4 ; 2,9	x	;	1,9**	0,3 ; 3,8
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	2,6**	0,9 ; 4,6	3,3**	0,3 ; 6,7	1,9**	0,1 ; 4,4
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,367		P = 0,286		P = 0,943	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	2,9**	1,1 ; 5,2	4,5**	0,7 ; 9,6	1,8**	0,2 ; 3,8
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	2,0*	1,3 ; 2,9	2,3**	1,1 ; 3,7	1,7**	0,8 ; 2,7
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,041		P = 0,059		P = 0,390	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	4,4**	1,7 ; 7,8	6,7**	1,0 ; 14,0	2,9**	0,4 ; 6,2
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	2,0*	1,2 ; 2,8	2,2**	1,1 ; 3,4	1,7**	0,9 ; 2,7
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,367		P = 0,515		P = 0,686	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,2*	1,3 ; 3,2	2,8**	1,3 ; 4,4	1,5**	0,5 ; 2,7
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	3,4**	0,6 ; 7,2	x	;	x	;
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	2,5**	1,1 ; 4,2	2,6**	0,2 ; 5,5	2,5**	0,7 ; 4,6
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,005		P = 0,148		P = 0,048	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,2**	0,5 ; 2,0	1,4**	0,2 ; 2,8	1,0**	0,3 ; 1,9
Bon	2,5	2,7	2,4	3,2*	1,6 ; 4,9	3,9**	1,4 ; 6,9	2,5**	0,8 ; 4,6
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	5,3**	2,1 ; 9,3	5,2**	0,8 ; 11,1	5,3**	1,0 ; 11,4
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,005		P = 0,073		P = 0,065	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	1,4**	0,6 ; 2,4	2,1**	0,5 ; 3,8	x	;
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,3*	1,3 ; 3,3	2,0**	0,7 ; 3,6	2,5**	1,1 ; 4,1
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	8,3**	2,7 ; 15,7	10,2**	0,7 ; 22,8	6,4**	0,7 ; 13,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,063		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	5,5*	3,2 ; 8,3	5,5**	1,5 ; 10,6	5,5**	2,7 ; 8,7
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	1,3*	0,7 ; 2,0	1,9**	0,9 ; 3,1	0,6**	0,1 ; 1,2

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,2**	0,0 ; 0,6	x	;	0,5**	0,0 ; 1,2
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,000		P = 'n.d.'		P = 0,000	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	x	;	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,028		P = 'n.d.'		P = 0,038	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,018		P = 'n.d.'		P = 0,012	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = .		P = 'n.d.'		P = .	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	1,6**	0,0 ; 3,8	x	;	2,7**	0,1 ; 6,2
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	x	;	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,418		P = 'n.d.'		P = 0,574	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,447		P = 'n.d.'		P = 0,472	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	x	;	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,062		P = 'n.d.'		P = 0,064	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 'n.d.'		P = 0,001	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	x	;	x	;	x	;
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,097				
Oui	10,2	10,0	10,3	10,2	8,8 ; 11,8	11,5	9,1 ; 14,1	8,9	7,1 ; 10,9	
Non	89,8	90,0	89,7	89,8	88,2 ; 91,2	88,5	85,9 ; 90,9	91,1	89,1 ; 92,9	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,002				
Oui	4,4	3,5	5,3	4,3	3,3 ; 5,3	2,7*	1,6 ; 3,9	5,9	4,3 ; 7,5	
Non	95,6	96,5	94,7	95,7	94,7 ; 96,7	97,3	96,1 ; 98,4	94,1	92,5 ; 95,7	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	12,3	10,6 ; 13,9	15,0	12,4 ; 17,8	9,5	7,7 ; 11,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,074	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	24,1	18,0 ; 30,0	32,3*	22,5 ; 42,4	15,1*	8,3 ; 22,4
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	10,3	7,6 ; 13,0	13,2*	9,0 ; 17,6	7,3*	4,5 ; 10,6
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	10,3	8,1 ; 12,7	10,9*	7,7 ; 14,6	9,8	6,9 ; 13,0
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	8,6*	5,5 ; 11,9	9,1**	4,1 ; 14,8	8,0*	4,4 ; 11,9
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,001		P = 0,006		P = 0,203	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	12,1	8,7 ; 15,6	13,9*	8,7 ; 20,0	10,4*	6,4 ; 14,9
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	8,4	6,2 ; 10,9	9,0*	5,4 ; 12,6	7,9*	5,1 ; 11,2
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	12,4	9,7 ; 14,9	15,7	11,7 ; 19,7	8,8*	5,8 ; 12,1
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	19,0*	12,7 ; 26,4	25,1*	13,6 ; 39,0	14,4*	6,7 ; 22,5
Autre	14,9	16,7	13,2*	22,9*	13,0 ; 34,0	29,8**	12,7 ; 48,4	16,2**	4,6 ; 29,4
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,329		P = 0,488		P = 0,084	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	13,1	10,0 ; 16,2	15,5*	10,8 ; 20,3	10,4*	6,5 ; 14,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	14,1	10,8 ; 17,5	17,5*	12,0 ; 23,1	11,2*	7,4 ; 15,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	10,3*	7,2 ; 13,5	15,2*	10,1 ; 21,2	4,9**	2,2 ; 8,1
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	11,1*	7,6 ; 15,1	11,0*	5,7 ; 16,8	11,3*	6,6 ; 16,6
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,006		P = 0,001		P = 0,453	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	17,0	12,5 ; 22,2	26,0*	17,1 ; 35,7	10,8*	6,5 ; 15,5
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	10,9	9,3 ; 12,7	12,8	10,1 ; 15,5	9,0	6,9 ; 11,2
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,001		P = 0,019		P = 0,023	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	11,3	9,3 ; 13,4	13,9	10,9 ; 17,1	8,1	5,7 ; 10,7
Étudiants	17,1	21,4	12,9	21,4*	14,3 ; 28,6	24,6*	13,5 ; 36,2	18,2*	9,4 ; 27,6
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	13,5*	8,0 ; 19,5	31,4**	11,2 ; 54,3	9,8**	4,9 ; 15,5
Retraités	7,5	7,0	7,9	9,6*	6,7 ; 12,7	11,2*	6,5 ; 16,6	8,2*	5,1 ; 11,7

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	78,3	72,1 ; 84,0	76,3	67,3 ; 83,8	81,4	72,0 ; 90,4
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	21,7	16,0 ; 27,9	23,7*	16,2 ; 32,7	18,6*	9,6 ; 28,0
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	20,9	14,9 ; 27,0	27,3*	18,4 ; 36,4	10,9**	4,2 ; 18,3
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	13,5*	8,6 ; 18,8	16,5*	9,1 ; 24,5	8,7**	3,3 ; 14,9
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	19,8	14,2 ; 25,9	22,2*	14,7 ; 30,3	16,1**	7,4 ; 25,5
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	8,1*	4,4 ; 12,3	4,1**	0,8 ; 8,1	14,5**	6,8 ; 23,3
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	22,3	16,7 ; 27,9	20,0*	12,5 ; 27,7	26,0*	17,1 ; 35,8
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	4,2**	2,0 ; 6,8	x	;	8,0**	3,0 ; 13,8
Autre	12,1	8,1	17,6	11,2*	7,1 ; 15,9	x	;	15,8*	8,6 ; 24,5
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	23,4	17,7 ; 29,5	20,5*	13,4 ; 28,4	28,0*	18,0 ; 38,6
Printemps	21,2	20,7	21,9	22,8	16,8 ; 28,8	21,2*	13,0 ; 29,3	25,4*	16,3 ; 35,4
Été	29,1	30,3	27,4	29,3	22,3 ; 36,4	31,0*	21,5 ; 40,3	26,7*	16,7 ; 37,0
Automne	23,7	24,0	23,3	24,4	18,3 ; 30,7	27,3*	18,9 ; 36,3	19,9*	11,9 ; 28,9
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	39,0	32,2 ; 45,9	31,4	23,1 ; 40,6	51,2	40,2 ; 62,5
Endroit public	28,1	24,8	32,5	25,8	19,6 ; 32,2	21,8*	14,7 ; 29,9	31,9*	21,4 ; 43,1
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	27,2	20,4 ; 34,0	35,9	26,2 ; 45,7	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	8,0**	4,0 ; 12,3	10,9**	5,2 ; 17,2	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	11,0*	6,3 ; 15,9	10,3**	4,0 ; 17,0	12,2**	5,5 ; 20,1
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	4,6**	1,3 ; 8,4	x	;	x	;
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	5,7**	2,4 ; 9,4	7,1**	2,3 ; 12,3	x	;
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	6,7**	3,3 ; 10,8	8,0**	3,5 ; 13,8	x	;
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	x	;	6,5**	2,0 ; 11,6	x	;
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	18,6	13,8 ; 24,0	18,9*	12,3 ; 26,6	18,0*	10,9 ; 26,1
Chute	34,6	30,5	40,3	33,1	26,9 ; 39,9	31,4	22,5 ; 40,5	35,7	26,4 ; 45,6
Autres	13,7	12,5	15,3	14,4*	9,7 ; 19,3	12,5*	6,5 ; 19,1	17,2*	9,4 ; 26,3
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	x	;	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	28,0	21,6 ; 34,4	29,2	20,5 ; 38,0	26,2*	16,4 ; 36,7
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	35,6	28,7 ; 42,3	37,5	28,0 ; 47,1	32,7	23,2 ; 42,7
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	x	;	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	15,8*	11,1 ; 21,1	11,7*	6,6 ; 17,7	22,4*	14,0 ; 32,3
Autre	11,9	10,9	13,2	13,9*	8,6 ; 19,6	15,4*	8,0 ; 23,3	11,6**	4,9 ; 19,6

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	4,4**	2,2 ; 7,0	4,7**	1,1 ; 9,1	4,2**	1,7 ; 7,3
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,186		P = 0,849		P = 0,853	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	5,7**	2,5 ; 9,3	6,6**	1,2 ; 13,0	4,7**	1,4 ; 8,6
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	x	;	x	;	x	;
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,761		P = 0,542		P = 0,945	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	4,1**	1,0 ; 7,9	x	;	4,6**	0,5 ; 9,7
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	4,9**	1,9 ; 8,3	5,4**	0,5 ; 11,2	4,3**	0,8 ; 8,8
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,232		P = 0,105		P = 0,396	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	3,9**	1,6 ; 6,3	4,2**	0,8 ; 8,5	3,5**	0,9 ; 6,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,346		P = 0,131		P = 0,268	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	7,1**	0,7 ; 15,2	x	;	x	;
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	3,6**	1,4 ; 6,2	x	;	4,3**	1,4 ; 7,7
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,023		P = 0,078		P = 0,113	
Oui	5,9	3,6*	7,3	8,8**	3,5 ; 15,3	x	;	7,4**	1,7 ; 14,4
Non	2,7*	2,2**	3,1*	2,3**	0,4 ; 4,5	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,204		P = 0,436		P = 0,171	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	8,1**	1,8 ; 15,5	x	;	7,5**	0,5 ; 16,2
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	3,7**	1,2 ; 6,7	4,7**	0,3 ; 10,1	2,8**	0,3 ; 5,8
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,327		P = 0,102		P = 0,908	
Résidence	62,7	52,8	68,6	59,1*	34,6 ; 82,0	66,7*	24,7 ; 100,0	51,2**	18,8 ; 82,7
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	x	;	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	37,5**	7,9 ; 67,6	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	30,2**	3,0 ; 59,5	x	;	x	;
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	x	;	x	;	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	29,8**	6,0 ; 58,2	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	20,9**	1,1 ; 45,6	x	;	x	;
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	11,7	10,1 ; 13,3	11,8	9,5 ; 14,3	11,6	9,6 ; 13,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,046		P = 0,638		P = 0,051	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	10,3*	5,8 ; 14,9	10,6**	4,3 ; 17,9	10,0**	4,2 ; 16,3
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	12,2	9,2 ; 15,3	12,8*	8,3 ; 17,8	11,5*	7,7 ; 15,7
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	13,8	11,3 ; 16,5	12,7	9,1 ; 16,6	14,9	11,4 ; 18,7
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	6,7*	4,2 ; 9,6	8,2**	3,9 ; 13,4	5,2**	2,4 ; 8,2
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,238		P = 0,634		P = 0,315	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	10,6*	7,3 ; 14,0	12,6*	7,3 ; 18,8	8,8*	5,0 ; 13,0
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	9,5	7,2 ; 12,0	8,6*	5,2 ; 12,5	10,4*	7,0 ; 13,8
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	12,1	9,7 ; 14,7	12,9	9,0 ; 16,9	11,3	8,1 ; 15,0
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	15,9*	9,6 ; 23,0	14,1**	3,9 ; 25,8	17,2*	9,2 ; 26,1
Autre	11,4	12,8*	10,2*	14,6**	6,6 ; 23,7	13,9**	1,0 ; 28,5	15,2**	5,4 ; 27,6
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,780		P = 0,957		P = 0,824	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	11,1	8,0 ; 14,2	11,2*	7,2 ; 15,8	11,0*	6,9 ; 15,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	13,0	10,0 ; 16,3	12,9*	8,3 ; 18,1	13,0	9,0 ; 17,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	11,4	8,2 ; 14,7	11,7*	6,9 ; 17,0	11,0*	7,1 ; 15,5
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	11,1*	7,5 ; 15,2	11,9*	6,2 ; 17,9	10,4*	5,5 ; 15,6
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,939		P = 0,968		P = 0,968	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	11,8*	8,2 ; 16,0	11,6**	5,5 ; 18,8	12,0*	7,4 ; 17,3
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	11,7	9,9 ; 13,5	11,5	9,1 ; 14,1	11,9	9,5 ; 14,2
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,008		P = 0,077		P = 0,049	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	18,6*	12,4 ; 24,8	20,0**	9,3 ; 31,5	17,7*	10,4 ; 25,4
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	11,1	9,5 ; 12,7	11,4	8,9 ; 13,9	10,8	8,7 ; 13,0
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024		P = 0,131		P = 0,072	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	13,5	11,2 ; 15,8	13,3	10,2 ; 16,6	13,6	10,5 ; 16,8
Étudiants	9,9	9,7	10,1	8,0**	3,4 ; 13,1	9,3**	2,6 ; 17,5	6,8**	0,8 ; 14,2
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	11,9*	6,7 ; 17,8	x	;	14,1*	7,9 ; 20,8
Retraités	6,9	6,7	7,0	7,5*	5,1 ; 10,2	8,7*	4,7 ; 13,2	6,5*	3,6 ; 9,7

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,625				
Oui	45,2	47,6	42,8	48,3	41,0 ; 55,9	50,0	39,4 ; 61,4	46,5	36,1 ; 57,2	
Non	54,8	52,4	57,2	51,7	44,1 ; 59,0	50,0	38,6 ; 60,6	53,5	42,8 ; 63,9	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,681				
Oui	25,4	27,6	23,1	22,2	15,6 ; 29,0	23,6*	14,2 ; 33,3	20,8*	11,7 ; 30,3	
Non	74,6	72,4	76,9	77,8	71,0 ; 84,4	76,4	66,7 ; 85,8	79,2	69,7 ; 88,3	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,965				
Oui	17,6	15,6	19,6	19,3	13,8 ; 25,3	19,2*	11,1 ; 28,1	19,4*	12,2 ; 27,8	
Non	82,4	84,4	80,4	80,7	74,7 ; 86,2	80,8	71,9 ; 88,9	80,6	72,2 ; 87,8	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,141				
Oui	8,1	7,2	9,0	7,1**	3,3 ; 11,2	9,7**	3,3 ; 17,4	4,3**	1,0 ; 8,2	
Non	91,9	92,8	91,0	92,9	88,8 ; 96,7	90,3	82,6 ; 96,7	95,7	91,8 ; 99,0	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 0,939				
Cou	3,1	1,8*	4,3	2,7**	0,6 ; 5,2	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	61,3	53,7 ; 68,5	57,6	46,6 ; 68,7	65,1	55,2 ; 75,1	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	11,3*	7,1 ; 16,1	10,3**	4,3 ; 17,6	12,3**	6,3 ; 19,3	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	4,9**	1,6 ; 8,8	x	;	4,1**	0,2 ; 8,9	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	16,3*	10,4 ; 22,8	19,0*	10,3 ; 28,8	13,5**	5,9 ; 22,4	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	3,5**	1,2 ; 6,3	5,0**	1,0 ; 10,0	x	;	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	31,5	29,3 ; 33,7	28,0	24,8 ; 31,3	35,0	31,9 ; 38,0
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,004		P = 0,030	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	21,5	15,6 ; 27,3	15,1*	7,6 ; 23,0	28,5*	19,9 ; 37,9
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	29,1	24,9 ; 33,3	27,5	21,0 ; 33,8	30,8	25,4 ; 36,4
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	37,1	33,6 ; 40,8	34,3	29,0 ; 39,8	39,9	34,9 ; 44,9
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	33,5	28,3 ; 38,6	28,2	20,4 ; 36,2	38,5	32,0 ; 45,7
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,017		P = 0,454		P = 0,047	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	36,1	31,3 ; 41,1	32,8	25,3 ; 40,5	39,0	31,9 ; 45,9
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	32,7	28,9 ; 36,5	29,4	24,0 ; 35,3	36,0	30,9 ; 41,3
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	29,1	25,5 ; 32,7	26,0	20,7 ; 31,5	32,4	27,3 ; 37,3
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	41,4	32,7 ; 50,5	36,4*	22,4 ; 51,5	45,2	34,2 ; 56,3
Autre	34,0	32,4	35,4	25,1*	15,8 ; 36,1	26,8**	11,6 ; 43,2	23,5**	11,5 ; 37,8
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,469		P = 0,252		P = 0,831	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	33,1	29,0 ; 37,4	29,3	23,5 ; 35,3	37,4	31,4 ; 43,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	32,8	28,5 ; 37,2	31,8	25,5 ; 38,8	33,7	27,8 ; 39,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	30,2	25,6 ; 35,1	26,3	19,6 ; 33,7	34,6	28,3 ; 40,7
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	28,4	23,3 ; 33,9	21,9*	14,7 ; 29,5	34,3	26,5 ; 42,2
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,451		P = 0,532		P = 0,956	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	33,4	27,5 ; 39,1	30,4*	21,3 ; 40,3	35,5	28,3 ; 42,9
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	31,1	28,5 ; 33,6	27,2	23,6 ; 30,8	35,3	31,8 ; 38,7
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,561		P = 0,002	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	41,9	33,7 ; 49,5	31,4*	19,2 ; 44,0	48,6	38,5 ; 58,2
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	30,5	28,1 ; 32,8	27,9	24,4 ; 31,5	33,2	29,9 ; 36,4
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,011		P = 0,069		P = 0,172	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	32,2	29,1 ; 35,1	28,2	29,1 ; 35,1	37,0	29,1 ; 35,1
Étudiants	20,7	14,8	26,3	20,6*	13,6 ; 27,6	15,7**	13,6 ; 27,6	25,5*	13,6 ; 27,6
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	34,5	26,8 ; 42,5	25,9**	26,8 ; 42,5	36,1	26,8 ; 42,5
Retraités	34,2	30,5	37,2	34,2	29,6 ; 38,8	34,2	29,6 ; 38,8	34,2	29,6 ; 38,8
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	25,4	22,6 ; 28,3	23,2	19,0 ; 27,4	27,7	24,0 ; 31,6
Bon	33,9	28,1	39,6	36,1	32,0 ; 40,4	31,6	25,8 ; 37,8	40,2	34,5 ; 45,9
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	55,4	48,2 ; 63,7	49,9	39,0 ; 61,0	61,2	50,9 ; 71,6
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	49,2	43,6 ; 54,7	40,8	31,2 ; 50,4	54,4	47,6 ; 61,0
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	26,7	24,3 ; 29,1	25,6	22,1 ; 29,3	27,8	24,4 ; 31,2
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,022		P = 0,021		P = 0,174	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	30,5*	15,3 ; 47,8	x	;	33,0**	15,7 ; 53,1
Poids normal	28,3	22,9	32,1	28,5	25,2 ; 31,7	22,1	17,1 ; 27,6	32,6	28,3 ; 37,0
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	31,6	28,1 ; 35,5	30,0	24,9 ; 35,0	34,5	28,7 ; 40,6
Obésité	37,9	30,5	46,1	39,0	33,3 ; 45,1	35,8	27,4 ; 44,5	43,5	34,6 ; 52,2

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,003				
Oui	30,3	25,3	35,2	31,5	29,3 ; 33,7	28,0	24,8 ; 31,3	35,0	31,9 ; 38,0	
Non	69,7	74,7	64,8	68,5	66,3 ; 70,7	72,0	68,7 ; 75,2	65,0	62,0 ; 68,1	
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	9,5	6,4	12,5	8,8	7,6 ; 10,1	5,4	3,9 ; 7,2	12,2	10,1 ; 14,3	
Non	90,5	93,6	87,5	91,2	89,9 ; 92,4	94,6	92,8 ; 96,1	87,8	85,7 ; 89,9	
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,050				
Oui	14,5	12,2	16,7	15,0	13,5 ; 16,7	13,3	10,8 ; 15,8	16,8	14,4 ; 19,3	
Non	85,5	87,8	83,3	85,0	83,3 ; 86,5	86,7	84,2 ; 89,2	83,2	80,7 ; 85,6	
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,001				
Oui	13,5	10,8	16,1	13,9	12,2 ; 15,5	11,2	9,1 ; 13,4	16,7	14,3 ; 19,1	
Non	86,5	89,2	83,9	86,1	84,5 ; 87,8	88,8	86,6 ; 90,9	83,3	80,9 ; 85,7	
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,088				
Oui	14,5	11,8	17,2	13,2	11,7 ; 14,9	11,9	9,6 ; 14,4	14,6	12,5 ; 16,8	
Non	85,5	88,2	82,8	86,8	85,1 ; 88,3	88,1	85,6 ; 90,4	85,4	83,2 ; 87,5	
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,622				
Oui	17,8	16,0	19,6	19,5	17,5 ; 21,4	19,0	16,1 ; 22,1	20,0	17,4 ; 22,6	
Non	82,2	84,0	80,4	80,5	78,6 ; 82,5	81,0	77,9 ; 83,9	80,0	77,4 ; 82,6	
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	14,2	10,6	17,8	13,9	12,3 ; 15,5	10,2	8,3 ; 12,4	17,5	15,2 ; 20,0	
Non	85,8	89,4	82,2	86,1	84,5 ; 87,7	89,8	87,6 ; 91,7	82,5	80,0 ; 84,8	

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	61,0	58,7 ; 63,3	29,0	27,0 ; 31,2	9,9	8,5 ; 11,4
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,023					
Hommes	52,6	34,1	13,3	57,9	54,2 ; 61,4	30,9	27,9 ; 34,3	11,2	8,8 ; 13,5
Femmes	60,1	29,8	10,1	64,2	61,0 ; 67,2	27,1	24,3 ; 30,1	8,7	6,9 ; 10,6
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	70,0	63,3 ; 76,5	25,0	18,9 ; 31,3	5,0**	2,1 ; 8,5
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	65,5	60,9 ; 69,9	24,9	21,0 ; 29,1	9,6*	6,7 ; 12,7
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	57,3	53,6 ; 60,9	30,2	27,0 ; 33,7	12,4	10,0 ; 14,9
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	50,1	44,7 ; 55,6	40,4	34,9 ; 45,9	9,5*	6,4 ; 13,1
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,007					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	50,7	45,0 ; 56,2	36,7	31,7 ; 41,9	12,6	9,2 ; 16,3
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	59,4	55,3 ; 63,5	30,7	27,2 ; 34,6	9,9	7,4 ; 12,3
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	65,5	61,7 ; 69,3	26,0	22,6 ; 29,7	8,5	6,1 ; 11,0
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	63,9	55,4 ; 72,5	22,8*	15,6 ; 30,3	13,3*	7,4 ; 20,2
Autre	48,0	34,3	17,7	48,0	35,8 ; 60,3	37,0	25,3 ; 49,1	15,0**	6,6 ; 25,5
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,830					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	61,7	59,2 ; 64,1	28,9	26,7 ; 31,1	9,4	8,0 ; 10,8
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	46,5	31,7 ; 61,5	34,8*	21,0 ; 48,4	18,7**	7,8 ; 31,2
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,956					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	61,0	58,6 ; 63,3	29,0	26,9 ; 31,2	10,0	8,5 ; 11,4
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	63,0*	31,6 ; 90,0	x	;	x	;
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	70,0*	35,3 ; 95,7	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	49,0	44,6 ; 53,8	37,1	32,8 ; 41,5	13,9	10,9 ; 17,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	58,4	53,9 ; 62,9	31,2	27,0 ; 35,5	10,4	7,7 ; 13,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	66,4	61,3 ; 71,3	26,1	21,9 ; 31,0	7,5*	4,6 ; 10,7
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	78,5	73,7 ; 82,9	16,0	12,2 ; 20,3	5,5*	3,0 ; 8,4
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	45,1	39,1 ; 51,5	38,8	32,8 ; 44,5	16,1	11,8 ; 20,4
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	64,0	61,4 ; 66,5	27,5	25,2 ; 29,9	8,5	6,8 ; 10,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	39,0	31,4 ; 46,6	39,1	31,7 ; 46,8	21,9	15,5 ; 28,4
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	63,5	61,1 ; 66,0	27,9	25,7 ; 30,1	8,6	7,1 ; 10,1
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	63,4	60,2 ; 66,4	26,2	23,7 ; 29,2	10,4	8,4 ; 12,5
Étudiants	62,8	27,9	9,3	73,1	65,6 ; 80,4	22,7	15,8 ; 29,6	4,3**	0,9 ; 8,2
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	45,1	36,3 ; 53,9	38,2	30,0 ; 46,8	16,7*	10,8 ; 23,4
Retraités	49,7	38,1	12,2	52,4	47,7 ; 57,1	39,4	34,9 ; 44,0	8,2*	5,7 ; 11,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	61,0	58,7 ; 63,3	29,0	27,0 ; 31,2	9,9	8,5 ; 11,4
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	49,1	44,1 ; 54,2	32,8	28,5 ; 37,4	18,1	14,5 ; 22,0
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	65,7	63,0 ; 68,3	27,6	25,2 ; 30,2	6,7	5,3 ; 8,2
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	71,3	68,3 ; 74,1	23,4	20,8 ; 26,1	5,4	3,8 ; 6,9
Bon	41,4	42,6	16,0	49,8	45,1 ; 54,3	37,0	32,8 ; 41,2	13,2	10,1 ; 16,4
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	34,8	27,8 ; 42,1	38,2	31,1 ; 46,0	27,0	20,0 ; 34,0
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	53,1	47,9 ; 58,2	29,3	24,6 ; 34,6	17,5	13,7 ; 21,5
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	63,6	61,0 ; 66,3	28,7	26,2 ; 31,2	7,7	6,2 ; 9,3
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,022					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	58,4	52,1 ; 64,2	35,0	29,6 ; 40,9	6,6*	3,9 ; 9,8
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	61,4	58,8 ; 64,0	28,2	26,0 ; 30,6	10,4	8,7 ; 12,0
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	66,0	63,4 ; 68,7	26,2	23,8 ; 28,7	7,8	6,4 ; 9,3
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	44,7	39,6 ; 49,9	38,4	33,8 ; 43,5	16,9	12,8 ; 20,9
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,283					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	64,4	60,0 ; 68,7	26,7	22,7 ; 30,7	9,0	6,4 ; 11,8
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	60,1	57,0 ; 63,3	28,9	26,2 ; 31,9	10,9	8,9 ; 12,9

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	12,1	10,7 ; 13,3	10,4	8,7 ; 12,2	13,7	11,9 ; 15,5
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	15,5	12,9 ; 18,0	13,1	9,8 ; 16,6	17,8	14,0 ; 21,7
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	44,8	39,0 ; 50,5	41,9	32,7 ; 50,7	47,5	40,2 ; 54,4
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,722		P = 0,885		P = 0,509	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	43,0	35,9 ; 50,0	42,3	31,1 ; 53,4	43,6	35,3 ; 52,8
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	47,9	37,4 ; 58,0	42,2*	25,6 ; 58,8	52,6	39,1 ; 65,9
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	49,2**	18,3 ; 77,2	x	;	58,4**	15,7 ; 94,5
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	25,6	22,2 ; 29,0	20,6	16,0 ; 25,5	31,1	26,1 ; 36,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	9,5	7,2 ; 11,9	9,5*	6,0 ; 13,4	9,5*	6,5 ; 12,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	4,4*	2,6 ; 6,3	3,6**	1,4 ; 6,1	5,2**	2,5 ; 8,3
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	3,3**	1,5 ; 5,2	3,0**	0,5 ; 6,1	3,5**	0,9 ; 6,5
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	25,3	20,6 ; 30,2	23,5*	15,4 ; 32,6	26,5	20,9 ; 32,5
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	9,2	7,9 ; 10,5	8,4	6,7 ; 10,2	10,1	8,1 ; 12,1
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,056		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	22,8	17,1 ; 29,2	17,5**	9,2 ; 27,5	26,1	18,7 ; 34,6
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	10,5	9,2 ; 11,7	9,7	8,0 ; 11,5	11,3	9,5 ; 13,1

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,7	74,7 ; 78,8	20,1	18,2 ; 21,9	3,2	2,2 ; 4,1
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	66,3	63,1 ; 69,8	28,0	24,8 ; 30,9	5,7*	3,9 ; 7,7
Femmes	87,9	11,3	0,7	87,1	84,9 ; 89,2	12,3	10,2 ; 14,5	0,6**	0,2 ; 1,1
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,033					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	83,6	78,3 ; 88,8	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	79,5	75,9 ; 83,1	17,2	13,9 ; 20,4	3,3**	1,3 ; 5,5
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	75,3	72,2 ; 78,4	22,1	19,1 ; 25,1	2,6*	1,5 ; 3,9
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	65,9	60,8 ; 71,4	28,3	23,2 ; 33,3	5,8**	2,9 ; 9,0
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,056					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	78,4	74,2 ; 82,5	18,4	14,5 ; 22,5	3,2**	1,5 ; 5,1
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	71,2	67,4 ; 75,1	26,4	22,5 ; 30,1	2,4**	1,2 ; 3,9
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	80,8	77,8 ; 84,0	16,7	13,9 ; 19,5	2,5**	1,0 ; 4,1
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	79,9	72,3 ; 87,0	15,8*	9,6 ; 22,5	4,3**	0,5 ; 9,2
Autre	75,5	19,3	5,3*	70,3	58,0 ; 81,1	22,6*	12,4 ; 33,5	7,1**	1,4 ; 14,4
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,818					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	74,8	72,5 ; 77,3	21,4	19,1 ; 23,6	3,8*	2,7 ; 5,0
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	82,8	77,8 ; 87,9	x	;	x	;
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	78,4	71,8 ; 84,7	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	79,6	69,6 ; 88,4	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,076					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	70,2	66,1 ; 74,4	24,1	20,3 ; 28,0	5,7*	3,5 ; 8,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	77,0	73,1 ; 80,8	20,6	17,0 ; 24,4	2,4**	1,0 ; 4,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	77,3	72,7 ; 81,4	20,1	16,1 ; 24,4	2,6**	0,8 ; 4,7
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	86,1	82,0 ; 90,0	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,086					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	71,2	65,1 ; 76,8	24,2	19,0 ; 29,7	4,7**	1,7 ; 8,3
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	78,0	75,9 ; 80,3	19,3	17,1 ; 21,3	2,6*	1,7 ; 3,7
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,243					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	72,5	65,2 ; 78,9	22,3	16,3 ; 29,1	5,3**	1,9 ; 9,4
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	77,1	75,1 ; 79,4	20,0	17,8 ; 21,9	2,9*	1,9 ; 3,9
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,593					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	77,4	74,9 ; 80,0	19,8	17,5 ; 22,2	2,8*	1,7 ; 4,0
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	83,9	77,6 ; 90,6	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	78,4	70,4 ; 85,9	x	;	x	;
Retraités	72,9	23,2	3,8	69,7	65,3 ; 74,2	26,1	21,9 ; 30,4	4,2**	2,1 ; 6,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	76,7	74,7 ; 78,8	20,1	18,2 ; 21,9	3,2	2,2 ; 4,1
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,029					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	72,0	67,5 ; 76,1	23,9	20,0 ; 28,0	4,1*	2,3 ; 6,3
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	78,6	76,2 ; 80,9	18,7	16,5 ; 20,8	2,7*	1,7 ; 3,8
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	81,1	78,6 ; 83,7	16,9	14,5 ; 19,3	2,0**	1,0 ; 3,1
Bon	75,1	21,2	3,6	71,4	67,5 ; 75,2	24,4	21,0 ; 28,0	4,2*	2,4 ; 6,4
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	66,8	59,9 ; 73,5	26,9	20,3 ; 33,4	6,3**	2,6 ; 10,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,543					
Élevé	77,2	19,2	3,6	78,9	74,8 ; 82,9	18,8	14,7 ; 22,8	2,3**	0,8 ; 4,1
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	76,5	74,2 ; 78,9	20,2	18,0 ; 22,3	3,3*	2,2 ; 4,5
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,001					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	67,7	61,8 ; 73,5	25,6	20,2 ; 30,9	6,7**	3,6 ; 10,3
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	78,0	75,8 ; 80,1	19,4	17,4 ; 21,3	2,7*	1,7 ; 3,7
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	89,4	86,6 ; 92,3	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	72,6	69,7 ; 75,5	23,5	20,8 ; 26,2	3,9*	2,5 ; 5,4

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	76,7	74,7 ; 78,8	66,3	63,1 ; 69,8	87,1	84,9 ; 89,2
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	20,1	18,2 ; 21,9	28,0	24,8 ; 30,9	12,3	10,2 ; 14,5
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	3,2	2,2 ; 4,1	5,7*	3,9 ; 7,7	0,6**	0,2 ; 1,1
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	67,7	61,8 ; 73,5	49,3	39,5 ; 59,5	81,6	75,9 ; 87,1
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	25,6	20,2 ; 30,9	38,6	29,3 ; 48,4	15,8*	10,6 ; 21,2
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	6,7**	3,6 ; 10,3	12,1**	5,0 ; 19,4	2,6**	0,6 ; 5,2
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	78,0	75,8 ; 80,1	68,3	64,9 ; 71,9	87,9	85,6 ; 90,3
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	19,4	17,4 ; 21,3	26,7	23,4 ; 29,9	x	;
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	2,7*	1,7 ; 3,7	5,0*	3,1 ; 7,0	x	;

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	32,0	29,5 ; 34,5	17,0	15,1 ; 19,0	51,0	48,4 ; 53,7
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	22,4	19,0 ; 25,8	15,6	12,8 ; 18,5	62,0	58,1 ; 65,8
Femmes	41,7	18,2	40,1	41,9	38,2 ; 45,4	18,4	15,6 ; 21,2	39,7	36,3 ; 43,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,008					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	28,4	21,8 ; 35,2	18,1*	12,4 ; 24,0	53,5	46,1 ; 60,8
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	29,0	25,1 ; 33,1	20,7	17,2 ; 24,5	50,3	45,9 ; 54,4
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	37,7	33,6 ; 41,7	13,0	10,4 ; 15,9	49,3	45,1 ; 53,4
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	28,7	22,5 ; 35,5	15,1*	9,8 ; 20,9	56,2	48,6 ; 63,9
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,008					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	34,8	29,3 ; 40,3	10,2*	7,1 ; 13,5	55,0	49,3 ; 60,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	30,6	26,3 ; 35,1	17,4	13,4 ; 21,0	52,0	47,5 ; 57,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	31,1	26,1 ; 36,4	18,4	14,5 ; 22,6	50,5	44,9 ; 55,6
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	32,0	26,4 ; 37,4	23,0	18,0 ; 28,4	45,1	39,2 ; 51,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,614					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	34,7	27,8 ; 41,9	14,6*	9,4 ; 20,4	50,6	43,2 ; 58,0
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	31,9	29,2 ; 34,7	17,2	15,1 ; 19,4	50,9	47,9 ; 53,8
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,087					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	30,5	27,5 ; 33,5	17,6	15,1 ; 20,2	51,9	48,8 ; 55,2
Étudiants	28,8	16,3	54,9	28,7	20,5 ; 37,0	17,8*	11,0 ; 25,0	53,5	44,5 ; 62,5
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	42,7	32,9 ; 52,4	17,2*	9,5 ; 25,4	40,1	30,8 ; 49,8
Retraités	38,0	12,4	49,6	38,1	32,5 ; 43,9	12,5*	8,3 ; 16,7	49,4	43,5 ; 55,5

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
1,9*	1,3 ; 2,5	44,3	41,9 ; 46,7	38,9	36,5 ; 41,2	15,0	13,3 ; 16,7	Ensemble de la population	
P = 0,000									
0,7**	0,1 ; 1,3	33,8	30,5 ; 37,2	48,4	44,9 ; 52,2	17,2	14,4 ; 19,9	Sexe	
3,1*	2,0 ; 4,3	55,2	52,0 ; 58,5	29,0	25,9 ; 32,0	12,8	10,7 ; 15,0	Hommes	
P = 0,003									
x		80,5	69,5 ; 90,3	14,2**	4,9 ; 24,3	x		Femmes	
5,2**	1,3 ; 9,8	60,8	50,8 ; 69,9	27,0	18,9 ; 36,1	7,0**	2,2 ; 12,3	Groupe d'âge	
P = 0,000									
4,4**	1,6 ; 7,6	68,3	61,0 ; 75,0	22,1	16,2 ; 28,4	5,2**	2,1 ; 8,9	15-17 ans	
1,5**	0,7 ; 2,6	43,9	39,8 ; 48,1	41,3	36,9 ; 45,7	13,2	10,1 ; 16,6	25-44 ans	
1,3**	0,5 ; 2,2	37,1	33,5 ; 40,9	41,8	38,3 ; 45,7	19,8	16,7 ; 22,9	45-64 ans	
1,4**	0,3 ; 2,9	37,5	32,4 ; 42,9	44,0	38,5 ; 49,4	17,1	13,1 ; 21,3	65 ans et plus	
P = 0,116									
x		74,6	55,8 ; 92,3	25,4**	7,7 ; 44,2	x		Hommes	
x		54,0	41,0 ; 66,8	34,6*	22,3 ; 47,2	x		15-17 ans	
P = 0,065									
x		61,0	50,5 ; 71,8	31,5*	21,7 ; 41,4	x		18-24 ans	
x		26,0	20,2 ; 32,3	56,0	49,0 ; 62,8	x		15-24 ans	
x		27,8	23,1 ; 33,0	50,1	45,0 ; 55,7	x		25-44 ans	
x		36,7	28,8 ; 44,8	45,5	36,8 ; 54,2	x		45-64 ans	
P = 0,387									
x		85,7	73,1 ; 95,8	x		x		65 ans et plus	
x		69,6	54,8 ; 82,6	17,3**	6,8 ; 29,3	x		Femmes	
P = 0,000									
7,3**	2,1 ; 13,4	76,4	66,4 ; 85,1	11,7**	5,0 ; 19,6	4,6**	0,9 ; 9,1	15-17 ans	
3,2**	1,4 ; 5,3	63,4	57,3 ; 69,5	25,4	20,0 ; 31,0	8,1*	5,0 ; 11,4	25-44 ans	
1,7**	0,5 ; 3,2	46,4	41,1 ; 51,7	33,6	28,6 ; 38,6	18,3	14,3 ; 22,7	45-64 ans	
2,2**	0,2 ; 4,8	38,2	31,2 ; 45,4	42,5	35,5 ; 49,4	17,1*	11,7 ; 22,9	65 ans et plus	
P = 0,160									
2,7**	1,2 ; 4,3	43,5	39,1 ; 48,0	37,2	32,8 ; 41,6	16,6	13,2 ; 19,9	Niveau de scolarité	
2,0**	0,7 ; 3,5	46,4	41,7 ; 51,1	35,9	31,7 ; 40,4	15,7	12,6 ; 19,1	Niveau inférieur au DES	
1,7**	0,7 ; 3,0	41,1	36,3 ; 46,5	41,5	36,1 ; 46,5	15,7	11,7 ; 19,7	Diplôme d'études secondaires (DES)	
x		46,0	40,1 ; 52,2	43,7	37,6 ; 49,7	x		Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
P = 0,560									
x		37,5	31,1 ; 43,9	42,9	36,4 ; 49,6	x		Diplôme d'études universitaires	
x		36,0	28,9 ; 42,9	45,4	38,9 ; 52,2	x		Hommes	
x		28,6	22,0 ; 35,6	53,6	45,7 ; 61,2	x		Niveau inférieur au DES	
x		30,5	21,9 ; 39,6	56,5	46,7 ; 65,7	x		Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 0,258									
5,2**	2,4 ; 8,7	50,4	44,3 ; 56,6	30,8	25,1 ; 36,3	13,6	10,0 ; 17,7	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
2,2**	0,4 ; 4,3	55,7	49,3 ; 62,1	27,4	22,1 ; 33,0	14,7	10,6 ; 19,3	Diplôme d'études universitaires	
3,4**	1,2 ; 6,3	55,9	49,0 ; 63,3	27,2	20,9 ; 33,5	13,5*	8,7 ; 18,6	Femmes	
x		61,0	53,2 ; 69,0	31,2	23,7 ; 38,6	x		Niveau inférieur au DES	
P = 0,011									
3,9**	1,9 ; 6,1	43,0	36,9 ; 49,4	34,0	28,0 ; 40,0	19,1	14,3 ; 24,0	Indice du niveau de revenu du ménage	
1,4*	0,8 ; 2,1	44,0	41,5 ; 46,7	40,3	37,8 ; 42,9	14,3	12,3 ; 16,2	Quintile 1 (faible)	
P = 0,146									
x		36,9	27,4 ; 47,3	35,5*	24,4 ; 46,5	x		Quintile 2 et suivants	
x		32,4	28,8 ; 36,2	51,4	47,4 ; 55,5	x		Hommes	
P = 0,086									
4,8**	2,0 ; 8,2	47,0	39,0 ; 55,0	33,1	25,3 ; 40,6	15,0*	10,6 ; 20,2	Femmes	
2,5*	1,4 ; 3,7	57,0	53,3 ; 60,8	27,9	24,6 ; 31,3	12,6	10,2 ; 15,1	Quintile 1 (faible)	
Quintile 2 et suivants									

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	40,8	38,6 ; 43,2	2,4*	1,6 ; 3,2	56,8	54,4 ; 59,2
Sexe	P = 0,000			P = 0,009					
Hommes	36,6	3,6	59,9	38,1	34,7 ; 41,4	3,3*	2,0 ; 4,6	58,7	55,1 ; 62,2
Femmes	40,5	2,3	57,1	43,6	40,3 ; 46,9	1,5*	0,8 ; 2,3	54,9	51,6 ; 58,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	15,6*	10,5 ; 21,1	5,5**	2,1 ; 9,2	78,9	72,6 ; 84,9
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	40,4	36,0 ; 44,9	1,7**	0,7 ; 2,9	57,9	53,4 ; 62,4
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	51,7	47,9 ; 55,4	1,4**	0,7 ; 2,4	46,8	43,0 ; 50,6
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	40,8	35,5 ; 46,4	2,8**	1,1 ; 4,8	56,4	50,6 ; 61,7
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	12,0**	5,3 ; 19,6	8,0**	2,1 ; 14,4	80,0	70,7 ; 88,8
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	36,7	30,0 ; 43,3	1,9**	0,2 ; 3,9	61,5	54,4 ; 68,1
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	51,1	45,7 ; 56,4	1,7**	0,5 ; 3,3	47,1	42,0 ; 52,6
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	37,2	29,3 ; 46,2	5,3**	1,8 ; 9,1	57,5	48,5 ; 65,7
Femmes	P = 0,000			P = 0,224					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	19,6*	11,7 ; 28,4	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	44,4	38,1 ; 50,8	1,6**	0,3 ; 3,1	54,0	47,2 ; 60,4
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	52,3	47,2 ; 57,6	1,2**	0,2 ; 2,4	46,5	41,1 ; 51,7
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	44,2	37,3 ; 51,5	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	34,4*	18,3 ; 52,4	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	13,2	10,8 ; 15,9	3,3*	2,0 ; 4,9	83,5	80,4 ; 86,4
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	54,1	50,2 ; 58,3	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	92,3	88,8 ; 95,3	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,002					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	69,3**	17,6 ; 100,0
Poids normal	4,7	6,8	88,5	4,2**	1,9 ; 6,8	7,4*	4,2 ; 11,2	88,4	84,0 ; 92,4
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	44,0	38,9 ; 49,5	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	89,9	84,3 ; 94,7	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	35,2**	16,9 ; 55,1	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	19,0	15,3 ; 23,0	0,7**	0,1 ; 1,5	80,3	76,3 ; 84,2
Embonpoint	69,6	x	x	71,5	66,1 ; 76,9	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	95,6	91,5 ; 98,9	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	76,4	73,0 ; 79,9	13,3	10,7 ; 16,3	10,2	7,9 ; 12,7
Sexe	P = 0,000			P = 0,226					
Hommes	81,4	10,5	8,0	80,2	74,6 ; 85,6	11,3*	6,8 ; 16,1	8,5*	5,1 ; 12,3
Femmes	74,5	14,1	11,5	74,0	69,3 ; 78,6	14,6	11,2 ; 18,6	11,4	8,1 ; 14,8
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,644					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	82,7	71,4 ; 92,4	8,7**	1,3 ; 17,5	8,7**	1,5 ; 17,6
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	76,7	70,4 ; 82,6	14,4*	9,3 ; 20,0	8,9*	5,3 ; 12,9
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	72,8	67,2 ; 78,4	15,6	11,3 ; 20,2	11,7*	7,7 ; 15,8
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	83,2	74,4 ; 90,7	6,2**	1,8 ; 11,5	10,6**	3,9 ; 18,3
Hommes	P = 0,252			P = 0,774					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	89,8	69,0 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	81,0	69,8 ; 90,9	x	;	x	;
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	79,5	71,6 ; 87,4	10,4**	4,0 ; 17,2	10,0**	4,7 ; 15,8
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	73,5	55,9 ; 89,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,753					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	79,9	65,9 ; 92,6	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	74,2	66,1 ; 81,8	14,4*	8,0 ; 21,6	11,4*	6,3 ; 16,9
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	67,8	60,1 ; 75,4	19,4*	13,4 ; 26,0	12,9*	7,5 ; 18,9
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	90,5	82,4 ; 97,1	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,056					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	83,9	77,9 ; 89,2	9,9*	5,6 ; 14,6	6,3**	2,8 ; 10,3
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	74,0	68,5 ; 79,3	14,9*	10,5 ; 19,6	11,1*	7,4 ; 15,0
Obésité	72,3	14,4	13,3	69,8	61,8 ; 77,4	16,2*	10,1 ; 22,7	14,1*	8,7 ; 20,1
Hommes	P = 0,002			P = 0,940					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	84,8	68,0 ; 98,9	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	80,9	73,3 ; 87,7	10,2**	4,8 ; 16,0	8,9**	4,3 ; 14,4
Obésité	76,0	12,2	11,8	76,9	65,6 ; 87,3	15,1**	5,9 ; 25,9	8,0**	2,2 ; 15,0
Femmes	P = 0,161			P = 0,003					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	83,7	77,3 ; 89,5	10,3*	5,6 ; 15,7	6,0**	2,3 ; 10,4
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	67,1	58,3 ; 75,3	19,6*	12,6 ; 27,0	13,3*	7,6 ; 19,2
Obésité	68,9	16,4	14,7	62,0	51,0 ; 72,9	17,3*	9,2 ; 26,0	20,7*	11,1 ; 30,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
19,8	18,0 ; 21,8	16,9	15,0 ; 18,7	3,1*	2,2 ; 4,1	60,2	57,8 ; 62,6	Ensemble de la population	
P = 0,000									
15,3	12,9 ; 18,0	13,5	11,1 ; 16,1	4,5*	2,9 ; 6,3	66,7	63,2 ; 69,9	Sexe	
24,3	21,5 ; 27,3	20,3	17,5 ; 23,0	1,7**	0,8 ; 2,6	53,7	50,5 ; 57,0	Hommes	
P = 0,000									
15,4*	10,1 ; 20,7	12,6*	7,9 ; 17,6	10,8*	6,3 ; 15,7	61,3	54,4 ; 68,3	Groupe d'âge	
19,5	16,2 ; 23,1	18,9	15,4 ; 22,5	2,8**	1,1 ; 4,6	58,8	54,4 ; 63,2	15-24 ans	
23,8	20,7 ; 27,1	18,2	15,2 ; 21,1	0,9**	0,3 ; 1,6	57,1	53,4 ; 60,7	25-44 ans	
14,7	10,8 ; 18,9	13,5	9,9 ; 17,5	x	;	x	;	45-64 ans	
P = 0,041									
8,5**	2,5 ; 15,2	6,3**	1,4 ; 12,4	16,8*	9,4 ; 25,0	68,4	58,8 ; 77,7	Hommes	
14,2*	9,6 ; 19,0	14,7*	9,8 ; 20,0	4,0**	1,0 ; 7,5	67,1	60,2 ; 73,4	15-24 ans	
18,9	14,6 ; 23,5	17,2	12,9 ; 21,7	0,8**	0,0 ; 1,8	63,1	57,4 ; 68,3	25-44 ans	
16,3*	10,0 ; 23,1	8,7**	3,6 ; 14,5	x	;	x	;	45-64 ans	
P = 0,356									
22,7*	14,0 ; 31,6	19,2*	11,9 ; 27,6	4,4**	0,3 ; 9,5	53,7	43,2 ; 64,5	Femmes	
24,9	19,9 ; 30,2	23,1	18,0 ; 28,1	1,5**	0,2 ; 3,1	50,5	44,6 ; 56,4	15-24 ans	
28,7	24,0 ; 33,4	19,1	15,1 ; 23,2	1,0**	0,1 ; 2,2	51,3	45,9 ; 56,3	25-44 ans	
13,2*	8,6 ; 18,3	18,1*	12,6 ; 23,7	x	;	x	;	45-64 ans	
P = 0,000									
x	;	x	;	28,5**	11,2 ; 45,9	64,7	46,3 ; 82,9	Statut pondéral	
9,3	7,1 ; 11,5	15,8	13,0 ; 18,7	3,7*	2,3 ; 5,3	71,2	67,7 ; 74,7	Poids insuffisant	
25,3	22,1 ; 28,8	18,2	15,1 ; 21,5	2,3**	0,9 ; 4,0	54,1	50,0 ; 58,2	Poids normal	
39,1	33,3 ; 45,0	18,0	13,0 ; 23,1	x	;	x	;	Embonpoint	
P = 0,000									
x	;	x	;	x	;	88,5	50,8 ; 100,0	Obésité	
2,5**	0,8 ; 4,7	7,4*	4,1 ; 11,6	8,1*	4,7 ; 12,1	82,0	76,3 ; 87,0	Hommes	
18,3	14,4 ; 22,6	16,0	12,1 ; 20,1	3,6**	1,3 ; 6,2	62,1	56,5 ; 67,4	Poids insuffisant	
32,7	24,6 ; 41,2	18,7*	11,8 ; 26,2	x	;	x	;	Poids normal	
P = 0,000									
x	;	x	;	32,4**	11,7 ; 52,1	59,3*	39,8 ; 80,7	Embonpoint	
13,6	10,3 ; 17,1	21,1	17,1 ; 25,2	0,9**	0,1 ; 1,8	64,4	59,9 ; 69,1	Obésité	
37,5	31,5 ; 43,5	22,1	17,2 ; 27,5	x	;	x	;	Hommes	
47,9	39,4 ; 57,0	16,9*	10,3 ; 23,8	x	;	x	;	Poids insuffisant	
P = 0,000									
37,2	33,7 ; 41,0	20,1	17,2 ; 23,2	x	;	x	;	Poids normal	
x	;	x	;	45,4*	27,7 ; 63,1	54,6*	36,9 ; 72,3	Embonpoint	
8,3	6,3 ; 10,3	15,1	12,7 ; 17,4	3,4*	2,1 ; 4,9	73,2	70,1 ; 76,4	Obésité	
P = 0,000									
37,2	33,7 ; 41,0	20,1	17,2 ; 23,2	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	45,4*	27,7 ; 63,1	54,6*	36,9 ; 72,3	Excès de poids	
8,3	6,3 ; 10,3	15,1	12,7 ; 17,4	3,4*	2,1 ; 4,9	73,2	70,1 ; 76,4	Trop maigre	
P = 0,000									
8,3	6,3 ; 10,3	15,1	12,7 ; 17,4	3,4*	2,1 ; 4,9	73,2	70,1 ; 76,4	À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
34,4	28,8 ; 39,7	15,8	12,0 ; 19,7	3,7**	1,8 ; 5,8	46,1	40,5 ; 51,8	Ensemble de la population	
P = 0,331									
Sexe									
39,8	29,8 ; 48,9	16,9*	10,3 ; 24,5	2,7**	0,2 ; 5,7	40,6	31,9 ; 49,9	Hommes	
31,1	24,5 ; 37,6	15,0	10,6 ; 19,8	4,3**	1,6 ; 7,6	49,5	42,1 ; 56,6	Femmes	
P = 0,647									
Groupe d'âge									
40,6*	20,0 ; 60,0	21,3**	7,3 ; 39,6	x	;	x	;	15-24 ans	
36,5	26,4 ; 46,7	16,8*	9,7 ; 24,5	5,8**	1,3 ; 11,1	40,9	31,0 ; 51,0	25-44 ans	
35,3	27,5 ; 42,8	14,1*	8,8 ; 20,0	3,3**	0,7 ; 6,6	47,3	39,8 ; 55,5	45-64 ans	
16,5**	5,3 ; 29,5	13,3**	3,7 ; 25,2	x	;	x	;	65 ans et plus	
P = 'n.d.'									
Hommes									
x	;	x	;	x	;	x	;	15-24 ans	
42,5*	24,7 ; 62,0	14,6**	1,9 ; 29,5	x	;	x	;	25-44 ans	
40,4*	26,9 ; 54,1	18,3**	8,4 ; 29,8	x	;	x	;	45-64 ans	
x	;	x	;	x	;	70,8	47,7 ; 92,9	65 ans et plus	
P = 0,955									
Femmes									
33,6**	10,7 ; 57,2	17,7**	1,8 ; 37,1	x	;	x	;	15-24 ans	
33,1*	20,9 ; 46,1	18,0*	9,4 ; 27,4	6,7**	0,6 ; 13,7	42,2	30,0 ; 54,6	25-44 ans	
31,9	22,2 ; 41,4	11,4**	5,6 ; 18,1	x	;	x	;	45-64 ans	
x	;	18,1**	2,6 ; 35,4	x	;	62,8	43,0 ; 82,7	65 ans et plus	
P = 0,305									
Statut pondéral									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
30,6*	18,9 ; 43,4	18,4**	8,9 ; 29,3	x	;	x	;	Poids normal	
38,8	30,3 ; 46,8	13,4*	8,5 ; 18,4	2,5**	0,2 ; 5,5	45,3	37,2 ; 53,8	Embonpoint	
29,2*	19,6 ; 38,9	18,4*	10,7 ; 26,8	8,5**	3,1 ; 14,6	43,9	34,7 ; 54,5	Obésité	
P = 'n.d.'									
Hommes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids normal	
44,6	31,5 ; 57,4	11,4**	4,3 ; 19,6	x	;	x	;	Embonpoint	
29,8*	14,4 ; 45,7	25,5**	11,8 ; 40,5	7,3**	0,6 ; 15,8	37,4*	23,3 ; 53,4	Obésité	
P = 0,788									
Femmes									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
27,7*	16,2 ; 40,8	18,4**	8,4 ; 30,2	x	;	x	;	Poids normal	
33,9*	23,2 ; 44,3	15,1*	8,4 ; 22,4	4,6**	0,4 ; 9,9	46,4	35,9 ; 57,6	Embonpoint	
28,5*	16,5 ; 41,3	11,7**	4,1 ; 20,6	9,6**	1,3 ; 19,0	50,1	37,8 ; 64,2	Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	89,8	87,1 ; 92,2	4,7*	3,1 ; 6,5	5,5*	3,7 ; 7,6
Sexe	P = 0,001			P = 0,602					
Hommes	88,9	6,9	4,2	91,8	87,7 ; 95,5	3,8**	1,4 ; 6,6	4,4**	1,5 ; 7,9
Femmes	85,7	7,5	6,8	88,5	85,1 ; 91,7	5,2*	3,0 ; 7,7	6,3*	3,9 ; 8,8
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,873					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	89,3	79,5 ; 97,1	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	91,3	86,9 ; 95,2	3,2**	1,1 ; 5,7	5,5**	2,3 ; 9,1
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	89,5	85,6 ; 93,2	4,6**	2,2 ; 7,4	5,9*	3,0 ; 9,1
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	86,4	77,8 ; 94,1	x	;	x	;
Hommes	P = 0,121			P = 'n.d.'					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	96,8	92,0 ; 100,0	x	;	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	88,9	81,8 ; 95,4	4,9**	1,0 ; 9,7	6,2**	1,0 ; 12,0
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	82,8	67,3 ; 97,2	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,871					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	85,3	72,2 ; 95,9	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	88,0	81,6 ; 93,8	4,5**	1,4 ; 8,4	7,5**	2,7 ; 13,1
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	89,9	85,2 ; 94,1	4,4**	1,3 ; 8,1	5,7**	2,7 ; 9,2
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	89,1	79,5 ; 97,6	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,061					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	91,7	86,8 ; 95,8	3,8**	1,2 ; 6,8	4,5**	1,1 ; 8,6
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	93,1	89,7 ; 96,2	3,1**	0,8 ; 5,7	3,8**	1,6 ; 6,5
Obésité	82,0	8,7	9,2	82,2	76,0 ; 88,0	9,5*	5,2 ; 14,5	8,4**	4,1 ; 13,3
Hommes	P = 0,002			P = 'n.d.'					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	87,6	70,7 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	94,4	89,3 ; 98,5	x	;	x	;
Obésité	85,2	8,2	6,6*	88,5	80,4 ; 95,7	x	;	x	;
Femmes	P = 0,034			P = 0,079					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	92,4	87,5 ; 96,9	3,3**	0,9 ; 6,3	4,3**	0,7 ; 8,4
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	91,8	86,2 ; 96,3	4,6**	0,7 ; 9,2	3,6**	1,0 ; 7,0
Obésité	79,1	9,2	11,8	75,2	64,9 ; 84,5	12,4**	5,4 ; 20,4	12,3**	5,2 ; 20,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	6,6*	4,6 ; 8,7	93,4	91,3 ; 95,4
Sexe	P = 0,024		P = 0,856			
Hommes	6,6	93,4	6,3**	3,0 ; 10,1	93,7	89,9 ; 97,0
Femmes	8,6	91,4	6,7*	4,3 ; 9,3	93,3	90,7 ; 95,7
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,551			
15-24 ans	11,2*	88,8	8,7**	1,3 ; 17,3	91,3	82,7 ; 98,7
25-44 ans	8,0	92,0	7,9*	4,3 ; 12,0	92,1	88,0 ; 95,7
45-64 ans	7,5	92,5	5,6**	2,8 ; 8,5	94,4	91,5 ; 97,2
65 ans et plus	4,9	95,1	3,7**	0,2 ; 8,5	96,3	91,5 ; 99,8
Hommes	P = 0,409		P = 0,986			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	6,8**	1,2 ; 13,9	93,2	86,1 ; 98,8
45-64 ans	7,0	93,0	7,1**	1,8 ; 13,4	92,9	86,6 ; 98,2
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,136			
15-24 ans	12,3*	87,7	11,9**	1,8 ; 23,4	88,1	76,6 ; 98,2
25-44 ans	9,9	90,1	8,6**	4,1 ; 13,8	91,4	86,2 ; 95,9
45-64 ans	7,8	92,2	4,4**	1,9 ; 7,4	95,6	92,6 ; 98,1
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,010			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	5,2**	2,3 ; 8,8	94,8	91,2 ; 97,7
Embonpoint	6,6	93,4	4,7**	2,2 ; 7,4	95,3	92,6 ; 97,8
Obésité	11,3	88,7	12,7*	7,2 ; 18,9	87,3	81,1 ; 92,8
Hommes	P = 0,000		P = 0,027			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	3,7**	0,6 ; 7,6	96,3	92,4 ; 99,4
Obésité	11,5	88,5	13,6**	4,6 ; 22,9	86,4	77,1 ; 95,4
Femmes	P = 0,032		P = 0,272			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	6,2**	2,7 ; 10,4	93,8	89,6 ; 97,3
Embonpoint	8,4	91,6	5,7**	2,0 ; 10,1	94,3	89,9 ; 98,0
Obésité	11,1	88,9	11,6**	4,8 ; 19,4	88,4	80,6 ; 95,2

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	0,8**	0,1 ; 1,7	x	;	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;	x	;
Rarement	2,8	2,6*	2,9	1,3**	0,5 ; 2,3	x	;	1,7**	0,5 ; 3,2
Jamais	94,8	94,8	94,8	97,3	96,0 ; 98,5	98,3	96,7 ; 99,7	96,7	94,7 ; 98,5
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,525					
Souvent	4,6	4,2	4,9	3,4*	1,9 ; 4,9	3,1**	0,8 ; 5,8	3,6**	1,7 ; 5,7
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	5,7*	3,9 ; 7,6	4,3**	2,0 ; 7,1	6,5*	4,1 ; 9,3
Rarement	5,1	5,5	4,9	4,6*	2,8 ; 6,5	5,7**	2,5 ; 9,4	3,8**	1,9 ; 6,1
Jamais	82,9	81,4	84,0	86,4	83,6 ; 89,2	86,9	82,0 ; 91,1	86,1	82,4 ; 89,5
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,755					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	2,0**	0,8 ; 3,4	x	;	2,6**	1,0 ; 4,6
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	6,7*	4,7 ; 8,8	x	;	6,9*	4,3 ; 9,7
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,8*	2,9 ; 6,8	3,8**	1,4 ; 6,6	5,4*	2,8 ; 8,3
Jamais	86,5	87,5	85,7	86,5	83,4 ; 89,5	88,7	84,0 ; 92,7	85,0	81,1 ; 89,0
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	99,1	98,3 ; 99,8	99,3	97,7 ; 100,0	99,0	98,1 ; 99,9
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	0,5**	0,0 ; 1,1	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	99,0	98,1 ; 99,8	98,9	97,3 ; 100,0	99,2	97,9 ; 100,0
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	1,1**	0,3 ; 2,0	x	;	1,7**	0,5 ; 3,2
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,0	96,9 ; 99,0	99,9	99,3 ; 100,0	96,9	94,9 ; 98,5
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,6	99,2 ; 100,0	99,6	98,6 ; 100,0	99,7	99,1 ; 100,0
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	0,9**	0,2 ; 1,8	x	;	1,5**	0,4 ; 2,9
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,8	96,6 ; 98,9	99,3	97,8 ; 100,0	96,9	94,9 ; 98,6

Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	1,2**	0,4 ; 2,2	x	;	1,6**	0,4 ; 3,1
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	97,3	95,8 ; 98,6	98,0	95,9 ; 99,7	96,9	94,8 ; 98,6
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	0,4**	0,0 ; 1,0	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,5	98,8 ; 99,9	99,9	99,3 ; 100,0	99,2	98,2 ; 99,9
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,3	98,4 ; 100,0	x	;	98,9	97,3 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
4,7*	3,0 ; 6,6	33,1	29,3 ; 37,0	44,2	40,4 ; 48,3	18,0	14,7 ; 21,3	Ensemble de la population	
P = 0,000									
7,6*	4,1 ; 11,7	41,3	34,5 ; 47,9	37,5	31,1 ; 44,2	13,6*	8,9 ; 18,5	Sexe	
2,8**	1,3 ; 4,8	27,9	23,3 ; 32,5	48,4	43,3 ; 53,8	20,8	16,3 ; 25,3	Hommes	
								Femmes	
P = 0,465									
x	;	34,6*	20,9 ; 48,4	41,8*	28,3 ; 56,5	x	;	Groupe d'âge	
6,0**	2,8 ; 9,8	25,0	18,5 ; 31,5	46,2	39,6 ; 53,7	22,8	16,5 ; 29,1	15-24 ans	
3,3**	1,3 ; 5,4	35,2	29,3 ; 41,3	44,5	38,7 ; 50,5	17,0	12,3 ; 21,9	25-44 ans	
5,3**	0,9 ; 11,3	50,2	39,1 ; 61,0	38,7	28,5 ; 49,2	5,8**	1,1 ; 11,5	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,934									
x	;	60,8*	27,4 ; 90,4	33,6**	3,9 ; 65,6	x	;	Hommes	
12,8**	4,9 ; 21,9	26,7*	15,1 ; 38,2	38,7*	26,5 ; 52,3	21,8*	11,0 ; 33,0	15-24 ans	
4,6**	0,9 ; 9,0	45,1	35,5 ; 55,3	38,2	29,1 ; 47,3	12,1**	6,0 ; 19,1	25-44 ans	
x	;	53,6*	33,1 ; 72,6	34,4*	17,1 ; 53,2	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,721									
x	;	24,4**	9,8 ; 40,2	45,0*	28,9 ; 62,1	x	;	Femmes	
x	;	23,9*	16,4 ; 32,5	50,7	41,9 ; 59,8	x	;	15-24 ans	
2,3**	0,3 ; 4,9	27,9	21,0 ; 35,3	49,2	41,5 ; 57,0	20,7*	13,9 ; 27,4	25-44 ans	
x	;	47,7	34,4 ; 60,2	41,9*	29,1 ; 55,5	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,089									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
4,9**	1,8 ; 8,9	31,1	23,8 ; 38,3	43,4	35,6 ; 51,4	20,7*	14,2 ; 27,5	Poids insuffisant	
3,8**	1,6 ; 6,4	29,8	24,4 ; 35,6	49,5	43,5 ; 55,8	17,0	12,2 ; 22,3	Poids normal	
6,8**	2,9 ; 11,6	43,0	34,4 ; 51,5	37,1	29,4 ; 45,0	13,2*	7,8 ; 18,8	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,589									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	42,4**	20,3 ; 64,9	31,2**	10,4 ; 52,8	x	;	Poids insuffisant	
6,6**	2,4 ; 11,7	34,5	26,0 ; 43,4	44,2	35,1 ; 53,7	14,6*	7,9 ; 21,8	Poids normal	
10,3**	3,3 ; 18,6	53,2	40,5 ; 65,6	27,6*	17,0 ; 39,3	9,0**	3,0 ; 16,0	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,790									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
4,8**	1,6 ; 9,1	29,0	21,3 ; 36,8	45,6	37,4 ; 54,4	20,6*	13,5 ; 27,9	Poids insuffisant	
x	;	25,1	17,8 ; 32,6	54,7	46,0 ; 63,5	x	;	Poids normal	
x	;	31,1*	20,4 ; 42,4	48,1	36,6 ; 59,3	x	;	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018			P = 0,967					
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	46,7	42,6 ; 50,7	46,1	39,5 ; 53,0	47,1	42,0 ; 52,0	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	39,6	35,7 ; 43,5	39,9	32,8 ; 46,4	39,4	34,4 ; 44,5	
Non	14,4	15,3	13,7	13,8	11,1 ; 16,4	14,1	9,6 ; 18,8	13,6	10,2 ; 16,9	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000			P = 0,930					
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	45,4	41,5 ; 49,8	44,5	37,8 ; 51,3	46,0	40,9 ; 51,1	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	37,5	33,6 ; 41,3	38,4	31,6 ; 44,9	37,0	32,0 ; 41,8	
Non	19,6	22,6	17,4	17,1	14,1 ; 20,1	17,1	12,4 ; 22,1	17,0	13,1 ; 21,0	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000			P = 0,121					
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	46,4	42,1 ; 50,4	40,9	34,0 ; 47,9	49,8	44,5 ; 54,7	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	25,1	21,6 ; 28,8	27,6	21,5 ; 34,0	23,4	19,2 ; 27,8	
Non	27,7	32,4	24,3	28,6	24,8 ; 32,4	31,5	25,1 ; 37,7	26,7	22,2 ; 31,5	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014			P = 0,008					
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	48,4	44,2 ; 52,4	40,7	33,9 ; 48,2	53,3	48,1 ; 58,1	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	28,5	25,1 ; 32,2	30,7	24,5 ; 37,4	27,1	22,7 ; 31,9	
Non	26,1	27,4	25,1	23,1	19,8 ; 26,5	28,6	22,7 ; 34,7	19,6	15,9 ; 23,6	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000			P = 0,000					
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	64,5	60,5 ; 68,5	53,0	46,2 ; 59,8	71,9	66,9 ; 76,5	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	18,9	15,7 ; 22,3	25,4	19,1 ; 31,7	14,7	11,3 ; 18,3	
Non	17,4	18,5	16,6	16,6	13,6 ; 19,6	21,6	16,5 ; 27,1	13,4	10,1 ; 16,9	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000			P = 0,000					
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	64,8	60,8 ; 68,7	53,1	46,2 ; 60,2	72,3	67,7 ; 76,8	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	21,4	18,1 ; 25,0	28,5	21,8 ; 35,0	16,9	13,1 ; 20,8	
Non	12,6	14,0	11,6	13,8	11,0 ; 16,9	18,4*	13,2 ; 24,4	10,8	7,6 ; 14,1	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000			P = 0,000					
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	49,9	46,0 ; 53,8	44,0	37,1 ; 51,1	53,6	48,4 ; 58,7	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	28,6	24,8 ; 32,3	24,8	19,1 ; 30,8	31,0	26,2 ; 36,1	
Non	21,5	24,4	19,4	21,6	18,4 ; 25,0	31,2	24,7 ; 37,9	15,4	12,0 ; 19,1	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000			P = 0,249					
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	12,2	9,5 ; 15,0	11,8*	7,6 ; 16,5	12,5	9,0 ; 15,9	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	17,2	14,2 ; 20,3	20,5	15,2 ; 26,2	15,0	11,6 ; 18,6	
Non	72,0	67,3	75,4	70,6	67,0 ; 74,2	67,7	61,3 ; 73,9	72,5	67,9 ; 76,9	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000			P = 0,169					
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	35,8	31,7 ; 39,9	40,5	33,7 ; 47,6	32,8	27,8 ; 37,7	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	13,1	10,4 ; 16,0	12,9*	8,0 ; 17,8	13,2	9,9 ; 16,8	
Non	49,9	43,2	54,7	51,1	46,9 ; 55,2	46,6	39,7 ; 53,5	54,0	48,7 ; 59,2	



Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	57,5	53,5 ; 61,5	48,7	42,3 ; 55,7	63,2	57,9 ; 68,0	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	14,9	12,0 ; 17,8	22,0	16,4 ; 27,7	10,3*	7,3 ; 13,5	
Non	29,6	28,8	30,2	27,6	24,0 ; 31,5	29,3	23,0 ; 35,7	26,4	22,0 ; 31,2	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	38,2	34,2 ; 42,2	26,5	20,3 ; 32,8	45,6	40,4 ; 50,8	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	14,7	11,8 ; 17,7	18,5	13,2 ; 24,0	12,3	8,9 ; 15,7	
Non	48,5	52,0	45,9	47,1	43,0 ; 51,4	55,0	48,3 ; 62,2	42,1	37,1 ; 47,2	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,085				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	35,7	31,7 ; 39,6	31,1	25,0 ; 37,6	38,6	33,5 ; 43,8	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	29,7	25,9 ; 33,6	34,2	27,4 ; 40,8	26,9	22,0 ; 31,6	
Non	37,5	34,7	39,5	34,6	31,0 ; 38,5	34,7	28,5 ; 41,4	34,5	30,1 ; 39,5	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
50,0	47,7 ; 52,4	36,8	34,3 ; 39,1	13,2	11,5 ; 15,1	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
42,3	38,8 ; 45,6	41,4	37,7 ; 44,9	16,3	13,5 ; 19,2	Hommes
57,7	54,5 ; 61,0	32,2	29,0 ; 35,3	10,2	8,1 ; 12,3	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
54,5	42,6 ; 66,5	15,9**	6,8 ; 25,5	29,6*	19,2 ; 40,8	15-17 ans
26,2*	17,7 ; 34,7	34,2	25,5 ; 43,5	39,6	30,7 ; 49,0	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
36,9	29,8 ; 43,9	27,2	20,7 ; 33,8	35,8	29,1 ; 42,9	25-44 ans
36,2	31,9 ; 40,5	48,1	43,4 ; 52,9	15,6	12,3 ; 19,2	45-64 ans
53,6	50,1 ; 57,4	40,8	37,0 ; 44,2	5,6*	3,9 ; 7,6	65 ans et plus
90,6	87,0 ; 93,8	x	;	x	;	
		P = 0,000				Hommes
51,2*	32,2 ; 69,9	20,4**	4,7 ; 38,0	28,4**	12,9 ; 45,8	15-17 ans
30,2*	17,5 ; 43,5	27,9*	15,6 ; 41,2	41,8*	29,0 ; 55,5	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
37,6	26,9 ; 48,0	25,3*	16,0 ; 35,3	37,1	27,5 ; 47,6	25-44 ans
29,5	23,0 ; 36,3	50,7	43,1 ; 57,7	19,8	13,9 ; 25,6	45-64 ans
41,5	36,3 ; 46,7	49,6	44,2 ; 55,0	8,9*	5,7 ; 12,5	65 ans et plus
84,8	78,0 ; 91,1	x	;	x	;	
		P = 0,000				Femmes
57,5	41,1 ; 74,6	11,8**	1,5 ; 23,8	30,7*	16,1 ; 46,4	15-17 ans
21,4**	9,9 ; 34,6	41,5*	28,0 ; 55,5	37,1*	24,2 ; 50,1	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
36,2	26,3 ; 46,8	29,3	20,0 ; 39,3	34,5	24,8 ; 44,1	25-44 ans
43,0	36,9 ; 49,1	45,5	39,7 ; 51,8	11,4*	7,7 ; 15,4	45-64 ans
65,5	60,6 ; 70,5	32,1	27,0 ; 36,9	2,5**	1,0 ; 4,0	65 ans et plus
95,9	92,7 ; 98,4	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	48,3	46,0 ; 50,6	55,8	52,5 ; 59,2	40,8	37,7 ; 44,0
Non	56,1	49,9	62,1	51,7	49,4 ; 54,0	44,2	40,8 ; 47,5	59,2	56,0 ; 62,3
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	11,4	9,8 ; 13,0	16,0	13,2 ; 18,9	6,8	5,2 ; 8,5
Non	89,4	85,6	93,2	88,6	87,0 ; 90,2	84,0	81,1 ; 86,8	93,2	91,5 ; 94,8
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Oui	7,3	9,1	5,5	8,5	7,1 ; 10,0	10,8	8,5 ; 13,3	6,2	4,7 ; 7,8
Non	92,7	90,9	94,5	91,5	90,0 ; 92,9	89,2	86,7 ; 91,5	93,8	92,2 ; 95,3
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,032					
Oui	5,1	6,3	3,9	5,5	4,4 ; 6,7	6,9	4,9 ; 9,0	4,2*	2,9 ; 5,6
Non	94,9	93,7	96,1	94,5	93,3 ; 95,6	93,1	91,0 ; 95,1	95,8	94,4 ; 97,1
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	12,3	16,1	8,7	12,3	10,7 ; 14,0	16,4	13,7 ; 19,4	8,2	6,3 ; 10,0
Non	87,7	83,9	91,3	87,7	86,0 ; 89,3	83,6	80,6 ; 86,3	91,8	90,0 ; 93,7
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = 0,334					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,5**	0,2 ; 0,9	0,7**	0,1 ; 1,5	0,3**	0,0 ; 0,7
Non	99,5	99,4	99,6	99,5	99,1 ; 99,8	99,3	98,5 ; 99,9	99,7	99,3 ; 100,0
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,367					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,4**	0,1 ; 0,9	x	;	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,6	99,1 ; 99,9	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,290					
Oui	0,8	1,2	0,3*	1,2**	0,6 ; 1,9	1,7**	0,6 ; 2,9	0,8**	0,1 ; 1,6
Non	99,2	98,8	99,7	98,8	98,1 ; 99,4	98,3	97,1 ; 99,4	99,2	98,4 ; 99,9
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,631					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,8*	1,2 ; 2,5	2,0**	1,0 ; 3,1	1,7**	0,8 ; 2,6
Non	98,2	98,1	98,4	98,2	97,5 ; 98,8	98,0	96,9 ; 99,0	98,3	97,4 ; 99,2
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,006					
Oui	1,6	2,3	0,9	1,8*	1,2 ; 2,6	2,7*	1,5 ; 4,1	0,9**	0,3 ; 1,5
Non	98,4	97,7	99,1	98,2	97,4 ; 98,8	97,3	95,9 ; 98,5	99,1	98,5 ; 99,7
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,799					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	x	;	x	;	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,001				
Oui	12,2	16,2	8,3	12,5	10,9 ; 14,3	15,4	12,7 ; 18,2	9,6	7,6 ; 11,6	
Non	87,8	83,8	91,7	87,5	85,7 ; 89,1	84,6	81,8 ; 87,3	90,4	88,4 ; 92,4	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,015				
Oui	1,6	2,3	0,8	1,4**	0,7 ; 2,2	2,3**	1,1 ; 3,8	0,5**	0,0 ; 1	
Non	98,4	97,7	99,2	98,6	97,8 ; 99,3	97,7	96,2 ; 98,9	99,5	99,0 ; 100,0	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,443				
Oui	1,8	2,4	1,3	2,3*	1,5 ; 3,1	2,6**	1,4 ; 4,1	1,9**	0,9 ; 3,0	
Non	98,2	97,6	98,7	97,7	96,9 ; 98,5	97,4	95,9 ; 98,6	98,1	97,0 ; 99,1	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,077				
Oui	1,4	1,7	1,0	1,5*	0,9 ; 2,2	2,2**	1,1 ; 3,4	0,8**	0,2 ; 1,5	
Non	98,6	98,3	99,0	98,5	97,8 ; 99,1	97,8	96,6 ; 98,9	99,2	98,5 ; 99,8	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,221				
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,6**	0,2 ; 1,1	0,9**	0,2 ; 1,8	x	;	
Non	99,2	98,8	99,6	99,4	98,9 ; 99,8	99,1	98,2 ; 99,8	x	;	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 'n.d.'				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = .				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,287				
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	x	;	x	;	x	;	
Non	99,6	99,6	99,7	x	;	x	;	x	;	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = .				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	13,2	11,5 ; 15,1	16,3	13,5 ; 19,2	10,2	8,1 ; 12,3
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	29,6*	19,2 ; 40,8	28,4**	12,9 ; 45,8	30,7*	16,1 ; 46,4
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	39,6	30,7 ; 49,0	41,8*	29,0 ; 55,5	37,1*	24,2 ; 50,1
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	15,6	12,3 ; 19,2	19,8	13,9 ; 25,6	11,4*	7,7 ; 15,4
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	5,6*	3,9 ; 7,6	8,9*	5,7 ; 12,5	2,5**	1,0 ; 4,0
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	30,0	27,5 ; 32,4	8,7	7,3 ; 10,2	11,3	9,7 ; 13,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	32,3	28,7 ; 35,9	10,2	8,0 ; 12,5	15,2	12,5 ; 18,1
Femmes	25,4	6,8	7,4	27,6	24,4 ; 30,6	7,3	5,5 ; 9,1	7,4	5,7 ; 9,2
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	34,1*	22,5 ; 45,4	x	;	9,8**	3,3 ; 17,6
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	36,7	28,0 ; 45,8	10,3**	4,8 ; 16,2	26,8	18,7 ; 35,4
15-24 ans	33,4	8,4	15,9	35,7	28,6 ; 43,0	7,0*	3,5 ; 10,9	20,4	14,6 ; 26,4
25-44 ans	29,9	12,3	16,1	34,2	29,8 ; 38,6	13,8	10,7 ; 17,2	15,8	12,3 ; 19,3
45-64 ans	29,0	7,1	7,2	31,1	27,5 ; 34,5	8,1	6,0 ; 10,3	7,3	5,3 ; 9,3
65 ans et plus	7,1	0,5**	0,4**	9,0*	5,8 ; 12,6	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,028					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	42,8*	23,9 ; 61,8	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	27,3*	16,1 ; 40,0	9,5**	2,9 ; 17,9	33,0*	19,7 ; 45,8
15-24 ans	33,0	8,7	18,3	32,7*	23,3 ; 43,1	6,2**	1,9 ; 11,8	23,5*	14,4 ; 33,2
25-44 ans	29,0	13,5	21,1	32,7	26,0 ; 39,6	17,1*	12,0 ; 22,8	20,6	14,7 ; 26,6
45-64 ans	32,2	9,0	10,0	37,7	32,2 ; 43,1	9,2*	6,1 ; 12,4	11,6*	8,1 ; 15,6
65 ans et plus	10,0	0,8**	0,6**	14,7*	8,3 ; 21,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,030					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	26,2**	12,0 ; 41,5	x	;	13,1**	2,3 ; 26,2
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	47,7	34,0 ; 60,8	11,2**	2,6 ; 21,2	19,7*	10,3 ; 30,9
15-24 ans	33,8	8,1	13,5	38,9	28,6 ; 49,1	7,9**	2,5 ; 14,0	17,0*	9,9 ; 24,9
25-44 ans	30,8	11,0	11,0	35,7	30,1 ; 41,8	10,4*	7,0 ; 14,2	10,9*	7,3 ; 14,8
45-64 ans	25,9	5,3	4,5	24,5	19,8 ; 29,0	7,0*	4,3 ; 10,0	3,0*	1,4 ; 4,8
65 ans et plus	4,8	0,2**	0,3**	3,9**	1,4 ; 6,9	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	81,1	79,4 ; 82,7	83,7	81,2 ; 86,3	78,4	76,0 ; 80,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	47,3	36,0 ; 59,6	33,4*	16,8 ; 52,4	59,4	43,3 ; 75,0
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	81,7	73,5 ; 89,2	83,3	72,1 ; 93,8	79,7	67,1 ; 91,1
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	68,7	61,9 ; 75,7	66,1	55,9 ; 76,4	71,4	62,0 ; 80,9
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	95,3	93,2 ; 97,3	94,1	90,3 ; 97,5	96,6	94,4 ; 98,5
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	85,7	83,2 ; 87,9	91,2	88,1 ; 93,9	80,2	76,2 ; 83,9
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	67,2	63,0 ; 71,4	71,8	65,9 ; 78,0	61,9	55,6 ; 67,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	83,4	79,9 ; 86,6	87,8	83,1 ; 92,0	79,6	74,5 ; 84,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	88,9	85,6 ; 92,1	90,0	85,0 ; 94,6	87,8	83,1 ; 92,0
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	89,7	86,4 ; 92,9	90,5	85,5 ; 95,2	89,0	84,6 ; 93,1
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	89,5	87,7 ; 91,2	86,7	83,8 ; 89,3	92,4	90,5 ; 94,3
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	8,6	7,1 ; 10,2	10,2	7,8 ; 12,8	7,0	5,1 ; 8,8
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,9*	1,2 ; 2,8	3,1*	1,7 ; 4,8	0,6**	0,1 ; 1,2
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	47,7	46,5 ; 49,0	x	;	98,5	97,6 ; 99,3
Femmes	51,5	97,5	0,8	52,0	50,8 ; 53,2	99,7	99,3 ; 100,0	0,9**	0,3 ; 1,7
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	x	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	89,5	87,7 ; 91,2	8,6	7,1 ; 10,2	1,9*	1,2 ; 2,8
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,006					
Hommes	86,4	10,7	2,9	86,7	83,8 ; 89,3	10,2	7,8 ; 12,8	3,1*	1,7 ; 4,8
Femmes	91,6	7,4	0,9*	92,4	90,5 ; 94,3	7,0	5,1 ; 8,8	0,6**	0,1 ; 1,2
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	64,8	47,2 ; 79,9	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	59,9	49,5 ; 70,5	31,9*	22,4 ; 41,7	8,2**	2,9 ; 14,4
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	61,2	52,5 ; 69,6	32,8	24,7 ; 41,1	6,1**	2,1 ; 10,6
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	92,4	89,8 ; 94,9	6,0*	3,8 ; 8,4	1,6**	0,5 ; 2,9
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	95,3	93,5 ; 96,9	3,6*	2,1 ; 5,3	1,1**	0,3 ; 1,9
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	93,7	89,3 ; 97,5	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	x	;	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	86,7	83,8 ; 89,4	10,2	7,9 ; 12,8	3,0**	1,6 ; 4,7
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,282					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	93,0	91,1 ; 94,8	6,5	4,7 ; 8,3	0,5**	0,1 ; 1,0
Femmes	92,1	x	x	87,5	53,3 ; 100,0	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	48,0	44,3 ; 52,1	66,9	62,1 ; 71,5
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000	...	...	...
15-24 ans	87,9	...	91,1	83,4 ; 97,7	...	;
25-44 ans	62,4	...	57,3	50,3 ; 64,5	...	;
45-64 ans	29,9	...	34,8	29,2 ; 40,2	...	;
65 ans et plus	7,3	...	6,5**	0,8 ; 13,4	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...	...	P = 0,000	...
15-24 ans	...	90,0	...	;	90,5	82,8 ; 97,1
25-34 ans	...	71,0	...	;	74,3	65,7 ; 82,3
35-49 ans	...	53,5	...	;	53,2	46,2 ; 59,9
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,039	...	P = 0,012	...
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	38,8	30,9 ; 46,8	68,6	55,8 ; 80,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	47,8	40,6 ; 55,3	55,3	46,0 ; 64,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	55,3	47,0 ; 63,6	74,6	67,1 ; 82,1
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	50,7	41,2 ; 60,6	70,3	60,2 ; 80,0
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	...	P = 0,089	...
Un partenaire	43,8	64,2	43,4	39,5 ; 47,7	65,3	60,2 ; 70,4
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	77,0	65,2 ; 86,7	80,7	67,3 ; 92,7
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	82,6	60,1 ; 100,0	75,5*	25,6 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = .	...	P = 0,741	...
Hommes	x	66,6	x	;	66,8	62,1 ; 71,5
Femmes	47,8	x	48,0	44,3 ; 52,1	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	11,0	9,3 ; 12,8	12,7	10,7 ; 14,8	76,2	73,9 ; 78,4
Sexe	P = 0,093			P = 0,392					
Hommes	14,8	14,9	70,3	11,0	8,7 ; 13,7	14,0	11,1 ; 16,9	75,0	71,4 ; 78,3
Femmes	13,2	14,7	72,1	11,0	8,7 ; 13,4	11,4	8,8 ; 14,0	77,6	74,7 ; 80,5
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	51,3*	34,0 ; 69,8	38,0*	20,2 ; 54,8	10,7**	2,0 ; 22,4
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	38,3	28,2 ; 49,4	31,9*	21,7 ; 42,3	29,8*	20,8 ; 39,5
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	41,7	32,9 ; 51,0	33,5	24,6 ; 42,3	24,9*	17,7 ; 32,5
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	8,1	5,8 ; 10,7	16,4	12,9 ; 20,0	75,5	71,4 ; 79,4
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	5,1*	3,3 ; 7,1	4,0*	2,4 ; 5,9	90,9	88,3 ; 93,1
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	2,8**	0,1 ; 6,3	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,704					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	12,8*	8,9 ; 17,5	13,4*	9,0 ; 18,0	73,8	68,5 ; 79,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	10,7	7,6 ; 14,1	11,5*	7,8 ; 15,4	77,8	73,2 ; 82,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	11,8	8,2 ; 15,5	12,3*	8,8 ; 16,3	75,9	71,2 ; 80,3
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	8,2*	4,7 ; 12,1	14,9*	10,2 ; 19,7	76,9	71,2 ; 82,2
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	8,5	6,9 ; 10,1	8,8	7,1 ; 10,5	82,7	80,6 ; 84,8
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	29,1*	19,8 ; 39,1	46,4	35,0 ; 56,2	24,5*	16,2 ; 33,3
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	48,4*	27,0 ; 72,1	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	14,5	12,7 ; 16,5	14,5	11,8 ; 17,5	14,6	12,0 ; 17,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	68,4	51,4 ; 84,5	53,9**	19,3 ; 85,7	75,5	55,2 ; 93,9
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	42,8	32,7 ; 53,5	41,9*	27,4 ; 56,7	44,0*	29,2 ; 59,2
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	49,5	40,9 ; 58,6	44,0	31,0 ; 57,5	54,8	42,6 ; 67,3
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	12,8	9,8 ; 15,9	12,7*	8,2 ; 17,8	12,9*	8,8 ; 17,1
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	6,4*	4,4 ; 8,5	8,9*	5,7 ; 12,4	3,4**	1,4 ; 5,6
	3,1*	3,9*	1,8**	3,9**	0,9 ; 7,9	5,3**	0,5 ; 11,6	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,664		P = 0,903		P = 0,078	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	16,7	12,4 ; 21,5	13,3*	8,0 ; 19,2	21,1*	14,0 ; 29,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	14,6	11,0 ; 18,4	14,5*	9,5 ; 20,1	14,8*	9,8 ; 20,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	13,8	10,1 ; 17,8	14,3*	8,6 ; 20,3	13,3*	8,5 ; 18,6
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	13,0*	8,7 ; 17,5	16,8*	9,6 ; 25,3	9,5*	4,9 ; 14,9
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	11,4	9,5 ; 13,4	11,0	8,4 ; 13,8	11,9	9,4 ; 14,5
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	38,4	28,5 ; 49,0	32,7*	20,4 ; 46,5	47,7*	31,6 ; 63,5
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	52,2*	30,3 ; 75,4	53,1*	28,2 ; 80,3	x	;
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,553		P = 0,075		P = 0,239	
Hommes	18,7	54,0	17,9	14,6	12,0 ; 17,3	x	;	14,5	11,9 ; 17,2
Femmes	19,2	19,2	x	14,4	11,7 ; 17,3	14,4	11,7 ; 17,3	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	7,1	5,7 ; 8,5	6,9	5,0 ; 9,1	7,3	5,5 ; 9,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,005	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	5,5**	1,2 ; 10,9	x	;	12,7**	3,0 ; 24,3
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,007	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	4,0**	0,8 ; 8,0	x	;	8,1**	1,7 ; 15,8
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	12,5	9,5 ; 15,6	12,9*	8,2 ; 18,3	12,0*	8,5 ; 15,8
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	5,3*	3,7 ; 7,1	5,4*	2,9 ; 8,1	5,2*	3,1 ; 7,6
	2,7	3,2*	2,2	1,3**	0,2 ; 2,8	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,161		P = 0,344		P = 0,370	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	6,3*	3,6 ; 9,1	7,0**	2,9 ; 12,1	5,5**	2,6 ; 8,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	6,2*	4,0 ; 8,6	4,7**	1,8 ; 8,2	7,5*	4,5 ; 11,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	9,8*	7,0 ; 13,0	9,8*	5,7 ; 14,5	9,8*	6,0 ; 14,0
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	6,0*	3,4 ; 9,1	5,6**	1,7 ; 10,4	6,4**	2,7 ; 10,7
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,004		P = 0,540	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	7,3	5,7 ; 8,9	6,9*	4,7 ; 9,5	7,6	5,5 ; 9,8
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	7,8**	2,6 ; 14,3	5,4**	0,1 ; 12,3	11,6**	1,7 ; 23,8
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	30,1**	11,2 ; 51,3	33,8**	11,8 ; 58,1	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,539		P = 0,009		P = 0,230	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	8,0	6,0 ; 10,3	x	;	7,9	5,9 ; 10,2
Femmes	7,0	7,0	8,9**	7,4	5,3 ; 9,9	7,5	5,3 ; 10,0	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = .		P = .		P = .	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	x	;	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	7,2	5,8 ; 8,6	7,0	5,1 ; 9,2	7,4	5,6 ; 9,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	22,4*	14,8 ; 30,6	77,6	69,4 ; 85,2
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,269			
15-35 ans	25,6	74,4	23,3*	14,9 ; 32,6	76,7	67,4 ; 85,1
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,394			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	25,3**	6,4 ; 48,5	74,7	51,5 ; 93,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	33,1**	12,2 ; 54,8	66,9	45,2 ; 87,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	20,4**	8,3 ; 34,2	79,6	65,8 ; 91,7
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	x	;	x	;
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	22,4*	14,8 ; 30,6	77,6	69,4 ; 85,2
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	73,1	70,0 ; 76,1	15,6	13,2 ; 18,0	11,3	8,9 ; 13,6
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,007					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	53,2	39,8 ; 67,8	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	85,0	80,6 ; 89,2	8,0*	4,8 ; 11,3	7,1*	3,9 ; 10,6
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	68,3	63,9 ; 72,5	24,2	20,3 ; 28,2	7,5	5,2 ; 9,9
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,001					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	59,1	51,3 ; 67,3	25,7	19,1 ; 32,7	15,1*	9,0 ; 21,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	66,3	60,2 ; 72,6	16,9	12,5 ; 21,7	16,8*	11,7 ; 21,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	81,7	76,2 ; 86,6	11,5*	7,7 ; 16,0	6,8**	3,4 ; 10,8
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	88,9	83,5 ; 93,6	8,2**	4,0 ; 13,2	2,9**	0,3 ; 6,1
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,022					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	74,1	71,0 ; 77,1	15,9	13,5 ; 18,4	9,9	7,8 ; 12,1
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	57,5*	35,2 ; 79,1	8,2**	0,2 ; 18,3	34,3**	12,3 ; 55,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 15

# LAURENTIDES







# 1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes	Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
Ensemble de la population		49,4	50,6			49,9	49,8 ; 49,9	50,1	50,1 ; 50,2
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000				P = 0,000			
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	15,4	15,3 ; 15,4	16,2	16,1 ; 16,2	14,6	14,5 ; 14,6
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	33,0	33,0 ; 33,1	33,1	33,0 ; 33,1	33,0	33,0 ; 33,1
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	36,9	36,9 ; 36,9	36,8	36,8 ; 36,9	37,0	37,0 ; 37,0
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	14,7	14,6 ; 14,7	14,0	13,9 ; 14,0	15,4	15,3 ; 15,4
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,263			
Personne seule	13,4	10,7	16,0	10,0	9,0 ; 11,1	9,1	7,7 ; 10,8	10,9	9,5 ; 12,4
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	30,8	28,8 ; 32,8	32,8	29,9 ; 35,9	28,8	26,2 ; 31,5
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	45,1	42,5 ; 47,3	45,2	41,5 ; 48,8	45,0	41,8 ; 48,1
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	8,0	6,7 ; 9,4	7,3	5,4 ; 9,5	8,7	6,9 ; 10,9
Autre	6,7	6,5	6,9	6,1	4,7 ; 7,6	5,6*	3,6 ; 7,8	6,6	4,7 ; 8,7
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>		P = 0,256				P = 0,912			
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	95,4	94,3 ; 96,5	95,3	93,7 ; 96,8	95,5	93,9 ; 96,9
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,4**	0,1 ; 0,8	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	4,2	3,2 ; 5,3	x	;	x	;
<b>Langue parlée à la maison</b>		P = 0,912				P = 0,603			
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	96,2	95,2 ; 97,1	96,6	95,1 ; 97,9	95,8	94,2 ; 97,1
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	3,1	2,4 ; 4,0	2,5*	1,5 ; 3,8	x	;
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	0,7**	0,3 ; 1,3	0,9**	0,1 ; 1,9	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,683				P = 0,002			
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	29,0	26,8 ; 31,4	33,5	29,6 ; 37,0	24,6	21,8 ; 27,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	27,6	25,3 ; 30,1	26,2	22,6 ; 29,6	29,1	25,8 ; 32,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	26,6	24,4 ; 28,7	25,3	22,1 ; 28,6	28,0	25,1 ; 30,9
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	16,7	15,1 ; 18,4	15,1	12,8 ; 17,7	18,3	16,0 ; 20,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000				P = 0,018			
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	15,0	13,3 ; 17,0	12,5	9,8 ; 15,5	17,4	14,9 ; 20,0
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	18,8	16,8 ; 20,9	17,1	14,1 ; 20,3	20,5	17,8 ; 23,3
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	21,4	19,3 ; 23,6	22,7	19,4 ; 26,1	20,2	17,4 ; 23,0
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	22,9	20,6 ; 25,0	24,0	20,7 ; 27,4	21,7	18,7 ; 24,5
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	21,9	19,8 ; 24,0	23,7	20,6 ; 27,1	20,2	17,3 ; 22,9
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000				P = 0,663			
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	34,2	31,6 ; 36,6	34,3	30,5 ; 37,9	34,1	30,7 ; 37,4
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	56,3	53,8 ; 58,9	55,6	51,7 ; 59,5	57,0	53,4 ; 60,4
Pauvre	9,4	8,9	9,9	9,1	7,6 ; 10,7	9,8	7,5 ; 12,3	8,4	6,6 ; 10,4
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	0,4**	0,2 ; 0,7	0,3**	0,0 ; 0,6	0,5**	0,1 ; 1,1
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	62,0	60,0 ; 64,0	65,4	62,2 ; 68,4	58,7	55,9 ; 61,5
Étudiants	13,1	13,0	13,2	12,0	10,6 ; 13,3	12,2	9,8 ; 14,4	11,8	10,1 ; 13,3
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	5,9	4,7 ; 7,0	2,3*	1,3 ; 3,5	9,4	7,4 ; 11,5
Retraités	19,6	18,0	21,1	20,1	18,9 ; 21,4	20,1	18,2 ; 22,0	20,2	18,6 ; 21,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	58,9	56,3 ; 61,4	31,0	28,7 ; 33,5	10,1	8,6 ; 11,6
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,040					
Hommes	56,6	33,5	9,9	57,1	53,3 ; 60,8	33,9	30,1 ; 37,7	9,0	7,0 ; 11,1
Femmes	55,5	32,8	11,7	60,6	57,2 ; 64,0	28,2	25,2 ; 31,2	11,2	9,1 ; 13,5
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	62,6	54,3 ; 71,1	30,8	22,9 ; 39,4	6,6**	2,1 ; 11,6
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	67,0	63,0 ; 71,2	28,7	24,6 ; 32,7	4,3*	2,5 ; 6,1
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	57,9	54,0 ; 62,0	30,6	26,8 ; 34,4	11,5	8,9 ; 14,2
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	36,8	31,0 ; 42,7	38,3	32,4 ; 44,5	24,9	19,8 ; 29,9
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	45,4	40,4 ; 50,7	35,0	30,0 ; 40,0	19,6	15,5 ; 24,0
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	57,8	53,7 ; 62,2	30,7	26,6 ; 34,6	11,5	8,9 ; 14,2
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	63,5	59,4 ; 67,8	30,6	26,8 ; 34,6	5,9*	3,7 ; 8,0
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	62,4	52,4 ; 71,6	26,9*	18,5 ; 35,8	10,8**	5,2 ; 17,5
Autre	46,0	39,4	14,6	49,3	35,3 ; 62,2	34,0*	21,7 ; 46,8	16,7**	7,8 ; 26,8
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	44,0	38,6 ; 48,8	39,2	34,4 ; 44,3	16,8	13,3 ; 20,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	57,3	52,1 ; 62,8	32,0	27,1 ; 37,0	10,7	7,7 ; 13,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	69,1	64,9 ; 73,6	25,2	20,9 ; 29,3	5,7*	3,6 ; 8,0
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	69,4	64,2 ; 74,7	25,6	20,8 ; 30,7	4,9**	2,4 ; 7,8
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	40,6	33,8 ; 47,3	37,3	30,4 ; 44,2	22,2	17,1 ; 27,8
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	61,8	59,1 ; 64,5	30,3	27,7 ; 33,1	7,9	6,4 ; 9,5
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	38,3	30,0 ; 46,4	31,2	23,3 ; 39,7	30,5	23,0 ; 37,9
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	61,1	58,4 ; 63,7	31,0	28,5 ; 33,7	7,9	6,5 ; 9,4
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	66,6	63,6 ; 69,7	27,4	24,5 ; 30,3	6,0	4,5 ; 7,5
Étudiants	62,7	32,2	5,0	58,6	48,8 ; 68,4	34,1	24,9 ; 43,4	7,3**	1,8 ; 13,5
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	34,5	24,6 ; 44,7	37,2	27,3 ; 47,0	28,2*	18,8 ; 38,2
Retraités	40,2	39,5	20,4	40,5	35,7 ; 45,3	39,3	34,3 ; 44,3	20,1	16,3 ; 24,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	58,9	56,3 ; 61,4	31,0	28,7 ; 33,5	10,1	8,6 ; 11,6
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	49,0	44,0 ; 54,5	35,7	30,8 ; 40,5	15,3	11,4 ; 19,1
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	62,5	59,6 ; 65,3	29,3	26,5 ; 32,1	8,2	6,8 ; 9,6
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	32,4**	15,2 ; 50,9	48,1*	28,3 ; 66,7	19,5**	5,6 ; 35,5
Poids normal	62,6	29,4	8,0	67,0	63,2 ; 70,8	24,2	20,8 ; 27,7	8,8	6,5 ; 11,1
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	53,1	49,6 ; 56,5	35,9	32,4 ; 39,4	11,0	8,9 ; 13,2
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	66,4	62,9 ; 70,1	26,6	23,2 ; 30,2	6,9	5,1 ; 8,9
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	53,9	50,2 ; 57,5	35,5	31,9 ; 39,3	10,6	8,3 ; 12,9
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	39,3	28,6 ; 49,9	30,8*	21,8 ; 41,5	29,9*	20,7 ; 39,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	42,2	36,8 ; 47,4	34,9	29,9 ; 40,2	22,9	18,0 ; 27,7
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	64,0	61,1 ; 66,9	29,9	27,2 ; 32,7	6,1	4,8 ; 7,3

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	48,7	46,1 ; 51,3	45,3	42,8 ; 47,8	6,0	4,8 ; 7,2
<b>Sexe</b>		P = 0,097					P = 0,367		
Hommes	47,5	46,6	6,0	50,2	46,4 ; 53,8	43,5	39,8 ; 47,4	6,3	4,6 ; 8,2
Femmes	47,1	45,9	7,0	47,2	43,7 ; 50,7	47,1	43,7 ; 50,5	5,7	4,1 ; 7,3
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000					P = 0,352		
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	57,0	48,6 ; 65,7	x	;	x	;
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	44,1	39,7 ; 48,4	48,3	43,9 ; 52,4	7,7	5,4 ; 10,1
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	48,7	44,5 ; 52,8	45,4	41,5 ; 49,6	5,9*	4,0 ; 7,8
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	50,5	44,3 ; 56,7	43,4	37,1 ; 49,7	6,1*	3,5 ; 8,9
<b>Composition du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Personne seule	38,2	49,2	12,5	37,7	32,4 ; 43,0	47,7	42,4 ; 53,0	14,6	10,5 ; 18,5
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	54,0	49,5 ; 58,2	42,0	37,7 ; 46,5	4,0*	2,5 ; 5,8
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	49,2	44,9 ; 53,4	46,6	42,4 ; 51,1	4,2*	2,6 ; 6,1
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	43,3	33,8 ; 52,9	50,6	40,7 ; 60,4	6,2**	2,3 ; 10,8
Autre	44,5	46,1	9,4*	43,1*	29,3 ; 56,5	42,8*	29,9 ; 56,2	14,1**	5,8 ; 23,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000					P = 0,019		
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	51,8	46,2 ; 56,8	42,7	37,9 ; 47,9	5,5*	3,5 ; 7,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	51,0	45,6 ; 56,2	43,6	38,5 ; 48,7	5,5*	3,3 ; 7,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	47,1	42,2 ; 52,0	44,7	39,8 ; 49,5	8,2*	5,6 ; 11,2
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	42,1	36,3 ; 48,0	54,5	48,6 ; 60,3	3,4**	1,5 ; 5,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000					P = 0,017		
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	43,8	36,9 ; 51,1	46,1	39,2 ; 53,2	10,1*	6,4 ; 14,1
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	50,0	47,1 ; 52,8	44,8	42,1 ; 47,7	5,2	4,0 ; 6,5
<b>Perception de sa situation financière</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	33,1	24,3 ; 42,0	50,4	41,6 ; 59,5	16,5*	10,8 ; 22,4
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	50,2	47,5 ; 53,0	45,0	42,4 ; 47,8	4,7	3,6 ; 5,9
<b>Occupation principale</b>		P = 0,000					P = 0,027		
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	47,1	43,9 ; 50,2	47,2	44,1 ; 50,4	5,8	4,3 ; 7,3
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	58,4	48,5 ; 68,2	38,7	29,3 ; 48,7	2,9**	0,0 ; 6,7
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	42,9	31,6 ; 53,0	40,4	30,7 ; 51,6	16,8*	8,5 ; 25,6
Retraités	51,9	42,8	5,3	50,1	44,9 ; 55,1	45,0	39,9 ; 50,2	4,9*	2,9 ; 7,1
<b>Perception de l'état de santé</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	54,7	51,4 ; 58,0	41,3	38,0 ; 44,5	4,0*	2,7 ; 5,4
Bon	40,5	52,6	6,9	42,0	37,0 ; 46,9	52,0	47,4 ; 56,8	5,9*	3,9 ; 8,2
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	34,0	26,6 ; 42,0	48,1	39,8 ; 55,7	17,9*	12,3 ; 24,3
<b>Niveau de détresse psychologique</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Élevé	27,7	55,6	16,8	28,0	23,3 ; 33,2	55,1	49,7 ; 60,7	16,9	13,1 ; 20,7
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	54,8	51,7 ; 57,8	42,7	39,8 ; 45,6	2,5*	1,6 ; 3,5
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	21,3	49,3	29,4	17,9**	6,2 ; 31,1	47,0*	30,9 ; 62,9	35,1*	20,8 ; 50,0
Non	48,1	46,1	5,8	49,6	46,9 ; 52,1	45,4	42,8 ; 48,0	5,1	4,0 ; 6,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	23,3	21,2 ; 25,6	76,7	74,4 ; 78,8
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,007			
Hommes	18,2	81,8	20,0	16,9 ; 23,2	80,0	76,8 ; 83,1
Femmes	26,0	74,0	26,6	23,6 ; 29,7	73,4	70,3 ; 76,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,149			
15-24 ans	24,4	75,6	22,5*	15,4 ; 29,7	77,5	70,3 ; 84,6
25-44 ans	24,3	75,7	27,0	23,2 ; 31,1	73,0	68,9 ; 76,8
45-64 ans	20,6	79,4	21,6	18,5 ; 25,1	78,4	74,9 ; 81,5
65 ans et plus	18,8	81,2	19,8	15,2 ; 24,7	80,2	75,3 ; 84,8
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,067			
Personne seule	25,7	74,3	26,4	21,8 ; 31,4	73,6	68,6 ; 78,2
Couple sans enfant	17,7	82,3	21,2	17,7 ; 25,1	78,8	74,9 ; 82,3
Couple avec enfants	20,8	79,2	21,9	18,4 ; 25,5	78,1	74,5 ; 81,6
Famille monoparentale	32,2	67,8	29,1	20,7 ; 38,1	70,9	61,9 ; 79,3
Autre	29,7	70,3	33,1*	21,1 ; 46,1	66,9	53,9 ; 78,9
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,204			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	26,1	21,8 ; 30,7	73,9	69,3 ; 78,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	22,8	18,5 ; 27,4	77,2	72,6 ; 81,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	24,2	20,0 ; 28,6	75,8	71,4 ; 80,0
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	18,8	14,4 ; 23,5	81,2	76,5 ; 85,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	35,2	28,4 ; 42,3	64,8	57,7 ; 71,6
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	21,3	19,0 ; 23,7	78,7	76,3 ; 81,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	42,6	34,4 ; 51,3	57,4	48,7 ; 65,6
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	21,3	19,1 ; 23,6	78,7	76,4 ; 80,9
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,013			
Travailleurs	20,9	79,1	23,1	20,4 ; 25,8	76,9	74,2 ; 79,6
Étudiants	24,8	75,2	23,3*	15,4 ; 31,8	76,7	68,2 ; 84,6
Personnes sans emploi	37,9	62,1	39,0	28,6 ; 49,8	61,0	50,2 ; 71,4
Retraités	18,2	81,8	19,2	15,5 ; 23,5	80,8	76,5 ; 84,5
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	16,7	14,3 ; 19,3	83,3	80,7 ; 85,7
Bon	26,6	73,4	26,2	22,3 ; 30,5	73,8	69,5 ; 77,7
Passable ou mauvais	48,8	51,2	53,4	45,4 ; 61,2	46,6	38,8 ; 54,6
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	13,3	10,9 ; 16,0	86,7	84,0 ; 89,1
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	28,0	24,7 ; 31,6	72,0	68,4 ; 75,3
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	66,7	56,6 ; 76,9	33,3*	23,1 ; 43,4
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	64,7	48,9 ; 80,9	35,3*	19,1 ; 51,1
Non	20,6	79,4	21,8	19,7 ; 24,1	78,2	75,9 ; 80,3
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,003			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	23,0	20,9 ; 25,2	77,0	74,8 ; 79,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,8*	2,0 ; 3,8	3,3*	2,0 ; 4,9	2,4*	1,3 ; 3,5
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,498		P = 0,440		P = 0,701	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	3,7**	0,8 ; 7,4	x	;	x	;
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	3,4*	1,9 ; 5,1	4,0**	1,5 ; 7,0	2,8**	1,1 ; 4,8
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	2,5*	1,4 ; 3,8	2,3**	1,0 ; 4,0	2,6**	0,9 ; 4,7
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,5**	0,3 ; 3,0	2,0**	0,1 ; 4,4	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,001		P = 0,144	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	6,6*	3,9 ; 9,5	11,4*	6,3 ; 17,1	2,5**	0,2 ; 5,2
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	1,2**	0,3 ; 2,3	x	;	x	;
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	2,0**	0,8 ; 3,4	1,7**	0,1 ; 3,8	2,2**	0,5 ; 4,2
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	5,6**	1,7 ; 10,3	x	;	6,7**	1,5 ; 13,0
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	8,4**	1,1 ; 17,3	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,468		P = 0,483		P = 0,556	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	3,5**	1,8 ; 5,4	3,7**	1,3 ; 6,7	3,1**	0,7 ; 5,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	3,5**	1,5 ; 5,7	4,8**	1,5 ; 9,0	2,2**	0,3 ; 4,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	2,3**	1,1 ; 3,8	1,6**	0,3 ; 3,4	3,0**	1,0 ; 5,4
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	1,6**	0,3 ; 3,4	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,012		P = 0,003		P = 0,775	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	5,2**	2,6 ; 8,3	8,7**	3,4 ; 15,5	2,7**	0,4 ; 5,4
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	2,2*	1,4 ; 3,2	2,2**	1,0 ; 3,7	2,3**	1,1 ; 3,5
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,026		P = 0,013	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	7,9**	3,6 ; 12,9	7,8**	2,6 ; 14,7	8,1**	0,8 ; 16,2
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	2,3*	1,5 ; 3,3	2,8*	1,5 ; 4,5	1,8**	0,9 ; 2,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,173		P = 0,194		P = 0,269	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,6*	1,7 ; 3,7	3,1*	1,7 ; 4,7	2,1**	0,9 ; 3,5
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	x	;	x	;	x	;
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	7,2**	2,6 ; 12,6	x	;	6,0**	0,9 ; 12,3
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	2,0**	0,8 ; 3,5	2,5**	0,7 ; 4,7	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,046		P = 0,001	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,9**	1,0 ; 3,0	2,4**	0,8 ; 4,4	1,4**	0,4 ; 2,6
Bon	2,5	2,7	2,4	2,4**	1,2 ; 4,0	3,2**	1,2 ; 5,9	1,5**	0,1 ; 3,2
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	9,5**	5,1 ; 14,5	9,1**	3,1 ; 16,1	9,8**	3,6 ; 16,8
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	1,0**	0,3 ; 1,9	1,1**	0,2 ; 2,3	x	;
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,9*	1,6 ; 4,4	3,8**	1,4 ; 6,7	2,1**	0,8 ; 3,6
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	16,7*	9,5 ; 24,9	18,1**	7,8 ; 29,9	15,2**	4,9 ; 27,2
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,001	
Élevé	7,7	9,0	6,8	8,0*	5,3 ; 10,8	10,3*	5,8 ; 15,3	6,3**	3,1 ; 9,8
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	1,3**	0,6 ; 2,2	1,7**	0,5 ; 3,1	0,9**	0,2 ; 1,9

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,6**	0,2 ; 1,1	x	;	0,9**	0,2 ; 1,8
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,846		P = 0,052		P = 0,394	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	0,8**	0,1 ; 1,8	x	;	1,5**	0,1 ; 3,5
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,133		P = 0,074		P = 0,074	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	x	;	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,294		P = 0,115		P = 0,842	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	1,3**	0,2 ; 2,6	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,498		P = 0,369		P = 0,721	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,6**	0,1 ; 1,1	x	;	0,8**	0,1 ; 1,8
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,152		P = 0,558		P = 0,136	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,5**	0,1 ; 1,0	x	;	0,7**	0,0 ; 1,6
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,115		P = 0,719		P = 0,125	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	x	;	x	;	x	;
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,875		P = 0,732		P = 0,609	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	0,7**	0,1 ; 1,4	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	x	;	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,003		P = 0,007		P = 0,018	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	2,0**	0,4 ; 4,1	x	;	2,5**	0,2 ; 5,7
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région	Hommes		Femmes		
		%	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,641			
Oui	10,2	10,0	10,3	10,7	9,2 ; 12,3	10,3	8,2 ; 12,7	11,1	9,0 ; 13,4
Non	89,8	90,0	89,7	89,3	87,7 ; 90,8	89,7	87,3 ; 91,8	88,9	86,6 ; 91,0
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,199			
Oui	4,4	3,5	5,3	5,5	4,3 ; 6,8	4,6*	3,0 ; 6,5	6,3	4,7 ; 8,3
Non	95,6	96,5	94,7	94,5	93,2 ; 95,7	95,4	93,5 ; 97,0	93,7	91,7 ; 95,3

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	11,8	10,0 ; 13,6	14,8	11,9 ; 17,8	8,8	6,8 ; 10,8
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,097	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	24,5*	16,9 ; 32,8	34,2*	21,6 ; 47,6	13,9**	5,6 ; 22,9
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	11,0	8,3 ; 14,0	15,0*	10,5 ; 20,1	7,0*	4,2 ; 10,2
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	10,3	8,0 ; 12,7	10,2*	6,7 ; 13,8	10,5	7,4 ; 13,9
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	4,1**	1,8 ; 6,6	4,0**	0,9 ; 7,7	4,1**	0,8 ; 8,0
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,017		P = 0,023		P = 0,182	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	9,9*	6,9 ; 13,3	9,1**	4,3 ; 14,4	10,6*	6,7 ; 15,1
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	8,8*	6,2 ; 11,4	9,5*	5,5 ; 13,7	7,9*	4,8 ; 11,4
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	11,7	8,8 ; 14,7	15,9*	11,1 ; 21,0	7,6*	4,5 ; 10,9
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	21,3*	12,7 ; 30,6	34,4*	18,1 ; 50,9	10,6**	4,0 ; 18,3
Autre	14,9	16,7	13,2*	18,8**	8,1 ; 30,5	x	;	18,7**	5,7 ; 33,3
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,145		P = 0,520		P = 0,103	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	13,8	10,1 ; 17,8	16,2*	10,8 ; 22,3	10,6*	6,0 ; 15,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	11,3*	8,0 ; 14,8	16,5*	10,6 ; 22,9	6,6**	3,4 ; 10,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	12,7	9,2 ; 16,5	13,6*	7,9 ; 19,8	11,8*	7,4 ; 16,3
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	7,6*	4,8 ; 10,8	10,0**	4,6 ; 16,0	5,7**	2,9 ; 9,2
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,726		P = 0,344		P = 0,068	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	10,5*	6,0 ; 15,4	18,1**	8,4 ; 28,4	5,2**	2,1 ; 8,9
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	11,4	9,5 ; 13,4	13,2	10,0 ; 16,3	9,6	7,3 ; 12,1
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,230	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	12,6	10,4 ; 15,0	15,8	12,2 ; 19,6	9,0	6,6 ; 11,7
Étudiants	17,1	21,4	12,9	21,0*	12,8 ; 29,5	28,4*	15,3 ; 42,6	13,4**	4,1 ; 23,3
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	11,2**	5,2 ; 18,0	x	;	10,0**	3,7 ; 16,8
Retraités	7,5	7,0	7,9	3,7*	1,9 ; 5,7	2,6**	0,5 ; 5,0	4,8**	1,9 ; 8,1

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	72,0	64,0 ; 79,6	69,8	58,5 ; 80,3	75,8	64,2 ; 87,1
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	28,0	20,4 ; 36,0	30,2*	19,7 ; 41,5	24,2*	12,9 ; 35,8
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	28,0	20,1 ; 35,8	37,6	26,1 ; 49,0	12,4**	5,1 ; 20,2
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	12,9*	8,0 ; 18,5	13,1**	6,5 ; 20,9	12,7**	5,1 ; 21,5
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	19,6*	13,0 ; 26,5	21,3*	12,0 ; 31,3	17,0**	7,8 ; 27,1
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	7,9**	3,7 ; 12,5	5,4**	0,6 ; 11,0	11,9**	4,4 ; 20,4
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	16,8*	11,4 ; 23,0	11,2**	5,1 ; 17,9	26,1*	15,3 ; 38,0
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	3,8**	1,0 ; 7,0	x	;	5,9**	1,2 ; 11,6
Autre	12,1	8,1	17,6	10,9*	6,1 ; 15,9	x	;	14,0**	6,3 ; 22,5
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	27,8	20,7 ; 35,4	23,4*	14,3 ; 33,4	34,9*	23,5 ; 46,8
Printemps	21,2	20,7	21,9	19,9*	12,9 ; 27,6	23,5*	13,7 ; 34,4	14,0**	6,5 ; 22,8
Été	29,1	30,3	27,4	27,6	19,5 ; 35,5	29,3*	18,1 ; 40,2	24,6*	14,1 ; 36,4
Automne	23,7	24,0	23,3	24,8*	17,2 ; 32,0	23,8*	13,9 ; 34,1	26,5*	15,1 ; 37,6
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	41,1	33,1 ; 49,6	30,0*	19,6 ; 41,6	58,2	46,5 ; 70,3
Endroit public	28,1	24,8	32,5	25,1	18,0 ; 32,7	25,8*	16,0 ; 37,2	24,0*	14,0 ; 34,3
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	27,0	19,0 ; 35,1	36,3*	24,4 ; 49,0	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	6,8**	2,5 ; 12,2	8,0**	1,9 ; 16,0	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	10,5**	5,2 ; 16,3	11,8**	4,6 ; 20,4	8,3**	1,5 ; 15,5
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	x	;	x	;	x	;
Heurté/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	7,4**	3,9 ; 11,7	6,8**	2,2 ; 12,5	8,4**	2,8 ; 15,1
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	10,7*	5,5 ; 16,4	13,6**	5,7 ; 22,4	5,9**	0,9 ; 12,4
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	4,8**	0,9 ; 9,7	x	;	x	;
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	21,7	15,6 ; 28,1	19,6*	12,2 ; 28,0	25,2*	14,1 ; 36,7
Chute	34,6	30,5	40,3	35,1	27,7 ; 43,2	30,9*	20,4 ; 41,6	42,1	30,0 ; 54,6
Autres	13,7	12,5	15,3	8,3**	4,1 ; 13,6	10,5**	3,9 ; 18,6	4,7**	0,9 ; 9,3
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	3,3**	0,6 ; 6,5	x	;	5,7**	0,3 ; 12,4
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	24,5*	17,0 ; 32,1	29,9*	18,9 ; 41,0	15,6**	7,6 ; 24,5
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	36,2	28,2 ; 44,6	36,1	25,0 ; 47,6	36,3*	25,2 ; 48,6
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	3,1**	0,9 ; 5,8	x	;	5,3**	1,0 ; 10,8
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	18,0*	12,2 ; 24,3	14,6*	7,9 ; 22,0	23,8*	12,8 ; 35,6
Autre	11,9	10,9	13,2	14,9*	9,1 ; 21,3	15,8**	7,8 ; 24,6	13,3**	5,6 ; 22,8

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	2,7**	0,8 ; 5,1	x	;	2,9**	0,1 ; 6,5
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,026		P = 0,674		P = 0,014	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	2,4**	0,5 ; 4,7	x	;	x	;
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	x	;	x	;	x	;
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,585		P = .		P = 0,885	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	x	;	x	;	x	;
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	2,8**	0,2 ; 5,8	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = .		P = .		P = .	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	x	;	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	2,5**	0,7 ; 4,6	x	;	x	;
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,040		P = 0,155		P = 0,004	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	5,6**	0,6 ; 11,3	x	;	x	;
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	x	;	x	;	x	;
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,651		P = 0,958		P = 0,563	
Oui	5,9	3,6*	7,3	x	;	x	;	x	;
Non	2,7*	2,2**	3,1*	3,1**	0,5 ; 6,4	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,364		P = 0,547		P = 0,272	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	x	;	x	;	x	;
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	2,0**	0,3 ; 4,1	x	;	x	;
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = .		P = 'n.d.'		P = 'n.d.'	
Résidence	62,7	52,8	68,6	68,8*	25,3 ; 99,8	x	;	x	;
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	x	;	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	x	;	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	x	;	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	x	;	x	;	x	;
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	x	;	x	;	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	10,1	8,6 ; 11,6	9,8	7,6 ; 12,1	10,3	8,4 ; 12,4
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,213		P = 0,038	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	7,5**	3,0 ; 12,4	x	;	8,7**	2,0 ; 16,3
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	10,1	7,9 ; 12,6	10,6*	7,1 ; 14,3	9,7*	6,5 ; 13,4
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	13,6	10,9 ; 16,4	12,5*	8,5 ; 16,7	14,7	11,0 ; 18,5
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	3,9**	1,8 ; 6,3	5,1**	1,5 ; 9,2	2,8**	0,6 ; 5,8
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,070		P = 0,164		P = 0,352	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	9,7	6,9 ; 12,9	12,0*	7,0 ; 17,7	7,8*	4,4 ; 11,6
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	10,0	7,6 ; 12,7	10,4*	6,8 ; 14,2	9,6*	6,4 ; 13,3
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	11,8	9,1 ; 14,5	11,2*	7,3 ; 15,2	12,3*	8,6 ; 16,3
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	4,4**	1,2 ; 8,5	x	;	6,8**	1,3 ; 13,4
Autre	11,4	12,8*	10,2*	6,3**	2,0 ; 11,8	x	;	6,8**	0,6 ; 14,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,117		P = 0,038		P = 0,142	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	7,5*	5,1 ; 10,3	7,3*	3,9 ; 11,0	7,8*	4,5 ; 11,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	10,3	7,4 ; 13,5	7,0*	3,9 ; 10,7	13,3*	8,5 ; 18,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	12,5	9,4 ; 15,8	13,8*	8,7 ; 19,4	11,3*	7,6 ; 15,4
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	10,4*	6,9 ; 14,2	13,9*	7,6 ; 20,7	7,5**	3,6 ; 12,0
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,063		P = 0,341		P = 0,150	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	6,6*	3,5 ; 10,2	6,7**	1,5 ; 13,3	6,6**	2,9 ; 11,0
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	10,7	9,0 ; 12,4	10,5	8,1 ; 12,9	10,9	8,6 ; 13,3
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,323		P = 0,388		P = 0,627	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	12,8*	7,7 ; 18,7	13,2**	5,6 ; 22,0	12,3**	5,3 ; 20,8
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	10,1	8,6 ; 11,7	9,8	7,5 ; 12,2	10,3	8,2 ; 12,6
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,014		P = 0,166		P = 0,144	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	11,8	9,8 ; 13,9	11,7	9,0 ; 14,7	11,9	9,1 ; 14,8
Étudiants	9,9	9,7	10,1	7,8**	2,6 ; 14,0	x	;	8,8**	0,8 ; 17,9
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	14,3*	7,8 ; 21,8	15,2**	2,4 ; 33,0	14,0**	6,3 ; 22,6
Retraités	6,9	6,7	7,0	4,8*	3,0 ; 7,0	4,9**	2,0 ; 8,3	4,7**	2,3 ; 7,6

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,451				
Oui	45,2	47,6	42,8	49,7	41,4 ; 57,5	46,6	34,6 ; 59,5	52,9	41,1 ; 64,1	
Non	54,8	52,4	57,2	50,3	42,5 ; 58,6	53,4	40,5 ; 65,4	47,1	35,9 ; 58,9	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,132				
Oui	25,4	27,6	23,1	18,2*	11,6 ; 25,4	23,8*	12,6 ; 35,4	12,7**	5,0 ; 21,6	
Non	74,6	72,4	76,9	81,8	74,6 ; 88,4	76,2	64,6 ; 87,4	87,3	78,4 ; 95,0	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,345				
Oui	17,6	15,6	19,6	18,0	12,7 ; 24,0	15,2*	8,0 ; 23,9	20,8*	12,7 ; 29,4	
Non	82,4	84,4	80,4	82,0	76,0 ; 87,3	84,8	76,1 ; 92,0	79,2	70,6 ; 87,3	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,112				
Oui	8,1	7,2	9,0	10,9*	5,7 ; 16,4	15,2**	6,6 ; 25,3	6,7**	1,6 ; 12,8	
Non	91,9	92,8	91,0	89,1	83,6 ; 94,3	84,8	74,7 ; 93,4	93,3	87,2 ; 98,4	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 'n.d.'				
Cou	3,1	1,8*	4,3	x	;	x	;	x	;	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	61,4	53,7 ; 69,1	50,6	39,1 ; 62,0	71,4	60,7 ; 81,7	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	13,9*	8,1 ; 20,3	20,2**	10,2 ; 31,0	7,9**	2,1 ; 15,3	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	x	;	x	;	x	;	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	17,9*	11,9 ; 24,3	22,7*	13,7 ; 32,5	13,4**	5,7 ; 22,6	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	2,3**	0,3 ; 4,9	x	;	x	;	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	31,0	28,7 ; 33,5	24,7	21,6 ; 28,1	37,3	34,0 ; 40,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,368		P = 0,011	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	23,3*	16,4 ; 31,1	18,5**	9,2 ; 29,1	28,5*	18,4 ; 39,7
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	28,2	24,5 ; 32,0	24,1	18,8 ; 29,7	32,4	26,9 ; 37,8
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	34,7	31,2 ; 38,5	27,4	22,4 ; 33,1	41,7	36,5 ; 47,0
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	36,4	30,7 ; 42,0	26,4	18,8 ; 33,8	45,4	37,7 ; 53,6
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,130		P = 0,648		P = 0,243	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	39,7	34,2 ; 44,9	33,5	25,3 ; 41,4	44,6	37,8 ; 51,2
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	31,0	27,1 ; 35,0	23,9	18,5 ; 29,6	39,0	33,5 ; 45,0
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	28,6	24,9 ; 32,6	23,8	18,7 ; 29,2	33,3	28,0 ; 39,0
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	31,7	23,6 ; 41,0	23,8**	11,6 ; 37,9	38,1	27,3 ; 49,6
Autre	34,0	32,4	35,4	28,4*	17,5 ; 40,6	24,8**	8,2 ; 45,3	31,4*	17,7 ; 47,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,568		P = 0,861		P = 0,497	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	30,9	26,5 ; 35,5	24,3	18,5 ; 30,5	39,7	33,0 ; 46,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	32,4	27,9 ; 37,3	25,4	18,8 ; 31,9	38,7	32,2 ; 45,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	32,1	27,8 ; 36,7	26,3	19,9 ; 33,3	37,4	31,0 ; 43,7
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	27,6	22,2 ; 32,9	21,9*	14,5 ; 30,0	32,2	24,8 ; 39,5
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,533		P = 0,330		P = 0,650	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	32,9	26,8 ; 39,3	29,4*	19,6 ; 39,7	35,4	27,8 ; 43,4
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	30,8	28,4 ; 33,4	24,4	21,1 ; 28,1	37,4	33,7 ; 41,3
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,094		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	44,7	35,9 ; 53,1	32,6*	22,0 ; 44,5	58,0	46,2 ; 68,8
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	29,4	27,1 ; 31,8	23,5	20,3 ; 27,0	35,1	31,6 ; 38,6
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,005		P = 0,127		P = 0,125	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	30,9	27,9 ; 33,8	26,1	22,1 ; 30,3	36,1	31,7 ; 40,4
Étudiants	20,7	14,8	26,3	21,2*	13,5 ; 29,5	14,5**	4,4 ; 25,5	28,1*	16,7 ; 40,7
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	43,9	33,1 ; 54,4	41,4**	17,1 ; 67,3	44,5	32,0 ; 56,3
Retraités	34,2	30,5	37,2	33,9	29,4 ; 38,5	25,4	19,2 ; 32,0	42,3	36,2 ; 49,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	24,4	21,7 ; 27,4	20,0	16,2 ; 24,2	28,6	24,7 ; 32,7
Bon	33,9	28,1	39,6	33,9	29,5 ; 38,4	27,0	21,1 ; 33,1	42,0	35,6 ; 48,1
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	61,8	54,0 ; 69,5	47,1	34,6 ; 59,4	73,0	63,7 ; 82,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	50,0	44,7 ; 55,4	38,8	30,6 ; 47,5	58,2	51,2 ; 64,8
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	25,0	22,5 ; 27,3	20,9	17,8 ; 24,3	29,3	25,8 ; 32,9
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,239		P = 0,569		P = 0,066	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	23,6**	9,6 ; 40,6	x	;	27,3**	9,9 ; 47,7
Poids normal	28,3	22,9	32,1	29,1	25,5 ; 32,6	22,2	16,9 ; 27,5	33,9	29,1 ; 38,8
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	31,5	27,8 ; 35,6	26,1	21,2 ; 31,2	40,2	34,3 ; 46,7
Obésité	37,9	30,5	46,1	35,5	29,5 ; 42,2	26,7	19,4 ; 34,9	45,2	36,2 ; 54,8

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	30,3	25,3	35,2	31,0	28,7 ; 33,5	24,7	21,6 ; 28,1	37,3	34,0 ; 40,7
Non	69,7	74,7	64,8	69,0	66,5 ; 71,3	75,3	71,9 ; 78,4	62,7	59,3 ; 66,0
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	9,5	6,4	12,5	10,5	8,9 ; 12,1	6,3	4,6 ; 8,2	14,6	12,2 ; 17,2
Non	90,5	93,6	87,5	89,5	87,9 ; 91,1	93,7	91,8 ; 95,4	85,4	82,8 ; 87,8
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000					P = 0,070		
Oui	14,5	12,2	16,7	14,1	12,3 ; 15,9	12,3	10,0 ; 15,0	15,8	13,2 ; 18,6
Non	85,5	87,8	83,3	85,9	84,1 ; 87,7	87,7	85,0 ; 90,0	84,2	81,4 ; 86,8
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	13,5	10,8	16,1	14,0	12,4 ; 15,7	10,5	8,4 ; 12,8	17,5	14,9 ; 20,0
Non	86,5	89,2	83,9	86,0	84,3 ; 87,6	89,5	87,2 ; 91,6	82,5	80,0 ; 85,1
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000					P = 0,015		
Oui	14,5	11,8	17,2	14,5	12,8 ; 16,1	12,3	9,9 ; 14,7	16,8	14,1 ; 19,2
Non	85,5	88,2	82,8	85,5	83,9 ; 87,2	87,7	85,3 ; 90,1	83,2	80,8 ; 85,9
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000					P = 0,071		
Oui	17,8	16,0	19,6	18,1	16,3 ; 20,2	16,4	13,8 ; 19,2	19,9	17,2 ; 22,7
Non	82,2	84,0	80,4	81,9	79,8 ; 83,7	83,6	80,8 ; 86,2	80,1	77,3 ; 82,8
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000					P = 0,000		
Oui	14,2	10,6	17,8	14,7	13,0 ; 16,6	10,3	8,0 ; 12,8	19,1	16,5 ; 21,9
Non	85,8	89,4	82,2	85,3	83,4 ; 87,0	89,7	87,2 ; 92,0	80,9	78,1 ; 83,5

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

### Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	58,4	55,8 ; 61,0	31,7	29,3 ; 34,1	9,9	8,4 ; 11,6
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	52,6	34,1	13,3	52,9	48,9 ; 56,6	34,1	30,5 ; 37,7	13,0	10,5 ; 15,9
Femmes	60,1	29,8	10,1	63,9	60,5 ; 67,3	29,3	26,2 ; 32,5	6,8	5,1 ; 8,6
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	67,2	58,9 ; 75,5	23,8*	16,5 ; 31,5	9,0**	4,0 ; 15,0
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	63,8	59,6 ; 68,0	26,8	22,7 ; 30,7	9,4	6,9 ; 12,1
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	54,5	50,2 ; 58,6	36,3	32,5 ; 40,2	9,1	6,8 ; 11,5
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	45,6	39,4 ; 51,8	40,2	34,0 ; 46,4	14,2*	10,1 ; 18,7
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,005					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	51,9	46,7 ; 57,3	37,1	31,7 ; 42,3	11,0*	7,5 ; 14,5
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	57,1	52,6 ; 61,4	33,6	29,7 ; 37,7	9,3	6,8 ; 12,0
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	64,1	60,0 ; 68,3	26,5	22,8 ; 30,3	9,4	7,0 ; 12,1
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	55,3	45,7 ; 65,5	34,6	25,3 ; 44,3	10,1**	4,7 ; 16,8
Autre	48,0	34,3	17,7	39,6*	27,1 ; 53,2	48,0	34,7 ; 61,5	12,4**	4,5 ; 21,5
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,771					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	58,8	56,0 ; 61,3	31,6	29,2 ; 34,1	9,7	8,1 ; 11,3
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	53,1	39,5 ; 66,5	34,2*	21,9 ; 47,4	12,8**	4,8 ; 22,2
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,383					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	59,0	56,3 ; 61,6	31,2	28,8 ; 33,8	9,8	8,2 ; 11,4
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	45,1*	28,4 ; 61,7	44,0*	27,2 ; 60,8	10,9**	2,7 ; 21,1
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	x	;	50,3**	8,4 ; 100,0	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	47,0	41,7 ; 52,3	37,3	32,3 ; 42,6	15,6	12,0 ; 19,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	54,7	49,0 ; 60,0	36,5	31,5 ; 41,9	8,8*	6,0 ; 11,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	66,3	61,7 ; 70,9	25,3	21,1 ; 29,6	8,4*	6,0 ; 11,0
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	71,8	66,4 ; 77,4	24,3	19,0 ; 29,5	3,9**	1,9 ; 6,3
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	37,1	30,2 ; 44,1	45,7	38,7 ; 52,9	17,2	12,3 ; 22,9
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	62,4	59,8 ; 65,3	29,3	26,7 ; 31,9	8,3	6,7 ; 10,0
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	35,4	27,7 ; 43,7	39,1	30,6 ; 47,8	25,5	18,6 ; 32,9
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	60,7	57,9 ; 63,4	31,2	28,7 ; 33,8	8,2	6,7 ; 9,8
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,010					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	60,7	57,4 ; 63,8	30,8	27,8 ; 33,9	8,5	6,7 ; 10,4
Étudiants	62,8	27,9	9,3	71,0	61,4 ; 80,4	20,5*	12,5 ; 29,2	8,5**	2,8 ; 15,3
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	45,3	34,4 ; 55,7	41,6	31,5 ; 52,2	13,2*	7,3 ; 20,4
Retraités	49,7	38,1	12,2	47,6	42,4 ; 52,8	39,1	34,0 ; 44,1	13,3	9,9 ; 17,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	58,4	55,8 ; 61,0	31,7	29,3 ; 34,1	9,9	8,4 ; 11,6
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	46,0	40,7 ; 51,3	36,2	30,9 ; 41,4	17,8	14,0 ; 22,0
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	63,0	59,9 ; 65,8	30,1	27,5 ; 32,9	6,9	5,4 ; 8,6
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	71,3	68,1 ; 74,3	24,1	21,2 ; 26,9	4,7*	3,3 ; 6,1
Bon	41,4	42,6	16,0	42,6	38,0 ; 47,4	42,6	38,1 ; 47,4	14,8	11,2 ; 18,5
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	32,0	24,6 ; 39,7	43,0	35,0 ; 50,7	25,1	18,7 ; 32,1
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	48,6	43,0 ; 53,9	33,4	28,2 ; 38,6	18,0	14,0 ; 22,5
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	61,4	58,4 ; 64,4	31,1	28,4 ; 34,0	7,4	5,9 ; 9,1
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,001					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	47,8	40,9 ; 54,8	43,7	36,7 ; 50,4	8,5*	4,7 ; 12,7
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	59,7	57,0 ; 62,3	30,3	28,0 ; 32,9	10,0	8,3 ; 11,8
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	63,1	60,2 ; 66,1	29,2	26,5 ; 31,9	7,7	6,0 ; 9,4
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	44,4	39,2 ; 49,7	39,0	33,9 ; 44,2	16,6	12,7 ; 20,6
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,003					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	65,7	61,0 ; 70,2	27,5	23,4 ; 31,9	6,8*	4,4 ; 9,4
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	57,0	53,6 ; 60,3	31,7	28,6 ; 34,8	11,3	9,2 ; 13,6

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	10,6	9,3 ; 11,8	8,8	7,2 ; 10,6	12,2	10,5 ; 14,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	13,1	10,6 ; 15,6	9,3*	6,4 ; 12,7	16,7	13,0 ; 20,6
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	41,1	35,5 ; 46,9	41,6	32,8 ; 50,6	40,6	32,8 ; 48,9
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,033		P = 0,198		P = 0,037	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	36,2	29,2 ; 43,7	38,8	28,0 ; 49,6	33,8	23,6 ; 44,7
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	50,8	40,3 ; 61,7	51,1*	34,0 ; 68,3	50,6	36,1 ; 64,3
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	52,4*	27,8 ; 78,6	x	;	64,6*	35,3 ; 91,5
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	22,5	19,4 ; 26,0	16,0	12,1 ; 20,2	31,3	25,6 ; 37,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	8,8	6,5 ; 11,5	7,2*	4,0 ; 10,9	10,2*	6,9 ; 14,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	4,2*	2,6 ; 6,1	4,4**	1,9 ; 7,3	4,1**	1,9 ; 6,5
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	3,1**	1,5 ; 5,0	3,7**	0,8 ; 7,0	2,6**	0,8 ; 4,9
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	24,8	19,6 ; 30,4	23,2*	15,1 ; 32,8	26,0	19,7 ; 33,0
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	8,2	6,9 ; 9,5	6,7	5,1 ; 8,4	9,6	7,7 ; 11,7
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,006		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	21,2*	15,4 ; 27,7	17,5*	9,8 ; 26,5	25,3*	16,7 ; 35,0
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	9,3	8,0 ; 10,6	7,9	6,2 ; 9,7	10,7	8,8 ; 12,8

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	75,5	73,4 ; 77,5	21,9	19,9 ; 24,0	2,6*	1,9 ; 3,5
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	62,8	59,2 ; 66,3	32,5	29,1 ; 36,1	4,6*	3,2 ; 6,3
Femmes	87,9	11,3	0,7	87,9	85,8 ; 89,9	11,4	9,5 ; 13,6	0,7**	0,2 ; 1,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,442					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	83,9	77,7 ; 89,8	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	79,3	75,7 ; 82,8	18,6	15,2 ; 22,0	2,2**	0,9 ; 3,7
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	72,8	69,3 ; 76,2	24,5	21,1 ; 27,8	2,7*	1,6 ; 4,1
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	63,6	58,1 ; 69,2	30,9	25,7 ; 36,1	5,5**	2,7 ; 8,6
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,651					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	70,6	65,4 ; 75,4	24,6	20,2 ; 29,2	4,8*	2,5 ; 7,3
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	72,0	68,0 ; 75,9	25,3	21,6 ; 29,2	2,6**	1,3 ; 4,2
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	78,2	74,8 ; 81,6	19,8	16,4 ; 23,3	2,0**	0,9 ; 3,4
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	78,7	70,8 ; 86,0	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	77,2	66,5 ; 86,8	x	;	x	;
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,874					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	74,4	71,9 ; 76,9	22,5	20,1 ; 25,0	3,1*	2,1 ; 4,2
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	76,3	70,0 ; 82,8	21,6	15,4 ; 27,8	2,1**	0,2 ; 4,5
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	80,3	74,8 ; 85,7	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	75,2	63,6 ; 85,7	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,096					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	65,8	61,1 ; 70,5	28,8	24,1 ; 33,4	5,5*	3,4 ; 7,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	77,7	73,8 ; 81,6	20,9	17,2 ; 24,8	1,4**	0,4 ; 2,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	79,2	75,1 ; 83,4	19,2	15,2 ; 23,2	1,6**	0,5 ; 2,9
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	82,8	78,4 ; 87,2	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,003					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	68,4	61,8 ; 74,4	26,5	20,6 ; 32,6	5,1*	2,7 ; 8,0
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	76,6	74,3 ; 78,9	21,4	19,2 ; 23,7	2,0*	1,2 ; 2,9
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	66,1	58,3 ; 74,2	27,9	20,0 ; 35,2	5,9**	2,8 ; 9,7
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	76,4	74,3 ; 78,6	21,4	19,4 ; 23,6	2,1*	1,4 ; 3,0
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,303					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	76,0	73,3 ; 78,8	22,1	19,4 ; 24,7	1,9*	1,1 ; 2,9
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	89,2	82,5 ; 94,8	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	72,2	62,4 ; 81,1	21,8*	13,4 ; 30,6	6,1**	2,1 ; 10,7
Retraités	72,9	23,2	3,8	65,8	61,0 ; 70,5	30,1	25,3 ; 34,7	4,2*	2,2 ; 6,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	75,5	73,4 ; 77,5	21,9	19,9 ; 24,0	2,6*	1,9 ; 3,5
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,208					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	72,2	67,3 ; 76,7	25,2	20,7 ; 29,8	2,6**	1,2 ; 4,3
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	76,7	74,3 ; 79,2	20,8	18,4 ; 23,1	2,5*	1,7 ; 3,5
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	79,7	76,9 ; 82,4	18,9	16,3 ; 21,7	1,4**	0,7 ; 2,2
Bon	75,1	21,2	3,6	69,0	64,8 ; 73,4	26,8	22,7 ; 30,7	4,2*	2,4 ; 6,3
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	70,8	63,7 ; 77,1	24,4	18,4 ; 31,1	4,8**	1,7 ; 8,4
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,629					
Élevé	77,2	19,2	3,6	73,6	68,7 ; 78,3	23,6	18,8 ; 28,3	2,8**	1,2 ; 4,5
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	76,1	73,7 ; 78,5	21,6	19,3 ; 23,9	2,3*	1,5 ; 3,3
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,000					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	61,5	55,1 ; 68,0	32,9	26,8 ; 39,3	5,6**	2,7 ; 8,8
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	77,2	75,0 ; 79,4	20,6	18,5 ; 22,8	2,2*	1,5 ; 3,1
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,011					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	89,0	86,1 ; 91,8	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	71,7	68,9 ; 74,7	25,2	22,4 ; 28,0	3,1*	2,1 ; 4,4

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	75,5	73,4 ; 77,5	62,8	59,2 ; 66,3	87,9	85,8 ; 89,9
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	21,9	19,9 ; 24,0	32,5	29,1 ; 36,1	11,4	9,5 ; 13,6
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	2,6*	1,9 ; 3,5	4,6*	3,2 ; 6,3	0,7**	0,2 ; 1,3
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	61,5	55,1 ; 68,0	44,7	34,0 ; 55,5	73,5	65,2 ; 81,0
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	32,9	26,8 ; 39,3	46,7	35,8 ; 57,6	23,1*	16,0 ; 30,9
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	5,6**	2,7 ; 8,8	8,6**	3,0 ; 14,8	3,4**	0,5 ; 7,2
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	77,2	75,0 ; 79,4	64,7	60,8 ; 68,4	89,9	87,8 ; 91,9
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	20,6	18,5 ; 22,8	31,2	27,6 ; 35,2	x	;
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	2,2*	1,5 ; 3,1	4,1*	2,6 ; 5,8	x	;

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	31,7	29,1 ; 34,2	16,1	14,1 ; 18,1	52,2	49,5 ; 55,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	22,4	19,0 ; 25,8	15,6	12,7 ; 18,8	61,9	58,0 ; 65,9
Femmes	41,7	18,2	40,1	41,2	37,6 ; 44,7	16,5	13,9 ; 19,2	42,3	38,5 ; 46,0
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,006					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	23,0*	15,6 ; 30,6	17,0*	10,8 ; 23,9	60,1	51,6 ; 68,3
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	28,6	25,0 ; 32,5	17,0	13,8 ; 20,5	54,4	49,7 ; 58,8
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	37,5	33,5 ; 41,5	15,9	12,8 ; 19,2	46,6	42,4 ; 51,0
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	38,3	30,3 ; 46,1	10,9*	6,3 ; 16,4	50,8	43,1 ; 58,2
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,015					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	25,9	20,7 ; 31,2	12,7*	8,6 ; 17,2	61,5	55,4 ; 67,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	31,8	26,9 ; 37,0	16,0	12,1 ; 20,0	52,2	46,6 ; 57,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	33,8	29,1 ; 38,4	19,1	15,4 ; 23,1	47,1	42,0 ; 52,2
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	35,2	29,5 ; 40,8	16,8	12,3 ; 21,3	48,0	42,1 ; 54,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,001					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	35,0	26,9 ; 43,7	5,3**	2,0 ; 9,5	59,8	51,0 ; 68,1
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	31,2	28,4 ; 33,8	17,9	15,6 ; 20,2	50,9	47,8 ; 53,8
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,246					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	31,2	28,1 ; 34,1	16,7	14,1 ; 19,3	52,1	48,8 ; 55,5
Étudiants	28,8	16,3	54,9	25,3*	16,6 ; 34,1	17,5*	10,5 ; 25,7	57,2	47,1 ; 66,6
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	30,5*	19,5 ; 41,8	14,9**	7,2 ; 23,7	54,6	42,9 ; 66,9
Retraités	38,0	12,4	49,6	39,0	33,2 ; 45,2	12,6*	8,8 ; 16,7	48,4	42,5 ; 54,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
2,0*	1,3 ; 2,8	45,4	43,0 ; 48,1	37,4	34,8 ; 39,8	15,2	13,4 ; 17,1	Ensemble de la population	
P = 0,000									
1,2**	0,3 ; 2,2	37,1	33,6 ; 41,0	45,9	42,1 ; 49,6	15,9	13,1 ; 18,6	Sexe	
2,8*	1,7 ; 4,1	53,9	50,2 ; 57,2	28,8	25,5 ; 32,0	14,5	12,2 ; 16,9	Hommes	
P = 0,081									
x	;	67,1	54,1 ; 79,1	21,4*	10,9 ; 33,0	x	;	Femmes	
x	;	63,0	50,3 ; 74,8	26,7*	15,8 ; 39,3	x	;	Groupe d'âge	
P = 0,000									
5,6**	2,0 ; 9,8	65,0	56,5 ; 73,4	24,0*	16,6 ; 32,1	5,3**	1,7 ; 9,5	15-17 ans	
0,9**	0,2 ; 1,8	45,0	40,7 ; 49,1	38,2	33,9 ; 42,4	16,0	12,7 ; 19,3	15-24 ans	
1,1**	0,4 ; 2,0	40,6	36,5 ; 44,5	40,5	36,5 ; 44,5	17,8	14,9 ; 20,9	25-44 ans	
2,8**	1,0 ; 4,8	37,7	32,2 ; 43,8	42,1	36,0 ; 48,2	17,4	13,0 ; 22,2	45-64 ans	
P = 'n.d.'									
x	;	58,3*	40,1 ; 76,6	32,7*	15,5 ; 50,7	x	;	65 ans et plus	
x	;	65,2	46,4 ; 83,6	22,6**	6,2 ; 41,3	x	;	Hommes	
P = 'n.d.'									
x	;	61,5	48,6 ; 74,0	28,0*	16,3 ; 40,2	x	;	15-17 ans	
x	;	31,0	25,4 ; 37,0	52,6	46,0 ; 59,3	x	;	15-24 ans	
x	;	31,9	26,1 ; 38,0	47,3	41,2 ; 53,6	x	;	25-44 ans	
x	;	37,0	28,6 ; 45,9	47,1	37,7 ; 56,2	x	;	45-64 ans	
P = 0,882									
x	;	79,0	61,4 ; 94,1	x	;	x	;	65 ans et plus	
x	;	60,8	43,6 ; 77,0	30,7*	15,8 ; 47,5	x	;	Femmes	
P = 0,120									
x	;	69,1	57,1 ; 80,4	19,4*	10,2 ; 30,0	x	;	15-17 ans	
1,4**	0,2 ; 3,0	59,5	53,7 ; 65,2	23,2	17,9 ; 28,7	15,9	11,4 ; 20,6	15-24 ans	
1,9**	0,6 ; 3,5	49,2	43,8 ; 54,5	33,8	28,9 ; 38,9	15,1	11,7 ; 18,8	25-44 ans	
4,6**	1,6 ; 8,2	38,4	30,6 ; 46,4	37,4	29,5 ; 45,9	19,5*	13,2 ; 26,2	45-64 ans	
P = 0,253									
2,9**	1,2 ; 4,9	44,5	39,6 ; 49,7	35,9	30,9 ; 40,7	16,7	12,9 ; 20,5	65 ans et plus	
1,7**	0,5 ; 3,3	47,0	41,6 ; 52,1	34,4	29,5 ; 39,6	16,9	13,5 ; 20,7	Niveau de scolarité	
1,9**	0,6 ; 3,6	42,1	37,4 ; 47,2	41,9	36,7 ; 46,8	14,1	10,8 ; 17,6	Niveau inférieur au DES	
0,8**	0,0 ; 1,7	50,3	44,2 ; 55,8	37,3	31,7 ; 43,1	11,6*	8,1 ; 15,5	Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 'n.d.'									
x	;	41,3	34,4 ; 48,8	39,9	32,6 ; 47,1	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
x	;	36,9	29,1 ; 44,8	44,2	36,3 ; 52,3	x	;	Diplôme d'études universitaires	
x	;	33,3	26,1 ; 40,9	51,6	43,8 ; 58,9	x	;	Hommes	
x	;	34,2	25,8 ; 42,8	53,0	44,0 ; 62,3	x	;	Niveau inférieur au DES	
P = 0,334									
4,8**	1,6 ; 8,8	49,0	41,7 ; 56,2	30,3	23,7 ; 37,0	16,0*	11,2 ; 21,4	Diplôme d'études secondaires (DES)	
2,4**	0,5 ; 4,9	56,2	49,1 ; 63,1	25,4	19,5 ; 31,8	16,0*	11,5 ; 21,0	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
2,3**	0,5 ; 4,3	50,3	43,4 ; 56,7	32,8	26,8 ; 39,5	14,6	10,2 ; 19,4	Diplôme d'études universitaires	
x	;	64,1	56,3 ; 71,7	23,9	16,8 ; 30,9	x	;	Indice du niveau de revenu du ménage	
P = 0,807									
2,9**	0,9 ; 5,4	44,8	37,4 ; 51,9	36,7	30,1 ; 43,4	15,6*	10,9 ; 20,8	Quintile 1 (faible)	
1,9*	1,1 ; 2,8	45,5	42,7 ; 48,2	37,4	34,6 ; 40,1	15,2	13,1 ; 17,2	Quintile 2 et suivants	
P = 'n.d.'									
x	;	48,0	35,5 ; 60,3	34,6*	23,3 ; 46,1	x	;	Hommes	
1,1**	0,2 ; 2,3	35,2	31,1 ; 39,1	48,0	43,9 ; 52,2	15,8	12,8 ; 18,8	Quintile 1 (faible)	
P = 0,033									
3,4**	0,6 ; 6,8	42,6	33,7 ; 50,8	38,2	30,2 ; 46,6	15,8*	10,3 ; 22,3	Quintile 2 et suivants	
2,7*	1,5 ; 4,1	56,4	52,3 ; 60,1	26,4	23,0 ; 30,0	14,5	11,9 ; 17,2	Femmes	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	39,5	37,0 ; 41,9	2,3*	1,6 ; 3,2	58,2	55,7 ; 60,6
Sexe	P = 0,000			P = 0,009					
Hommes	36,6	3,6	59,9	36,1	32,6 ; 39,6	3,1*	1,7 ; 4,6	60,8	57,2 ; 64,5
Femmes	40,5	2,3	57,1	42,9	39,6 ; 46,4	1,6**	0,8 ; 2,5	55,6	52,2 ; 58,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,055					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	13,9*	8,2 ; 20,4	x	;	x	;
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	43,5	39,2 ; 48,0	2,7**	1,3 ; 4,3	53,7	49,2 ; 58,1
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	46,5	42,6 ; 50,3	1,5**	0,7 ; 2,5	52,0	48,2 ; 55,9
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	39,4	33,2 ; 45,0	3,2**	1,3 ; 5,4	57,5	51,7 ; 63,6
Hommes	P = 0,000			P = 0,377					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	10,3**	3,2 ; 18,9	x	;	x	;
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	41,6	35,4 ; 47,8	3,9**	1,5 ; 6,8	54,4	47,8 ; 60,6
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	44,4	38,3 ; 50,3	1,9**	0,6 ; 3,5	53,7	47,9 ; 59,8
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	31,1	22,5 ; 39,3	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,434					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	18,1*	9,1 ; 28,3	x	;	x	;
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	45,4	39,4 ; 51,8	x	;	x	;
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	48,5	43,1 ; 53,8	1,1**	0,1 ; 2,4	50,4	45,1 ; 55,6
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	46,6	38,3 ; 54,7	3,1**	0,8 ; 5,9	50,3	42,3 ; 58,4
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	31,5**	15,8 ; 50,1	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	10,2	8,2 ; 12,4	3,5*	2,0 ; 5,2	86,2	83,5 ; 88,8
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	56,7	52,5 ; 60,9	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	90,5	86,4 ; 93,9	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	1,9**	0,4 ; 3,6	6,9**	3,5 ; 10,8	91,3	87,0 ; 94,9
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	47,0	41,8 ; 52,7	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	87,7	81,1 ; 93,4	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	31,7**	12,0 ; 53,6	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	16,0	12,7 ; 19,5	1,2**	0,3 ; 2,3	82,7	79,1 ; 86,2
Embonpoint	69,6	x	x	72,4	66,3 ; 78,3	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	93,6	89,1 ; 97,2	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	79,2	75,8 ; 82,5	12,8	10,2 ; 15,6	8,0	5,8 ; 10,2
Sexe	P = 0,000			P = 0,024					
Hommes	81,4	10,5	8,0	85,1	79,8 ; 89,6	8,3*	4,6 ; 12,5	6,6*	3,6 ; 10,2
Femmes	74,5	14,1	11,5	75,4	71,1 ; 80,1	15,7	11,9 ; 19,6	8,9*	5,9 ; 11,9
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,682					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	92,9	82,8 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	74,9	68,6 ; 80,6	17,9	12,9 ; 23,6	7,2*	3,6 ; 11,0
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	78,6	72,9 ; 83,8	11,1*	6,8 ; 15,6	10,3*	6,7 ; 14,7
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	82,1	72,9 ; 90,1	8,5**	3,0 ; 15,4	9,4**	2,8 ; 16,9
Hommes	P = 0,252			P = 0,853					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	90,5	64,6 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	85,4	76,8 ; 92,8	x	;	x	;
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	85,5	77,2 ; 92,4	5,1**	0,9 ; 10,2	9,3**	3,4 ; 16,7
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	75,3	55,8 ; 92,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,765					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	94,3	84,8 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	67,0	58,4 ; 75,4	23,2*	16,0 ; 30,9	9,8**	4,4 ; 15,9
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	74,4	67,2 ; 81,9	14,7*	8,4 ; 21,0	10,9*	5,9 ; 16,3
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	85,4	74,7 ; 94,0	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,156					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	83,4	77,4 ; 89,1	12,3*	7,1 ; 18,1	4,3**	1,5 ; 7,8
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	79,4	74,3 ; 84,3	12,9*	8,9 ; 17,4	7,7*	4,5 ; 11,2
Obésité	72,3	14,4	13,3	73,3	64,9 ; 81,0	13,1*	7,5 ; 19,5	13,6*	8,0 ; 20,3
Hommes	P = 0,002			P = 0,627					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	94,8	79,9 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	86,0	79,7 ; 91,7	9,2**	4,2 ; 14,7	4,8**	1,5 ; 9,0
Obésité	76,0	12,2	11,8	79,9	67,4 ; 90,2	x	;	x	;
Femmes	P = 0,161			P = 0,119					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	82,0	75,4 ; 88,3	13,2*	7,4 ; 19,4	4,8**	1,7 ; 8,8
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	72,3	64,6 ; 80,1	16,9*	10,5 ; 23,9	10,8**	5,0 ; 16,7
Obésité	68,9	16,4	14,7	67,3	55,7 ; 78,0	18,0*	9,6 ; 27,5	14,7**	6,5 ; 23,9

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
17,9	16,0 ; 19,8	16,3	14,4 ; 18,2	2,4*	1,6 ; 3,3	63,4	61,0 ; 65,8	Ensemble de la population	
P = 0,000									
13,7	11,1 ; 16,4	12,8	10,4 ; 15,4	4,0*	2,4 ; 5,8	69,5	65,8 ; 73,0	Sexe	
22,0	19,4 ; 24,7	19,7	17,0 ; 22,8	0,8**	0,3 ; 1,5	57,4	54,1 ; 60,6	Hommes	
P = 0,005									
11,3*	6,3 ; 16,8	13,6*	8,1 ; 19,8	7,9**	3,3 ; 13,3	67,2	58,6 ; 75,2	Femmes	
21,9	18,5 ; 25,5	17,0	13,7 ; 20,3	2,1**	0,9 ; 3,4	59,0	54,8 ; 63,2	Groupe d'âge	
18,2	15,4 ; 21,2	18,0	15,1 ; 21,1	0,9**	0,3 ; 1,7	62,9	59,2 ; 66,6	15-24 ans	
14,6	10,5 ; 19,1	12,7*	8,8 ; 16,9	x	;	x	;	25-44 ans	
P = 0,268									
10,6**	3,6 ; 18,9	x	;	14,7**	5,9 ; 25,0	x	;	45-64 ans	
18,2	13,2 ; 23,3	15,3	11,0 ; 20,3	3,1**	1,2 ; 5,3	63,3	57,0 ; 69,5	65 ans et plus	
11,6*	7,8 ; 15,5	15,5	11,4 ; 20,1	x	;	x	;	Hommes	
11,7*	6,2 ; 17,7	7,0**	2,8 ; 11,8	x	;	x	;	15-24 ans	
P = 0,770									
12,0**	4,8 ; 20,2	22,0*	12,5 ; 32,6	x	;	x	;	25-44 ans	
25,6	20,5 ; 30,6	18,7	14,0 ; 23,8	x	;	x	;	45-64 ans	
24,6	20,2 ; 29,2	20,5	16,2 ; 24,8	0,9**	0,0 ; 2,0	54,1	49,1 ; 59,3	65 ans et plus	
17,2*	11,3 ; 23,8	17,7*	11,2 ; 24,7	x	;	x	;	Femmes	
P = 0,052									
x	;	x	;	x	;	76,4	57,8 ; 93,2	Statut pondéral	
7,6	5,7 ; 9,5	13,8	11,0 ; 16,5	3,7*	2,2 ; 5,5	74,9	71,6 ; 78,2	Poids insuffisant	
23,7	20,2 ; 27,3	19,5	16,1 ; 23,1	1,3**	0,2 ; 2,7	55,5	51,2 ; 59,8	Poids normal	
37,1	30,7 ; 43,4	17,5	12,7 ; 22,5	x	;	x	;	Embonpoint	
P = 0,286									
x	;	x	;	x	;	55,5**	11,9 ; 100,0	Obésité	
1,9**	0,5 ; 3,6	3,8**	1,6 ; 6,3	7,2**	3,7 ; 11,3	87,1	82,4 ; 91,4	Hommes	
16,6	12,6 ; 21,0	19,2	15,0 ; 24,0	2,1**	0,3 ; 4,4	62,1	56,3 ; 67,6	Poids insuffisant	
33,1	23,9 ; 42,4	16,1*	9,7 ; 23,4	x	;	x	;	Poids normal	
P = 0,210									
x	;	x	;	x	;	85,1	69,0 ; 98,0	Embonpoint	
11,6	8,7 ; 14,7	20,7	16,4 ; 25,0	1,3**	0,4 ; 2,5	66,4	61,8 ; 71,0	Obésité	
35,1	29,1 ; 41,3	19,9	14,8 ; 25,5	x	;	x	;	Femmes	
41,6	32,8 ; 50,7	19,0*	11,5 ; 26,8	x	;	x	;	Poids insuffisant	
P = 0,000									
35,5	31,7 ; 39,4	19,7	16,7 ; 23,0	x	;	x	;	Poids normal	
x	;	x	;	22,3**	7,4 ; 39,6	76,2	58,8 ; 91,6	Embonpoint	
6,8	5,3 ; 8,6	14,4	12,0 ; 16,8	3,3*	2,0 ; 4,8	75,5	72,4 ; 78,3	Obésité	
P = 0,000									
Perception à l'égard de son poids									
Excès de poids									
Trop maigre									
À peu près normal(e)									

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
37,8	32,3 ; 43,6	15,5	11,3 ; 19,9	6,6*	3,9 ; 9,8	40,1	34,0 ; 46,0	Ensemble de la population	
P = 0,197									
40,5	31,1 ; 50,9	8,4**	3,5 ; 14,1	4,9**	0,5 ; 10,6	46,2	35,5 ; 56,7	Sexe	
36,1	29,4 ; 43,6	19,9	13,8 ; 25,6	7,7**	4,0 ; 11,8	36,4	29,5 ; 43,4	Hommes	
								Femmes	
P = 0,691									
x	;	34,0**	11,4 ; 58,4	x	;	x	;	Groupe d'âge	
49,8	40,5 ; 59,6	12,3**	6,3 ; 18,8	6,8**	2,5 ; 12,1	31,1	22,8 ; 40,3	15-24 ans	
39,6	30,5 ; 49,1	13,7*	7,9 ; 20,1	5,3**	1,6 ; 9,7	41,4	31,5 ; 50,7	25-44 ans	
13,2**	3,8 ; 25,7	16,8**	5,8 ; 28,9	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,903									
x	;	x	;	x	;	88,8	55,1 ; 100,0	Hommes	
67,4	52,0 ; 82,5	x	;	x	;	20,9**	8,5 ; 35,3	15-24 ans	
29,7**	14,7 ; 47,9	x	;	x	;	59,1*	38,5 ; 77,5	25-44 ans	
x	;	x	;	x	;	61,5*	32,9 ; 87,6	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,787									
x	;	67,7*	31,8 ; 98,3	x	;	x	;	Femmes	
37,5*	26,3 ; 49,8	16,5**	7,5 ; 25,7	7,7**	2,3 ; 14,4	38,3*	26,4 ; 50,0	15-24 ans	
44,2	33,0 ; 55,7	15,3*	8,2 ; 23,7	7,3**	2,0 ; 13,4	33,1*	23,0 ; 44,3	25-44 ans	
15,2**	1,6 ; 32,7	13,5**	1,1 ; 29,0	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,439									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
31,2*	19,1 ; 44,1	15,7**	6,9 ; 25,4	x	;	x	;	Poids insuffisant	
38,8	30,5 ; 47,5	16,4*	9,6 ; 23,5	x	;	x	;	Poids normal	
38,7	27,8 ; 50,1	14,5**	7,7 ; 22,7	14,9**	7,7 ; 23,3	31,8*	20,6 ; 43,4	Embonpoint	
								Obésité	
P = 'n.d.'									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids insuffisant	
39,4*	26,5 ; 53,4	x	;	x	;	54,4	39,7 ; 68,1	Poids normal	
42,6*	25,7 ; 61,2	13,7**	3,5 ; 26,2	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,605									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
29,1*	16,5 ; 42,1	17,5**	7,8 ; 28,2	x	;	x	;	Poids insuffisant	
38,3	27,6 ; 49,8	24,4*	14,0 ; 35,0	x	;	x	;	Poids normal	
35,1*	21,0 ; 49,7	15,4**	5,6 ; 26,7	17,8**	8,3 ; 28,9	31,8*	18,6 ; 46,7	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	89,3	86,5 ; 91,9	5,3*	3,5 ; 7,3	5,3*	3,4 ; 7,3
Sexe	P = 0,001			P = 0,228					
Hommes	88,9	6,9	4,2	90,5	86,3 ; 94,5	6,4**	2,9 ; 9,9	3,2**	0,8 ; 5,9
Femmes	85,7	7,5	6,8	88,7	85,2 ; 91,9	4,7*	2,5 ; 7,2	6,7*	4,1 ; 9,4
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,975					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	88,3	76,3 ; 98,6	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	87,2	82,0 ; 91,8	6,7**	3,1 ; 10,7	6,1**	2,9 ; 9,8
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	91,2	87,5 ; 94,4	3,8**	1,7 ; 6,4	5,0*	2,5 ; 7,6
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	91,2	83,8 ; 96,9	x	;	x	;
Hommes	P = 0,121			P = 0,982					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	88,1	65,5 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	89,6	81,9 ; 96,3	6,7**	1,1 ; 13,0	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	93,1	87,0 ; 98,3	4,9**	0,4 ; 10,3	x	;
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	86,1	70,1 ; 99,3	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,984					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	88,4	72,8 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	85,5	78,5 ; 91,8	6,6**	2,0 ; 12,2	7,9**	3,4 ; 13,2
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	90,0	85,3 ; 94,1	3,3**	0,9 ; 6,1	6,7*	3,3 ; 10,5
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	93,6	86,3 ; 99,6	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,399					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	95,8	92,5 ; 98,7	x	;	x	;
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	88,8	84,3 ; 92,8	6,2*	3,3 ; 9,6	5,0**	2,3 ; 8,1
Obésité	82,0	8,7	9,2	83,4	76,8 ; 89,5	8,7**	3,8 ; 14,5	7,9**	3,8 ; 12,5
Hommes	P = 0,002			P = 0,733					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	93,8	76,4 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	92,0	86,6 ; 96,8	4,9**	1,0 ; 9,6	3,1**	0,2 ; 6,8
Obésité	85,2	8,2	6,6*	85,9	75,4 ; 94,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,034			P = 0,386					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	96,1	92,7 ; 99,1	x	;	x	;
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	85,4	78,3 ; 91,8	7,5**	3,2 ; 12,9	7,0**	2,5 ; 12,6
Obésité	79,1	9,2	11,8	81,1	71,3 ; 90,2	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	6,2*	4,1 ; 8,4	93,8	91,6 ; 95,9
Sexe	P = 0,024		P = 0,615			
Hommes	6,6	93,4	5,5**	2,3 ; 9,4	94,5	90,6 ; 97,7
Femmes	8,6	91,4	6,7*	4,0 ; 9,6	93,3	90,4 ; 96,0
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,302			
15-24 ans	11,2*	88,8	x	;	x	;
25-44 ans	8,0	92,0	8,3**	4,6 ; 12,7	91,7	87,3 ; 95,4
45-64 ans	7,5	92,5	4,4*	2,2 ; 6,9	95,6	93,1 ; 97,8
65 ans et plus	4,9	95,1	x	;	x	;
Hommes	P = 0,409		P = 0,158			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	9,2**	2,4 ; 17,7	90,8	82,3 ; 97,6
45-64 ans	7,0	93,0	x	;	x	;
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,693			
15-24 ans	12,3*	87,7	x	;	x	;
25-44 ans	9,9	90,1	7,7**	3,1 ; 13,0	92,3	87,0 ; 96,9
45-64 ans	7,8	92,2	5,4**	2,4 ; 8,8	94,6	91,2 ; 97,6
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,574			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	7,7**	3,4 ; 12,6	92,3	87,4 ; 96,6
Embonpoint	6,6	93,4	5,1**	2,2 ; 8,6	94,9	91,4 ; 97,8
Obésité	11,3	88,7	7,1**	2,9 ; 12,2	92,9	87,8 ; 97,1
Hommes	P = 0,000		P = 0,576			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	5,2**	1,3 ; 10,4	94,8	89,6 ; 98,7
Obésité	11,5	88,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,032		P = 0,536			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	8,7**	3,8 ; 14,1	91,3	85,9 ; 96,2
Embonpoint	8,4	91,6	4,9**	0,9 ; 10,1	95,1	89,9 ; 99,1
Obésité	11,1	88,9	6,4**	2,0 ; 11,7	93,6	88,3 ; 98,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	2,8	2,6*	2,9	3,8*	2,0 ; 5,9	4,1**	1,1 ; 7,6	3,7**	1,4 ; 6,5
Jamais	94,8	94,8	94,8	94,8	92,5 ; 97,0	94,5	90,7 ; 97,8	95,1	92,0 ; 97,6
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,279					
Souvent	4,6	4,2	4,9	2,9**	1,4 ; 4,6	3,2**	0,8 ; 6,2	2,7**	0,9 ; 4,9
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	6,7*	4,4 ; 9,1	9,8*	5,4 ; 14,5	4,8*	2,4 ; 7,5
Rarement	5,1	5,5	4,9	5,1*	3,2 ; 7,4	3,7**	1,1 ; 7,1	6,0*	3,4 ; 9,1
Jamais	82,9	81,4	84,0	85,3	82,0 ; 88,5	83,3	77,3 ; 88,9	86,5	82,4 ; 90,5
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,850					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	2,0**	0,8 ; 3,4	2,3**	0,3 ; 5,0	1,7**	0,4 ; 3,5
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	7,3*	5,1 ; 10,0	8,3**	3,9 ; 13,3	6,7*	4,3 ; 9,5
Rarement	4,5	4,3	4,5	5,4*	3,5 ; 7,4	6,0**	2,5 ; 10,1	5,0*	2,9 ; 7,3
Jamais	86,5	87,5	85,7	85,3	82,0 ; 88,3	83,3	77,4 ; 89,2	86,6	82,8 ; 89,9
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,4	97,1 ; 99,5	97,9	94,8 ; 100,0	98,7	97,5 ; 99,8
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	98,3	96,8 ; 99,6	97,7	94,4 ; 100,0	98,7	97,1 ; 99,9
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	1,4**	0,3 ; 2,7	x	;	1,2**	0,1 ; 2,5
Jamais	98,4	99,2	97,7	97,5	95,9 ; 99,0	97,8	94,6 ; 100,0	97,4	95,4 ; 99,2
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	1,1**	0,2 ; 2,2	x	;	1,1**	0,1 ; 2,4
Jamais	99,1	99,2	99,0	98,9	97,8 ; 99,8	99,0	96,4 ; 100,0	98,9	97,6 ; 99,9
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,2**	0,3 ; 2,2	x	;	1,4**	0,3 ; 2,7
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,8	96,3 ; 99,0	98,8	96,5 ; 100,0	97,2	95,2 ; 98,9



Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Commencer ou recommencer à fumer	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	0,9**	0,1 ; 1,9	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	98,0	96,7 ; 99,1	98,6	96,3 ; 100,0	97,6	95,9 ; 99,1
Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	0,7**	0,0 ; 1,6	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	98,9	97,9 ; 99,8	98,7	96,5 ; 100,0	99,0	98,0 ; 99,9
Se faire vomir	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,5	98,8 ; 100,0	99,3	97,5 ; 100,0	99,7	99,0 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
5,4*	3,3 ; 7,7	33,3	29,2 ; 37,6	43,3	39,1 ; 47,6	18,0	14,8 ; 21,4	Ensemble de la population	
P = 0,602									
6,5**	2,5 ; 11,0	34,1	27,4 ; 41,5	44,0	36,9 ; 51,3	15,3*	10,0 ; 20,9	Sexe	
4,7**	2,4 ; 7,4	32,8	27,6 ; 38,0	42,8	37,4 ; 48,5	19,7	15,4 ; 24,1	Hommes	
								Femmes	
P = 0,506									
x	;	38,8*	21,4 ; 56,5	43,0*	24,8 ; 61,3	x	;	Groupe d'âge	
2,4**	0,5 ; 4,6	32,2	25,4 ; 39,2	41,9	35,3 ; 48,4	23,6	17,6 ; 29,7	15-24 ans	
6,2**	2,5 ; 10,5	30,1	24,3 ; 36,3	46,7	40,3 ; 53,4	16,9	12,2 ; 22,1	25-44 ans	
10,7**	2,5 ; 21,9	44,3	31,0 ; 56,8	35,3*	22,9 ; 47,9	9,7**	2,2 ; 19,1	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,985									
x	;	49,9**	16,8 ; 87,2	x	;	x	;	Hommes	
x	;	33,8*	23,2 ; 45,1	42,7	31,8 ; 53,4	20,8*	11,6 ; 31,1	15-24 ans	
8,5**	0,7 ; 17,5	27,3*	18,6 ; 37,4	50,2	39,0 ; 62,0	14,1**	6,1 ; 23,2	25-44 ans	
x	;	47,2*	24,0 ; 69,8	30,3**	9,9 ; 52,7	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,942									
x	;	32,6**	12,4 ; 53,7	45,7*	23,1 ; 67,1	x	;	Femmes	
x	;	31,0	22,1 ; 40,0	41,3	32,3 ; 50,3	x	;	15-24 ans	
4,9**	1,3 ; 9,1	31,8	23,9 ; 39,6	44,7	36,8 ; 52,9	18,6*	12,5 ; 25,1	25-44 ans	
x	;	42,8*	27,4 ; 60,0	37,8*	22,7 ; 53,7	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,325									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
6,6**	2,5 ; 11,2	38,9	30,7 ; 47,0	34,6	27,0 ; 42,5	19,9*	13,6 ; 26,5	Poids insuffisant	
4,1**	1,5 ; 7,0	30,7	24,8 ; 36,9	46,5	40,0 ; 52,9	18,8	13,9 ; 24,1	Poids normal	
7,0**	1,6 ; 13,6	30,1	22,3 ; 38,6	47,6	38,5 ; 57,0	15,3*	8,8 ; 21,9	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,933									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	43,2**	17,7 ; 70,0	24,6**	4,4 ; 49,8	x	;	Poids insuffisant	
3,7**	0,4 ; 7,6	33,0	24,6 ; 42,1	46,8	37,3 ; 56,5	16,5*	9,9 ; 24,2	Poids normal	
11,7**	0,8 ; 24,0	31,5*	19,9 ; 45,3	45,2*	31,6 ; 59,6	11,6**	3,4 ; 21,2	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,738									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
6,1**	2,1 ; 11,0	38,3	29,8 ; 47,1	35,9	27,6 ; 44,5	19,7*	13,3 ; 26,8	Poids insuffisant	
4,5**	0,7 ; 9,4	28,2	19,8 ; 36,6	46,1	36,8 ; 55,3	21,3*	14,2 ; 29,1	Poids normal	
x	;	28,8*	17,7 ; 40,0	49,7	38,1 ; 61,1	x	;	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,337				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	44,8	40,5 ; 48,9	41,9	34,8 ; 49,3	46,6	41,3 ; 51,9	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	38,1	34,0 ; 42,2	38,1	30,8 ; 45,6	38,1	33,1 ; 43,3	
Non	14,4	15,3	13,7	17,1	13,9 ; 20,2	19,9	14,2 ; 26,2	15,3	11,6 ; 19,1	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,513				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	45,2	40,6 ; 49,5	44,3	37,1 ; 51,6	45,8	40,0 ; 50,9	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	35,8	31,8 ; 40,1	34,3	27,4 ; 41,2	36,8	31,9 ; 42,2	
Non	19,6	22,6	17,4	19,0	15,6 ; 22,5	21,5	15,6 ; 27,8	17,4	13,1 ; 22,0	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,031				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	44,2	39,8 ; 48,5	37,1	30,0 ; 44,7	48,7	43,0 ; 54,0	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	31,6	27,7 ; 35,6	33,5	26,5 ; 40,9	30,4	25,4 ; 35,5	
Non	27,7	32,4	24,3	24,2	20,8 ; 27,8	29,4	23,0 ; 36,1	20,9	16,8 ; 25,5	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,360				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	44,3	39,9 ; 48,7	40,7	33,6 ; 48,2	46,5	41,2 ; 51,7	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	30,5	26,6 ; 34,6	31,1	24,1 ; 38,0	30,2	25,3 ; 35,4	
Non	26,1	27,4	25,1	25,2	21,4 ; 29,0	28,2	21,8 ; 34,9	23,3	19,1 ; 27,6	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,005				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	63,3	58,9 ; 67,5	56,4	48,9 ; 63,6	67,7	62,4 ; 72,8	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	18,5	15,1 ; 22,1	25,5	18,7 ; 32,4	14,2	10,5 ; 18,4	
Non	17,4	18,5	16,6	18,1	15,0 ; 21,5	18,2	13,1 ; 23,7	18,1	14,0 ; 22,4	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,017				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	64,2	60,0 ; 68,4	57,8	50,3 ; 65,4	68,2	63,0 ; 73,4	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	24,3	20,5 ; 28,4	31,4	24,1 ; 38,8	19,9	15,3 ; 24,4	
Non	12,6	14,0	11,6	11,5	8,7 ; 14,3	10,8*	6,7 ; 15,4	11,9*	8,3 ; 15,8	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,628				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	49,2	44,8 ; 53,5	47,8	40,8 ; 55,2	50,1	44,6 ; 55,4	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	25,9	22,2 ; 29,8	24,9	18,8 ; 31,5	26,5	21,8 ; 31,5	
Non	21,5	24,4	19,4	24,9	20,9 ; 28,8	27,3	20,2 ; 34,1	23,4	18,9 ; 28,3	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	11,8	9,0 ; 14,8	17,5*	11,9 ; 23,7	8,3*	5,7 ; 11,1	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	18,8	15,3 ; 22,2	24,2	17,8 ; 31,1	15,4	11,6 ; 19,4	
Non	72,0	67,3	75,4	69,4	65,4 ; 73,4	58,4	51,0 ; 65,7	76,2	71,7 ; 80,8	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,450				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	32,9	29,1 ; 36,9	36,2	29,1 ; 43,2	30,8	26,0 ; 35,8	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	12,6	9,8 ; 15,5	11,6*	7,1 ; 16,4	13,2	9,8 ; 16,8	
Non	49,9	43,2	54,7	54,6	50,3 ; 58,8	52,2	45,0 ; 59,4	56,1	50,8 ; 61,0	

Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région							
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes			
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,025					
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	52,7	48,3 ; 57,0	49,9	42,7 ; 57,7	54,4	48,9 ; 59,8		
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	18,0	14,4 ; 21,4	23,9	17,2 ; 30,3	14,2	10,3 ; 18,3		
Non	29,6	28,8	30,2	29,4	25,5 ; 33,3	26,1	19,4 ; 32,6	31,4	26,4 ; 36,5		
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,023					
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	39,1	35,2 ; 43,4	31,5	25,1 ; 38,2	43,9	38,5 ; 49,3		
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	13,8	10,9 ; 16,9	15,1*	9,8 ; 20,9	13,1	9,5 ; 17,0		
Non	48,5	52,0	45,9	47,0	42,6 ; 51,3	53,5	45,9 ; 60,4	43,0	37,8 ; 48,4		
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,524					
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	39,0	34,8 ; 43,3	38,4	31,2 ; 45,6	39,3	33,9 ; 44,5		
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	25,7	21,7 ; 29,7	28,3	21,6 ; 35,5	24,1	19,4 ; 29,0		
Non	37,5	34,7	39,5	35,3	31,4 ; 39,3	33,2	26,7 ; 40,1	36,6	31,3 ; 42,0		

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.  
 2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.  
 \* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.  
 \*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.  
 Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
50,4	47,9 ; 53,0	36,8	34,3 ; 39,2	12,8	10,9 ; 14,7	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
45,3	41,7 ; 49,2	37,6	33,8 ; 41,2	17,0	13,9 ; 20,2	Hommes
55,4	51,9 ; 58,8	35,9	32,6 ; 39,2	8,7	6,6 ; 10,9	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
64,2	50,9 ; 76,3	12,5**	3,9 ; 21,8	23,3*	13,1 ; 35,0	15-17 ans
30,5*	19,6 ; 42,4	29,2*	18,5 ; 40,4	40,3	28,5 ; 52,2	18-24 ans
		P = 0,000				
47,4	38,5 ; 56,1	20,8*	13,8 ; 27,9	31,8	24,0 ; 40,0	15-24 ans
34,0	29,9 ; 37,9	50,9	46,4 ; 55,3	15,1	11,9 ; 18,4	25-44 ans
52,9	48,9 ; 57,1	40,2	36,2 ; 44,2	6,9*	4,7 ; 9,2	45-64 ans
89,1	84,8 ; 92,9	x	;	x	;	65 ans et plus
		P = 0,170				Hommes
67,4	49,2 ; 84,1	x	;	x	;	15-17 ans
28,0**	10,1 ; 45,9	22,5**	6,8 ; 40,7	49,5*	30,9 ; 68,3	18-24 ans
		P = 0,000				
49,5	35,8 ; 62,4	14,3**	5,6 ; 23,8	36,2*	24,7 ; 48,8	15-24 ans
26,3	21,1 ; 31,9	52,4	45,6 ; 58,9	21,4	16,1 ; 27,0	25-44 ans
47,1	41,2 ; 53,4	43,3	37,3 ; 49,1	9,6*	6,1 ; 13,7	45-64 ans
85,6	79,0 ; 91,5	x	;	x	;	65 ans et plus
		P = 0,000				Femmes
59,9*	40,9 ; 77,8	19,1**	3,5 ; 36,9	21,0**	7,4 ; 37,4	15-17 ans
32,7*	17,4 ; 48,3	35,5*	20,3 ; 50,8	31,8*	17,0 ; 47,4	18-24 ans
		P = 0,000				
45,1	33,6 ; 56,9	28,0*	17,4 ; 38,9	26,9*	16,9 ; 37,9	15-24 ans
41,5	35,4 ; 47,2	49,6	43,7 ; 55,5	9,0*	5,5 ; 12,7	25-44 ans
58,5	53,2 ; 63,8	37,2	32,0 ; 42,2	4,3**	1,9 ; 7,1	45-64 ans
92,2	86,6 ; 96,9	x	;	x	;	65 ans et plus

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	43,9	50,1	37,9	47,9	45,4 ; 50,5	53,2	49,4 ; 56,9	42,8	39,5 ; 46,2
Non	56,1	49,9	62,1	52,1	49,5 ; 54,6	46,8	43,1 ; 50,6	57,2	53,8 ; 60,5
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	10,6	14,4	6,8	11,3	9,6 ; 13,0	14,7	12,1 ; 17,3	7,9	6,0 ; 10,0
Non	89,4	85,6	93,2	88,7	87,0 ; 90,4	85,3	82,7 ; 87,9	92,1	90,0 ; 94,0
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,030			
Oui	7,3	9,1	5,5	9,1	7,5 ; 10,8	10,8	8,5 ; 13,4	7,4	5,6 ; 9,5
Non	92,7	90,9	94,5	90,9	89,2 ; 92,5	89,2	86,6 ; 91,5	92,6	90,5 ; 94,4
<b>Ecstasy</b>		P = 0,000				P = 0,036			
Oui	5,1	6,3	3,9	6,2	4,8 ; 7,6	7,6	5,5 ; 10,0	4,7*	3,1 ; 6,4
Non	94,9	93,7	96,1	93,8	92,4 ; 95,2	92,4	90,0 ; 94,5	95,3	93,6 ; 96,9
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	12,3	16,1	8,7	13,4	11,7 ; 15,3	17,8	15,0 ; 20,9	9,0	7,1 ; 11,1
Non	87,7	83,9	91,3	86,6	84,7 ; 88,3	82,2	79,1 ; 85,0	91,0	88,9 ; 92,9
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,071				P = 0,294			
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,4**	0,2 ; 0,8	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;
Non	99,5	99,4	99,6	99,6	99,2 ; 99,8	99,4	98,8 ; 99,9	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,000				P = 0,106			
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,7**	0,2 ; 1,2	1,1**	0,2 ; 2,1	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,3	98,8 ; 99,8	98,9	97,9 ; 99,8	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,000				P = 0,339			
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,9**	0,4 ; 1,5	1,2**	0,4 ; 2,2	0,6**	0,1 ; 1,3
Non	99,2	98,8	99,7	99,1	98,5 ; 99,6	98,8	97,8 ; 99,6	99,4	98,7 ; 99,9
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,179				P = 0,608			
Oui	1,8	1,9	1,6	1,6*	1,0 ; 2,3	1,8**	0,9 ; 2,9	1,5**	0,8 ; 2,3
Non	98,2	98,1	98,4	98,4	97,7 ; 99,0	98,2	97,1 ; 99,1	98,5	97,7 ; 99,2
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,000				P = 0,110			
Oui	1,6	2,3	0,9	2,3*	1,5 ; 3,2	3,0**	1,6 ; 4,7	1,6**	0,8 ; 2,6
Non	98,4	97,7	99,1	97,7	96,8 ; 98,5	97,0	95,3 ; 98,4	98,4	97,4 ; 99,2
<b>Drogues par injection</b>		P = 0,000				P = 0,072			
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,7**	0,3 ; 1,3	1,2**	0,4 ; 2,2	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,3	98,7 ; 99,7	98,8	97,8 ; 99,6	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui	12,2	16,2	8,3	12,0	10,1 ; 13,8	16,3	13,3 ; 19,4	7,8	5,8 ; 9,9	
Non	87,8	83,8	91,7	88,0	86,2 ; 89,9	83,7	80,6 ; 86,7	92,2	90,1 ; 94,2	
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,479				
Oui	1,6	2,3	0,8	1,2*	0,6 ; 1,9	1,4**	0,5 ; 2,5	1,0**	0,3 ; 1,8	
Non	98,4	97,7	99,2	98,8	98,1 ; 99,4	98,6	97,5 ; 99,5	99,0	98,2 ; 99,7	
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,353				
Oui	1,8	2,4	1,3	1,9*	1,1 ; 2,8	1,5**	0,6 ; 2,5	2,3**	1,1 ; 3,7	
Non	98,2	97,6	98,7	98,1	97,2 ; 98,9	98,5	97,5 ; 99,4	97,7	96,3 ; 98,9	
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,490				
Oui	1,4	1,7	1,0	2,2*	1,4 ; 3,2	1,9**	0,8 ; 3,2	2,6**	1,3 ; 4,0	
Non	98,6	98,3	99,0	97,8	96,8 ; 98,6	98,1	96,8 ; 99,2	97,4	96,0 ; 98,7	
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,958				
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,6**	0,2 ; 1,1	0,6**	0,1 ; 1,3	x	;	
Non	99,2	98,8	99,6	99,4	98,9 ; 99,8	99,4	98,7 ; 99,9	x	;	
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 'n.d.'				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = 0,008				
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;	
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;	
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,568				
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,4**	0,1 ; 0,8	x	;	0,5**	0,0 ; 1,1	
Non	99,6	99,6	99,7	99,6	99,2 ; 99,9	x	;	99,5	98,9 ; 100,0	
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = .				
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;	
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;	

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	12,8	10,9 ; 14,7	17,0	13,9 ; 20,2	8,7	6,6 ; 10,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	23,3*	13,1 ; 35,0	25,1**	10,4 ; 41,7	21,0**	7,4 ; 37,4
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	40,3	28,5 ; 52,2	49,5*	30,9 ; 68,3	31,8*	17,0 ; 47,4
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	15,1	11,9 ; 18,4	21,4	16,1 ; 27,0	9,0*	5,5 ; 12,7
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	6,9*	4,7 ; 9,2	9,6*	6,1 ; 13,7	4,3**	1,9 ; 7,1
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	29,7	27,3 ; 32,1	7,3	6,0 ; 8,8	12,5	10,8 ; 14,4
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	28,3	9,5	14,0	30,6	26,8 ; 34,2	7,7	5,7 ; 9,9	16,3	13,4 ; 19,3
Femmes	25,4	6,8	7,4	28,8	25,6 ; 32,0	6,9	5,1 ; 8,7	8,9	6,9 ; 11,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	22,9*	11,9 ; 34,5	x	;	10,8**	3,1 ; 19,5
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	32,7*	21,0 ; 44,2	6,2**	1,7 ; 11,9	30,7*	19,5 ; 42,1
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,4	8,4	15,9	27,7	20,0 ; 35,8	4,1**	1,5 ; 7,2	20,7*	13,9 ; 27,9
45-64 ans	29,9	12,3	16,1	36,8	32,4 ; 40,8	11,3	8,5 ; 14,3	18,0	14,6 ; 21,4
65 ans et plus	29,0	7,1	7,2	31,5	27,5 ; 35,2	7,3	5,2 ; 9,7	8,3	6,3 ; 10,7
Hommes	7,1	0,5**	0,4**	9,2*	5,7 ; 13,2	x	;	x	;
Hommes	P = 0,000			P = 0,304					
15-17 ans	31,4	6,9**	6,7**	23,0**	8,3 ; 39,3	x	;	x	;
18-24 ans	33,9	9,9	25,6	29,2**	12,2 ; 46,6	x	;	40,6*	23,3 ; 59,9
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,051					
25-44 ans	33,0	8,7	18,3	25,8*	15,1 ; 37,7	x	;	22,9*	12,9 ; 34,1
45-64 ans	29,0	13,5	21,1	34,9	28,8 ; 40,9	13,2*	8,8 ; 18,2	25,6	20,0 ; 31,3
65 ans et plus	32,2	9,0	10,0	35,6	29,3 ; 41,6	7,5*	4,5 ; 10,9	9,8*	6,5 ; 13,6
Femmes	10,0	0,8**	0,6**	11,3*	6,1 ; 17,2	x	;	x	;
Femmes	P = 0,000			P = 0,073					
15-17 ans	24,6	3,4*	10,9*	22,7**	8,0 ; 39,5	x	;	14,4**	1,2 ; 29,9
18-24 ans	39,2	10,7	15,0	35,9*	20,4 ; 51,4	9,9**	2,0 ; 19,7	21,5**	8,9 ; 35,4
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,8	8,1	13,5	29,9*	18,6 ; 41,2	6,8**	2,0 ; 12,5	18,2*	9,5 ; 28,3
45-64 ans	30,8	11,0	11,0	38,6	32,8 ; 44,7	9,4*	6,2 ; 13,0	10,5*	6,9 ; 14,5
65 ans et plus	25,9	5,3	4,5	27,5	22,8 ; 32,2	7,2*	4,1 ; 10,6	6,8*	4,1 ; 9,9

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	81,0	79,1 ; 82,8	84,5	81,7 ; 87,1	77,6	75,0 ; 80,0
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	50,0	37,7 ; 63,0	49,6*	31,8 ; 67,9	50,5*	31,0 ; 69,1
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	86,4	77,5 ; 94,6	95,2	86,3 ; 100,0	78,2	63,7 ; 92,7
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	68,1	60,1 ; 76,0	70,3	58,6 ; 81,8	65,5	54,4 ; 76,6
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	95,4	93,2 ; 97,3	95,0	91,1 ; 98,0	95,9	93,4 ; 97,9
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	87,5	85,2 ; 89,8	91,8	88,7 ; 94,6	83,3	79,4 ; 86,8
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	66,0	60,9 ; 70,5	71,3	64,2 ; 77,6	58,9	51,7 ; 65,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	82,8	78,9 ; 86,3	88,2	82,3 ; 93,3	78,0	72,0 ; 83,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	90,8	88,2 ; 93,3	93,6	90,2 ; 96,6	88,2	84,2 ; 92,1
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	89,5	86,2 ; 92,4	92,9	88,6 ; 96,8	86,7	81,5 ; 91,1
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	90,0	88,1 ; 91,7	88,3	85,3 ; 91,0	91,8	89,4 ; 93,9
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	8,4	6,8 ; 10,1	9,4	7,0 ; 12,1	7,3	5,3 ; 9,6
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,6*	0,9 ; 2,4	2,3**	1,1 ; 3,8	0,8**	0,2 ; 1,7
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	47,7	46,3 ; 49,2	1,0**	0,2 ; 2,2	97,9	96,7 ; 98,9
Femmes	51,5	97,5	0,8	51,6	50,2 ; 52,9	98,5	97,2 ; 99,5	1,2**	0,5 ; 2,0
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,7**	0,2 ; 1,3	x	;	0,9**	0,1 ; 1,9

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	90,0	88,1 ; 91,7	8,4	6,8 ; 10,1	1,6*	0,9 ; 2,4
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,114					
Hommes	86,4	10,7	2,9	88,3	85,3 ; 91,0	9,4	7,0 ; 12,1	2,3**	1,1 ; 3,8
Femmes	91,6	7,4	0,9*	91,8	89,4 ; 93,9	7,3	5,3 ; 9,6	0,8**	0,2 ; 1,7
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,187					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	57,8*	38,1 ; 75,1	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	72,0	59,6 ; 83,1	x	;	x	;
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	66,7	56,1 ; 76,2	28,7*	19,5 ; 38,7	4,5**	0,6 ; 9,6
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	90,0	87,2 ; 92,5	7,9	5,7 ; 10,4	2,1**	1,0 ; 3,3
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	96,1	94,5 ; 97,6	x	;	x	;
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	99,2	97,5 ; 100,0	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,627					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	x	;	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	89,4	86,5 ; 92,0	8,5	6,1 ; 11,1	2,2**	1,0 ; 3,6
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,049					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	92,5	90,3 ; 94,6	x	;	x	;
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	49,3	45,2 ; 53,0	64,5	59,6 ; 69,1
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000	...	...	...
15-24 ans	87,9	...	89,0	78,4 ; 98,0	...	;
25-44 ans	62,4	...	60,5	53,9 ; 67,1	...	;
45-64 ans	29,9	...	32,8	26,2 ; 39,0	...	;
65 ans et plus	7,3	...	10,3**	3,2 ; 19,1	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...	...	P = 0,000	...
15-24 ans	...	90,0	...	;	85,4	74,8 ; 94,5
25-34 ans	...	71,0	...	;	72,8	64,5 ; 80,9
35-49 ans	...	53,5	...	;	52,5	45,7 ; 59,3
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,431	...	P = 0,688	...
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	43,6	35,3 ; 52,0	64,3	48,9 ; 80,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	51,4	42,9 ; 59,4	60,8	50,8 ; 71,1
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	52,3	44,6 ; 60,0	64,7	56,9 ; 72,1
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	49,4	39,7 ; 58,7	69,3	59,8 ; 78,6
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	...	P = 0,000	...
Un partenaire	43,8	64,2	45,8	41,3 ; 49,9	61,6	56,3 ; 66,6
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	74,0	61,2 ; 85,3	86,1	75,5 ; 95,2
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	89,9	67,9 ; 100,0	87,8	47,7 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = 0,317	...	P = 0,604	...
Hommes	x	66,6	x	;	64,4	59,5 ; 69,1
Femmes	47,8	x	49,1	45,0 ; 53,0	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	12,9	11,0 ; 15,0	11,1	9,2 ; 13,1	76,0	73,5 ; 78,2
Sexe	P = 0,093			P = 0,110					
Hommes	14,8	14,9	70,3	15,0	12,2 ; 18,0	10,5	7,8 ; 13,4	74,4	71,0 ; 77,7
Femmes	13,2	14,7	72,1	10,6	8,2 ; 13,3	11,7	9,0 ; 14,5	77,6	74,4 ; 80,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	66,8	49,0 ; 84,7	x	;	x	;
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	39,8*	27,1 ; 53,5	28,6*	16,3 ; 41,3	31,6*	19,9 ; 44,0
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	49,8	39,1 ; 61,0	26,3*	16,8 ; 35,4	23,9*	15,6 ; 32,9
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	11,6	8,9 ; 14,5	15,5	12,3 ; 19,0	72,9	68,7 ; 76,7
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	4,0*	2,5 ; 5,7	3,5**	1,9 ; 5,4	92,5	90,1 ; 94,6
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	x	;	x	;	97,8	95,1 ; 100,0
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,105					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	15,7*	10,8 ; 21,0	8,9*	5,1 ; 13,1	75,4	69,7 ; 81,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	16,4	11,9 ; 21,4	11,7*	7,5 ; 15,9	71,8	66,6 ; 77,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	9,7*	6,7 ; 13,1	11,8	8,4 ; 15,7	78,4	73,9 ; 82,9
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	9,4*	6,2 ; 13,1	11,8*	8,2 ; 15,9	78,7	73,4 ; 83,5
Nombre de partenaires	P = 0,000			P = 0,000					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	9,5	7,6 ; 11,4	7,8	6,1 ; 9,6	82,7	80,4 ; 85,1
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	43,9	33,0 ; 55,5	38,1	27,4 ; 49,0	17,9*	10,6 ; 25,8
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	42,8**	18,8 ; 67,8	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	16,7	14,5 ; 19,0	18,2	15,1 ; 21,5	15,1	12,2 ; 18,2
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	71,0	53,1 ; 87,0	77,7	53,8 ; 98,0	62,3*	34,1 ; 87,2
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	46,4	33,0 ; 59,8	52,1*	32,0 ; 72,7	39,9*	22,0 ; 57,5
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	55,5	44,8 ; 66,2	62,0	46,5 ; 76,7	47,8	33,1 ; 62,3
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	17,9	14,8 ; 21,2	18,0	13,3 ; 23,0	17,8	13,5 ; 22,3
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	5,3*	3,5 ; 7,3	6,3*	3,6 ; 9,5	4,2**	1,8 ; 7,1
	3,1*	3,9*	1,8**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,537		P = 0,620		P = 0,867	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	16,8*	11,9 ; 22,5	18,6*	12,2 ; 25,6	13,9**	6,4 ; 22,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	19,3	14,5 ; 24,4	21,6*	14,1 ; 29,3	17,0*	10,8 ; 23,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	15,0	11,3 ; 18,8	15,9*	9,8 ; 22,4	14,1*	9,5 ; 19,1
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	15,9	11,7 ; 20,5	16,2*	9,6 ; 23,3	15,6*	10,1 ; 21,7
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	12,8	10,7 ; 15,0	13,5	10,5 ; 16,8	12,0	9,2 ; 15,0
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	53,5	42,3 ; 64,5	57,9	43,4 ; 72,5	47,5*	30,2 ; 64,7
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	44,6**	21,2 ; 70,0	36,2**	10,0 ; 68,1	69,2**	17,0 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,104		P = 0,056		P = 0,223	
Hommes	18,7	54,0	17,9	15,3	12,3 ; 18,2	41,3**	4,3 ; 100,0	15,0	12,0 ; 17,9
Femmes	19,2	19,2	x	17,7	14,6 ; 21,0	17,7	14,6 ; 21,0	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	9,9	8,4 ; 11,5	8,0	5,8 ; 10,4	11,9	9,8 ; 14,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,128		P = 0,012	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	9,5**	2,6 ; 17,8	x	;	12,2**	2,1 ; 23,6
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,002		P = 0,062		P = 0,019	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	6,3**	1,8 ; 11,7	x	;	8,8**	1,8 ; 17,0
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	14,5	11,4 ; 17,8	11,9*	7,4 ; 16,8	17,0	12,9 ; 21,6
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	9,1	7,0 ; 11,3	7,7*	4,8 ; 11,1	10,4*	7,4 ; 13,7
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,023		P = 0,656		P = 0,021	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	7,3*	4,4 ; 10,8	7,1**	2,9 ; 12,2	7,6*	3,9 ; 11,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	8,5*	6,0 ; 11,2	6,7**	3,2 ; 10,7	10,1*	6,3 ; 14,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	11,1	8,1 ; 14,1	8,6*	4,7 ; 13,1	13,3	9,3 ; 17,5
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	14,6	10,4 ; 19,0	11,0**	5,2 ; 17,6	17,6*	12,1 ; 23,6
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,145		P = 0,575		P = 0,062	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	9,9	8,1 ; 11,8	8,4*	5,8 ; 11,2	11,5	9,1 ; 14,1
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	14,4*	7,6 ; 21,7	8,9**	1,5 ; 17,7	21,8**	10,0 ; 35,6
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	21,7**	4,5 ; 43,8	x	;	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,026		P = 0,341		P = 0,006	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	12,2	9,8 ; 14,7	x	;	12,1	9,8 ; 14,6
Femmes	7,0	7,0	8,9**	8,6*	6,2 ; 11,2	8,6*	6,2 ; 11,3	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,019		P = 0,020		P = 0,065	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	42,5**	5,9 ; 79,4	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	9,8	8,2 ; 11,4	7,7*	5,5 ; 10,1	11,8	9,7 ; 14,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%		%	
			Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)	
Ensemble de la population	23,5	76,5	24,2*	14,5 ; 33,6	75,8	66,4 ; 85,5
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,049			
15-35 ans	25,6	74,4	26,9*	15,8 ; 37,8	73,1	62,2 ; 84,2
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,279			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	30,5**	8,4 ; 54,9	69,5*	45,1 ; 91,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	22,3**	9,3 ; 37,1	77,7	62,9 ; 90,7
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	x	;	x	;
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = .			
Né au Canada	24,8	75,2	24,8*	14,9 ; 34,4	75,2	65,6 ; 85,1
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Laurentides et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%		%		%	
				Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)		Intervalle de confiance (95 %)	
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	77,6	74,5 ; 80,7	14,4	12,2 ; 16,9	8,0	5,8 ; 10,4
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	70,9	55,5 ; 86,1	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	88,0	83,8 ; 91,8	6,1*	3,5 ; 9,2	5,9**	2,9 ; 9,4
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	70,6	66,2 ; 74,9	23,5	19,6 ; 27,6	5,9*	3,6 ; 8,6
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,005					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	65,7	56,9 ; 73,7	26,2	19,2 ; 33,9	8,1**	3,6 ; 13,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	73,4	66,6 ; 79,7	13,5*	9,2 ; 18,3	13,1*	7,6 ; 19,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	83,7	78,7 ; 88,3	10,3*	6,7 ; 14,2	6,0**	2,9 ; 9,5
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	84,8	79,2 ; 89,9	11,8*	7,5 ; 16,7	3,4**	0,4 ; 7,1
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,332					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	78,0	75,0 ; 81,1	14,6	12,3 ; 17,2	7,3	5,2 ; 9,7
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	x	;	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	71,4	50,3 ; 90,0	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région 16  
**MONTÉRÉGIE**

---



# 1 CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Tableau 1

**Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population		49,4	50,6			49,5	49,5 ; 49,5	50,5	50,5 ; 50,5
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	15,4	16,0	14,8	15,8	15,8 ; 15,8	16,5	16,4 ; 16,5	15,1	15,1 ; 15,2
25-44 ans	33,3	34,4	32,3	33,0	33,0 ; 33,1	33,6	33,6 ; 33,7	32,5	32,4 ; 32,5
45-64 ans	35,1	35,1	35,2	36,2	36,2 ; 36,2	36,0	35,9 ; 36,0	36,4	36,3 ; 36,4
65 ans et plus	16,1	14,6	17,6	15,0	15,0 ; 15,0	13,9	13,8 ; 13,9	16,0	16,0 ; 16,1
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	13,4	10,7	16,0	10,4	9,5 ; 11,6	8,0	6,7 ; 9,5	12,8	11,3 ; 14,5
Couple sans enfant	28,7	30,5	26,9	28,9	27,0 ; 30,8	30,0	27,4 ; 32,8	27,8	25,2 ; 30,5
Couple avec enfants	42,7	45,8	39,7	47,1	44,7 ; 49,4	51,4	47,8 ; 54,5	42,9	39,7 ; 45,9
Famille monoparentale	8,5	6,4	10,5	8,0	6,7 ; 9,3	6,3	4,6 ; 8,1	9,7	7,9 ; 11,6
Autre	6,7	6,5	6,9	5,6	4,3 ; 6,9	4,3*	2,8 ; 6,1	6,8	4,9 ; 8,7
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,256			P = 0,879					
Né au Canada	87,7	87,1	88,3	92,5	91,1 ; 93,8	92,1	90,1 ; 94,2	92,9	91,0 ; 94,7
Au Canada depuis moins de 5 ans	2,4	2,7	2,2	0,8**	0,4 ; 1,4	0,9**	0,2 ; 1,8	0,7**	0,1 ; 1,5
Au Canada depuis 5 ans et plus	9,8	10,2	9,4	6,7	5,3 ; 8,0	7,0	5,1 ; 8,9	6,4	4,6 ; 8,2
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,912			P = 0,495					
Au moins le français	86,5	86,6	86,4	90,4	88,9 ; 91,8	91,3	89,2 ; 93,4	89,4	87,4 ; 91,3
Au moins l'anglais, mais pas le français	9,3	9,3	9,4	7,5	6,2 ; 8,8	6,7	4,8 ; 8,6	8,3	6,5 ; 10,1
Ni français ni anglais	4,2	4,1	4,3	2,2*	1,3 ; 3,0	2,0**	0,9 ; 3,2	2,3**	1,2 ; 3,5
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,683			P = 0,834					
Niveau inférieur au DES	24,8	25,1	24,5	24,1	22,2 ; 26,1	24,2	21,4 ; 27,4	24,0	21,4 ; 26,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	25,3	25,4	25,2	28,0	25,7 ; 30,3	28,0	24,7 ; 31,3	27,9	24,9 ; 30,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	26,0	25,9	26,2	26,7	24,5 ; 28,9	27,4	23,9 ; 30,8	26,1	23,3 ; 28,8
Diplôme d'études universitaires	23,9	23,6	24,2	21,2	19,3 ; 23,2	20,3	17,6 ; 23,3	22,0	19,3 ; 24,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Quintile 1 (faible)	19,3	16,0	22,4	15,4	13,7 ; 17,1	13,1	10,8 ; 15,5	17,7	15,4 ; 20,2
Quintile 2	20,7	19,5	21,9	19,4	17,5 ; 21,4	17,2	14,5 ; 20,0	21,5	18,8 ; 24,5
Quintile 3	19,5	20,1	19,0	18,7	16,7 ; 20,7	19,2	16,3 ; 22,1	18,1	15,6 ; 20,8
Quintile 4	20,4	20,8	20,1	23,2	21,0 ; 25,4	23,4	20,2 ; 26,7	23,0	20,1 ; 25,9
Quintile 5 (élevé)	20,1	23,6	16,6	23,3	21,1 ; 25,3	27,0	23,7 ; 30,4	19,7	16,9 ; 22,3
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,034					
À l'aise financièrement	35,0	37,1	33,0	35,9	33,4 ; 38,3	36,2	32,7 ; 39,9	35,5	32,4 ; 38,8
Revenus suffisants	54,0	52,5	55,5	54,9	52,3 ; 57,4	56,7	52,9 ; 60,3	53,1	49,7 ; 56,3
Pauvre	9,4	8,9	9,9	7,9	6,6 ; 9,1	6,1	4,4 ; 7,8	9,6	7,8 ; 11,5
Très pauvre	1,6	1,6	1,7	1,4*	0,9 ; 2,0	1,0**	0,3 ; 1,9	1,8*	1,0 ; 2,8
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	60,2	65,6	54,9	62,6	60,9 ; 64,2	67,6	65,1 ; 69,9	57,6	55,1 ; 60,0
Étudiants	13,1	13,0	13,2	13,1	12,0 ; 14,2	13,1	11,4 ; 14,7	13,2	11,6 ; 14,7
Personnes sans emploi	7,2	3,5	10,8	5,8	4,7 ; 6,9	2,6*	1,5 ; 3,9	8,9	7,2 ; 10,8
Retraités	19,6	18,0	21,1	18,5	17,4 ; 19,6	16,7	15,2 ; 18,2	20,3	18,8 ; 21,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 2 ÉTAT DE SANTÉ

Tableau 2

### Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	55,7	53,3 ; 58,0	34,0	31,8 ; 36,2	10,3	8,9 ; 11,8
<b>Sexe</b>	P = 0,004			P = 0,809					
Hommes	56,6	33,5	9,9	56,5	52,7 ; 60,2	33,5	30,0 ; 36,9	10,0	8,0 ; 12,2
Femmes	55,5	32,8	11,7	55,0	51,8 ; 58,2	34,4	31,3 ; 37,4	10,6	8,8 ; 12,5
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	61,0	33,5	5,5	57,2	50,0 ; 64,4	39,2	32,0 ; 46,4	3,6**	1,2 ; 6,5
25-44 ans	64,8	29,1	6,1	61,2	56,8 ; 65,5	29,9	25,7 ; 34,0	8,9	6,3 ; 11,7
45-64 ans	53,7	33,3	13,0	56,1	52,4 ; 59,8	32,5	29,0 ; 36,1	11,4	9,0 ; 13,9
65 ans et plus	36,9	41,3	21,7	40,3	35,1 ; 45,4	41,3	36,0 ; 46,6	18,4	14,5 ; 22,5
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Personne seule	47,0	34,2	18,8	47,9	42,9 ; 52,8	30,6	26,1 ; 35,2	21,5	17,7 ; 25,6
Couple sans enfant	53,7	33,7	12,5	52,4	47,9 ; 56,8	35,2	31,4 ; 39,4	12,4	9,7 ; 15,4
Couple avec enfants	62,1	31,6	6,3	60,5	56,5 ; 64,6	32,9	29,1 ; 36,8	6,5	4,6 ; 8,6
Famille monoparentale	56,8	31,6	11,6	59,9	51,1 ; 68,6	31,4	23,2 ; 40,0	8,6**	4,3 ; 13,8
Autre	46,0	39,4	14,6	35,7*	24,7 ; 48,1	51,7	38,8 ; 63,6	12,6**	5,2 ; 21,3
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	39,5	40,4	20,1	40,0	35,3 ; 45,2	41,9	36,9 ; 47,0	18,1	14,5 ; 21,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	35,1	10,3	54,3	49,7 ; 58,9	36,3	31,8 ; 40,9	9,4	6,8 ; 11,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	62,1	30,3	7,6	61,0	56,1 ; 65,5	30,9	26,4 ; 35,2	8,1*	5,7 ; 10,9
Diplôme d'études universitaires	68,1	26,6	5,2	68,5	63,6 ; 73,4	26,3	21,8 ; 31,2	5,2**	2,8 ; 7,9
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	38,8	40,8	20,4	37,1	30,9 ; 42,8	43,5	37,1 ; 49,5	19,4	15,3 ; 24,1
Quintile 2 et suivants	60,7	31,0	8,3	59,3	56,6 ; 61,8	32,5	30,0 ; 35,0	8,2	6,8 ; 9,8
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	34,8	38,0	27,2	32,8	25,6 ; 40,5	39,6	31,8 ; 47,6	27,6	20,6 ; 35,0
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	32,5	8,6	58,1	55,5 ; 60,4	33,5	31,2 ; 36,0	8,4	7,1 ; 9,8
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Travailleurs	61,9	30,9	7,2	60,3	57,2 ; 63,2	32,3	29,3 ; 35,3	7,5	5,9 ; 9,2
Étudiants	62,7	32,2	5,0	58,5	50,3 ; 66,7	36,7	28,5 ; 44,9	4,8**	1,5 ; 8,8
Personnes sans emploi	36,9	37,2	25,8	37,8	28,3 ; 48,3	35,8	26,3 ; 45,3	26,4*	17,4 ; 35,8
Retraités	40,2	39,5	20,4	43,3	38,6 ; 48,2	38,2	33,3 ; 43,1	18,5	15,1 ; 22,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3

**Répartition de la population selon la perception de l'état de santé et certaines caractéristiques de santé, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellent ou très bon	Bon	Passable ou mauvais	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,1	33,1	10,8	55,7	53,3 ; 58,0	34,0	31,8 ; 36,2	10,3	8,9 ; 11,8
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,9	37,6	15,4	40,9	35,9 ; 46,3	42,2	36,9 ; 47,6	16,9	13,2 ; 20,8
Non-fumeur	59,0	31,7	9,3	60,3	57,7 ; 62,9	31,4	29,0 ; 34,0	8,2	6,8 ; 9,8
Statut pondéral	P = 0,000			P = 0,007					
Poids insuffisant	55,6	30,8	13,6*	63,1	45,0 ; 81,2	26,5**	10,9 ; 43,0	10,4**	1,0 ; 22,8
Poids normal	62,6	29,4	8,0	59,8	55,9 ; 63,3	32,7	29,2 ; 36,2	7,5	5,7 ; 9,6
Surplus de poids (embonpoint ou obésité)	49,9	37,1	13,1	51,6	48,2 ; 54,9	35,9	32,7 ; 39,0	12,5	10,5 ; 14,8
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000			P = 0,000					
Très satisfaisante	64,2	28,3	7,5	62,7	59,1 ; 66,2	29,2	25,8 ; 32,5	8,1	6,1 ; 10,1
Plutôt satisfaisante	51,4	37,6	11,1	51,7	47,9 ; 55,4	38,2	34,8 ; 41,8	10,1	8,2 ; 12,3
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	35,0	30,8	32,4	23,5 ; 42,4	38,9	28,7 ; 49,4	28,7	20,2 ; 38,3
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	37,3	39,5	23,1	36,6	31,4 ; 41,7	44,4	39,2 ; 49,8	19,0	15,1 ; 23,1
Faible à modéré	62,0	31,1	6,9	61,6	58,9 ; 64,3	30,8	28,4 ; 33,4	7,6	6,1 ; 9,0

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

### 3 SANTÉ MENTALE

Tableau 4

**Répartition de la population selon la satisfaction à l'égard de sa vie sociale et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Très satisfaisante	Plutôt satisfaisante	Plutôt ou très insatisfaisante	Très satisfaisante		Plutôt satisfaisante		Plutôt ou très insatisfaisante	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,3	46,2	6,5	46,7	44,2 ; 49,1	47,8	45,2 ; 50,3	5,6	4,6 ; 6,6
<b>Sexe</b>	P = 0,097			P = 0,100					
Hommes	47,5	46,6	6,0	47,4	43,7 ; 51,3	48,2	44,4 ; 51,8	4,4*	3,0 ; 5,8
Femmes	47,1	45,9	7,0	45,9	42,6 ; 49,2	47,3	44,1 ; 50,6	6,8	5,3 ; 8,4
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,044					
15-24 ans	54,7	41,5	3,7*	47,8	40,0 ; 54,9	47,9	40,8 ; 55,2	4,3**	1,7 ; 7,6
25-44 ans	43,9	48,9	7,1	44,6	40,2 ; 49,2	49,6	44,9 ; 54,1	5,8*	3,9 ; 7,9
45-64 ans	45,1	47,5	7,4	43,9	40,1 ; 47,9	50,1	46,0 ; 54,0	6,0	4,3 ; 7,8
65 ans et plus	52,4	42,0	5,6	57,1	51,5 ; 62,6	37,5	32,5 ; 42,9	5,4*	3,1 ; 7,7
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Personne seule	38,2	49,2	12,5	41,4	36,6 ; 46,5	46,3	41,3 ; 51,2	12,3	9,0 ; 16,0
Couple sans enfant	52,7	43,0	4,2	52,3	48,0 ; 56,5	44,8	40,7 ; 49,2	2,9**	1,4 ; 4,4
Couple avec enfants	48,1	46,5	5,4	45,1	41,0 ; 49,0	49,5	45,4 ; 53,5	5,4*	3,7 ; 7,2
Famille monoparentale	39,6	51,9	8,6	41,7	32,9 ; 50,4	50,2	40,9 ; 58,7	8,1**	4,3 ; 12,7
Autre	44,5	46,1	9,4*	40,8*	28,1 ; 53,4	52,2	39,5 ; 65,5	6,9**	1,4 ; 14,0
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,017					
Niveau inférieur au DES	51,9	42,1	6,0	54,3	49,1 ; 59,4	41,3	36,2 ; 46,6	4,3*	2,6 ; 6,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	48,2	46,1	5,8	46,7	42,2 ; 51,7	47,6	42,8 ; 52,2	5,8*	3,7 ; 8,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	44,9	47,7	7,4	41,6	36,9 ; 46,6	51,4	46,3 ; 56,4	6,9*	4,6 ; 9,5
Diplôme d'études universitaires	44,2	49,1	6,7	45,1	39,6 ; 50,4	50,2	44,7 ; 55,4	4,7*	2,7 ; 7,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,006					
Quintile 1 (faible)	39,6	48,4	12,0	41,0	35,1 ; 47,0	49,5	43,3 ; 55,7	9,5*	6,6 ; 12,7
Quintile 2 et suivants	49,1	45,6	5,2	47,7	45,0 ; 50,5	47,4	44,5 ; 50,0	5,0	3,9 ; 6,2
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	29,0	51,7	19,3	23,7	17,1 ; 30,4	59,6	51,8 ; 67,1	16,7*	11,2 ; 22,6
À l'aise ou revenus suffisants	49,6	45,7	4,8	48,9	46,4 ; 51,7	46,7	44,0 ; 49,4	4,3	3,4 ; 5,4
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Travailleurs	45,8	47,8	6,5	45,0	41,7 ; 48,2	49,9	46,7 ; 53,2	5,1	3,8 ; 6,4
Étudiants	53,0	43,2	3,8*	47,5	39,6 ; 55,6	48,2	40,1 ; 56,2	4,3**	1,4 ; 8,0
Personnes sans emploi	38,2	48,1	13,7	38,0	28,1 ; 47,6	48,3	38,5 ; 58,3	13,7**	7,0 ; 21,4
Retraités	51,9	42,8	5,3	55,4	50,5 ; 60,4	40,0	35,0 ; 44,7	4,6*	2,7 ; 6,7
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	53,9	42,1	3,9	52,4	49,1 ; 55,7	44,3	41,0 ; 47,6	3,2*	2,2 ; 4,4
Bon	40,5	52,6	6,9	40,0	35,8 ; 44,4	53,6	49,3 ; 57,9	6,4*	4,3 ; 8,6
Passable ou mauvais	33,3	48,0	18,7	37,1	29,2 ; 44,3	47,2	39,9 ; 54,9	15,7*	11,1 ; 20,9
<b>Niveau de détresse psychologique</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	27,7	55,6	16,8	30,4	25,5 ; 35,3	56,7	51,3 ; 61,8	12,9	9,7 ; 16,2
Faible à modéré	52,8	43,7	3,5	51,5	48,8 ; 54,4	45,2	42,2 ; 47,9	3,3*	2,3 ; 4,3
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	21,3	49,3	29,4	10,4**	1,1 ; 21,6	56,0	39,0 ; 71,0	33,6*	20,2 ; 49,3
Non	48,1	46,1	5,8	47,9	45,4 ; 50,3	47,5	44,9 ; 50,0	4,6	3,7 ; 5,6

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 5

**Répartition de la population selon le niveau de détresse psychologique (K6) et certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Élevé	Faible à modéré	Élevé		Faible à modéré	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	22,2	77,8	22,7	20,7 ; 24,9	77,3	75,1 ; 79,3
<b>Sexe</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Hommes	18,2	81,8	17,9	15,2 ; 20,9	82,1	79,1 ; 84,8
Femmes	26,0	74,0	27,5	24,5 ; 30,7	72,5	69,3 ; 75,5
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000		P = 0,002			
15-24 ans	24,4	75,6	29,7	23,0 ; 36,7	70,3	63,3 ; 77,0
25-44 ans	24,3	75,7	24,3	20,7 ; 28,1	75,7	71,9 ; 79,3
45-64 ans	20,6	79,4	21,3	18,0 ; 24,7	78,7	75,3 ; 82,0
65 ans et plus	18,8	81,2	14,9	11,2 ; 18,8	85,1	81,2 ; 88,8
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Personne seule	25,7	74,3	25,3	20,7 ; 29,7	74,7	70,3 ; 79,3
Couple sans enfant	17,7	82,3	15,9	12,9 ; 19,3	84,1	80,7 ; 87,1
Couple avec enfants	20,8	79,2	23,8	20,5 ; 27,2	76,2	72,8 ; 79,5
Famille monoparentale	32,2	67,8	32,1	23,9 ; 40,7	67,9	59,3 ; 76,1
Autre	29,7	70,3	31,1*	19,6 ; 43,3	68,9	56,7 ; 80,4
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000		P = 0,001			
Niveau inférieur au DES	26,3	73,7	26,0	21,7 ; 30,5	74,0	69,5 ; 78,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	76,9	26,2	21,8 ; 30,6	73,8	69,4 ; 78,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	21,5	78,5	22,6	18,6 ; 26,8	77,4	73,2 ; 81,4
Diplôme d'études universitaires	18,0	82,0	15,0	11,3 ; 18,6	85,0	81,4 ; 88,7
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000		P = 0,009			
Quintile 1 (faible)	33,6	66,4	29,5	23,9 ; 35,6	70,5	64,4 ; 76,1
Quintile 2 et suivants	19,6	80,4	21,7	19,5 ; 24,1	78,3	75,9 ; 80,5
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Pauvre ou très pauvre	44,6	55,4	49,6	41,5 ; 57,5	50,4	42,5 ; 58,5
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	80,7	20,0	17,9 ; 22,0	80,0	78,0 ; 82,1
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Travailleurs	20,9	79,1	22,0	19,3 ; 24,7	78,0	75,3 ; 80,7
Étudiants	24,8	75,2	29,3	21,8 ; 37,0	70,7	63,0 ; 78,2
Personnes sans emploi	37,9	62,1	41,0	31,1 ; 51,1	59,0	48,9 ; 68,9
Retraités	18,2	81,8	14,4	11,2 ; 17,8	85,6	82,2 ; 88,8
<b>Perception de l'état de santé</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Excellent ou très bon	14,6	85,4	14,9	12,5 ; 17,4	85,1	82,6 ; 87,5
Bon	26,6	73,4	29,8	25,8 ; 34,1	70,2	65,9 ; 74,2
Passable ou mauvais	48,8	51,2	42,5	35,3 ; 50,0	57,5	50,0 ; 64,7
<b>Satisfaction à l'égard de sa vie sociale</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Très satisfaisante	12,9	87,1	14,8	12,2 ; 17,7	85,2	82,3 ; 87,8
Plutôt satisfaisante	26,5	73,5	27,0	23,9 ; 30,3	73,0	69,7 ; 76,1
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	42,2	53,6	43,0 ; 64,0	46,4	36,0 ; 57,0
<b>Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	71,3	28,7	75,0	60,2 ; 89,3	25,0**	10,7 ; 39,8
Non	20,6	79,4	21,0	19,0 ; 23,1	79,0	76,9 ; 81,0
<b>Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois</b>	P = 0,000		P = 0,000			
Oui	83,8	16,2**	x	;	x	;
Non	21,8	78,2	22,3	20,3 ; 24,5	77,7	75,5 ; 79,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir eu des idées suicidaires sérieuses<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	2,3	2,5	2,2	2,4*	1,7 ; 3,2	1,9*	1,0 ; 3,0	2,9*	1,9 ; 4,2
Groupe d'âge	P = 0,022	P = 0,121	P = 0,273	P = 0,170		P = 0,554		P = 0,301	
15-24 ans	2,9*	3,3*	2,4*	4,4**	1,6 ; 7,8	x	;	5,5**	0,9 ; 11,3
25-44 ans	2,5	2,6*	2,3	2,5*	1,2 ; 4,0	2,0**	0,4 ; 3,9	3,0**	1,0 ; 5,4
45-64 ans	2,4	2,5	2,3	1,9*	1,0 ; 2,9	1,4**	0,3 ; 2,9	2,3**	0,9 ; 3,9
65 ans et plus	1,3*	1,3*	1,4*	1,4**	0,3 ; 3,0	x	;	1,7**	0,3 ; 3,5
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,031		P = 0,248		P = 0,054	
Personne seule	4,0	5,4	3,1	5,5*	3,2 ; 7,9	5,0**	1,5 ; 9,3	5,8**	2,9 ; 8,9
Couple sans enfant	1,6	1,6*	1,5*	1,0**	0,1 ; 2,2	x	;	x	;
Couple avec enfants	1,7	1,8*	1,6*	2,3**	1,1 ; 3,7	2,2**	0,6 ; 4,0	2,5**	0,6 ; 4,9
Famille monoparentale	4,4	3,7*	4,8*	4,2**	1,3 ; 7,8	x	;	6,3**	1,9 ; 12,0
Autre	4,2**	6,1**	2,4**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,499	P = 0,243	P = 0,846	P = 0,654		P = 0,643		P = 0,732	
Niveau inférieur au DES	2,6	3,1*	2,1	2,5**	1,1 ; 4,1	x	;	3,7**	1,5 ; 6,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,5	2,9	2,1*	2,7**	1,2 ; 4,5	2,3**	0,6 ; 4,5	3,1**	0,7 ; 6,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	2,3	2,1*	2,4*	2,9**	1,3 ; 4,7	2,6**	0,4 ; 5,4	3,1**	1,1 ; 5,8
Diplôme d'études universitaires	2,0*	2,0**	2,0*	1,5**	0,3 ; 2,8	x	;	1,8**	0,3 ; 3,6
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,536		P = 0,005	
Quintile 1 (faible)	3,7	4,2	3,4	4,9*	2,7 ; 7,6	x	;	6,5**	3,2 ; 10,5
Quintile 2 et suivants	2,0	2,2	1,8	1,9*	1,2 ; 2,7	1,8**	0,8 ; 3,0	2,0**	0,9 ; 3,2
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,344		P = 0,000	
Pauvre ou très pauvre	6,8	7,2	6,4	8,4*	4,3 ; 13,1	x	;	11,4**	5,3 ; 18,0
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	2,0	1,6	1,8*	1,1 ; 2,6	1,8**	0,8 ; 2,9	1,8**	0,9 ; 3,0
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,025	P = 0,001	P = 0,290		P = 0,899		P = 0,179	
Travailleurs	2,1	2,3	2,0	2,1*	1,3 ; 3,1	1,7**	0,7 ; 3,0	2,5**	1,3 ; 4,1
Étudiants	3,1*	3,6**	2,6*	4,0**	1,1 ; 7,9	x	;	6,0**	0,9 ; 12,7
Personnes sans emploi	4,7	6,2*	4,3*	4,0**	0,9 ; 8,0	x	;	4,4**	0,8 ; 8,9
Retraités	1,5	1,8*	1,4*	1,9**	0,7 ; 3,5	x	;	1,5**	0,3 ; 3,1
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,367		P = 0,003	
Excellent ou très bon	1,4	1,6*	1,2*	1,1**	0,4 ; 1,9	1,2**	0,2 ; 2,6	1,0**	0,2 ; 2,0
Bon	2,5	2,7	2,4	3,6*	2,1 ; 5,4	2,8**	1,0 ; 5,0	4,4**	1,9 ; 7,4
Passable ou mauvais	6,8	7,2	6,5	5,7**	2,7 ; 9,0	x	;	8,4**	3,4 ; 14,1
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,007		P = 0,000	
Très satisfaisante	1,0	1,1*	1,0*	0,5**	0,0 ; 1,2	x	;	1,1**	0,1 ; 2,3
Plutôt satisfaisante	2,5	2,7	2,2	2,8*	1,7 ; 4,2	2,7**	1,1 ; 4,6	3,0**	1,1 ; 5,1
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	12,2	9,5	15,4*	9,0 ; 22,9	13,9**	2,6 ; 27,5	16,4*	8,3 ; 25,9
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,000	
Élevé	7,7	9,0	6,8	8,1*	5,5 ; 11,0	7,0**	3,2 ; 11,7	8,9*	5,2 ; 12,8
Faible à modéré	0,9	1,1	0,6*	0,8**	0,3 ; 1,4	0,8**	0,1 ; 1,6	0,7**	0,1 ; 1,6

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7

**Proportion des personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,2*	0,7*	0,6**	0,2 ; 1,0	x	;	0,9**	0,3 ; 1,8
Groupe d'âge	P = 0,047	P = 0,977	P = 0,023	P = 0,646		P = 0,524		P = 0,556	
15-24 ans	0,5*	0,2**	0,8**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,2**	1,0*	0,9**	0,2 ; 2,0	x	;	1,7**	0,2 ; 3,7
45-64 ans	0,4*	0,3**	0,5**	x	;	x	;	x	;
65 ans et plus	0,1**	0,2**	0,1**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,005	P = 0,000	P = 0,001		P = 0,779		P = 0,016	
Personne seule	0,7*	0,8**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Couple sans enfant	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
Couple avec enfants	0,3*	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Famille monoparentale	1,6**	0,6**	2,2**	3,3**	0,3 ; 7,2	x	;	x	;
Autre	0,5**	x	0,6**	x	;	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,042	P = 0,174	P = 0,161	P = 0,749		P = 0,603		P = 0,377	
Niveau inférieur au DES	0,8*	0,4**	1,1*	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,5*	0,3**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	0,4**	0,1**	0,7**	x	;	x	;	x	;
Diplôme d'études universitaires	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,019	P = 0,007	P = 0,256		P = .		P = 0,896	
Quintile 1 (faible)	0,9*	0,5**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Quintile 2 et suivants	0,3*	0,2*	0,5*	0,5**	0,1 ; 1,0	x	;	1,0**	0,2 ; 1,9
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,005		P = .		P = 0,060	
Pauvre ou très pauvre	1,4*	1,1**	1,6**	2,9**	0,3 ; 6,1	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	0,3*	0,1**	0,6*	0,3**	0,0 ; 0,7	x	;	0,7**	0,1 ; 1,4
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,000	
Excellent ou très bon	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Bon	0,3*	0,2**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Passable ou mauvais	2,0*	0,8**	2,9*	4,4**	1,2 ; 8,1	x	;	7,5**	1,7 ; 14,2
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,003		P = 0,000	
Très satisfaisante	0,2**	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Plutôt satisfaisante	0,5*	0,2**	0,6*	x	;	x	;	x	;
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,2**	3,2**	5,0**	0,7 ; 10,4	x	;	x	;
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = .		P = 0,001	
Élevé	1,7	0,7*	2,3*	1,9**	0,4 ; 3,7	x	;	2,9**	0,6 ; 5,8
Faible à modéré	0,1**	0,1**	0,1**	x	;	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8

**Répartition de la population selon la présence ou non d'idées suicidaires sérieuses ou d'une tentative de suicide à vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Idées suicidaires sérieuses à vie<sup>1</sup></b>		P = 0,553				P = 0,045				
Oui	10,2	10,0	10,3	9,8	8,3 ; 11,4	8,3	6,3 ; 10,3	11,3	9,3 ; 13,7	
Non	89,8	90,0	89,7	90,2	88,6 ; 91,7	91,7	89,7 ; 93,7	88,7	86,3 ; 90,7	
<b>Tentative de suicide à vie</b>		P = 0,000				P = 0,152				
Oui	4,4	3,5	5,3	5,0	4,0 ; 6,2	4,3*	2,9 ; 5,8	5,8	4,4 ; 7,4	
Non	95,6	96,5	94,7	95,0	93,8 ; 96,0	95,7	94,2 ; 97,1	94,2	92,6 ; 95,6	

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide à vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 4 BLESSURES

Tableau 9

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	12,9	9,2	11,8	10,2 ; 13,4	14,0	11,5 ; 16,7	9,6	7,7 ; 11,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,001		P = 0,066	
15-24 ans	17,5	22,5	12,3	14,9*	9,8 ; 20,3	21,1*	12,8 ; 30,3	8,2**	2,8 ; 14,0
25-44 ans	12,1	14,4	9,7	16,2	12,9 ; 19,5	18,7	13,4 ; 24,3	13,7	10,0 ; 17,6
45-64 ans	9,3	9,9	8,7	9,0	6,8 ; 11,6	9,8*	6,5 ; 13,6	8,3*	5,5 ; 11,5
65 ans et plus	6,5	5,9	7,0	5,4*	3,1 ; 8,0	5,2**	1,7 ; 9,3	5,7**	2,6 ; 9,0
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,024	P = 0,145		P = 0,051		P = 0,948	
Personne seule	9,5	9,4	9,5	9,8*	6,9 ; 12,9	10,0*	5,2 ; 15,3	9,6*	5,7 ; 13,6
Couple sans enfant	9,1	9,2	9,1	9,4	6,8 ; 12,0	9,2*	5,4 ; 13,1	9,7*	6,0 ; 13,5
Couple avec enfants	11,8	15,0	8,3	13,9	11,2 ; 16,8	18,1	13,7 ; 22,6	9,1*	6,0 ; 12,4
Famille monoparentale	13,3	17,5	10,8	12,7*	7,5 ; 18,5	14,6**	5,6 ; 24,8	11,5**	5,0 ; 19,3
Autre	14,9	16,7	13,2*	10,7**	3,8 ; 18,8	15,1**	2,1 ; 31,4	7,9**	0,3 ; 17,3
Niveau de scolarité	P = 0,231	P = 0,008	P = 0,662	P = 0,813		P = 0,613		P = 0,133	
Niveau inférieur au DES	10,8	12,2	9,3	11,0*	7,7 ; 14,4	11,7*	6,6 ; 16,9	10,3*	6,3 ; 14,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	11,9	14,9	8,9	11,8	8,7 ; 14,9	16,4*	11,1 ; 21,9	7,3*	4,1 ; 10,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	11,2	13,6	8,8	11,6	8,5 ; 14,9	14,9*	10,0 ; 20,2	8,2*	4,7 ; 12,3
Diplôme d'études universitaires	10,2	10,5	10,0	13,4	9,9 ; 17,4	12,9*	7,7 ; 18,9	13,8*	9,2 ; 18,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,421	P = 0,263	P = 0,419	P = 0,403		P = 0,649		P = 0,617	
Quintile 1 (faible)	10,5	11,6	9,7	10,2*	6,4 ; 14,4	12,1**	4,4 ; 20,1	8,9*	4,4 ; 20,1
Quintile 2 et suivants	11,1	13,2	9,0	12,4	10,7 ; 14,3	14,6	11,9 ; 17,7	10,1	11,9 ; 17,7
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,161		P = 0,161		P = 0,754	
Travailleurs	11,0	12,9	8,9	12,6	;	12,6	11,4 ; 17,8	10,3	7,8 ; 13,1
Étudiants	17,1	21,4	12,9	14,0*	;	14,0*	9,4 ; 29,5	9,1**	3,1 ; 15,4
Personnes sans emploi	9,5	12,1*	8,7	9,8**	;	9,8**	1,5 ; 42,4	6,6**	0,9 ; 13,2
Retraités	7,5	7,0	7,9	7,9*	;	7,9*	3,4 ; 11,4	8,4*	4,9 ; 12,2

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 10

**Répartition de la population selon les circonstances de la blessure la plus grave et le sexe, population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Fréquence des blessures</b>									
Une fois	79,1	79,4	78,8	78,5	72,3 ; 84,6	79,8	71,0 ; 87,6	76,6	67,9 ; 85,2
Deux fois ou plus	20,9	20,6	21,2	21,5	15,4 ; 27,7	20,2*	12,4 ; 29,0	23,4*	14,8 ; 32,1
<b>Activité pratiquée</b>									
Sport ou exercice physique	24,5	30,9	15,6	22,4	16,1 ; 29,2	29,0*	19,7 ; 39,6	12,9**	5,6 ; 21,1
Loisir ou passe-temps	12,5	12,5	12,4	15,1*	10,1 ; 20,7	14,3*	7,4 ; 21,6	16,4*	8,9 ; 24,7
Travail rémunéré	20,4	24,3	15,1	22,7	16,3 ; 29,5	27,9*	18,4 ; 38,0	15,2**	7,9 ; 23,8
Déplacement	7,7	4,5*	12,0	6,4**	3,3 ; 10,1	x	;	12,1**	5,8 ; 19,4
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	17,2	20,5	16,3*	10,9 ; 22,0	13,5**	6,7 ; 21,2	20,1*	11,6 ; 29,9
Sommeil, repas ou soins personnels	4,2	2,3**	6,9*	5,5**	2,0 ; 9,6	x	;	9,1**	2,6 ; 16,4
Autre	12,1	8,1	17,6	11,6*	7,0 ; 16,8	9,9**	3,7 ; 16,9	14,1*	7,4 ; 21,6
<b>Saison de la blessure</b>									
Hiver	26,0	25,0	27,4	30,2	23,3 ; 37,6	31,1*	21,0 ; 41,1	29,0*	19,2 ; 39,0
Printemps	21,2	20,7	21,9	13,9*	9,2 ; 19,2	13,8*	7,2 ; 21,5	13,9**	7,4 ; 21,7
Été	29,1	30,3	27,4	30,7	23,3 ; 37,8	26,3*	16,6 ; 35,8	37,1	26,4 ; 48,0
Automne	23,7	24,0	23,3	25,2	18,9 ; 31,9	28,8*	19,4 ; 39,1	20,0*	11,6 ; 29,0
<b>Lieu de la blessure</b>									
Résidence	39,7	32,0	49,8	39,2	31,9 ; 46,4	31,1*	21,3 ; 41,2	50,7	39,4 ; 61,4
Endroit public	28,1	24,8	32,5	28,6	21,6 ; 35,5	25,3*	15,1 ; 35,4	33,4*	23,3 ; 44,2
Lieu de sport ou de plein air	26,3	34,2	15,8	25,0	18,1 ; 32,2	33,6*	23,7 ; 44,2	x	;
Zone agricole, industrielle ou de construction	5,9	9,0	1,9*	7,2**	3,1 ; 11,9	10,0**	3,6 ; 17,7	x	;
<b>Cause de la blessure</b>									
Accident de transport	7,9	9,3	6,0*	7,0**	3,1 ; 11,3	9,4**	3,5 ; 16,1	x	;
Frappé/poussé/mordu accidentellement	3,8*	5,2*	1,9**	4,9**	1,5 ; 8,9	6,5**	1,4 ; 12,6	x	;
Heurt/écrasé accidentellement	5,7	6,2	5,0*	4,6**	1,6 ; 8,1	5,2**	0,8 ; 10,6	3,8**	0,4 ; 8,1
Contact avec une machine	7,8	9,1	6,1*	9,9*	5,1 ; 15,0	12,5**	5,5 ; 20,2	6,1**	0,5 ; 13,1
Fumée/feu/flamme	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	3,5*	3,8*	x	;	x	;	6,1**	1,3 ; 12,2
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	23,2	20,9	20,5	14,7 ; 26,9	22,2*	13,6 ; 31,2	17,9*	10,9 ; 26,0
Chute	34,6	30,5	40,3	30,6	23,7 ; 37,5	24,6*	16,1 ; 33,4	39,3	29,1 ; 49,7
Autres	13,7	12,5	15,3	16,8*	11,6 ; 22,7	15,4*	8,4 ; 23,2	19,0*	10,3 ; 28,0
<b>Partie du corps atteinte</b>									
Cou	2,3*	1,8*	3,0*	2,9**	0,5 ; 5,8	x	;	x	;
Membres supérieurs	26,1	29,5	21,5	29,8	22,5 ; 37,1	37,9	27,5 ; 48,3	18,3*	10,5 ; 27,3
Membres inférieurs	38,3	37,3	39,7	36,8	29,9 ; 44,1	32,7	23,4 ; 43,1	42,6	32,3 ; 53,4
Dos (partie supérieure)	3,3	2,9*	3,9*	2,9**	0,6 ; 5,7	x	;	x	;
Dos (partie inférieure)	18,1	17,7	18,7	17,8*	12,4 ; 23,9	17,3*	9,2 ; 25,9	18,6*	11,3 ; 26,9
Autre	11,9	10,9	13,2	9,8*	5,7 ; 14,3	7,8**	2,6 ; 13,9	12,5**	5,5 ; 20,2

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 11

**Proportion des personnes victimes d'une blessure non intentionnelle<sup>1</sup> causée par une chute au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques personnelles et les circonstances de la chute et le sexe, population de 65 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	3,9	2,8*	4,8	3,0**	1,2 ; 4,9	x	;	3,9**	1,4 ; 6,9
Groupe d'âge	P = 0,359	P = 0,965	P = 0,373	P = 0,600		P = 0,112		P = 0,985	
65-74 ans	3,7	3,0*	4,3	2,9**	0,7 ; 5,8	x	;	3,8**	0,2 ; 8,3
75-84 ans	3,9*	2,6**	4,9*	2,4**	0,2 ; 5,0	x	;	4,1**	0,3 ; 8,7
85 ans et plus	6,0**	x	7,2**	x	;	x	;	x	;
Composition du ménage	P = 0,009	P = 0,634	P = 0,017	P = 0,280		P = .		P = 0,175	
Personne vivant seule	5,4	2,4**	6,4	4,6**	1,3 ; 8,3	x	;	6,2**	1,8 ; 11,1
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,9*	3,7*	2,2**	0,2 ; 4,7	x	;	x	;
Perception de sa situation financière	P = 0,002	P = 0,557	P = 0,002	P = 0,023		P = 0,002		P = 0,051	
Pauvre ou très pauvre	6,8*	3,7**	8,7*	10,6**	0,9 ; 22,6	x	;	x	;
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,8*	4,0	2,2**	0,6 ; 4,3	x	;	3,4**	0,7 ; 6,8
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,067		P = 0,016		P = 0,124	
Passable ou mauvais	7,9	7,4**	8,2*	7,6**	2,1 ; 14,2	x	;	9,6**	2,3 ; 18,8
Excellent, très bon ou bon	2,8	1,9*	3,5	1,8**	0,2 ; 3,9	x	;	x	;
Présence de troubles musculosquelettiques <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,166	P = 0,000	P = 0,264		P = 0,887		P = 0,252	
Oui	5,9	3,6*	7,3	4,7**	0,9 ; 9,1	x	;	6,3**	0,9 ; 13,0
Non	2,7*	2,2**	3,1*	2,3**	0,5 ; 4,4	x	;	2,7**	0,2 ; 5,8
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,219	P = 0,000	P = 0,784		P = .		P = 0,619	
Élevé	6,8	4,0**	8,3*	x	;	x	;	x	;
Faible à modéré	3,0	2,6**	3,4	2,7**	0,9 ; 5,1	x	;	3,7**	0,7 ; 7,5
Lieu de la blessure non intentionnelle <sup>1</sup>	P = 0,139	P = 0,222	P = 0,962	P = 0,347		P = .		P = 0,756	
Résidence	62,7	52,8	68,6	55,9**	23,1 ; 90,4	x	;	71,8*	30,1 ; 100,0
Endroit public	65,7	62,9*	67,1	76,4*	34,9 ; 100,0	x	;	x	;
Lieu de sport ou de plein air	37,4**	25,7**	64,7*	x	;	x	;	x	;
Saison de la chute <sup>3</sup>									
Hiver	21,0*	30,6**	16,6*	x	;	x	;	x	;
Printemps	27,7*	25,2**	28,9*	x	;	x	;	x	;
Été	29,3*	28,8**	29,5*	x	;	x	;	x	;
Automne	22,0*	15,5**	25,1*	x	;	x	;	x	;
Façon dont la chute s'est produite <sup>3</sup>									
En patinant, skiant, etc.	2,4**	x	x	x	;	x	;	x	;
En montant ou descendant un escalier	16,8*	5,1**	22,4*	x	;	x	;	x	;
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	35,0*	9,1*	38,0**	5,9 ; 72,5	x	;	x	;
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	36,1**	43,3	41,4**	10,0 ; 75,9	x	;	57,5**	16,4 ; 92,1
En tombant d'un meuble	7,9**	6,7**	8,5**	x	;	x	;	x	;
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	10,1**	3,4**	x	;	x	;	x	;
Autre	8,9**	3,6**	11,4**	x	;	x	;	x	;

1. Cause d'une blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

3. Il s'agit de la répartition de la population victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon les circonstances.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 12

**Proportion des personnes victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,8	12,0	11,6	12,2	10,6 ; 13,8	11,9	9,4 ; 14,5	12,4	10,3 ; 14,6
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004		P = 0,093		P = 0,139	
15-24 ans	10,1	10,6	9,6	9,2*	5,1 ; 13,9	8,5**	2,6 ; 15,4	10,0**	3,9 ; 17,1
25-44 ans	13,7	14,7	12,6	15,1	12,1 ; 18,3	14,9*	10,3 ; 19,8	15,3	11,3 ; 19,5
45-64 ans	14,0	13,2	14,7	13,3	10,5 ; 16,1	13,4*	9,2 ; 17,7	13,2	9,8 ; 16,8
65 ans et plus	4,9	4,6	5,2	6,3*	3,8 ; 9,0	5,1**	1,9 ; 8,7	7,3**	3,7 ; 11,2
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,022	P = 0,010	P = 0,050		P = 0,058		P = 0,332	
Personne seule	10,0	11,0	9,3	9,4*	6,6 ; 12,4	11,1*	6,0 ; 16,5	8,3*	5,1 ; 12,0
Couple sans enfant	10,4	10,1	10,7	9,2	6,8 ; 11,6	6,6*	3,7 ; 9,6	11,8*	8,1 ; 15,7
Couple avec enfants	13,2	13,6	12,6	15,2	12,4 ; 18,1	15,3	11,1 ; 19,5	15,1	11,4 ; 19,0
Famille monoparentale	14,2	12,4	15,2	15,1*	8,9 ; 22,1	17,0**	5,2 ; 30,6	13,9*	7,1 ; 21,7
Autre	11,4	12,8*	10,2*	8,8**	1,6 ; 17,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,030	P = 0,215		P = 0,014		P = 0,757	
Niveau inférieur au DES	9,4	9,0	9,7	9,7*	6,7 ; 12,7	6,3**	2,8 ; 10,4	13,0*	8,6 ; 17,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	12,6	13,0	12,2	14,5	11,1 ; 17,8	18,1	12,6 ; 23,5	10,8*	7,2 ; 14,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	12,5	12,0	13,0	12,3	9,0 ; 15,7	10,7*	5,8 ; 16,1	14,0*	9,4 ; 18,7
Diplôme d'études universitaires	13,1	14,4	11,8	12,4	8,9 ; 16,0	12,2*	6,8 ; 17,9	12,5*	8,2 ; 17,3
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,014	P = 0,017	P = 0,318	P = 0,757		P = 0,756		P = 0,914	
Quintile 1 (faible)	10,2	9,4	10,9	11,7*	8,0 ; 16,0	10,9**	3,7 ; 19,0	12,4*	7,9 ; 17,6
Quintile 2 et suivants	12,2	12,5	11,8	12,4	10,5 ; 14,3	12,3	9,5 ; 15,0	12,6	10,2 ; 15,1
Perception de sa situation financière	P = 0,029	P = 0,536	P = 0,000	P = 0,524		P = 0,383		P = 0,988	
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,4	15,8	10,9*	6,4 ; 15,8	8,2**	1,2 ; 16,6	12,4*	6,7 ; 18,7
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	12,3	11,0	12,5	10,6 ; 14,2	12,5	9,7 ; 15,2	12,4	10,2 ; 14,8
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,041		P = 0,064		P = 0,347	
Travailleurs	13,9	14,2	13,5	13,8	11,6 ; 16,0	14,2	10,9 ; 17,5	13,3	10,5 ; 16,3
Étudiants	9,9	9,7	10,1	10,0*	5,1 ; 15,4	10,1**	2,5 ; 18,8	10,0**	4,2 ; 16,7
Personnes sans emploi	12,3	9,2*	13,3	14,0*	7,6 ; 20,9	x	;	16,6*	9,0 ; 24,8
Retraités	6,9	6,7	7,0	7,9*	5,3 ; 10,5	5,4**	2,2 ; 8,9	9,8*	5,8 ; 14,0

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 13

**Répartition de la population victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon l'activité pratiquée<sup>2</sup>, la partie du corps atteinte et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Travail rémunéré</b>		P = 0,091				P = 0,280				
Oui	45,2	47,6	42,8	49,5	42,1 ; 57,2	53,8	41,4 ; 65,3	45,6	36,0 ; 55,3	
Non	54,8	52,4	57,2	50,5	42,8 ; 57,9	46,2	34,7 ; 58,6	54,4	44,7 ; 64,0	
<b>Sport ou exercice physique</b>		P = 0,081				P = 0,386				
Oui	25,4	27,6	23,1	22,3	16,0 ; 28,5	25,0*	15,8 ; 35,2	19,8*	11,8 ; 27,8	
Non	74,6	72,4	76,9	77,7	71,5 ; 84,0	75,0	64,8 ; 84,2	80,2	72,2 ; 88,2	
<b>Tâches ménagères, autre travail ou études</b>		P = 0,037				P = 0,926				
Oui	17,6	15,6	19,6	15,9*	11,0 ; 21,5	16,1*	8,2 ; 25,1	15,6*	9,3 ; 23,3	
Non	82,4	84,4	80,4	84,1	78,5 ; 89,0	83,9	74,9 ; 91,8	84,4	76,7 ; 90,7	
<b>Loisir ou passe-temps</b>		P = 0,172				P = 0,130				
Oui	8,1	7,2	9,0	9,0*	5,4 ; 13,4	5,4**	1,0 ; 11,5	12,4*	6,5 ; 19,1	
Non	91,9	92,8	91,0	91,0	86,6 ; 94,6	94,6	88,5 ; 99,0	87,6	80,9 ; 93,5	
<b>Partie du corps atteinte</b>		P = 0,009				P = 0,952				
Cou	3,1	1,8*	4,3	4,4**	1,6 ; 7,5	x	;	5,3**	1,6 ; 9,7	
Membres supérieurs	54,8	51,4	58,3	53,9	46,9 ; 61,0	53,5	41,3 ; 65,0	54,2	44,7 ; 63,3	
Membres inférieurs	18,3	20,1	16,5	18,6	13,0 ; 24,6	21,1*	12,0 ; 30,9	16,4*	9,8 ; 23,5	
Dos (partie supérieure)	3,7	3,8*	3,7*	3,1**	0,8 ; 5,7	x	;	6**	1,6 ; 10,9	
Dos (partie inférieure)	16,1	18,9	13,3	16,2*	10,4 ; 22,3	17,6**	8,5 ; 27,8	14,9*	7,6 ; 22,6	
Autre	4,0*	4,1*	3,9**	3,8**	1,1 ; 7,2	x	;	3,2**	0,2 ; 6,9	

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 14

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, socioéconomiques et de santé et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	30,3	25,3	35,2	30,9	28,7 ; 33,2	24,5	21,6 ; 27,5	37,1	34,0 ; 40,3
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,028		P = 0,102		P = 0,378	
15-24 ans	22,3	17,2	27,7	23,0	16,9 ; 29,4	15,9*	8,8 ; 23,8	30,6*	21,4 ; 40,5
25-44 ans	28,0	23,8	32,3	31,8	27,7 ; 36,0	25,7	19,9 ; 31,6	37,9	32,3 ; 43,6
45-64 ans	34,9	29,5	40,1	33,2	29,5 ; 36,9	26,7	21,9 ; 31,9	39,5	34,0 ; 44,8
65 ans et plus	32,9	27,9	37,1	31,8	26,8 ; 36,8	26,7	19,7 ; 34,3	36,2	29,2 ; 42,9
Composition du ménage	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,337		P = 0,668		P = 0,379	
Personne seule	33,7	26,6	38,3	31,1	26,5 ; 35,8	25,4*	18,1 ; 33,3	34,6	28,6 ; 40,5
Couple sans enfant	31,7	26,7	37,2	33,6	29,6 ; 37,4	25,8	20,7 ; 31,1	41,8	35,8 ; 47,6
Couple avec enfants	27,3	23,4	31,7	28,9	25,4 ; 32,5	23,9	19,1 ; 28,6	34,7	29,3 ; 40,1
Famille monoparentale	33,7	24,0	39,4	34,4	26,5 ; 42,8	24,1**	12,6 ; 37,3	41,0	30,4 ; 51,6
Autre	34,0	32,4	35,4	34,9*	22,9 ; 47,2	35,8**	16,7 ; 56,8	34,4*	19,4 ; 50,9
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,098		P = 0,384		P = 0,177	
Niveau inférieur au DES	32,1	27,7	36,6	30,6	26,3 ; 35,3	24,7	18,4 ; 31,3	36,5	29,7 ; 43,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,7	28,3	37,0	34,7	30,2 ; 39,2	28,7	22,3 ; 35,2	40,5	34,3 ; 46,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	31,5	25,7	37,1	31,4	26,7 ; 35,8	23,2	17,6 ; 29,3	39,8	32,9 ; 46,4
Diplôme d'études universitaires	24,9	19,5	30,2	26,3	21,9 ; 31,0	21,1*	14,7 ; 27,7	31,0	24,6 ; 37,4
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,015	P = 0,003	P = 0,880		P = 0,352		P = 0,290	
Quintile 1 (faible)	34,6	29,0	38,6	31,7	26,5 ; 37,2	28,8	20,0 ; 38,2	33,8	27,3 ; 40,7
Quintile 2 et suivants	29,5	24,9	34,4	31,3	28,6 ; 33,8	24,7	21,4 ; 28,0	38,1	34,4 ; 41,6
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,231		P = 0,003	
Pauvre ou très pauvre	45,1	37,1	52,2	43,1	35,1 ; 51,0	30,6*	19,2 ; 43,7	50,7	40,4 ; 60,3
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	23,7	33,1	29,7	27,4 ; 32,1	23,9	20,7 ; 27,0	35,7	32,2 ; 39,2
Occupation principale	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,008		P = 0,046		P = 0,336	
Travailleurs	30,3	25,5	35,9	31,6	28,7 ; 34,5	25,7	21,8 ; 29,6	38,5	34,1 ; 42,8
Étudiants	20,7	14,8	26,3	21,1	15,0 ; 28,0	12,8**	5,3 ; 21,4	29,4*	19,3 ; 40,1
Personnes sans emploi	37,9	34,0	39,1	35,9	26,4 ; 45,2	25,0**	6,5 ; 47,6	38,9	28,1 ; 49,3
Retraités	34,2	30,5	37,2	34,0	29,5 ; 38,6	29,8	22,8 ; 36,7	37,5	30,9 ; 43,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Excellent ou très bon	22,8	18,9	26,6	23,0	20,2 ; 25,9	18,2	14,4 ; 22,3	27,8	23,8 ; 31,9
Bon	33,9	28,1	39,6	36,2	31,9 ; 40,3	27,6	22,4 ; 33,2	44,3	37,8 ; 50,2
Passable ou mauvais	57,8	50,6	63,7	56,4	49,2 ; 63,6	48,1	37,3 ; 60,1	64,0	54,5 ; 73,0
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Élevé	48,5	41,5	53,3	49,0	43,5 ; 54,4	39,2	30,0 ; 48,3	55,3	48,6 ; 62,2
Faible à modéré	24,9	21,3	28,7	25,5	23,1 ; 27,9	21,0	17,8 ; 24,3	30,5	26,9 ; 34,1
Statut pondéral	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,000	P = 0,080		P = 0,587		P = 0,092	
Poids insuffisant	27,9	21,8**	29,5	39,3*	21,1 ; 58,3	x	;	40,1*	20,4 ; 60,5
Poids normal	28,3	22,9	32,1	29,2	25,6 ; 32,5	22,4	17,4 ; 27,9	33,9	29,2 ; 38,5
Embonpoint	29,8	25,4	37,1	29,4	25,8 ; 33,3	24,4	20,0 ; 29,1	38,8	32,6 ; 45,1
Obésité	37,9	30,5	46,1	37,0	31,0 ; 43,0	28,1	20,2 ; 36,1	45,9	37,7 ; 54,9

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 15

**Proportion des personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)<sup>1</sup> au cours d'une période de 12 mois selon la partie du corps, le lien avec le travail et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Au moins un TMS</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	30,3	25,3	35,2	30,9	28,7 ; 33,2	24,5	21,6 ; 27,5	37,1	34,0 ; 40,3
Non	69,7	74,7	64,8	69,1	66,8 ; 71,3	75,5	72,5 ; 78,4	62,9	59,7 ; 66,0
<b>TMS au cou</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	9,5	6,4	12,5	10,7	9,2 ; 12,2	6,7	5,0 ; 8,5	14,6	12,3 ; 17,0
Non	90,5	93,6	87,5	89,3	87,8 ; 90,8	93,3	91,5 ; 95,0	85,4	83,0 ; 87,7
<b>TMS au dos</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	14,5	12,2	16,7	14,6	12,9 ; 16,3	11,1	9,0 ; 13,4	17,9	15,4 ; 20,6
Non	85,5	87,8	83,3	85,4	83,7 ; 87,1	88,9	86,6 ; 91,0	82,1	79,4 ; 84,6
<b>TMS aux membres supérieurs</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	13,5	10,8	16,1	15,0	13,3 ; 16,7	11,0	8,8 ; 13,3	18,9	16,3 ; 21,5
Non	86,5	89,2	83,9	85,0	83,3 ; 86,7	89,0	86,7 ; 91,2	81,1	78,5 ; 83,7
<b>TMS aux membres inférieurs</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	14,5	11,8	17,2	14,4	12,8 ; 16,0	11,1	9,1 ; 13,3	17,5	15,1 ; 19,8
Non	85,5	88,2	82,8	85,6	84,0 ; 87,2	88,9	86,7 ; 90,9	82,5	80,2 ; 84,9
<b>Au moins un TMS lié au travail<sup>2</sup></b>		P = 0,000				P = 0,002			
Oui	17,8	16,0	19,6	18,9	17,1 ; 20,8	15,8	13,1 ; 18,5	22,0	19,3 ; 24,8
Non	82,2	84,0	80,4	81,1	79,2 ; 82,9	84,2	81,5 ; 86,9	78,0	75,2 ; 80,7
<b>Au moins un TMS non lié au travail</b>		P = 0,000				P = 0,000			
Oui	14,2	10,6	17,8	13,3	11,7 ; 15,0	9,4	7,5 ; 11,5	17,1	14,5 ; 19,7
Non	85,8	89,4	82,2	86,7	85,0 ; 88,3	90,6	88,5 ; 92,5	82,9	80,3 ; 85,5

1. TMS ayant touché au moins une partie du corps et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes.

2. Travail actuel ou antérieur.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 5 SANTÉ BUCCODENTAIRE

Tableau 16

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	58,8	56,4 ; 61,2	30,5	28,2 ; 32,9	10,7	9,2 ; 12,3
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,004					
Hommes	52,6	34,1	13,3	54,7	51,0 ; 58,5	33,2	29,7 ; 36,8	12,0	9,8 ; 14,4
Femmes	60,1	29,8	10,1	62,8	59,8 ; 66,0	27,7	24,7 ; 30,7	9,4	7,5 ; 11,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,002					
15-24 ans	62,9	27,1	10,0	70,3	63,7 ; 76,6	22,4	16,7 ; 28,2	7,3**	3,8 ; 11,2
25-44 ans	59,5	29,7	10,7	59,6	55,3 ; 64,1	31,0	26,7 ; 35,3	9,4	6,8 ; 12,0
45-64 ans	54,2	33,1	12,7	55,8	51,9 ; 59,8	32,0	28,3 ; 36,0	12,2	9,6 ; 14,8
65 ans et plus	47,8	39,1	13,1	51,9	46,7 ; 57,0	34,2	29,4 ; 39,3	13,9	10,3 ; 17,7
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,026					
Personne seule	52,2	34,6	13,2	56,2	51,0 ; 61,1	31,9	27,1 ; 36,8	11,9	8,5 ; 15,4
Couple sans enfant	56,9	32,7	10,3	54,6	50,4 ; 58,9	34,6	30,6 ; 38,7	10,8	8,2 ; 13,5
Couple avec enfants	58,9	30,3	10,7	62,0	58,0 ; 66,2	28,4	24,5 ; 32,3	9,6	7,2 ; 12,1
Famille monoparentale	55,2	31,8	13,1	64,2	55,4 ; 71,9	25,3	18,4 ; 33,3	10,5*	5,7 ; 15,9
Autre	48,0	34,3	17,7	48,2	35,8 ; 60,8	31,6*	20,0 ; 43,4	20,2*	10,7 ; 30,3
<b>Naissance au Canada ou durée de résidence</b>	P = 0,000			P = 0,477					
Né au Canada	58,7	30,9	10,4	60,6	58,0 ; 63,0	29,6	27,3 ; 32,0	9,8	8,4 ; 11,4
Au Canada depuis moins de 5 ans	39,8	39,4	20,9*	x	;	56,3**	21,3 ; 93,4	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	40,6	39,3	20,1	37,0	26,8 ; 47,2	39,5	29,2 ; 49,8	23,5*	15,1 ; 33,3
<b>Langue parlée à la maison</b>	P = 0,000			P = 0,236					
Au moins le français	57,6	31,6	10,8	59,3	56,7 ; 61,9	30,2	27,8 ; 32,7	10,5	9,0 ; 12,1
Au moins l'anglais, mais pas le français	55,9	29,0	15,0	60,7	51,4 ; 69,5	28,8	20,0 ; 38,0	10,6*	5,7 ; 16,0
Ni français ni anglais	32,6	44,9	22,5	28,5**	9,2 ; 48,9	50,8*	31,5 ; 72,3	20,7**	5,5 ; 36,8
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	44,1	38,7	17,1	49,2	44,2 ; 54,3	35,7	30,8 ; 40,5	15,1	11,8 ; 18,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	55,4	33,5	11,1	57,1	52,6 ; 61,8	33,1	28,6 ; 37,5	9,8*	7,0 ; 12,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	60,1	29,7	10,1	62,5	57,6 ; 67,4	27,4	22,8 ; 31,9	10,1	7,4 ; 13,1
Diplôme d'études universitaires	65,9	25,9	8,3	67,4	62,4 ; 72,4	25,4	20,7 ; 30,1	7,2*	4,6 ; 10,1
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	40,3	40,0	19,7	41,9	35,9 ; 48,0	38,6	32,5 ; 44,5	19,5	14,8 ; 24,6
Quintile 2 et suivants	60,5	29,8	9,7	62,0	59,3 ; 64,7	29,0	26,5 ; 31,7	8,9	7,4 ; 10,6
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Pauvre ou très pauvre	35,6	40,8	23,6	39,4	31,9 ; 47,5	37,2	29,8 ; 45,1	23,3	16,8 ; 30,0
À l'aise ou revenus suffisants	59,2	30,7	10,1	60,9	58,3 ; 63,4	29,7	27,4 ; 32,3	9,4	7,9 ; 10,9
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,007					
Travailleurs	58,8	30,3	10,9	59,5	56,3 ; 62,7	30,4	27,4 ; 33,5	10,1	8,2 ; 12,0
Étudiants	62,8	27,9	9,3	66,9	59,3 ; 74,6	25,9	19,3 ; 33,1	7,3**	3,2 ; 11,9
Personnes sans emploi	42,7	37,7	19,6	51,1	40,9 ; 61,1	28,5*	19,8 ; 37,5	20,4*	12,3 ; 29,2
Retraités	49,7	38,1	12,2	52,8	48,2 ; 57,5	34,7	30,1 ; 39,4	12,5	9,2 ; 15,9

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 17

**Répartition de la population selon la perception de sa santé buccodentaire et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excellente ou très bonne	Bonne	Passable ou mauvaise	Excellente ou très bonne		Bonne		Passable ou mauvaise	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	56,4	31,9	11,7	58,8	56,4 ; 61,2	30,5	28,2 ; 32,9	10,7	9,2 ; 12,3
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,000					
Fumeur actuel	46,4	34,7	19,0	48,2	42,9 ; 53,5	35,9	30,5 ; 41,1	15,9	12,2 ; 19,9
Non-fumeur	59,5	31,1	9,4	62,1	59,4 ; 64,9	28,8	26,2 ; 31,4	9,1	7,5 ; 10,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	69,6	24,5	5,8	71,0	67,9 ; 74,0	24,4	21,4 ; 27,4	4,6	3,3 ; 6,0
Bon	41,4	42,6	16,0	44,4	40,0 ; 48,9	40,8	36,5 ; 45,1	14,8	11,8 ; 17,8
Passable ou mauvais	34,0	37,5	28,5	40,2	32,9 ; 47,5	29,1	22,9 ; 36,0	30,7	24,1 ; 37,7
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,000					
Élevé	45,8	35,4	18,9	47,5	41,9 ; 52,9	35,4	30,3 ; 40,8	17,1	13,3 ; 21,3
Faible à modéré	59,9	30,7	9,4	62,5	59,8 ; 65,2	28,8	26,2 ; 31,4	8,7	7,2 ; 10,4
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,094					
Aucune dent	51,4	39,3	9,3	54,0	47,6 ; 60,8	37,4	31,0 ; 43,8	8,6*	4,5 ; 13,1
Au moins une dent	57,1	31,0	11,9	59,4	56,7 ; 62,0	29,7	27,2 ; 32,3	10,9	9,4 ; 12,6
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	60,7	30,4	8,9	63,8	61,0 ; 66,4	28,7	26,2 ; 31,4	7,5	6,1 ; 9,0
Moins de deux fois par jour	40,7	37,6	21,8	41,9	36,4 ; 47,6	36,6	31,5 ; 41,6	21,5	17,5 ; 25,9
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,084					
Au moins une fois par jour	62,2	29,3	8,4	61,6	57,0 ; 66,0	30,0	26,0 ; 34,3	8,4	5,9 ; 11,0
Moins d'une fois par jour	54,7	31,7	13,6	58,2	55,0 ; 61,5	29,5	26,3 ; 32,6	12,3	10,3 ; 14,4

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 18

**Proportion des personnes édentées<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	11,0	8,6	13,3	10,4	9,2 ; 11,6	7,8	6,3 ; 9,4	12,9	11,3 ; 14,7
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-24 ans	0,6**	1,0**	0,3**	x	;	x	;	x	;
25-44 ans	0,6*	0,5**	0,7*	x	;	x	;	x	;
45-64 ans	13,1	10,5	15,7	13,4	11,0 ; 16,0	9,2*	6,2 ; 12,4	17,3	13,7 ; 21,3
65 ans et plus	39,6	33,7	44,1	36,2	31,4 ; 41,3	30,0	22,8 ; 37,7	41,3	34,8 ; 48,1
	P = 0,000	P = 0,026	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,420		P = 0,001	
65-74 ans	34,6	31,3	37,5	28,5	22,6 ; 34,8	26,7*	17,8 ; 35,7	30,1	22,0 ; 39,1
75-84 ans	45,2	36,8	50,9	48,9	39,4 ; 58,1	35,1*	20,5 ; 50,7	58,1	46,2 ; 69,3
85 ans et plus	57,7	48,2*	61,5	50,6*	30,4 ; 73,3	44,8**	10,6 ; 80,2	55,5**	26,1 ; 88,6
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	26,0	18,6	33,3	23,5	19,8 ; 27,4	17,3	12,5 ; 22,6	29,6	24,1 ; 35,0
Diplôme d'études secondaires (DES)	10,2	8,8	11,6	9,6	7,3 ; 12,2	7,4*	4,2 ; 10,9	11,8*	8,4 ; 15,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	5,4	4,9	5,8	4,8*	3,0 ; 6,9	4,0**	1,8 ; 6,7	5,6*	2,8 ; 8,9
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,2	2,8	3,7**	1,8 ; 6,0	2,3**	0,3 ; 4,7	4,9**	1,7 ; 8,7
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,012		P = 0,000	
Quintile 1 (faible)	20,0	15,2	23,3	21,3	17,3 ; 26,0	13,3*	8,1 ; 19,9	27,2	21,5 ; 33,6
Quintile 2 et suivants	8,4	7,2	9,8	8,1	6,8 ; 9,4	6,9	5,3 ; 8,7	9,2	7,3 ; 11,3
Perception de sa situation financière	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,404		P = 0,544		P = 0,857	
Pauvre ou très pauvre	16,9	12,8	20,6	11,9*	7,7 ; 16,6	9,9**	3,3 ; 18,0	13,2*	7,7 ; 19,4
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	8,0	12,0	10,1	8,8 ; 11,4	7,5	5,9 ; 9,2	12,6	10,7 ; 14,7

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 19

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	77,2	75,1 ; 79,3	20,6	18,5 ; 22,6	2,2	1,5 ; 2,9
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	69,3	26,3	4,4	68,3	64,7 ; 71,6	28,2	24,9 ; 31,6	3,4*	2,2 ; 4,7
Femmes	87,9	11,3	0,7	85,9	83,6 ; 88,1	13,1	11,0 ; 15,3	1,0**	0,4 ; 1,7
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,388					
15-24 ans	83,5	14,9	1,6*	82,5	77,0 ; 88,1	x	;	x	;
25-44 ans	82,1	15,8	2,2	78,8	75,0 ; 82,4	19,5	15,9 ; 23,1	1,8**	0,6 ; 3,2
45-64 ans	76,8	20,6	2,6	75,4	72,2 ; 78,7	22,2	19,1 ; 25,2	2,4*	1,3 ; 3,6
65 ans et plus	71,2	24,5	4,3	72,4	67,6 ; 77,0	23,6	19,3 ; 28,0	4,0**	2,0 ; 6,4
<b>Composition du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,463					
Personne seule	78,1	18,8	3,1	74,8	70,3 ; 79,2	21,7	17,7 ; 26,0	3,5**	1,6 ; 5,5
Couple sans enfant	75,7	21,8	2,5	74,2	70,5 ; 77,7	23,4	19,9 ; 27,1	2,4**	1,1 ; 3,8
Couple avec enfants	80,9	17,0	2,1	79,6	76,2 ; 83,0	18,6	15,5 ; 21,9	1,7**	0,7 ; 2,8
Famille monoparentale	82,6	15,8	1,6*	81,3	74,1 ; 88,2	x	;	x	;
Autre	75,5	19,3	5,3*	73,6	62,2 ; 84,5	21,0*	10,9 ; 31,8	5,4**	0,9 ; 11,3
<b>Nombre d'enfants de 14 ans et moins</b>	P = 0,000			P = 0,805					
Aucun enfant	77,2	20,0	2,8	75,3	72,8 ; 77,8	22,1	19,7 ; 24,6	2,6*	1,7 ; 3,5
Un enfant	82,9	15,1	2,1*	79,8	74,2 ; 85,2	18,1	13,1 ; 23,7	2,0**	0,2 ; 4,3
Deux enfants	83,6	15,3	1,1*	84,5	78,7 ; 89,6	x	;	x	;
Trois enfants ou plus	78,3	18,2	3,5**	77,6	64,6 ; 89,6	x	;	x	;
<b>Niveau de scolarité</b>	P = 0,000			P = 0,002					
Niveau inférieur au DES	70,4	24,6	5,0	68,1	63,2 ; 72,9	27,3	22,6 ; 32,2	4,7*	2,5 ; 6,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	78,8	18,8	2,4	78,2	74,3 ; 82,0	19,5	15,8 ; 23,2	2,4**	1,1 ; 3,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	81,3	16,8	1,9	79,4	75,2 ; 83,5	19,5	15,4 ; 23,5	1,1**	0,3 ; 2,3
Diplôme d'études universitaires	84,4	14,6	1,0*	83,9	79,9 ; 87,3	x	;	x	;
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Quintile 1 (faible)	73,7	21,6	4,8	66,7	61,1 ; 72,1	27,4	21,9 ; 32,7	5,9**	3,2 ; 9,0
Quintile 2 et suivants	80,1	17,9	1,9	79,2	76,9 ; 81,4	19,2	17,1 ; 21,4	1,6*	1,0 ; 2,3
<b>Perception de sa situation financière</b>	P = 0,000			P = 0,001					
Pauvre ou très pauvre	72,1	22,1	5,9	71,7	64,5 ; 78,4	21,6	15,5 ; 28,2	6,7**	3,0 ; 11,3
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	18,2	2,1	77,9	75,7 ; 80,0	20,4	18,3 ; 22,6	1,7*	1,1 ; 2,3
<b>Occupation principale</b>	P = 0,000			P = 0,005					
Travailleurs	79,6	18,2	2,2	77,9	75,2 ; 80,5	20,2	17,7 ; 22,8	1,9*	1,1 ; 2,8
Étudiants	85,7	13,0	1,3**	83,4	76,8 ; 89,4	x	;	x	;
Personnes sans emploi	74,1	20,9	4,9*	67,5	57,2 ; 77,0	23,8*	15,5 ; 33,5	8,7**	3,0 ; 15,6
Retraités	72,9	23,2	3,8	73,9	69,5 ; 78,1	23,1	18,9 ; 27,3	3,0**	1,4 ; 4,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 20

**Répartition de la population selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et certaines caractéristiques de santé et certains comportements, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins deux fois par jour	Une fois par jour	Moins d'une fois par jour	Au moins deux fois par jour		Une fois par jour		Moins d'une fois par jour	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	78,8	18,7	2,6	77,2	75,1 ; 79,3	20,6	18,5 ; 22,6	2,2	1,5 ; 2,9
Statut de fumeur	P = 0,000			P = 0,276					
Fumeur actuel	74,9	21,2	3,9	74,9	70,2 ; 79,4	22,1	17,8 ; 26,6	3,0**	1,4 ; 5,0
Non-fumeur	80,0	17,9	2,1	78,1	75,8 ; 80,3	20,0	17,7 ; 22,2	2,0*	1,2 ; 2,7
Perception de l'état de santé	P = 0,000			P = 0,000					
Excellent ou très bon	82,7	15,9	1,4	81,1	78,5 ; 83,5	17,9	15,4 ; 20,5	1,0**	0,4 ; 1,7
Bon	75,1	21,2	3,6	74,0	70,0 ; 77,7	23,3	19,6 ; 26,9	2,8*	1,5 ; 4,2
Passable ou mauvais	69,8	24,9	5,3	67,7	60,8 ; 74,3	26,0	19,8 ; 32,6	6,3**	2,9 ; 10,5
Niveau de détresse psychologique	P = 0,000			P = 0,543					
Élevé	77,2	19,2	3,6	76,5	72,0 ; 80,9	20,5	16,4 ; 24,7	3,0**	1,2 ; 5,1
Faible à modéré	79,6	18,3	2,1	77,7	75,3 ; 80,0	20,3	18,0 ; 22,5	2,0*	1,3 ; 2,8
Nombre de dents naturelles	P = 0,000			P = 0,003					
Aucune dent	69,8	25,0	5,3	69,7	63,3 ; 75,7	25,0	19,3 ; 31,3	5,3**	2,5 ; 8,4
Au moins une dent	79,9	17,9	2,2	78,1	75,9 ; 80,3	20,0	18,0 ; 22,1	1,9*	1,2 ; 2,6
Utilisation de la soie dentaire	P = 0,000			P = 0,053					
Au moins une fois par jour	89,3	10,4	0,3**	86,1	82,9 ; 89,1	x	;	x	;
Moins d'une fois par jour	75,2	21,6	3,1	73,9	71,0 ; 76,7	23,3	20,5 ; 26,1	2,7*	1,7 ; 3,8

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 21

**Répartition de la population ayant ou non des dents naturelles selon la fréquence de brossage des dents (ou prothèses) et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	78,8	69,3	87,9	77,2	75,1 ; 79,3	68,3	64,7 ; 71,6	85,9	83,6 ; 88,1
Une fois par jour	18,7	26,3	11,3	20,6	18,5 ; 22,6	28,2	24,9 ; 31,6	13,1	11,0 ; 15,3
Moins d'une fois par jour	2,6	4,4	0,7	2,2	1,5 ; 2,9	3,4*	2,2 ; 4,7	1,0**	0,4 ; 1,7
Population édentée <sup>1</sup>	P = 0,000			P = 0,077					
Au moins deux fois par jour	69,8	55,1	78,9	69,7	63,3 ; 75,7	60,1	48,6 ; 71,2	75,2	67,4 ; 82,7
Une fois par jour	25,0	35,6	18,3	25,0	19,3 ; 31,3	32,4*	21,5 ; 43,6	20,8*	13,9 ; 28,5
Moins d'une fois par jour	5,3	9,3	2,8*	5,3**	2,5 ; 8,4	7,5**	2,1 ; 14,0	4,0**	1,1 ; 7,4
Population ayant au moins une dent	P = 0,000			P = 0,000					
Au moins deux fois par jour	79,9	70,6	89,3	78,1	75,9 ; 80,3	69,0	65,3 ; 72,6	87,5	85,1 ; 89,7
Une fois par jour	17,9	25,4	10,3	20,0	18,0 ; 22,1	27,9	24,4 ; 31,4	11,9	9,8 ; 14,2
Moins d'une fois par jour	2,2	4,0	0,4*	1,9*	1,2 ; 2,6	3,1*	1,8 ; 4,4	0,6**	0,1 ; 1,3

1. Population de personnes n'ayant aucune dent naturelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 22

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation de la soie dentaire et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Au moins une fois par jour	Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	Une fois par semaine ou moins	Au moins une fois par jour		Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine		Une fois par semaine ou moins	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	33,1	16,9	50,0	33,9	31,5 ; 36,5	16,9	14,9 ; 18,9	49,2	46,5 ; 51,7
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	24,6	15,6	59,7	26,3	23,0 ; 29,8	15,2	12,5 ; 17,9	58,5	54,7 ; 62,2
Femmes	41,7	18,2	40,1	41,8	38,3 ; 45,4	18,6	15,8 ; 21,4	39,6	36,1 ; 43,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	27,1	15,6	57,3	24,9	18,6 ; 31,5	19,2*	13,5 ; 25,2	55,9	48,3 ; 62,9
25-44 ans	29,8	19,9	50,2	30,9	27,0 ; 34,9	20,4	16,8 ; 24,0	48,7	44,0 ; 53,0
45-64 ans	38,6	15,9	45,5	40,1	36,0 ; 44,4	13,6	10,7 ; 16,5	46,4	42,2 ; 50,6
65 ans et plus	36,6	11,5	52,0	39,5	33,3 ; 46,0	11,5*	7,5 ; 15,9	49,0	42,4 ; 55,3
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,000					
Niveau inférieur au DES	30,4	11,0	58,6	30,5	25,1 ; 36,3	8,0*	4,8 ; 11,5	61,5	55,9 ; 67,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	32,8	16,2	50,9	35,0	30,0 ; 39,9	17,3	13,6 ; 21,0	47,7	42,8 ; 52,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	32,1	19,3	48,6	32,4	27,9 ; 37,0	20,4	16,5 ; 24,6	47,2	42,2 ; 52,2
Diplôme d'études universitaires	36,3	19,7	44,0	38,0	32,6 ; 43,5	19,5	15,3 ; 24,2	42,5	37,1 ; 47,8
Indice du niveau de revenu du ménage	P = 0,000			P = 0,262					
Quintile 1 (faible)	32,4	13,4	54,2	31,8	26,0 ; 38,4	13,8*	9,0 ; 19,0	54,3	47,3 ; 61,2
Quintile 2 et suivants	33,1	17,8	49,1	34,1	31,4 ; 36,9	17,4	15,2 ; 19,6	48,5	45,7 ; 51,4
Occupation principale	P = 0,000			P = 0,190					
Travailleurs	32,6	18,2	49,2	34,5	31,6 ; 37,6	16,8	14,5 ; 19,3	48,7	45,4 ; 51,9
Étudiants	28,8	16,3	54,9	26,3	19,3 ; 34,1	20,0*	13,3 ; 27,1	53,6	45,5 ; 61,6
Personnes sans emploi	37,3	14,7	48,1	33,6*	23,2 ; 45,1	15,1**	6,8 ; 24,5	51,3	40,0 ; 62,8
Retraités	38,0	12,4	49,6	40,1	34,6 ; 46,0	14,0	9,9 ; 18,4	45,9	39,9 ; 52,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 6 STATUT PONDÉRAL

Tableau 23

**Répartition de la population selon le statut pondéral et certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Poids insuffisant	Poids normal	Embonpoint	Obésité
	%			
Ensemble de la population	2,4	47,1	34,9	15,6
<b>Sexe</b>		P = 0,000		
Hommes	1,0*	39,0	43,6	16,5
Femmes	3,8	55,3	26,1	14,8
<b>Groupe d'âge</b>		P = 0,000		
15-17 ans	6,8*	73,1	15,0	5,1*
18-24 ans	5,7*	67,5	19,0	7,8
		P = 0,000		
15-24 ans	6,1	69,6	17,5	6,8
25-44 ans	2,2	47,8	35,2	14,7
45-64 ans	1,2	39,4	39,7	19,6
65 ans et plus	1,9	41,0	40,1	17,0
<b>Hommes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	4,9**	71,9	17,0	6,1*
18-24 ans	2,7**	63,1	24,6	9,6
		P = 0,000		
15-24 ans	3,6**	66,4	21,7	8,3
25-44 ans	0,5**	37,0	46,3	16,2
45-64 ans	0,5**	30,0	49,1	20,5
65 ans et plus	0,7**	35,4	47,8	16,1
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
15-17 ans	8,9*	74,4	12,7*	4,0**
18-24 ans	8,8*	72,2	13,1	5,8*
		P = 0,000		
15-24 ans	8,8	73,1	13,0	5,1*
25-44 ans	4,2	59,8	22,9	13,1
45-64 ans	2,0	48,8	30,6	18,7
65 ans et plus	2,8	45,4	34,1	17,8
<b>Niveau de scolarité</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	3,1	44,2	34,2	18,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	47,3	34,2	16,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	2,5*	46,2	35,7	15,7
Diplôme d'études universitaires	2,2	50,6	35,6	11,6
<b>Hommes</b>		P = 0,006		
Niveau inférieur au DES	1,6*	40,6	39,6	18,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	39,5	41,9	17,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	1,1**	37,2	45,7	16,1
Diplôme d'études universitaires	0,5**	38,6	47,3	13,6
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Niveau inférieur au DES	4,6	47,9	28,7	18,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	55,2	26,3	15,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	3,9*	55,2	25,6	15,3
Diplôme d'études universitaires	3,8*	62,7	23,9	9,6
<b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	2,6	46,4	32,4	18,6
Quintile 2 et suivants	2,4	47,3	35,5	14,9
<b>Hommes</b>		P = 0,093		
Quintile 1 (faible)	0,7*	41,9	40,3	17,1
Quintile 2 et suivants	1,1*	38,3	44,3	16,3
<b>Femmes</b>		P = 0,000		
Quintile 1 (faible)	3,9	49,7	26,8	19,6
Quintile 2 et suivants	3,8	57,1	25,8	13,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
2,0*	1,3 ; 2,7	45,4	43,0 ; 47,6	35,6	33,5 ; 37,8	17,0	15,1 ; 18,9	Ensemble de la population	
P = 0,000									
0,4**	0,0 ; 0,9	36,7	33,1 ; 40,0	45,8	42,4 ; 49,4	17,1	14,4 ; 19,8	Sexe	
3,6*	2,3 ; 4,9	54,2	50,9 ; 57,6	25,3	22,5 ; 28,0	17,0	14,5 ; 19,5	Hommes	
P = 0,000									
6,2**	1,2 ; 12,1	73,2	62,4 ; 82,5	12,8**	5,2 ; 21,0	7,8**	2,6 ; 13,9	Groupe d'âge	
x	;	71,3	62,4 ; 80,1	19,4*	12,0 ; 27,5	x	;	15-17 ans	
P = 0,000									
4,2**	1,4 ; 7,3	72,2	65,5 ; 78,3	16,5*	11,5 ; 22,2	7,1**	3,4 ; 11,1	15-24 ans	
1,8**	0,7 ; 3,1	42,4	38,0 ; 46,8	38,6	34,4 ; 43,0	17,1	13,6 ; 20,6	25-44 ans	
1,2**	0,4 ; 2,1	38,0	34,1 ; 41,7	39,2	35,6 ; 42,8	21,6	18,3 ; 24,8	45-64 ans	
1,7**	0,4 ; 3,4	41,4	36,5 ; 46,4	40,8	35,8 ; 45,8	16,1	12,1 ; 20,3	65 ans et plus	
P = 'n.d.'									
x	;	74,6	59,2 ; 87,8	16,1**	4,7 ; 29,4	x	;	Hommes	
x	;	60,4	46,6 ; 74,1	28,2*	16,2 ; 41,7	x	;	15-17 ans	
P = 'n.d.'									
x	;	66,4	56,4 ; 76,0	23,0*	14,8 ; 32,2	x	;	15-24 ans	
x	;	32,7	26,1 ; 39,0	50,4	43,5 ; 57,5	x	;	25-44 ans	
x	;	27,2	22,1 ; 32,4	51,5	46,0 ; 57,2	x	;	45-64 ans	
x	;	36,4	28,9 ; 44,3	46,7	38,6 ; 54,3	x	;	65 ans et plus	
P = 0,456									
12,6**	2,5 ; 24,4	71,8	56,5 ; 84,8	x	;	x	;	Femmes	
x	;	83,5	72,3 ; 93,6	9,7**	1,6 ; 19,4	x	;	15-17 ans	
P = 0,000									
8,6**	3,0 ; 15,2	78,4	69,4 ; 86,3	9,5**	3,6 ; 16,2	3,4**	0,2 ; 7,4	15-24 ans	
3,5**	1,2 ; 5,9	53,2	47,0 ; 59,7	25,6	20,4 ; 31,2	17,7	12,8 ; 22,7	25-44 ans	
2,1**	0,7 ; 3,9	48,6	43,3 ; 54,0	27,0	22,3 ; 31,8	22,2	17,5 ; 27,0	45-64 ans	
x	;	45,6	38,6 ; 53,1	35,9	29,1 ; 42,9	x	;	65 ans et plus	
P = 0,677									
2,4**	0,9 ; 4,2	45,2	40,0 ; 50,3	32,1	27,6 ; 36,9	20,3	16,5 ; 24,4	Niveau de scolarité	
2,2**	0,9 ; 3,7	48,1	43,7 ; 52,7	34,2	30,1 ; 38,5	15,5	12,1 ; 18,8	Niveau inférieur au DES	
2,1**	0,8 ; 3,5	43,9	39,0 ; 48,6	37,8	32,9 ; 42,6	16,3	12,7 ; 20,2	Diplôme d'études secondaires (DES)	
x	;	43,6	38,3 ; 49,0	38,3	33,3 ; 43,9	x	;	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
P = 'n.d.'									
x	;	41,5	34,2 ; 49,6	37,3	29,9 ; 45,1	x	;	Diplôme d'études universitaires	
x	;	37,0	29,9 ; 43,6	48,3	41,6 ; 55,4	x	;	Hommes	
x	;	37,0	30,0 ; 44,1	47,1	39,7 ; 54,2	x	;	Niveau inférieur au DES	
x	;	29,9	22,5 ; 37,8	50,2	42,2 ; 58,3	x	;	Diplôme d'études secondaires (DES)	
P = 0,641									
4,5**	1,6 ; 8,1	48,9	42,1 ; 55,5	26,8	21,2 ; 32,6	19,8	14,7 ; 25,3	Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	
4,4**	1,8 ; 7,4	59,6	53,4 ; 65,9	19,8	15,1 ; 25,1	16,2	11,5 ; 21,0	Diplôme d'études universitaires	
3,5**	1,0 ; 6,4	51,2	44,4 ; 58,0	27,8	21,8 ; 34,3	17,5*	12,5 ; 23,2	Femmes	
x	;	56,7	49,5 ; 63,7	26,9	20,9 ; 33,6	x	;	Niveau inférieur au DES	
P = 0,063									
2,0**	0,7 ; 3,6	42,7	36,9 ; 48,6	32,5	26,7 ; 38,4	22,8	17,8 ; 28,2	Indice du niveau de revenu du ménage	
2,0*	1,2 ; 2,8	46,3	43,5 ; 48,8	35,9	33,5 ; 38,5	15,9	13,9 ; 17,9	Quintile 1 (faible)	
P = 'n.d.'									
x	;	37,2	27,5 ; 47,8	42,5	31,9 ; 52,8	x	;	Quintile 2 et suivants	
x	;	36,8	33,0 ; 40,6	46,4	42,5 ; 50,3	x	;	Hommes	
P = 0,030									
3,2**	1,0 ; 6,1	47,0	38,7 ; 55,0	24,8	18,5 ; 31,8	25,0	17,9 ; 31,9	Femmes	
3,6*	2,1 ; 5,2	56,3	52,7 ; 60,2	24,8	21,6 ; 28,0	15,3	12,6 ; 18,0	Quintile 1 (faible)	

Tableau 24

**Répartition de la population selon la perception à l'égard de son poids et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Excès de poids	Trop maigre	À peu près normal(e)	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal(e)	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	38,6	2,9	58,5	38,6	36,3 ; 41,0	3,0	2,1 ; 3,9	58,4	55,9 ; 60,7
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,019					
Hommes	36,6	3,6	59,9	35,0	31,5 ; 38,2	2,9*	1,6 ; 4,4	62,1	58,6 ; 65,6
Femmes	40,5	2,3	57,1	42,3	39,0 ; 45,6	3,1*	1,8 ; 4,5	54,7	51,4 ; 57,9
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	16,6	4,9	78,5	18,3*	12,7 ; 24,5	4,9**	1,9 ; 8,5	76,7	70,2 ; 83,0
25-44 ans	37,6	3,3	59,1	38,8	34,9 ; 43,1	3,3**	1,5 ; 5,4	57,9	53,3 ; 62,1
45-64 ans	48,9	1,8	49,3	48,1	44,1 ; 51,9	2,3*	1,2 ; 3,5	49,6	45,7 ; 53,7
65 ans et plus	38,7	2,7	58,6	36,7	31,7 ; 41,8	2,1**	0,8 ; 3,8	61,2	55,7 ; 66,0
<b>Hommes</b>	P = 0,000			P = 0,017					
15-24 ans	14,7	7,5*	77,8	16,7*	9,0 ; 25,3	5,1**	0,7 ; 10,4	78,3	69,1 ; 86,9
25-44 ans	35,4	3,7	60,9	33,1	26,8 ; 39,3	3,6**	1,1 ; 6,7	63,3	57,1 ; 69,7
45-64 ans	47,4	2,1	50,5	46,0	40,2 ; 51,7	1,6**	0,3 ; 3,1	52,5	46,8 ; 58,2
65 ans et plus	37,2	2,2	60,6	32,9	25,4 ; 40,6	x	;	x	;
<b>Femmes</b>	P = 0,000			P = 0,064					
15-24 ans	18,5	2,2*	79,3	20,1*	12,3 ; 28,8	4,8**	0,5 ; 10,1	75,1	65,6 ; 83,7
25-44 ans	40,0	2,8*	57,2	45,1	39,0 ; 51,4	3,0**	0,5 ; 6,0	51,9	46,0 ; 58,0
45-64 ans	50,4	1,6	48,1	50,2	44,9 ; 55,5	2,9**	1,1 ; 5,0	46,9	41,6 ; 52,3
65 ans et plus	39,9	3,1	57,0	39,8	33,1 ; 46,8	2,0**	0,4 ; 4,0	58,2	51,2 ; 64,9
<b>Statut pondéral</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,2**	33,3	66,4	x	;	40,3*	21,9 ; 59,2	x	;
Poids normal	10,6	4,0	85,3	8,8	6,8 ; 11,0	4,7**	3,0 ; 6,5	86,4	83,7 ; 89,0
Embonpoint	55,3	0,3**	44,4	52,6	48,6 ; 56,9	x	;	x	;
Obésité	90,7	x	x	92,0	88,3 ; 95,1	x	;	x	;
<b>Hommes</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	x	60,5	39,3*	x	;	x	;	x	;
Poids normal	4,7	6,8	88,5	2,7**	1,0 ; 4,7	7,3*	4,1 ; 11,1	90,0	86,0 ; 93,7
Embonpoint	46,8	0,5**	52,8	41,2	36,0 ; 46,6	x	;	x	;
Obésité	87,5	x	x	88,6	82,3 ; 94,1	x	;	x	;
<b>Femmes</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Poids insuffisant	0,3**	26,2	73,5	x	;	37,8*	18,5 ; 58,0	x	;
Poids normal	14,8	2,1	83,1	13,1	9,9 ; 16,5	3,0**	1,3 ; 4,9	84,0	80,4 ; 87,4
Embonpoint	69,6	x	x	73,7	68,1 ; 79,2	x	;	x	;
Obésité	94,2	x	x	95,4	91,3 ; 98,8	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 25

**Répartition de la population selon le nombre de recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucun	Un	Deux ou plus	Aucun		Un		Deux ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	77,4	12,6	10,0	79,5	76,5 ; 82,6	10,7	8,5 ; 13,2	9,7	7,5 ; 12,0
Sexe	P = 0,000			P = 0,000					
Hommes	81,4	10,5	8,0	88,0	84,0 ; 91,7	7,1*	4,2 ; 10,2	4,9*	2,5 ; 7,8
Femmes	74,5	14,1	11,5	73,4	69,0 ; 77,7	13,4	10,1 ; 17,1	13,2	9,8 ; 16,6
Groupe d'âge	P = 0,001			P = 0,635					
15-24 ans	81,7	10,9	7,4*	85,9	76,1 ; 94,2	7,7**	1,3 ; 15,9	6,4**	0,6 ; 13,6
25-44 ans	76,3	13,9	9,8	76,9	71,1 ; 82,4	12,8*	8,6 ; 17,5	10,4*	6,3 ; 14,4
45-64 ans	75,5	12,6	11,9	77,9	72,9 ; 82,6	11,4*	7,9 ; 15,4	10,7*	7,1 ; 14,6
65 ans et plus	82,9	10,2	6,9	87,2	79,8 ; 93,4	4,9**	1,3 ; 9,3	7,9**	2,4 ; 14,4
Hommes	P = 0,252			P = 0,902					
15-24 ans	86,5	9,1**	4,5**	98,7	93,0 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	81,4	11,2	7,5*	89,1	81,8 ; 95,6	x	;	x	;
45-64 ans	79,4	10,4	10,2	82,9	76,1 ; 89,0	9,1**	4,5 ; 14,5	8,0**	3,5 ; 13,1
65 ans et plus	84,2	10,3*	5,5*	94,4	85,5 ; 100,0	x	;	x	;
Femmes	P = 0,004			P = 0,792					
15-24 ans	78,8	12,0*	9,1*	78,9	64,5 ; 91,2	11,2**	1,4 ; 23,5	9,9**	1,0 ; 20,7
25-44 ans	72,3	16,0	11,7	68,3	59,8 ; 76,0	16,5*	10,3 ; 23,4	15,2*	9,0 ; 21,5
45-64 ans	72,6	14,2	13,2	73,8	66,4 ; 80,7	13,2*	7,9 ; 19,2	13,0*	7,8 ; 18,9
65 ans et plus	82,0	10,1	7,8	82,3	71,4 ; 91,9	5,9**	1,1 ; 12,2	11,8**	3,1 ; 22,0
Statut pondéral	P = 0,117			P = 0,024					
Poids insuffisant	82,3	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	81,2	10,2	8,6	77,7	71,8 ; 83,8	8,0*	4,2 ; 12,3	14,3*	9,1 ; 19,7
Embonpoint	77,7	13,6	8,7	81,1	75,9 ; 85,8	12,8*	8,9 ; 17,1	6,1*	3,4 ; 9,1
Obésité	72,3	14,4	13,3	79,6	73,3 ; 85,2	11,3*	6,9 ; 16,3	9,1*	5,0 ; 13,5
Hommes	P = 0,002			P = 0,944					
Poids insuffisant	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	86,8	8,1*	5,1*	90,8	78,6 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	82,7	10,4	6,9	87,6	81,6 ; 92,8	7,5**	3,7 ; 11,9	4,9**	1,6 ; 8,9
Obésité	76,0	12,2	11,8	87,6	80,1 ; 94,3	8,6**	3,1 ; 15,2	3,8**	0,2 ; 8,3
Femmes	P = 0,161			P = 0,100					
Poids insuffisant	78,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	79,5	10,8	9,7	74,6	67,2 ; 81,4	9,6*	5,0 ; 14,9	15,8*	9,8 ; 22,3
Embonpoint	71,9	17,2	10,9	72,7	64,4 ; 80,8	19,6*	12,1 ; 27,3	7,7**	3,2 ; 12,9
Obésité	68,9	16,4	14,7	72,7	63,0 ; 81,8	13,6**	7,0 ; 21,2	13,7**	7,0 ; 21,2

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 26

**Répartition de la population selon la principale action entreprise concernant son poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge, le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Perdre du poids	Maintenir son poids	Gagner du poids	N'avoir rien fait
	%			
Ensemble de la population	18,7	17,2	3,0	61,1
Sexe		P = 0,000		
Hommes	15,2	15,5	4,1	65,2
Femmes	22,1	18,8	1,9	57,2
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	14,6	12,7	8,4	64,3
25-44 ans	20,3	17,7	3,1	58,9
45-64 ans	21,0	19,6	1,2	58,1
65 ans et plus	13,8	14,9	1,4	69,9
Hommes		P = 0,000		
15-24 ans	10,8	9,5	13,6	66,1
25-44 ans	15,8	16,9	4,0	63,3
45-64 ans	17,6	17,3	1,0*	64,2
65 ans et plus	12,7	14,5	1,2*	71,6
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	18,5	16,0	3,0*	62,5
25-44 ans	25,0	18,5	2,3*	54,3
45-64 ans	24,4	21,9	1,4*	52,3
65 ans et plus	14,7	15,2	1,5*	68,6
Statut pondéral		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,0**	4,9**	16,4*	76,7
Poids normal	8,6	15,1	4,7	71,7
Embonpoint	23,5	20,3	1,1*	55,1
Obésité	41,5	19,0	0,2**	39,3
Hommes		P = 0,000		
Poids insuffisant	x	4,0**	15,0**	x
Poids normal	4,2	9,4	8,3	78,1
Embonpoint	17,5	20,0	1,6*	60,9
Obésité	36,6	19,2	0,4**	43,7
Femmes		P = 0,000		
Poids insuffisant	2,1**	5,1**	16,8*	75,9
Poids normal	11,7	19,1	2,1	67,1
Embonpoint	33,6	20,9	0,3**	45,2
Obésité	46,9	18,7	x	x
Perception à l'égard de son poids		P = 0,000		
Excès de poids	37,6	20,6	0,2**	41,6
Trop maigre	1,9**	1,3**	33,7	63,1
À peu près normal(e)	7,2	15,8	3,3	73,8

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
18,6	16,7 ; 20,6	19,4	17,5 ; 21,3	3,7	2,7 ; 4,8	58,3	55,9 ; 60,6	Ensemble de la population	
P = 0,000									
14,6	12,0 ; 17,2	17,9	15,2 ; 20,7	4,6*	2,9 ; 6,3	63,0	59,4 ; 66,6	Sexe	
22,6	19,8 ; 25,5	20,9	18,1 ; 23,5	2,9*	1,7 ; 4,2	53,7	50,4 ; 56,9	Hommes	
								Femmes	
P = 0,000									
14,4*	9,6 ; 19,8	16,3*	10,9 ; 21,8	9,8*	5,5 ; 14,6	59,4	51,7 ; 66,4	Groupe d'âge	
22,9	19,2 ; 26,7	18,2	14,8 ; 21,7	4,1*	2,1 ; 6,0	54,8	50,6 ; 59,3	15-24 ans	
19,5	16,3 ; 22,7	22,9	19,5 ; 26,2	1,7**	0,7 ; 2,8	55,9	52,0 ; 59,7	25-44 ans	
11,1	8,1 ; 14,5	16,6	12,7 ; 20,7	1,4**	0,3 ; 2,8	70,9	66,2 ; 75,5	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,213									
8,3**	3,0 ; 15,0	13,1**	5,8 ; 20,7	15,9**	7,8 ; 24,4	62,7	52,2 ; 72,7	Hommes	
17,0*	12,1 ; 22,3	16,6*	11,8 ; 22,0	4,4**	1,4 ; 7,6	62,1	55,3 ; 68,9	15-24 ans	
16,9	12,7 ; 21,4	22,1	17,5 ; 26,8	x	;	x	;	25-44 ans	
9,9*	5,3 ; 15,2	15,6*	9,7 ; 21,7	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,317									
20,8*	12,7 ; 29,9	19,8*	11,7 ; 28,4	x	;	x	;	Femmes	
28,9	23,4 ; 34,2	19,9	15,3 ; 24,6	3,7**	1,3 ; 6,6	47,4	41,9 ; 53,5	15-24 ans	
22,0	17,7 ; 26,8	23,7	19,0 ; 28,4	2,7**	1,0 ; 4,6	51,6	46,2 ; 57,1	25-44 ans	
12,2*	8,2 ; 16,8	17,4*	12,2 ; 23,3	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,004									
x	;	x	;	25,9**	9,9 ; 43,2	69,5	51,0 ; 86,0	Statut pondéral	
8,3	6,2 ; 10,4	15,9	13,4 ; 18,6	6,0*	4,0 ; 8,0	69,8	66,4 ; 73,2	Poids insuffisant	
20,6	17,4 ; 24,0	23,5	20,0 ; 27,0	1,3**	0,2 ; 2,5	54,6	50,4 ; 58,7	Poids normal	
44,5	38,5 ; 50,6	21,7	16,6 ; 27,1	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
4,6**	2,3 ; 7,4	6,6*	3,9 ; 9,9	10,2*	6,1 ; 14,6	78,6	73,4 ; 83,9	Poids insuffisant	
13,3	9,7 ; 17,0	25,3	20,5 ; 30,0	1,7**	0,2 ; 3,5	59,7	54,3 ; 64,9	Poids normal	
39,9	31,0 ; 49,1	22,0*	14,5 ; 29,8	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,119									
x	;	x	;	27,6**	9,7 ; 46,3	67,3	47,7 ; 85,7	Femmes	
10,8	7,8 ; 14,0	22,3	18,4 ; 26,3	3,1**	1,4 ; 5,1	63,8	59,1 ; 68,2	Poids insuffisant	
34,2	28,2 ; 40,9	20,0	14,9 ; 25,3	x	;	x	;	Poids normal	
49,3	41,0 ; 57,8	21,4*	14,2 ; 29,2	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,000									
39,6	35,9 ; 43,5	22,3	18,9 ; 25,5	x	;	x	;	Perception à l'égard de son poids	
x	;	x	;	43,9*	26,5 ; 60,0	54,5	38,8 ; 72,2	Excès de poids	
5,7	4,2 ; 7,2	18,5	16,1 ; 21,2	3,9*	2,5 ; 5,5	71,9	68,9 ; 74,8	Trop maigre	
								À peu près normal(e)	

Tableau 27

**Répartition de la population selon le nombre de tentatives faites pour perdre du poids<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Une tentative	Deux ou trois tentatives	Quatre tentatives ou plus	Fait pratiquement toujours attention
	%			
Ensemble de la population	30,3	16,2	7,1	46,5
Sexe		P = 0,003		
Hommes	32,6	13,0	6,1	48,3
Femmes	28,7	18,3	7,7	45,3
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	29,7	24,3	5,5**	40,5
25-44 ans	36,5	15,2	6,6*	41,7
45-64 ans	28,0	15,5	7,6	48,9
65 ans et plus	18,0	13,4	8,3*	60,3
Hommes		P = 0,067		
15-24 ans	27,8*	19,0**	6,0**	47,3
25-44 ans	39,5	11,0*	6,6**	43,0
45-64 ans	31,2	13,5	5,6*	49,7
65 ans et plus	20,0*	11,6*	6,9**	61,5
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	30,9	27,4	5,3**	36,4
25-44 ans	34,6	17,9	6,7*	40,8
45-64 ans	25,8	16,9	9,0	48,3
65 ans et plus	16,6	14,7	9,3*	59,4
Statut pondéral		P = 0,285		
Poids insuffisant	26,2**	x	x	50,0**
Poids normal	33,5	14,6	7,0*	44,9
Embonpoint	31,0	15,3	5,1	48,6
Obésité	27,5	18,0	9,3	45,3
Hommes		P = 0,029		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	36,6*	4,5**	5,8**	53,1
Embonpoint	33,3	10,8	5,4*	50,6
Obésité	30,8	18,1	7,2*	44,0
Femmes		P = 0,394		
Poids insuffisant	30,6**	x	x	x
Poids normal	32,7	17,2	7,3*	42,8
Embonpoint	29,1	19,2	4,9*	46,8
Obésité	24,7	17,9	11,1	46,4

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Région									
Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
31,6	26,3 ; 36,9	17,0	12,9 ; 21,5	9,2*	5,7 ; 13,0	42,1	36,2 ; 47,9	Ensemble de la population	
P = 0,180									
37,1	27,9 ; 46,6	12,5*	6,7 ; 19,0	6,6**	2,1 ; 12,0	43,8	33,8 ; 53,4	Sexe	
28,2	21,7 ; 34,9	19,9	14,2 ; 25,9	10,9*	6,0 ; 16,2	41,0	34,0 ; 48,2	Hommes	
								Femmes	
P = 0,807									
24,7**	9,0 ; 43,5	26,9**	9,1 ; 45,8	x	;	x	;	Groupe d'âge	
39,5	30,5 ; 48,8	14,2*	8,0 ; 21,1	7,3**	2,1 ; 13,2	39,0	29,6 ; 48,4	15-24 ans	
27,4	19,8 ; 35,8	14,9*	8,8 ; 21,8	13,9*	7,6 ; 21,0	43,8	34,5 ; 53,1	25-44 ans	
21,9**	8,6 ; 36,1	26,6**	12,3 ; 42,9	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 1,000									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
45,1*	28,2 ; 63,1	x	;	x	;	44,0*	25,5 ; 61,1	15-24 ans	
33,6*	20,4 ; 47,5	16,1**	5,7 ; 28,2	7,1**	0,8 ; 15,1	43,2*	28,8 ; 58,1	25-44 ans	
x	;	x	;	x	;	48,9**	21,7 ; 76,2	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,787									
21,7**	3,5 ; 44,6	30,7**	6,6 ; 56,5	x	;	x	;	Femmes	
36,2*	25,8 ; 47,4	19,2*	10,4 ; 28,9	8,4**	1,6 ; 16,4	36,1	26,2 ; 46,8	15-24 ans	
23,0*	13,3 ; 33,9	14,0**	6,7 ; 23,0	18,8**	8,9 ; 29,5	44,2	32,1 ; 56,2	25-44 ans	
19,8**	4,0 ; 37,6	31,3**	11,8 ; 52,9	x	;	x	;	45-64 ans	
								65 ans et plus	
P = 0,253									
x	;	x	;	x	;	x	;	Statut pondéral	
29,4*	17,4 ; 42,5	12,4**	3,7 ; 21,8	18,6**	8,3 ; 30,1	39,6*	25,1 ; 52,9	Poids insuffisant	
39,5	30,6 ; 48,7	16,5*	10,0 ; 23,5	5,1**	0,9 ; 10,1	38,9	30,1 ; 47,8	Poids normal	
25,6*	17,6 ; 34,4	19,6*	12,9 ; 27,4	8,6**	3,2 ; 15,1	46,2	36,1 ; 55,5	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,758									
x	;	x	;	x	;	x	;	Hommes	
x	;	x	;	x	;	61,4*	28,7 ; 90,6	Poids insuffisant	
51,1*	35,6 ; 66,4	8,9**	2,1 ; 17,4	x	;	x	;	Poids normal	
28,7*	16,0 ; 42,5	18,7**	8,3 ; 31,5	x	;	x	;	Embonpoint	
								Obésité	
P = 0,716									
x	;	x	;	x	;	x	;	Femmes	
32,0*	17,5 ; 48,0	16,1**	5,1 ; 28,7	18,8**	6,7 ; 32,2	33,1*	18,5 ; 48,9	Poids insuffisant	
31,3*	20,6 ; 42,6	21,8*	11,7 ; 32,5	x	;	x	;	Poids normal	
23,0*	12,8 ; 34,8	20,3*	11,0 ; 30,6	13,6**	4,4 ; 23,7	43,1	31,1 ; 55,0	Embonpoint	
								Obésité	

Tableau 28

**Répartition de la population selon le nombre de consultations<sup>1</sup> auprès d'un professionnel de la santé et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Aucune	Une	Deux ou plus	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	87,1	7,2	5,7	86,7	83,9 ; 89,3	7,8	5,8 ; 9,9	5,5*	3,8 ; 7,5
Sexe	P = 0,001			P = 0,199					
Hommes	88,9	6,9	4,2	87,6	83,3 ; 91,5	8,8*	5,6 ; 12,3	3,6**	1,3 ; 6,3
Femmes	85,7	7,5	6,8	86,0	82,2 ; 89,5	7,0*	4,6 ; 9,8	7,0*	4,5 ; 9,9
Groupe d'âge	P = 0,018			P = 0,862					
15-24 ans	82,0	10,7*	7,3*	87,6	77,6 ; 96,0	x	;	x	;
25-44 ans	88,6	6,6	4,8	83,8	78,7 ; 88,7	8,7*	5,1 ; 12,8	7,5*	3,9 ; 11,4
45-64 ans	86,7	7,2	6,1	88,5	84,5 ; 92,1	6,8*	4,0 ; 10,0	4,7**	2,3 ; 7,5
65 ans et plus	88,8	5,8	5,4	88,7	81,7 ; 94,6	6,6**	1,9 ; 12,5	4,7**	0,6 ; 9,4
Hommes	P = 0,121			P = 0,902					
15-24 ans	87,1	8,9**	3,9**	86,7	68,5 ; 100,0	x	;	x	;
25-44 ans	91,8	5,3*	2,9*	87,8	79,8 ; 95,0	x	;	x	;
45-64 ans	87,1	7,7	5,2	89,1	83,0 ; 94,6	8,4**	3,4 ; 14,1	2,5**	0,2 ; 5,6
65 ans et plus	87,2	7,8*	5,0*	81,8	67,6 ; 93,3	x	;	x	;
Femmes	P = 0,017			P = 0,950					
15-24 ans	78,8	11,8*	9,4*	88,1	75,7 ; 98,7	x	;	x	;
25-44 ans	86,0	7,6	6,4	81,0	73,8 ; 87,6	10,3**	5,2 ; 16,1	8,7**	4,2 ; 14,2
45-64 ans	86,3	6,9	6,7	88,0	82,5 ; 92,8	5,5**	2,4 ; 9,3	6,5**	2,6 ; 11,1
65 ans et plus	89,9	4,3*	5,8*	93,9	86,8 ; 99,6	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,005			P = 0,041					
Poids insuffisant	94,0	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,8	4,8	3,5*	91,1	86,0 ; 95,5	4,2**	1,2 ; 7,9	4,7**	1,3 ; 8,6
Embonpoint	87,4	7,9	4,8	87,5	83,4 ; 91,3	9,4*	6,2 ; 12,9	3,1**	1,1 ; 5,5
Obésité	82,0	8,7	9,2	82,0	75,9 ; 87,4	8,6*	4,8 ; 12,9	9,4*	5,2 ; 14,1
Hommes	P = 0,002			P = 0,917					
Poids insuffisant	97,9	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	92,8	4,7**	2,5**	90,6	78,7 ; 100,0	x	;	x	;
Embonpoint	89,7	6,9	3,3	90,2	85,0 ; 94,8	x	;	x	;
Obésité	85,2	8,2	6,6*	82,1	72,3 ; 90,5	9,4**	3,9 ; 16,6	8,5**	2,0 ; 15,9
Femmes	P = 0,034			P = 0,493					
Poids insuffisant	93,2	x	x	x	;	x	;	x	;
Poids normal	91,4	4,8	3,8*	91,2	85,5 ; 96,2	4,0**	0,5 ; 8,1	4,8**	1,0 ; 9,5
Embonpoint	84,6	9,0	6,4	84,0	77,0 ; 90,4	9,5**	4,7 ; 15,1	6,5**	2,0 ; 11,6
Obésité	79,1	9,2	11,8	81,9	73,9 ; 89,0	7,9**	2,8 ; 14,1	10,2**	4,8 ; 16,6

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 29

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Un ou plus	Aucun	Un ou plus		Aucun	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	7,8	92,2	6,9*	5,0 ; 9,2	93,1	90,8 ; 95,0
Sexe	P = 0,024		P = 0,001			
Hommes	6,6	93,4	2,6**	0,9 ; 4,5	97,4	95,5 ; 99,1
Femmes	8,6	91,4	10,1*	6,9 ; 13,7	89,9	86,3 ; 93,1
Groupe d'âge	P = 0,011		P = 0,534			
15-24 ans	11,2*	88,8	8,2**	0,9 ; 17,3	91,8	82,7 ; 99,1
25-44 ans	8,0	92,0	8,4*	4,5 ; 12,7	91,6	87,3 ; 95,5
45-64 ans	7,5	92,5	6,2*	3,5 ; 9,1	93,8	90,9 ; 96,5
65 ans et plus	4,9	95,1	3,2**	0,2 ; 7,1	96,8	92,9 ; 99,8
Hommes	P = 0,409		P = 0,732			
15-24 ans	9,3**	90,7	x	;	x	;
25-44 ans	5,4*	94,6	x	;	x	;
45-64 ans	7,0	93,0	3,0**	0,4 ; 6,3	97,0	93,7 ; 99,6
65 ans et plus	6,5*	93,5	x	;	x	;
Femmes	P = 0,003		P = 0,340			
15-24 ans	12,3*	87,7	12,8**	1,4 ; 26,8	87,2	73,2 ; 98,6
25-44 ans	9,9	90,1	12,7*	6,6 ; 19,2	87,3	80,8 ; 93,4
45-64 ans	7,8	92,2	8,8*	4,6 ; 13,6	91,2	86,4 ; 95,4
65 ans et plus	3,8*	96,2	x	;	x	;
Statut pondéral	P = 0,000		P = 0,021			
Poids insuffisant	15,6**	84,4	x	;	x	;
Poids normal	6,1	93,9	6,3**	2,7 ; 10,6	93,7	89,4 ; 97,3
Embonpoint	6,6	93,4	3,8**	1,5 ; 6,8	96,2	93,2 ; 98,5
Obésité	11,3	88,7	11,3*	6,4 ; 16,2	88,7	83,8 ; 93,6
Hommes	P = 0,000		P = .			
Poids insuffisant	x	x	x	;	x	;
Poids normal	3,0*	97,0	x	;	x	;
Embonpoint	5,1*	94,9	x	;	x	;
Obésité	11,5	88,5	7,8**	2,9 ; 13,9	92,2	86,1 ; 97,1
Femmes	P = 0,032		P = 0,239			
Poids insuffisant	16,9**	83,1	x	;	x	;
Poids normal	7,0	93,0	7,8**	3,4 ; 13,0	92,2	87,0 ; 96,6
Embonpoint	8,4	91,6	8,8**	3,5 ; 15,4	91,2	84,6 ; 96,5
Obésité	11,1	88,9	14,4**	6,7 ; 22,4	85,6	77,6 ; 93,3

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 30

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Ne pas manger pendant toute une journée</b>	P = 0,758			P = 'n.d.'					
Souvent	0,8*	0,7**	0,9*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,6	1,9*	1,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	2,8	2,6*	2,9	2,7*	1,5 ; 4,2	2,3**	0,6 ; 4,4	3,0**	1,3 ; 5,2
Jamais	94,8	94,8	94,8	96,1	94,3 ; 97,5	97,5	95,3 ; 99,2	95,0	92,4 ; 97,3
<b>Sauter des repas</b>	P = 0,013			P = 0,082					
Souvent	4,6	4,2	4,9	3,9*	2,4 ; 5,6	1,5**	0,3 ; 3,1	5,7*	3,2 ; 8,4
À l'occasion	7,4	8,9	6,3	7,1	5,0 ; 9,2	9,1*	5,1 ; 13,0	5,7*	3,4 ; 8,0
Rarement	5,1	5,5	4,9	4,8*	3,1 ; 6,7	5,4**	2,7 ; 8,6	4,4**	2,2 ; 7,0
Jamais	82,9	81,4	84,0	84,1	81,1 ; 87,3	84,0	79,2 ; 88,8	84,2	80,1 ; 88,2
<b>Prendre des substituts de repas</b>	P = 0,099			P = 0,486					
Souvent	1,9	1,3*	2,4	2,1**	0,9 ; 3,4	x	;	3,3**	1,4 ; 5,6
À l'occasion	7,1	6,8	7,3	7,2*	5,1 ; 9,6	x	;	7,6*	4,9 ; 10,6
Rarement	4,5	4,3	4,5	4,0*	2,5 ; 5,7	3,4**	1,1 ; 6,3	4,5*	2,5 ; 6,8
Jamais	86,5	87,5	85,7	86,7	83,8 ; 89,4	89,6	85,0 ; 93,8	84,6	80,7 ; 88,3
<b>Prendre des laxatifs</b>	P = 0,479			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6*	0,7**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,9*	0,7**	1,0*	0,8**	0,1 ; 1,8	x	;	x	;
Jamais	98,2	98,5	98,0	98,5	97,3 ; 99,5	98,9	97,2 ; 100,0	98,2	96,5 ; 99,6
<b>Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)</b>	P = 0,858			P = 'n.d.'					
Souvent	0,6*	0,6**	0,5**	0,6**	0,0 ; 1,4	x	;	x	;
À l'occasion	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3*	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	98,9	98,8	98,7	97,7 ; 99,6	99,1	97,8 ; 100,0	98,4	96,9 ; 99,7
<b>Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)</b>	P = 0,164			P = 'n.d.'					
Souvent	0,4**	0,2**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,7*	0,4**	1,0*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5*	0,2**	0,8*	0,8**	0,1 ; 1,6	x	;	1,3**	0,1 ; 2,7
Jamais	98,4	99,2	97,7	98,2	96,9 ; 99,3	99,8	99,0 ; 100,0	97,1	94,9 ; 98,9
<b>Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin</b>	P = 0,265			P = 'n.d.'					
Souvent	0,5**	x	0,4**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,3**	0,2**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,1	99,2	99,0	99,3	98,5 ; 99,9	99,6	98,6 ; 100,0	99,1	97,8 ; 100,0
<b>Prendre des produits amaigrissants</b>	P = 0,006			P = 'n.d.'					
Souvent	0,3**	0,1**	0,5**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	1,2*	0,9**	1,3*	x	;	x	;	x	;
Rarement	1,3	0,5**	1,9*	1,4**	0,5 ; 2,5	x	;	2,2**	0,8 ; 4,1
Jamais	97,3	98,6	96,3	97,6	96,3 ; 98,8	98,9	97,4 ; 100,0	96,7	94,5 ; 98,4

Tableau 30 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Commencer ou recommencer à fumer</b>	P = 0,580			P = 'n.d.'					
Souvent	0,7*	0,5**	0,8*	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,4*	0,3**	0,5*	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,5**	0,5**	0,4**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,4	98,6	98,3	99,1	98,2 ; 99,8	99,6	98,7 ; 100,0	98,7	97,2 ; 99,9
<b>Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines</b>	P = 0,881			P = 'n.d.'					
Souvent	0,2**	0,2**	0,2**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,6**	0,6**	0,6**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,2*	0,1**	0,3**	x	;	x	;	x	;
Jamais	98,9	99,0	98,9	99,5	98,8 ; 100,0	99,7	98,9 ; 100,0	99,3	98,3 ; 100,0
<b>Se faire vomir</b>	P = 0,607			P = 'n.d.'					
Souvent	0,1**	x	0,1**	x	;	x	;	x	;
À l'occasion	0,2**	x	0,3**	x	;	x	;	x	;
Rarement	0,1**	x	0,2**	x	;	x	;	x	;
Jamais	99,6	99,9	99,4	99,7	99,2 ; 100,0	99,6	98,7 ; 100,0	99,7	99,2 ; 100,0

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 31

**Répartition de la population selon le nombre de recours à des méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			
	Aucune	Une à quatre méthodes	Cinq à huit méthodes	Neuf méthodes et plus
	%			
Ensemble de la population	4,3	34,7	44,6	16,4
Sexe		P = 0,000		
Hommes	5,4	38,5	42,3	13,8
Femmes	3,4	31,9	46,3	18,4
Groupe d'âge		P = 0,000		
15-24 ans	2,8*	35,8	44,5	16,9
25-44 ans	4,2	30,6	45,2	20,0
45-64 ans	4,1	35,6	44,8	15,4
65 ans et plus	6,5*	43,0	42,1	8,4
Hommes		P = 0,097		
15-24 ans	4,3**	43,7	38,8	13,2*
25-44 ans	5,7*	34,8	43,6	15,9
45-64 ans	4,8	39,5	42,1	13,6
65 ans et plus	8,0**	42,5	41,9	7,6*
Femmes		P = 0,000		
15-24 ans	1,9**	30,9	48,1	19,1
25-44 ans	3,1*	27,4	46,4	23,1
45-64 ans	3,6	32,8	46,8	16,8
65 ans et plus	5,5*	43,3	42,3	8,9
Statut pondéral		P = 0,388		
Poids insuffisant	17,6**	39,5**	33,1**	9,9**
Poids normal	4,6	36,2	42,5	16,8
Embonpoint	4,0	35,0	45,2	15,7
Obésité	4,3	32,9	45,4	17,3
Hommes		P = 0,951		
Poids insuffisant	x	x	x	x
Poids normal	7,1*	38,6	38,7	15,6
Embonpoint	5,0	39,2	42,9	13,0
Obésité	5,0*	37,2	43,7	14,0
Femmes		P = 0,374		
Poids insuffisant	9,5**	39,2**	x	x
Poids normal	3,8	35,4	43,6	17,1
Embonpoint	3,0*	30,2	48,0	18,9
Obésité	3,6*	28,8	47,1	20,5

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région									
Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus			
%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)	%	Intervalle de confiance (95%)		
4,0*	2,4 ; 5,8	36,6	32,7 ; 40,5	44,1	40,1 ; 48,3	15,3	12,5 ; 18,2	Ensemble de la population	
P = 0,010									
5,7**	2,7 ; 9,3	40,4	34,0 ; 47,3	43,5	36,8 ; 50,2	10,3*	6,7 ; 14,2	Sexe	
2,8**	1,2 ; 4,6	33,8	29,2 ; 38,5	44,6	39,6 ; 49,7	18,9	14,9 ; 23,2	Hommes	
P = 0,483									
x	;	39,3*	26,4 ; 52,9	46,5	32,3 ; 60,4	x	;	Femmes	
5,7**	2,4 ; 9,4	31,8	25,0 ; 38,4	42,8	36,0 ; 50,0	19,7	14,4 ; 25,4	Groupe d'âge	
4,0**	1,7 ; 6,7	36,8	30,9 ; 42,7	45,0	39,2 ; 50,9	14,2	10,2 ; 18,6	15-24 ans	
x	;	48,8	38,3 ; 59,1	42,1	32,0 ; 52,2	x	;	25-44 ans	
P = 0,973									
x	;	48,8*	24,1 ; 73,0	42,6**	18,5 ; 66,8	x	;	45-64 ans	
10,0**	3,0 ; 17,9	34,8*	22,5 ; 46,7	44,1	32,0 ; 56,8	11,1**	4,5 ; 19,2	Hommes	
4,1**	0,4 ; 8,7	42,7	33,2 ; 52,2	41,9	33,0 ; 50,9	11,4*	5,8 ; 17,4	15-24 ans	
x	;	41,3*	24,5 ; 59,0	49,8*	31,9 ; 66,8	x	;	25-44 ans	
P = 0,694									
x	;	34,2*	18,5 ; 50,3	48,7*	31,6 ; 65,2	x	;	45-64 ans	
x	;	29,8	22,1 ; 38,0	42,0	33,5 ; 51,1	x	;	Femmes	
3,9**	1,1 ; 7,3	32,0	24,5 ; 39,6	47,6	39,5 ; 55,8	16,5*	10,4 ; 23,1	15-24 ans	
x	;	54,0	40,6 ; 66,5	36,8*	25,3 ; 49,3	x	;	25-44 ans	
P = 0,761									
x	;	x	;	x	;	x	;	45-64 ans	
4,1**	1,1 ; 7,6	41,2	33,8 ; 48,9	41,3	33,5 ; 49,1	13,4*	8,4 ; 18,5	Statut pondéral	
3,1**	1,0 ; 5,7	35,2	29,0 ; 41,3	45,9	39,6 ; 52,4	15,8	11,4 ; 20,4	Poids insuffisant	
5,5**	2,1 ; 9,7	34,7	27,3 ; 42,0	43,7	35,7 ; 51,4	16,1*	10,8 ; 22,1	Poids normal	
P = 0,964									
x	;	x	;	x	;	x	;	Embonpoint	
x	;	42,5*	24,3 ; 61,1	36,0*	18,5 ; 54,5	x	;	Obésité	
4,7**	0,9 ; 9,0	40,3	31,1 ; 49,2	45,9	36,8 ; 55,1	9,1**	4,6 ; 14,2	Hommes	
6,3**	0,8 ; 13,5	40,5*	28,5 ; 52,9	43,0	30,9 ; 55,3	10,3**	3,9 ; 18,0	Poids insuffisant	
P = 0,500									
x	;	x	;	x	;	x	;	Poids normal	
3,0**	0,4 ; 5,9	41,0	33,0 ; 49,4	42,5	33,7 ; 50,8	13,5*	8,2 ; 19,2	Embonpoint	
x	;	28,6	20,5 ; 37,0	45,8	37,0 ; 55,4	x	;	Obésité	
4,8**	0,6 ; 10,0	29,6*	20,2 ; 39,1	44,4	34,0 ; 54,2	21,2*	13,1 ; 30,1	Femmes	

Tableau 32

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)</b>		P = 0,018				P = 0,928				
Oui, presque tous les jours	48,2	49,6	47,3	47,1	43,1 ; 51,1	47,3	40,5 ; 53,5	46,9	41,8 ; 52,1	
Oui, à l'occasion	37,4	35,1	39,0	37,5	33,5 ; 41,3	36,8	30,4 ; 43,0	38,0	33,3 ; 43,1	
Non	14,4	15,3	13,7	15,5	12,8 ; 18,2	16,0	11,5 ; 20,8	15,1	11,6 ; 18,6	
<b>Diminuer les portions</b>		P = 0,000				P = 0,043				
Oui, presque tous les jours	42,6	37,3	46,5	41,6	37,8 ; 45,7	35,4	29,6 ; 42,1	46,0	41,0 ; 51,3	
Oui, à l'occasion	37,8	40,1	36,1	39,1	35,1 ; 42,9	43,6	37,2 ; 50,1	35,9	31,0 ; 40,7	
Non	19,6	22,6	17,4	19,3	16,2 ; 22,3	21,0	15,9 ; 26,5	18,0	14,2 ; 21,8	
<b>Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	43,3	36,4	48,3	43,5	39,5 ; 47,6	32,4	26,3 ; 38,6	51,5	46,6 ; 56,4	
Oui, à l'occasion	29,0	31,2	27,4	30,8	27,0 ; 34,4	36,2	29,9 ; 42,5	26,9	22,3 ; 31,5	
Non	27,7	32,4	24,3	25,7	22,3 ; 29,2	31,4	25,5 ; 37,4	21,6	17,5 ; 25,8	
<b>Réduire le grignotage entre les repas</b>		P = 0,014				P = 0,839				
Oui, presque tous les jours	44,1	41,6	46,0	43,6	39,4 ; 47,5	42,6	36,1 ; 49,0	44,3	39,1 ; 49,4	
Oui, à l'occasion	29,8	31,0	28,9	32,5	28,8 ; 36,5	33,9	27,9 ; 40,4	31,6	26,9 ; 36,4	
Non	26,1	27,4	25,1	23,9	20,6 ; 27,4	23,6	18,2 ; 29,2	24,2	19,7 ; 28,6	
<b>Manger plus de fruits et de légumes</b>		P = 0,000				P = 0,011				
Oui, presque tous les jours	64,1	57,4	69,1	63,4	59,4 ; 67,1	57,3	50,9 ; 63,4	67,8	62,7 ; 72,4	
Oui, à l'occasion	18,5	24,2	14,3	17,3	14,2 ; 20,4	22,4	17,2 ; 28,1	13,6	10,2 ; 17,1	
Non	17,4	18,5	16,6	19,4	16,3 ; 22,6	20,3	15,6 ; 25,5	18,7	14,8 ; 22,9	
<b>Manger des aliments moins gras</b>		P = 0,000				P = 0,001				
Oui, presque tous les jours	64,4	56,8	70,0	64,8	61,1 ; 68,7	58,7	52,2 ; 65,1	69,3	64,5 ; 73,9	
Oui, à l'occasion	23,0	29,2	18,4	23,1	19,5 ; 26,5	31,1	24,8 ; 37,0	17,4	13,6 ; 21,4	
Non	12,6	14,0	11,6	12,0	9,5 ; 14,8	10,2*	6,6 ; 14,2	13,4	9,8 ; 17,2	
<b>Manger des aliments moins sucrés</b>		P = 0,000				P = 0,007				
Oui, presque tous les jours	51,0	47,0	53,8	47,6	43,5 ; 51,8	40,5	34,3 ; 47,1	52,7	47,5 ; 57,9	
Oui, à l'occasion	27,5	28,6	26,7	31,5	27,7 ; 35,3	36,5	30,1 ; 42,9	27,9	23,2 ; 32,6	
Non	21,5	24,4	19,4	20,9	17,6 ; 24,2	23,0	17,8 ; 28,4	19,4	15,5 ; 23,4	
<b>Réduire la consommation d'alcool</b>		P = 0,000				P = 0,081				
Oui, presque tous les jours	12,6	13,9	11,6	11,0	8,6 ; 13,4	12,4*	8,5 ; 16,8	10,0	7,0 ; 12,9	
Oui, à l'occasion	15,4	18,8	13,0	14,8	12,0 ; 17,7	18,1	13,1 ; 23,1	12,4	9,1 ; 16,0	
Non	72,0	67,3	75,4	74,2	70,7 ; 77,8	69,5	63,7 ; 75,3	77,6	73,6 ; 81,8	
<b>Diminuer la consommation de boissons sucrées</b>		P = 0,000				P = 0,001				
Oui, presque tous les jours	35,4	39,3	32,5	33,5	29,8 ; 37,3	37,0	30,8 ; 43,6	30,9	26,3 ; 35,9	
Oui, à l'occasion	14,8	17,5	12,8	16,8	13,6 ; 20,1	22,1	16,2 ; 28,2	12,9	9,6 ; 16,7	
Non	49,9	43,2	54,7	49,7	45,8 ; 53,7	40,9	34,8 ; 47,1	56,2	51,5 ; 61,2	



Tableau 32 (suite)

**Répartition de la population selon la fréquence du recours à certaines méthodes saines pour la santé<sup>1</sup> et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région						
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes		
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
<b>Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau</b>		P = 0,000				P = 0,083				
Oui, presque tous les jours	54,1	50,5	56,7	52,1	48,1 ; 56,0	49,3	42,7 ; 55,6	54,2	49,0 ; 58,9	
Oui, à l'occasion	16,3	20,7	13,1	17,6	14,3 ; 20,8	21,6	16,2 ; 27,3	14,6	11,1 ; 18,3	
Non	29,6	28,8	30,2	30,3	26,9 ; 34,0	29,1	23,2 ; 35,1	31,2	26,8 ; 36,0	
<b>Cuisiner davantage</b>		P = 0,000				P = 0,000				
Oui, presque tous les jours	37,4	31,6	41,6	38,4	34,6 ; 42,1	30,7	24,9 ; 36,8	44,0	38,8 ; 48,9	
Oui, à l'occasion	14,1	16,3	12,4	14,5	11,7 ; 17,6	20,1	15,0 ; 25,5	10,5	7,6 ; 13,7	
Non	48,5	52,0	45,9	47,1	43,1 ; 51,0	49,3	42,6 ; 56,0	45,5	40,6 ; 50,5	
<b>Diminuer la consommation de fast-food et de repas livrés</b>		P = 0,002				P = 0,192				
Oui, presque tous les jours	37,5	38,2	37,0	38,1	34,5 ; 41,9	38,1	31,8 ; 44,5	38,1	33,4 ; 42,9	
Oui, à l'occasion	25,0	27,1	23,5	27,2	23,6 ; 30,8	30,6	24,9 ; 36,8	24,7	20,3 ; 29,3	
Non	37,5	34,7	39,5	34,6	30,9 ; 38,4	31,2	25,5 ; 37,1	37,1	32,3 ; 42,1	

1. Au cours d'une période de six mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 7 DROGUES

Tableau 33

**Répartition de la population selon le type de consommateurs de drogues et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		
	Jamais consommé	Anciens consommateurs <sup>1</sup>	Consommateurs actuels <sup>2</sup>
	%		
Ensemble de la population	54,4	32,5	13,1
Sexe	P = 0,000		
Hommes	48,2	34,6	17,2
Femmes	60,4	30,6	9,0
Groupe d'âge	P = 0,000		
15-17 ans	57,9	11,5	30,5
18-24 ans	32,8	30,3	36,9
	P = 0,000		
15-24 ans	42,3	23,2	34,5
25-44 ans	41,7	42,0	16,2
45-64 ans	56,7	37,8	5,5
65 ans et plus	92,0	7,3	0,7*
Hommes	P = 0,000		
15-17 ans	55,1	11,5*	33,4
18-24 ans	30,6	25,5	43,9
	P = 0,000		
15-24 ans	40,1	20,1	39,8
25-44 ans	36,4	41,2	22,4
45-64 ans	48,9	43,5	7,7
65 ans et plus	88,7	10,4	0,9**
Femmes	P = 0,000		
15-17 ans	61,0	11,6*	27,4
18-24 ans	35,1	35,0	29,8
	P = 0,000		
15-24 ans	44,6	26,4	28,9
25-44 ans	47,3	42,8	9,9
45-64 ans	64,3	32,4	3,3
65 ans et plus	94,6	4,9	0,5**

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours d'une période de 12 mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Région						
Jamais consommé		Anciens consommateurs <sup>1</sup>		Consommateurs actuels <sup>2</sup>		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
54,4	52,1 ; 56,9	32,0	29,7 ; 34,2	13,6	11,9 ; 15,4	Ensemble de la population
		P = 0,000				Sexe
50,0	46,5 ; 53,7	33,5	30,0 ; 37,0	16,5	13,7 ; 19,2	Hommes
58,7	55,6 ; 61,8	30,5	27,5 ; 33,5	10,8	8,8 ; 13,0	Femmes
		P = 0,000				Groupe d'âge
55,4	43,8 ; 67,7	11,2**	4,0 ; 20,0	33,4*	22,2 ; 44,3	15-17 ans
29,1*	19,8 ; 38,0	33,8	24,3 ; 43,2	37,1	28,4 ; 46,7	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
40,1	32,8 ; 47,5	24,3	18,0 ; 31,3	35,6	28,7 ; 42,5	25-44 ans
40,1	35,8 ; 44,7	42,5	37,7 ; 47,0	17,4	14,0 ; 21,1	45-64 ans
59,3	55,5 ; 63,2	35,5	31,8 ; 39,2	5,3*	3,6 ; 7,1	65 ans et plus
93,4	90,5 ; 96,0	x	;	x	;	
		P = 0,002				Hommes
53,1	36,2 ; 71,0	14,2**	2,1 ; 28,5	32,7*	16,6 ; 49,0	15-17 ans
27,2*	14,5 ; 40,3	29,2*	16,8 ; 42,6	43,6*	30,3 ; 58,0	18-24 ans
		P = 0,002				15-24 ans
38,1	27,9 ; 48,8	22,9*	13,8 ; 32,4	39,0	29,3 ; 49,3	25-44 ans
36,6	30,0 ; 43,1	40,4	33,5 ; 47,3	23,0	17,2 ; 29,0	45-64 ans
53,3	47,5 ; 59,1	41,2	35,7 ; 47,1	5,4*	3,0 ; 8,0	65 ans et plus
90,9	85,5 ; 95,7	x	;	x	;	
		P = 0,012				Femmes
57,8	40,8 ; 73,4	x	;	x	;	15-17 ans
31,1*	17,7 ; 44,4	38,5*	25,0 ; 52,4	30,3*	19,2 ; 43,1	18-24 ans
		P = 0,000				15-24 ans
42,3	31,9 ; 52,6	25,8*	16,7 ; 35,5	31,9	22,6 ; 41,3	25-44 ans
43,5	37,6 ; 49,5	44,6	38,8 ; 50,7	11,9	8,3 ; 15,7	45-64 ans
65,0	60,0 ; 70,1	29,9	25,2 ; 34,8	5,1*	2,8 ; 7,7	65 ans et plus
95,5	92,5 ; 97,9	x	;	x	;	

Tableau 34

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours de la vie et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	43,9	50,1	37,9	43,8	41,4 ; 46,2	48,1	44,5 ; 51,6	39,7	36,6 ; 42,9
Non	56,1	49,9	62,1	56,2	53,8 ; 58,6	51,9	48,4 ; 55,5	60,3	57,1 ; 63,4
<b>Cocaïne (crack)</b>	P = 0,000			P = 0,000					
Oui	10,6	14,4	6,8	10,0	8,5 ; 11,5	13,0	10,4 ; 15,7	7,0	5,6 ; 8,7
Non	89,4	85,6	93,2	90,0	88,5 ; 91,5	87,0	84,3 ; 89,6	93,0	91,3 ; 94,4
<b>Amphétamines</b>	P = 0,000			P = 0,062					
Oui	7,3	9,1	5,5	7,4	6,1 ; 8,8	8,7	6,6 ; 11,2	6,1	4,7 ; 7,8
Non	92,7	90,9	94,5	92,6	91,2 ; 93,9	91,3	88,8 ; 93,4	93,9	92,2 ; 95,3
<b>Ecstasy</b>	P = 0,000			P = 0,412					
Oui	5,1	6,3	3,9	5,3	4,2 ; 6,5	5,8*	4,0 ; 7,7	4,8*	3,4 ; 6,3
Non	94,9	93,7	96,1	94,7	93,5 ; 95,8	94,2	92,3 ; 96,0	95,2	93,7 ; 96,6
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>	P = 0,000			P = 0,004					
Oui	12,3	16,1	8,7	11,4	9,9 ; 13,1	13,8	11,1 ; 16,5	9,1	7,3 ; 11,0
Non	87,7	83,9	91,3	88,6	86,9 ; 90,1	86,2	83,5 ; 88,9	90,9	89,0 ; 92,7
<b>Héroïne (smack)</b>	P = 0,071			P = 0,749					
Oui	0,5	0,6*	0,4*	0,5**	0,2 ; 1,0	0,6**	0,1 ; 1,4	0,5**	0,1 ; 1,0
Non	99,5	99,4	99,6	99,5	99,0 ; 99,8	99,4	98,6 ; 99,9	99,5	99,0 ; 99,9
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>	P = 0,000			P = 0,283					
Oui	0,5	0,8*	0,3*	0,4**	0,2 ; 0,8	0,6**	0,1 ; 1,2	x	;
Non	99,5	99,2	99,7	99,6	99,2 ; 99,8	99,4	98,8 ; 99,9	x	;
<b>Kétamine</b>	P = 0,000			P = 0,164					
Oui	0,8	1,2	0,3*	0,6**	0,2 ; 1,0	0,9**	0,2 ; 1,7	x	;
Non	99,2	98,8	99,7	99,4	99,0 ; 99,8	99,1	98,3 ; 99,8	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>	P = 0,179			P = 0,791					
Oui	1,8	1,9	1,6	1,6*	1,0 ; 2,3	1,5**	0,6 ; 2,6	1,7*	1,0 ; 2,6
Non	98,2	98,1	98,4	98,4	97,7 ; 99,0	98,5	97,4 ; 99,4	98,3	97,4 ; 99,0
<b>Colle (solvant)</b>	P = 0,000			P = 0,649					
Oui	1,6	2,3	0,9	1,5*	0,9 ; 2,2	1,6**	0,7 ; 2,7	1,3**	0,6 ; 2,2
Non	98,4	97,7	99,1	98,5	97,8 ; 99,1	98,4	97,3 ; 99,3	98,7	97,8 ; 99,4
<b>Drogues par injection</b>	P = 0,000			P = 0,126					
Oui	0,5	0,7*	0,2*	0,5**	0,2 ; 0,8	0,7**	0,2 ; 1,4	x	;
Non	99,5	99,3	99,8	99,5	99,2 ; 99,8	99,3	98,6 ; 99,8	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 35

**Répartition de la population selon le type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
<b>Cannabis (marijuana, hachisch)</b>		P = 0,000				P = 0,001			
Oui	12,2	16,2	8,3	12,6	11,0 ; 14,3	15,2	12,6 ; 17,9	10,0	8,1 ; 12,1
Non	87,8	83,8	91,7	87,4	85,7 ; 89	84,8	82,1 ; 87,4	90,0	87,9 ; 91,9
<b>Cocaïne (crack)</b>		P = 0,000				P = 0,009			
Oui	1,6	2,3	0,8	1,3**	0,7 ; 2	2,1**	1,0 ; 3,5	x	;
Non	98,4	97,7	99,2	98,7	98,0 ; 99,3	97,9	96,5 ; 99,0	99,6	99,0 ; 99,9
<b>Amphétamines</b>		P = 0,000				P = 0,046			
Oui	1,8	2,4	1,3	2,4*	1,6 ; 3,2	3,2*	1,8 ; 4,7	1,6**	0,8 ; 2,5
Non	98,2	97,6	98,7	97,6	96,8 ; 98,4	96,8	95,3 ; 98,2	98,4	97,5 ; 99,2
<b>Ecstasy</b>		P = 0,003				P = 0,925			
Oui	1,4	1,7	1,0	1,5*	0,9 ; 2,2	1,5**	0,6 ; 2,5	1,6**	0,7 ; 2,6
Non	98,6	98,3	99,0	98,5	97,8 ; 99,1	98,5	97,5 ; 99,4	98,4	97,4 ; 99,3
<b>Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)</b>		P = 0,000				P = 0,076			
Oui	0,8	1,2	0,4*	0,7**	0,3 ; 1,3	1,2**	0,3 ; 2,2	x	;
Non	99,2	98,8	99,6	99,3	98,7 ; 99,7	98,8	97,8 ; 99,7	x	;
<b>Héroïne (smack)</b>		P = 0,000				P = 'n.d.'			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;
<b>Crystal meth (méthamphétamines)</b>		P = 0,523				P = 'n.d.'			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Kétamine</b>		P = 0,120				P = 'n.d.'			
Oui	0,1**	0,1**	x	x	;	x	;	x	;
Non	99,9	99,9	x	x	;	x	;	x	;
<b>Médicaments non prescrits</b>		P = 0,465				P = 0,858			
Oui	0,4*	0,4*	0,3*	0,5**	0,2 ; 0,9	x	;	0,5**	0,1 ; 1,1
Non	99,6	99,6	99,7	99,5	99,1 ; 99,8	x	;	99,5	98,9 ; 99,9
<b>Colle (solvant)</b>		P = 0,988				P = .			
Oui	x	x	x	x	;	x	;	x	;
Non	x	x	x	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 36

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	13,1	17,2	9,0	13,6	11,9 ; 15,4	16,5	13,7 ; 19,2	10,8	8,8 ; 13,0
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	30,5	33,4	27,4	33,4*	22,2 ; 44,3	32,7*	16,6 ; 49,0	34,2*	18,7 ; 49,6
18-24 ans	36,9	43,9	29,8	37,1	28,4 ; 46,7	43,6*	30,3 ; 58,0	30,3*	19,2 ; 43,1
25-44 ans	16,2	22,4	9,9	17,4	14,0 ; 21,1	23,0	17,2 ; 29,0	11,9	8,3 ; 15,7
45-64 ans	5,5	7,7	3,3	5,3*	3,6 ; 7,1	5,4*	3,0 ; 8,0	5,1*	2,8 ; 7,7
65 ans et plus	0,7*	0,9**	0,5**	x	;	x	;	x	;

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 37

**Proportion des personnes ayant consommé de la drogue selon le nombre de drogues consommées<sup>1</sup> et le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Une drogue	Deux drogues	Trois drogues ou plus	Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	26,8	8,1	10,7	27,0	24,9 ; 29,1	8,0	6,6 ; 9,3	10,6	9,1 ; 12,2
Sexe	P = 0,000			P = 0,002					
Hommes	28,3	9,5	14,0	28,5	25,1 ; 31,9	8,4	6,2 ; 10,6	13,1	10,5 ; 15,8
Femmes	25,4	6,8	7,4	25,5	22,7 ; 28,4	7,6	5,9 ; 9,3	8,2	6,4 ; 10,1
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	28,2	5,2*	8,7	26,4*	16,0 ; 36,9	7,2**	1,7 ; 13,6	11,1**	4,3 ; 19,1
18-24 ans	36,6	10,3	20,3	45,2	35,9 ; 54,8	6,6**	2,2 ; 11,8	19,1*	12,4 ; 26,9
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,4	8,4	15,9	37,3	30,3 ; 44,5	6,8**	3,4 ; 10,7	15,7*	10,8 ; 21,3
45-64 ans	29,9	12,3	16,1	30,5	26,2 ; 34,6	12,8	9,8 ; 15,8	16,7	13,4 ; 20,4
65 ans et plus	29,0	7,1	7,2	27,1	23,8 ; 30,5	6,9	4,8 ; 9,0	6,8	4,8 ; 9,0
Hommes	7,1	0,5**	0,4**	6,2*	3,6 ; 9,0	x	;	x	;
15-17 ans	P = 0,000			P = 0,204					
18-24 ans	31,4	6,9**	6,7**	31,8*	15,3 ; 47,6	10,5**	1,0 ; 21,7	x	;
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,9	9,9	25,6	39,1*	26,2 ; 52,7	x	;	27,5*	15,6 ; 40,7
45-64 ans	33,0	8,7	18,3	36,0	26,0 ; 46,3	8,0**	2,5 ; 14,3	17,8*	10,3 ; 26,5
65 ans et plus	29,0	13,5	21,1	30,7	24,4 ; 37,3	12,7*	8,1 ; 17,5	19,9	14,4 ; 26,1
Femmes	32,2	9,0	10,0	30,0	25,0 ; 35,6	7,4*	4,2 ; 10,7	9,2*	5,8 ; 13,0
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,061					
25-44 ans	10,0	0,8**	0,6**	8,7**	3,9 ; 14,1	x	;	x	;
45-64 ans	P = 0,000			P = 0,000					
65 ans et plus	24,6	3,4*	10,9*	20,5**	7,7 ; 35,3	x	;	18,1**	6,0 ; 31,5
Hommes	39,2	10,7	15,0	51,6	37,5 ; 65,2	6,9**	0,7 ; 14,8	10,3**	3,7 ; 18,6
15-24 ans	P = 0,000			P = 0,000					
25-44 ans	33,8	8,1	13,5	38,6	28,5 ; 48,6	5,6**	1,3 ; 10,4	13,6*	7,3 ; 21,1
45-64 ans	30,8	11,0	11,0	30,2	24,6 ; 35,8	12,9	9,0 ; 16,7	13,5*	9,6 ; 17,5
65 ans et plus	25,9	5,3	4,5	24,2	19,7 ; 28,7	6,4*	3,8 ; 9,2	4,5*	2,4 ; 6,9
Femmes	4,8	0,2**	0,3**	4,0**	1,6 ; 6,8	x	;	x	;

1. Au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 8 SEXUALITÉ ET CONTRACEPTION

Tableau 38

**Proportion des personnes actives sexuellement<sup>1</sup> selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
		%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%
Ensemble de la population	78,1	83,0	73,4	80,5	78,9 ; 82,1	85,1	82,8 ; 87,2	76,0	73,5 ; 78,4
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	45,8	41,2	50,7	48,9	37,3 ; 60,3	40,1*	23,4 ; 56,7	58,3	42,2 ; 73,5
18-24 ans	79,9	79,9	80,0	81,3	73,6 ; 89,1	79,0	66,8 ; 89,8	83,8	72,5 ; 94,2
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	67,1	65,0	69,3	67,6	60,5 ; 74,5	62,5	51,9 ; 72,6	72,9	63,3 ; 81,9
45-64 ans	93,4	93,8	93,0	94,8	92,9 ; 96,5	95,9	93,5 ; 98,0	93,8	90,7 ; 96,5
65 ans et plus	82,7	88,9	76,6	85,0	82,5 ; 87,4	92,7	90,0 ; 95,3	77,6	73,1 ; 81,4
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Niveau inférieur au DES	59,5	67,4	51,7	63,0	58,1 ; 67,6	72,0	65,1 ; 78,2	54,2	47,4 ; 60,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	80,3	85,6	75,0	82,3	78,8 ; 85,3	83,1	78,1 ; 88,0	81,5	77,0 ; 85,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	85,4	88,7	82,2	88,0	85,1 ; 90,8	93,0	89,8 ; 95,8	82,8	78,0 ; 87,6
Diplôme d'études universitaires	86,8	90,0	83,8	88,3	85,2 ; 91,0	92,2	88,4 ; 95,4	84,8	79,8 ; 89,2
Nombre de partenaires									
Un partenaire	88,9	86,4	91,6	89,1	87,2 ; 90,7	88,0	85,4 ; 90,4	90,2	87,8 ; 92,5
Deux à quatre partenaires	9,2	10,7	7,4	9,2	7,6 ; 10,9	9,8	7,6 ; 12,2	8,4	6,3 ; 10,7
Cinq partenaires et plus	2,0	2,9	0,9*	1,8*	1,1 ; 2,6	2,2**	1,0 ; 3,6	1,4**	0,6 ; 2,3
Sexe des partenaires									
Hommes	47,8	2,1	98,2	47,6	46,3 ; 49,0	1,8**	0,8 ; 2,9	98,0	96,8 ; 99,0
Femmes	51,5	97,5	0,8	51,5	50,1 ; 52,7	97,6	96,3 ; 98,7	0,7**	0,1 ; 1,5
Hommes et femmes	0,7	0,4*	1,0	0,9**	0,4 ; 1,5	x	;	1,3**	0,5 ; 2,3

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 39

**Répartition de la population selon le nombre de partenaires sexuels<sup>1</sup> et le sexe, l'âge et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Un partenaire	Deux à quatre partenaires	Cinq partenaires ou plus	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires ou plus	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	88,9	9,2	2,0	89,1	87,2 ; 90,7	9,2	7,6 ; 10,9	1,8*	1,1 ; 2,6
<b>Sexe</b>	P = 0,000			P = 0,350					
Hommes	86,4	10,7	2,9	88,0	85,4 ; 90,4	9,8	7,6 ; 12,2	2,2**	1,0 ; 3,6
Femmes	91,6	7,4	0,9*	90,2	87,8 ; 92,5	8,4	6,3 ; 10,7	1,4**	0,6 ; 2,3
<b>Groupe d'âge</b>	P = 0,000			P = 0,002					
15-17 ans	69,1	27,6	3,4**	66,0	49,3 ; 81,0	x	;	x	;
18-24 ans	66,7	26,8	6,5	58,8	48,3 ; 69,5	33,0	23,1 ; 43,4	8,1**	2,3 ; 14,5
	P = 0,000			P = 0,002					
15-24 ans	67,3	27,0	5,7	61,0	51,9 ; 70,3	33,3	24,6 ; 42,4	5,6**	1,6 ; 10,1
25-44 ans	89,0	8,8	2,2	90,8	88,2 ; 93,3	7,3*	4,9 ; 9,7	1,9**	0,8 ; 3,2
45-64 ans	95,0	4,3	0,8*	96,0	94,2 ; 97,5	x	;	x	;
65 ans et plus	95,6	4,0*	0,4**	93,9	89,7 ; 97,3	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – hommes</b>	P = 0,000			P = 0,388					
Hommes	60,7	23,3*	16,0**	55,8*	24,6 ; 85,6	x	;	x	;
Femmes	87,3	10,2	2,5	89,1	86,6 ; 91,6	8,8	6,6 ; 11,1	2,1**	0,9 ; 3,5
Hommes et femmes	...	81,7	18,3**	...	;	x	;	x	;
<b>Sexe des partenaires – femmes</b>	P = 0,000			P = 0,397					
Hommes	92,5	6,8	0,6*	91,5	89,2 ; 93,6	7,3	5,3 ; 9,4	1,3**	0,5 ; 2,2
Femmes	92,1	x	x	x	;	x	;	x	;
Hommes et femmes	...	65,5	34,5*	...	;	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.



Tableau 40

**Proportion des personnes utilisant habituellement un moyen contraceptif<sup>1</sup> selon le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Hommes (15 ans et plus)	Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	Hommes (15 ans et plus)		Femmes (15 à 49 ans) <sup>2</sup>	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	47,9	66,6	44,6	40,8 ; 48,3	65,2	60,9 ; 69,8
Groupe d'âge – hommes	P = 0,000	...	P = 0,000	...	...	...
15-24 ans	87,9	...	88,7	78,8 ; 96,9	...	;
25-44 ans	62,4	...	60,4	53,2 ; 67,6	...	;
45-64 ans	29,9	...	25,0	19,6 ; 30,1	...	;
65 ans et plus	7,3	...	9,3**	3,3 ; 15,8	...	;
Groupe d'âge – femmes	...	P = 0,000	...	...	P = 0,000	...
15-24 ans	...	90,0	...	;	90,7	82,3 ; 97,5
25-34 ans	...	71,0	...	;	70,4	61,4 ; 78,7
35-49 ans	...	53,5	...	;	51,6	45,3 ; 58,5
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,009	P = 0,340	...	P = 0,599	...
Niveau inférieur au DES	37,9	63,9	40,0	30,6 ; 49,2	66,9	53,5 ; 79,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	62,2	45,6	37,6 ; 53,0	60,5	51,5 ; 69,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>3</sup>	53,1	68,2	49,7	42,3 ; 57,2	67,2	58,9 ; 75,3
Diplôme d'études universitaires	49,2	69,5	41,4	32,7 ; 50,0	67,6	58,5 ; 77,1
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	...	P = 0,001	...
Un partenaire	43,8	64,2	39,6	35,8 ; 43,5	61,6	56,7 ; 66,7
Deux à quatre partenaires	72,9	85,9	79,0	67,9 ; 88,1	89,9	81,4 ; 97,1
Cinq partenaires et plus	83,5	78,8	x	;	75,1*	39,4 ; 100,0
Sexe des partenaires	P = 0,433	P = 0,566	P = 0,634	...	P = 0,246	...
Hommes	x	66,6	x	;	64,9	60,4 ; 69,5
Femmes	47,8	x	44,6	40,8 ; 48,3	x	;
Hommes et femmes	57,5*	70,5	x	;	82,4	49,7 ; 100,0

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Il s'agit des femmes susceptibles d'avoir eu recours à un moyen contraceptif.

3. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 41

**Répartition de la population selon la fréquence d'utilisation du condom<sup>1</sup> et le sexe et certaines caractéristiques personnelles, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Toujours	À l'occasion	Jamais	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	14,1	14,8	71,1	12,2	10,3 ; 14,2	14,2	12,2 ; 16,2	73,6	71,3 ; 76,0
Sexe	P = 0,093			P = 0,923					
Hommes	14,8	14,9	70,3	12,5	9,8 ; 15,2	13,9	11,1 ; 16,7	73,6	70,4 ; 77,0
Femmes	13,2	14,7	72,1	11,9	9,2 ; 14,6	14,5	11,9 ; 17,3	73,6	70,4 ; 76,9
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,000					
15-17 ans	58,5	31,4	10,1*	44,4*	27,9 ; 62,9	41,5*	24,4 ; 59,0	14,1**	1,2 ; 28,6
18-24 ans	35,0	35,3	29,6	32,1*	22,0 ; 42,7	35,1	25,2 ; 45,1	32,8	23,2 ; 43,0
	P = 0,000			P = 0,000					
15-24 ans	41,0	34,3	24,7	35,8	27,1 ; 45,1	37,0	28,7 ; 45,8	27,2	19,5 ; 35,3
25-44 ans	14,5	19,9	65,6	11,5	8,6 ; 14,6	18,9	15,3 ; 22,4	69,7	65,4 ; 73,8
45-64 ans	6,4	5,0	88,6	6,5*	4,5 ; 8,7	4,3*	2,6 ; 6,3	89,1	86,4 ; 91,7
65 ans et plus	2,5*	2,5*	95,0	3,8**	0,8 ; 7,3	1,8**	0,1 ; 4,0	94,4	90,4 ; 97,7
Niveau de scolarité	P = 0,001			P = 0,904					
Niveau inférieur au DES	15,0	11,4	73,6	13,4*	8,1 ; 18,7	13,0*	8,2 ; 17,8	73,6	67,2 ; 79,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	13,9	13,9	72,1	11,0*	7,6 ; 14,5	16,3	12,5 ; 20,4	72,7	68,0 ; 77,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	13,6	16,0	70,4	13,0	9,3 ; 17,0	13,6*	9,5 ; 17,6	73,3	68,5 ; 78,4
Diplôme d'études universitaires	14,2	16,7	69,1	11,7*	8,2 ; 15,5	13,6	9,6 ; 17,7	74,8	69,7 ; 79,8
Nombre de partenaires	P = 0,001			P = 0,001					
Un partenaire	10,7	11,4	77,9	8,4	6,7 ; 10,1	10,8	8,9 ; 12,7	80,8	78,5 ; 83,3
Deux à quatre partenaires	38,9	41,5	19,6	43,1	33,1 ; 53,4	40,5	30,9 ; 50,3	16,5*	9,9 ; 24,2
Cinq partenaires et plus	51,4	42,9	5,8**	44,5*	22,0 ; 68,8	x	;	x	;

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 42

**Proportion des personnes ayant utilisé un condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus active sexuellement, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	19,1	20,0	18,2	16,1	14,0 ; 18,3	16,9	14,0 ; 20,2	15,2	12,3 ; 18,1
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
15-17 ans	70,1	76,1	64,8	57,4	39,9 ; 75,6	57,8**	27,1 ; 88,3	57,0*	35,3 ; 80,6
18-24 ans	47,9	53,3	42,5	45,5	34,4 ; 56,2	49,9*	32,8 ; 65,7	41,2*	25,0 ; 56,8
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
25-44 ans	53,6	58,8	48,5	49,1	39,6 ; 58,8	52,0	37,7 ; 65,9	46,5	34,0 ; 59,5
45-64 ans	21,0	22,1	19,8	14,9	11,6 ; 18,5	17,5*	12,2 ; 23,2	12,2*	8,1 ; 16,3
65 ans et plus	8,3	8,9	7,7	8,6	6,2 ; 11,0	8,2*	5,1 ; 11,4	9,0*	5,2 ; 13,2
	3,1*	3,9*	1,8**	4,4**	1,2 ; 8,0	6,8**	1,6 ; 12,9	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,313	P = 0,755	P = 0,071	P = 0,802		P = 0,977		P = 0,776	
Niveau inférieur au DES	18,7	20,6	16,1	18,2*	12,6 ; 24,0	18,3*	10,3 ; 26,6	18,1*	10,5 ; 26,2
Diplôme d'études secondaires (DES)	18,1	19,0	17,0	16,1	12,0 ; 20,0	16,4*	10,7 ; 22,4	15,8*	10,2 ; 21,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	19,6	20,8	18,3	16,1	11,9 ; 20,3	17,2*	10,9 ; 23,3	14,9*	8,8 ; 20,9
Diplôme d'études universitaires	20,2	19,9	20,6	14,7	10,7 ; 19,0	16,3*	10,3 ; 23,1	13,1*	8,0 ; 18,8
Nombre de partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000		P = 0,000		P = 0,000	
Un partenaire	14,9	14,5	15,3	11,5	9,5 ; 13,6	11,6	8,7 ; 14,7	11,4	8,7 ; 14,3
Deux à quatre partenaires	51,7	53,7	48,5	54,1	44,2 ; 63,8	55,7	41,8 ; 68,6	52,0	35,8 ; 66,9
Cinq partenaires et plus	60,9	61,0	60,8	53,4*	30,0 ; 77,1	58,0**	24,3 ; 92,3	45,3**	9,8 ; 79,2
Sexe des partenaires	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,233		P = 0,035		P = 0,081	
Hommes	18,7	54,0	17,9	15,4	12,5 ; 18,3	52,3**	17,1 ; 86,3	14,8	12,0 ; 17,7
Femmes	19,2	19,2	x	16,4	13,4 ; 19,7	16,4	13,4 ; 19,7	x	;
Hommes et femmes	48,0	46,8*	48,6*	36,3**	8,6 ; 68,8	x	;	44,1**	8,4 ; 85,8

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 43

**Proportion des personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon certaines caractéristiques personnelles et le sexe, population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Ensemble province	Hommes	Femmes	Ensemble région		Hommes		Femmes	
	%	%	%	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	8,2	7,1	9,2	7,6	6,1 ; 9,0	6,3*	4,4 ; 8,4	8,9	6,9 ; 10,9
Groupe d'âge	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,029		P = 0,575		P = 0,081	
15-17 ans	0,8**	x	1,3**	x	;	x	;	x	;
18-24 ans	6,4	3,1**	9,6	9,3**	3,3 ; 16,3	x	;	12,1**	2,4 ; 23,7
15-24 ans	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,023		P = 0,497		P = 0,081	
25-44 ans	4,9	2,4**	7,4	6,4**	2,2 ; 11,3	x	;	8,0**	1,6 ; 15,6
45-64 ans	11,3	9,3	13,3	9,9	7,3 ; 12,7	7,6*	3,7 ; 11,9	12,3	8,4 ; 16,2
65 ans et plus	8,6	8,0	9,1	7,8	5,6 ; 9,9	6,7*	3,9 ; 9,7	8,8*	5,8 ; 12,1
	2,7	3,2*	2,2	2,6**	1,0 ; 4,4	3,0**	0,4 ; 6,3	2,2**	0,4 ; 4,5
Niveau de scolarité	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,072		P = 0,258		P = 0,272	
Niveau inférieur au DES	4,2	3,7	4,8	4,8**	2,4 ; 7,4	2,9**	0,3 ; 6,2	6,6**	2,7 ; 11,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	7,5	7,0	7,9	6,9*	4,3 ; 9,8	6,9**	3,4 ; 11,4	7,0**	3,5 ; 10,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	9,3	7,6	11,0	8,3*	5,7 ; 11,1	5,8**	2,5 ; 9,5	10,9*	6,8 ; 15,2
Diplôme d'études universitaires	11,2	9,8	12,5	10,4*	7,1 ; 13,9	9,5**	4,7 ; 15,0	11,1*	7,0 ; 15,8
Nombre de partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,335		P = 0,187		P = 0,813	
Un partenaire	7,9	6,3	9,6	7,3	5,7 ; 8,9	5,5*	3,4 ; 7,6	9,2	6,8 ; 11,8
Deux à quatre partenaires	12,9	11,0	15,9	10,8**	5,2 ; 17,4	11,0**	3,7 ; 19,8	10,5**	2,1 ; 20,4
Cinq partenaires et plus	26,5	26,8*	25,3*	12,3**	0,4 ; 28,9	x	;	x	;
Sexe des partenaires <sup>2</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,004	P = 0,021		P = 0,007		P = 0,879	
Hommes	10,4	24,6*	10,1	9,8	7,5 ; 12,3	28,3**	4,6 ; 58,0	9,5	7,1 ; 11,9
Femmes	7,0	7,0	8,9**	5,7*	3,6 ; 7,8	5,7*	3,7 ; 7,9	x	;
Hommes et femmes	22,9*	14,4**	26,8**	x	;	x	;	x	;
Drogues par injection <sup>3</sup>	P = 0,000	P = 0,000	P = 0,001	P = 0,010		P = 0,018		P = 0,022	
Oui	31,8*	32,3*	30,4**	x	;	x	;	x	;
Non	8,2	7,0	9,3	7,6	6,1 ; 9,0	6,2*	4,3 ; 8,2	8,9	6,9 ; 11,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

2. Au cours d'une période de 12 mois.

3. Consommation au cours de la vie.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

## 9

## COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

Tableau 44

**Répartition des femmes selon le statut de fumeur et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 15 à 49 ans ayant utilisé la contraception hormonale combinée<sup>1</sup> et ayant eu des relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province		Région			
	Fumeuses	Non-fumeuses	Fumeuses		Non-fumeuses	
	%		%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	23,5	76,5	32,1	23,3 ; 41,8	67,9	58,2 ; 76,7
Groupe d'âge	P = 0,000		P = 0,096			
15-35 ans	25,6	74,4	35,6	25,5 ; 46,2	64,4	53,8 ; 74,5
36-49 ans	10,5*	89,5	x	;	x	;
Niveau de scolarité	P = 0,000		P = 0,532			
Niveau inférieur au DES	39,2	60,8	44,7**	19,1 ; 72,3	55,3*	27,7 ; 80,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	30,1	69,9	35,8*	20,5 ; 52,4	64,2	47,6 ; 79,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup>	23,1	76,9	26,4**	10,4 ; 45,2	73,6	54,8 ; 89,6
Diplôme d'études universitaires	11,9*	88,1	24,4**	7,6 ; 43,5	75,6	56,5 ; 92,4
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,123		P = 0,909			
Né au Canada	24,8	75,2	32,5	23,5 ; 41,9	67,5	58,1 ; 76,5
Au Canada depuis moins de 5 ans	x	x	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	12,0**	88,0	x	;	x	;

1. La contraception hormonale combinée (CHC) inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 45

**Répartition des femmes selon le temps écoulé depuis leur dernier test de Pap et certaines caractéristiques sociodémographiques, population féminine de 18 à 69 ans, Montérégie et ensemble du Québec, 2008**

	Province			Région					
	Moins de 3 ans	3 ans ou plus	Jamais passé	Moins de 3 ans		3 ans ou plus		Jamais passé	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble de la population	73,3	15,3	11,5	75,7	72,7 ; 78,7	14,3	11,9 ; 16,6	10,0	7,8 ; 12,4
Groupe d'âge	P = 0,000			P = 0,045					
18-24 ans	62,6	1,8**	35,6	62,4	47,6 ; 76,9	x	;	x	;
25-44 ans	82,5	8,6	8,8	86,3	82,0 ; 90,2	8,5*	5,4 ; 11,9	5,2**	2,7 ; 8,0
45-69 ans	68,4	23,7	7,9	70,3	65,9 ; 74,6	21,1	17,4 ; 24,9	8,6*	5,8 ; 11,5
Niveau de scolarité	P = 0,000			P = 0,024					
Niveau inférieur au DES	60,6	25,2	14,2	65,4	56,9 ; 73,4	20,3*	13,5 ; 27,6	14,2*	8,1 ; 20,7
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	15,4	14,6	72,0	65,7 ; 77,7	14,5*	10,2 ; 19,2	13,6*	8,9 ; 18,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>1</sup>	75,8	13,4	10,8	80,5	74,6 ; 85,8	11,3*	7,6 ; 15,6	8,1**	4,0 ; 12,9
Diplôme d'études universitaires	80,9	11,2	7,9	81,2	75,4 ; 86,7	12,9*	8,7 ; 17,8	5,9**	2,2 ; 9,9
Naissance au Canada ou durée de résidence	P = 0,000			P = 0,903					
Né au Canada	74,2	15,8	10,0	75,8	72,7 ; 78,9	14,3	11,9 ; 16,8	9,9	7,6 ; 12,2
Au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	8,1**	42,2*	84,3*	31,9 ; 100,0	x	;	x	;
Au Canada depuis 5 ans et plus	70,8	11,9*	17,2	71,2	54,4 ; 86,8	x	;	x	;

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

\* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Des statistiques sur le Québec d'hier et d'aujourd'hui  
pour le Québec de demain

Ce recueil statistique présente les données régionales de l'*Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008* réalisée auprès de 38 000 personnes dans 16 régions sociosanitaires du Québec. Les données recueillies visent à fournir au ministère de la Santé et des Services sociaux et à son réseau des renseignements utiles à la surveillance de l'état de santé de la population et à la planification sociosanitaire. Ce recueil comprend, pour chacune des régions, des tableaux qui dressent un portrait de certains aspects de la santé physique et mentale ainsi que des habitudes de vie des Québécois de 15 ans et plus vivant en ménage privé. La présente publication accompagne le rapport intitulé *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois* qui est aussi consultable sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec à l'adresse suivante : [www.stat.gouv.qc.ca](http://www.stat.gouv.qc.ca).