

L'ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION, 2008

Complément d'information au rapport *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois*

**Les intervalles de confiance des proportions
présentées dans les tableaux et figures**

**Institut de la statistique du Québec
Direction des statistiques de santé**

Mars 2011

Cette publication a été réalisée et produite par l'Institut de la statistique du Québec.

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction des statistiques de santé
Institut de la statistique du Québec
1200, avenue McGill College, bureau 500
Montréal (Québec) H3B 4J8
Téléphone : (514) 873-4749
Télécopieur : (514) 864-9919

Ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(aucuns frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site WEB : <http://www.stat.gouv.qc.ca>

Citation suggérée : CAMIRAND, Hélène, Francine BERNÈCHE, Linda CAZALE et autres (2011). *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : les intervalles de confiance des proportions présentées dans les tableaux et figures du rapport*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 82 p.

Avec l'assistance technique de : Andrée Roy

Avertissement :

En raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.

Signes conventionnels :

... N'ayant pas lieu de figurer

— Donnée infime

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Abréviations :

CV Coefficient de variation

IC Intervalle de confiance

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite sans l'autorisation expresse de l'Institut de la statistique du Québec. www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm

Mars 2011

Liste des tableaux

Note : L'ordre de présentation des tableaux suit l'ordre d'apparition des tableaux et figures du rapport de l'EQSP 2008. Les figures du rapport ont été transposées en tableaux et leur numérotation est précédée d'un «F». Les tableaux provenant des annexes du rapport sont identifiés par un «A».

Chapitre 2

2.1	Répartition de la population de 15 ans et plus selon le sexe et l'âge, Québec, 2008	9
2.2	Composition du ménage selon le sexe et l'âge du répondant, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	9
2.3	Naissance au Canada ou dans un autre pays selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	10
2.4	Langue parlée à la maison selon le sexe et l'âge du répondant, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	10
2.5	Niveau de scolarité selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	11
2.6	Revenu annuel du ménage par tranche de revenu selon le sexe et l'âge du répondant, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	11
2.7	Indice du niveau de revenu du ménage selon le sexe et l'âge du répondant, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	12
2.8	Perception de sa situation financière selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	12
F 2.1	Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon la durée perçue de la pauvreté, Québec, 2008.....	13
2.9	Occupation principale selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	13

Chapitre 3

F 3.1	Perception de l'état de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	14
3.1	Perception de l'état de santé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	14
3.2	Perception de l'état de santé selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	15
F 3.2	Perception de l'état de santé selon le statut de fumeur, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	16
F 3.3	Perception de l'état de santé selon le statut pondéral et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	16
F 3.4	Perception de l'état de santé selon le niveau de détresse psychologique et la satisfaction à l'égard de sa vie sociale, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	17

Chapitre 4

4.1	Insatisfaction à l'égard de sa vie sociale selon certaines caractéristiques démographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	18
4.2	Insatisfaction à l'égard de sa vie sociale selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	19
4.3	Insatisfaction à l'égard de sa vie sociale selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	20
4.4	Niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique (K6) selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	21
F 4.1	Niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique (K6) selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	22
4.5	Niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique (K6) selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	23
4.6	Niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique (K6) selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	24
4.7	Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	25
4.8	Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	26
4.9	Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	27
4.10	Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	28
4.11	Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	29

Chapitre 5

5.1	Victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	30
F 5.1	Victimes d'une blessure non intentionnelle au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	31
F 5.2	Victimes d'une blessure causée par une chute selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008.....	31
5.2	Circonstances de la blessure, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008.....	32
F 5.3	Lieu de la blessure selon le sexe, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008.....	33

F 5.4	Lieu de la blessure selon l'âge, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008.....	33
F 5.5	Type d'activité pratiquée lors de la blessure selon le sexe, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008.....	34
5.3	Victimes d'une blessure non intentionnelle causée par une chute selon certaines caractéristiques personnelles, population de 65 ans et plus, Québec, 2008.....	35
5.4	Circonstances de la chute, population de 65 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute, Québec, 2008.....	36
5.5	Victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	37
5.6	Victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	38
5.7	Circonstances de la blessure, population de 15 ans et plus victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs, Québec, 2008.....	39
5.8	Personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	40
5.9	Personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	41
5.10	Personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	42
5.11	Personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS) selon la région corporelle et le lien avec le travail, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	43

Chapitre 6

6.1	Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	44
6.2	Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	45
6.3	Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon certains comportements ou indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	46
6.4	Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon certaines situations ou habitudes d'hygiène dentaire, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	46
F 6.1	Perception de sa santé buccodentaire selon le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	47

F 6.2	Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	47
F 6.3	Personnes complètement édentées selon le sexe et l'âge, population de 45 ans et plus, Québec, 2008	47
6.5	Personnes complètement édentées selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	48
6.6	Personnes complètement édentées selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	48
6.7	Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	49
6.8	Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	50
6.9	Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon certains comportements ou indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	51
6.10	Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon certaines situations ou habitudes d'hygiène dentaire, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	51
F 6.4	Fréquence du brossage des dents (ou prothèses) selon le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	52
F 6.5	Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	52
6.11	Utilisation de la soie dentaire tous les jours selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle, Québec, 2008	52
6.12	Utilisation de la soie dentaire tous les jours selon le niveau de scolarité et l'occupation principale, population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle, Québec, 2008	53
F 6.6	Fréquence d'utilisation de la soie dentaire selon le sexe, population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle, Québec, 2008.....	53
F 6.7	Utilisation de la soie dentaire au moins une fois par jour selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle, Québec, 2008	54
A 6.1	Fréquence du brossage des dents (ou prothèses) selon la présence de dents naturelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	54

Chapitre 7

7.1	Statut pondéral selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	55
7.2	Statut pondéral selon le niveau de scolarité et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	56
7.3	Statut pondéral selon l'indice du niveau de revenu du ménage et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	57
7.4	Perception à l'égard de son poids selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	58
7.5	Perception à l'égard de son poids selon le statut pondéral et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	59

7.6	Principale action entreprise concernant son poids selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	60
7.7	Principale action entreprise concernant son poids selon le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	61
F 7.1	Nombre de tentatives faites pour perdre du poids selon l'âge, population féminine de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Québec, 2008.....	62
F 7.2	Fréquence du recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial selon l'âge, population féminine de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008	62
7.8	Consultation auprès de professionnels de la santé selon le sexe et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008.....	63
7.9	Nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité selon le statut pondéral et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008.....	64
F 7.3	Nombre de méthodes saines selon le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008.....	65
A 7.1	Recours aux méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008.....	65
A 7.2	Recours aux méthodes saines selon le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008	66
A 7.3	Nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé selon l'âge et l'indice du niveau de revenu du ménage, population féminine de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008	67
A 7.4	Nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé selon le niveau de scolarité et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008.....	68

Chapitre 8

8.1	Type de consommateurs de drogues selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	69
8.2	Nombre de drogues consommées au cours de la vie selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	70
8.3	Consommation du cannabis ou d'autres drogues selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois, Québec, 2008.....	71
8.4	Type de drogues consommées au cours d'une période de 12 mois selon le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	72
F 8.1	Consommation de drogues selon la composition du ménage, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	72
F 8.2	Consommation de drogues selon le niveau de scolarité et l'occupation principale, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	73
A 8.1	Type de drogues consommées au cours de la vie selon le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008	73

Chapitre 9

F 9.1	Personnes actives sexuellement selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008.....	74
9.1	Nombre de partenaires sexuels selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008.....	74
9.2	Nombre de partenaires sexuels selon le sexe de la personne et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008.....	75
9.3	Utilisation habituelle d'un moyen contraceptif selon l'âge, le niveau de scolarité et le nombre de partenaires, population féminine de 15 à 49 ans active sexuellement, Québec, 2008	76
9.4	Utilisation habituelle d'un moyen contraceptif selon l'âge, le niveau de scolarité et le nombre de partenaires, population masculine de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008.....	77
9.5	Fréquence d'utilisation du condom selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008	78
9.6	Utilisation du condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon le sexe, l'âge, le nombre de partenaires et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008.....	79
9.7	Proportion de personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus ayant eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Québec, 2008.....	80

Chapitre 10

F 10.1	Fumeuses actuelles selon l'utilisation de la contraception hormonale combinée (CHC) et l'âge, population féminine de 15 à 49 ans active sexuellement, Québec, 2008.....	81
F 10.2	Passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans selon l'âge, population féminine de 18 à 69 ans, Québec, 2008	81
F 10.3	Passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans selon la naissance au Canada ou la durée de résidence, population féminine de 18 à 69 ans, Québec, 2008	82
F 10.4	Passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans selon le niveau de scolarité, population féminine de 18 à 69 ans, Québec, 2008	82

Chapitre 2

Tableau 2.1

Répartition de la population de 15 ans et plus¹ selon le sexe et l'âge, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	100,0		49,4	49,4 ; 49,4	50,6	50,6 ; 50,6
Groupe d'âge						
15-19 ans	9,1	8,7 ; 9,5	9,8	9,3 ; 10,4	8,4	7,9 ; 8,9
20-24 ans	6,3	5,9 ; 6,7	6,1	5,5 ; 6,7	6,4	5,9 ; 7,0
25-34 ans	16,3	16,3 ; 16,3	16,8	16,8 ; 16,8	15,8	15,8 ; 15,8
35-44 ans	17,0	17,0 ; 17,0	17,5	17,5 ; 17,5	16,5	16,5 ; 16,5
45-54 ans	19,7	19,7 ; 19,7	19,9	19,9 ; 19,9	19,6	19,6 ; 19,6
55-64 ans	15,4	15,4 ; 15,4	15,2	15,2 ; 15,2	15,6	15,6 ; 15,6
65-74 ans	9,3	9,3 ; 9,3	9,0	9,0 ; 9,0	9,7	9,7 ; 9,7
75-84 ans	5,6	5,5 ; 5,8	5,0	4,8 ; 5,1	6,3	6,0 ; 6,5
85 ans et plus	1,2	1,0 ; 1,3	0,6	0,5 ; 0,8	1,7	1,4 ; 1,9

1. Population vivant en ménage privé.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 2.2

Composition du ménage¹ selon le sexe et l'âge du répondant, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Personne vivant seule		Couple sans enfant		Couple avec enfants		Famille monoparentale		Autre	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	13,4	13,0 ; 13,9	28,7	28,0 ; 29,4	42,7	41,8 ; 43,5	8,5	8,0 ; 9,0	6,7	6,2 ; 7,2
Sexe										
Hommes	10,7	10,2 ; 11,4	30,5	29,6 ; 31,5	45,8	44,5 ; 46,9	6,4	5,8 ; 7,1	6,5	5,7 ; 7,2
Femmes	16,0	15,4 ; 16,7	26,9	26,0 ; 27,8	39,7	38,5 ; 40,8	10,5	9,8 ; 11,4	6,9	6,2 ; 7,7
Groupe d'âge										
15-24 ans	1,9	1,5 ; 2,5	6,1	5,1 ; 7,2	61,6	58,9 ; 64,0	17,4	15,4 ; 19,4	13,0	11,1 ; 14,9
25-44 ans	7,9	7,3 ; 8,7	16,4	15,2 ; 17,6	60,7	59,0 ; 62,2	9,2	8,3 ; 10,2	5,9	5,0 ; 6,9
45-64 ans	15,3	14,6 ; 16,1	38,8	37,7 ; 40,0	34,6	33,1 ; 35,7	6,3	5,7 ; 7,1	5,0	4,4 ; 5,7
65 ans et plus	31,7	30,3 ; 33,4	53,8	51,9 ; 55,6	5,1	4,0 ; 6,2	3,3	2,6 ; 4,0	6,1	5,1 ; 7,1

1. Ménage dont fait partie le répondant.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 2.3

Naissance au Canada ou dans un autre pays selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Canada		Autre pays	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	87,7	87,0 ; 88,4	12,3	11,6 ; 13,0
Sexe¹				
Hommes	87,1	86,0 ; 88,1	12,9	11,9 ; 14,0
Femmes	88,3	87,4 ; 89,2	11,7	10,8 ; 12,6
Groupe d'âge				
15-24 ans	91,3	89,3 ; 93,1	8,7	6,9 ; 10,7
25-44 ans	83,1	81,8 ; 84,5	16,9	15,5 ; 18,2
45-64 ans	89,7	88,7 ; 90,7	10,3	9,3 ; 11,3
65 ans et plus	89,5	88,1 ; 90,9	10,5	9,1 ; 11,9

1. Le test d'association entre la variable naissance au Canada et la variable sexe n'est pas significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 2.4

Langue parlée à la maison¹ selon le sexe et l'âge du répondant, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Français uniquement		Français et autres(s) langue(s)		Anglais sans français et avec ou sans autre(s) langue(s)		Ni français ni anglais	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	82,7	82,0 ; 83,4	3,8	3,4 ; 4,3	9,3	8,7 ; 9,9	4,2	3,7 ; 4,6
Sexe¹								
Hommes	82,6	81,6 ; 83,7	4,0	3,4 ; 4,7	9,3	8,4 ; 10,2	4,1	3,4 ; 4,8
Femmes	82,7	81,7 ; 83,7	3,7	3,1 ; 4,2	9,4	8,5 ; 10,2	4,3	3,6 ; 4,9
Groupe d'âge								
15-24 ans	81,1	79,0 ; 83,4	2,5*	1,6 ; 3,6	11,4	9,4 ; 13,5	5,0*	3,4 ; 6,5
25-44 ans	79,8	78,4 ; 81,2	5,0	4,1 ; 5,9	9,2	8,0 ; 10,4	6,0	5,1 ; 7,0
45-64 ans	85,5	84,4 ; 86,5	3,2	2,7 ; 3,8	8,6	7,7 ; 9,6	2,7	2,1 ; 3,3
65 ans et plus	83,9	82,4 ; 85,5	4,0	3,1 ; 5,0	9,3	8,0 ; 10,6	2,8*	1,9 ; 3,7

1. Langue parlée le plus souvent à la maison; plus d'une langue pouvait être indiquée.

2. Le test d'association entre la variable langue parlée à la maison et la variable sexe n'est pas significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 2.5

Niveau de scolarité¹ selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Niveau inférieur au DES		Diplôme d'études secondaires (DES)		Diplôme ou certificat d'études collégiales ²		Diplôme d'études universitaires	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	24,8	24,1 ; 25,5	25,3	24,5 ; 26,0	26,0	25,2 ; 26,9	23,9	23,1 ; 24,7
Sexe³								
Hommes	25,1	24,1 ; 26,1	25,4	24,3 ; 26,6	25,9	24,7 ; 27,1	23,6	22,5 ; 24,7
Femmes	24,5	23,6 ; 25,3	25,2	24,2 ; 26,2	26,2	25,1 ; 27,2	24,2	23,2 ; 25,2
Groupe d'âge								
15-24 ans	39,2	36,6 ; 41,8	32,7	30,2 ; 35,1	22,6	20,3 ; 25,3	5,5	4,2 ; 7,0
25-44 ans	9,6	8,7 ; 10,6	19,6	18,3 ; 20,8	35,3	33,7 ; 36,8	35,5	34,0 ; 37,2
45-64 ans	20,1	19,2 ; 21,1	29,7	28,5 ; 30,9	24,7	23,6 ; 25,9	25,4	24,2 ; 26,6
65 ans et plus	52,9	51,2 ; 54,8	20,4	18,8 ; 22,0	12,8	11,6 ; 14,2	13,8	12,6 ; 15,1

1. Plus haut niveau de scolarité complété.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

3. Le test d'association entre la variable niveau de scolarité et la variable sexe n'est pas significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 2.6

Revenu annuel du ménage¹ par tranche de revenu selon le sexe et l'âge du répondant, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Moins de 20 000 \$		20 000 \$ à 39 999 \$		40 000 \$ à 59 999 \$		60 000 \$ à 99 999 \$		100 000 \$ et plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	9,6	9,2 ; 10,1	20,0	19,4 ; 20,7	20,5	19,9 ; 21,2	27,6	26,8 ; 28,4	22,2	21,4 ; 22,9
Sexe										
Hommes	7,2	6,6 ; 7,9	18,0	17,2 ; 18,9	20,3	19,4 ; 21,4	29,2	28,0 ; 30,3	25,1	23,9 ; 26,3
Femmes	11,9	11,3 ; 12,6	22,0	21,1 ; 22,9	20,7	19,8 ; 21,7	26,0	25,0 ; 27,1	19,3	18,3 ; 20,3
Groupe d'âge										
15-24 ans	7,8	6,5 ; 9,2	14,7	13,0 ; 16,4	17,6	15,6 ; 19,6	30,7	28,2 ; 33,2	29,3	26,8 ; 31,8
25-44 ans	6,1	5,3 ; 7,0	16,5	15,2 ; 17,8	20,7	19,5 ; 22,1	31,3	29,8 ; 32,8	25,4	24,0 ; 26,7
45-64 ans	8,4	7,8 ; 9,2	16,9	16,0 ; 17,8	21,3	20,3 ; 22,4	29,1	27,8 ; 30,2	24,3	23,1 ; 25,5
65 ans et plus	21,2	20,1 ; 22,6	39,3	37,5 ; 41,2	21,4	19,8 ; 22,8	13,9	12,6 ; 15,3	4,2	3,3 ; 5,2

1. Ménage dont fait partie le répondant.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 2.7

Indice du niveau de revenu du ménage¹ selon le sexe et l'âge du répondant, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Quintile 1 (faible)		Quintile 2		Quintile 3		Quintile 4		Quintile 5 (élevé)	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	19,3	18,6 ; 20,0	20,7	20,0 ; 21,5	19,5	18,9 ; 20,2	20,4	19,8 ; 21,2	20,1	19,3 ; 20,7
Sexe										
Hommes	16,0	15,0 ; 17,0	19,5	18,5 ; 20,6	20,1	19,0 ; 21,2	20,8	19,8 ; 21,9	23,6	22,5 ; 24,7
Femmes	22,4	21,5 ; 23,5	21,9	20,9 ; 22,9	19,0	18,1 ; 19,9	20,1	19,1 ; 21,0	16,6	15,8 ; 17,5
Groupe d'âge										
15-24 ans	18,7	16,7 ; 20,8	22,2	19,8 ; 24,6	19,4	17,3 ; 21,8	22,7	20,4 ; 25,0	17,1	15,2 ; 19,1
25-44 ans	17,8	16,4 ; 19,2	19,2	17,9 ; 20,5	20,4	19,2 ; 21,8	21,2	19,9 ; 22,6	21,4	20,1 ; 22,7
45-64 ans	14,2	13,4 ; 15,2	17,5	16,5 ; 18,6	20,0	18,9 ; 21,1	22,3	21,2 ; 23,5	25,9	24,7 ; 27,1
65 ans et plus	34,3	32,5 ; 36,2	29,6	27,9 ; 31,4	16,7	15,3 ; 18,1	12,3	11,0 ; 13,7	7,1	6,1 ; 8,2

1. Ménage dont fait partie le répondant.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 2.8

Perception de sa situation financière selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	À l'aise financièrement		Revenus suffisants		Pauvre		Très pauvre	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	35,0	34,1 ; 35,8	54,0	53,1 ; 54,9	9,4	8,9 ; 9,9	1,6	1,4 ; 1,8
Sexe								
Hommes	37,1	35,7 ; 38,3	52,5	51,2 ; 53,8	8,9	8,1 ; 9,7	1,6	1,3 ; 1,9
Femmes	33,0	31,8 ; 34,1	55,5	54,3 ; 56,7	9,9	9,2 ; 10,6	1,7	1,4 ; 2,0
Groupe d'âge								
15-19 ans	42,6	38,9 ; 46,0	50,1	46,8 ; 53,8	5,8	4,3 ; 7,6	1,5**	0,7 ; 2,4
20-24 ans	37,8	33,7 ; 41,7	52,5	48,3 ; 56,6	8,9	6,7 ; 11,3	0,9**	0,4 ; 1,6
25-34 ans	38,4	35,9 ; 40,9	51,2	48,7 ; 53,9	8,9	7,4 ; 10,6	1,4*	0,8 ; 2,1
35-44 ans	37,4	35,3 ; 39,5	50,9	48,8 ; 52,8	9,8	8,4 ; 11,4	1,9*	1,2 ; 2,7
45-64 ans	31,7	30,3 ; 33,0	56,6	55,2 ; 58,0	9,6	8,9 ; 10,4	2,1	1,8 ; 2,4
65-74 ans	29,4	27,3 ; 31,7	57,4	55,0 ; 59,6	12,0	10,5 ; 13,6	1,1*	0,8 ; 1,5
75 ans et plus	31,7	28,6 ; 34,7	58,0	54,9 ; 61,2	10,0	8,4 ; 11,9	0,4**	0,2 ; 0,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 2.1

Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon la durée perçue de la pauvreté, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Moins d'un an	16,3	14,2 ; 18,6
1 à 4 ans	33,6	31,0 ; 36,3
5 à 9 ans	18,2	16,3 ; 20,4
10 ans et plus	31,8	29,5 ; 34,3

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 2.9

Occupation principale¹ selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Travailleurs		Étudiants		Personnes sans emploi		Retraités	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	60,2	59,5 ; 60,8	13,1	12,6 ; 13,6	7,2	6,7 ; 7,6	19,6	19,2 ; 19,9
Sexe								
Hommes	65,6	64,6 ; 66,5	13,0	12,3 ; 13,7	3,5	2,9 ; 4,0	18,0	17,5 ; 18,5
Femmes	54,9	54,0 ; 55,8	13,2	12,6 ; 13,9	10,8	10,1 ; 11,5	21,1	20,6 ; 21,6
Groupe d'âge								
15-24 ans	27,0	24,9 ; 29,5	70,8	68,3 ; 73,0	2,2*	1,4 ; 3,0	—	— ; —
25-44 ans	86,2	85,0 ; 87,4	5,9	5,0 ; 6,9	7,8	6,9 ; 8,7	0,1**	0,0 ; 0,1
45-64 ans	74,0	72,9 ; 75,0	0,4*	0,3 ; 0,6	9,6	8,8 ; 10,4	16,0	15,2 ; 16,8
65 ans et plus	7,6	6,6 ; 8,7	0,1**	0,0 ; 0,2	5,4	4,5 ; 6,3	86,8	85,4 ; 88,2

1. Occupation principale au cours des 12 derniers mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

— Donnée infime.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population 2008*.

Chapitre 3

Tableau F 3.1
Perception de l'état de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Excellent	20,8	20,1 ; 21,6
Très bon	35,2	34,4 ; 36,1
Bon	33,1	32,3 ; 34
Passable	8,7	8,2 ; 9,2
Mauvais	2,1	1,9 ; 2,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3.1
Perception de l'état de santé selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	56,1	55,2 ; 56,9	33,1	32,3 ; 34,0	10,8	10,3 ; 11,4
Sexe						
Hommes	56,6	55,3 ; 58,0	33,5	32,2 ; 34,8	9,9	9,2 ; 10,6
Femmes	55,5	54,4 ; 56,7	32,8	31,7 ; 33,9	11,7	11,0 ; 12,5
Groupe d'âge						
15-24 ans	61,0	58,2 ; 63,8	33,5	30,9 ; 36,2	5,5	4,2 ; 6,8
25-44 ans	64,8	63,2 ; 66,4	29,1	27,6 ; 30,6	6,1	5,3 ; 6,9
45-64 ans	53,7	52,4 ; 55,0	33,3	32,1 ; 34,5	13,0	12,1 ; 13,9
65 ans et plus	36,9	35,1 ; 38,8	41,3	39,3 ; 43,3	21,7	20,3 ; 23,3
Composition du ménage						
Personne vivant seule	47,0	45,3 ; 48,6	34,2	32,6 ; 35,8	18,8	17,5 ; 20,1
Couple sans enfant	53,7	52,4 ; 55,1	33,7	32,3 ; 35,1	12,5	11,6 ; 13,5
Couple avec enfants	62,1	60,6 ; 63,7	31,6	30,1 ; 33,0	6,3	5,5 ; 7,2
Famille monoparentale	56,8	53,7 ; 60,1	31,6	28,8 ; 34,6	11,6	9,4 ; 13,9
Autre	46,0	41,7 ; 50,5	39,4	35,1 ; 43,8	14,6	12,0 ; 17,6

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 3.2

Perception de l'état de santé selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	56,2	55,2 ; 56,9	33,1	32,3 ; 34,0	10,7	10,3 ; 11,4
Niveau de scolarité						
Niveau inférieur au DES	39,5	37,9 ; 41,2	40,4	38,7 ; 42,1	20,1	18,8 ; 21,4
Diplôme d'études secondaires (DES)	54,5	52,8 ; 56,3	35,1	33,5 ; 36,9	10,3	9,4 ; 11,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales ¹	62,1	60,4 ; 63,9	30,3	28,6 ; 31,9	7,6	6,6 ; 8,7
Diplôme d'études universitaires	68,1	66,3 ; 69,9	26,6	24,9 ; 28,4	5,2	4,3 ; 6,2
Indice du niveau de revenu du ménage						
Quintile 1 (faible)	38,8	36,5 ; 40,8	40,8	38,7 ; 43,0	20,4	18,8 ; 22,1
Quintile 2	50,1	48,1 ; 52,2	37,6	35,6 ; 39,5	12,4	11,1 ; 13,6
Quintile 3	58,5	56,4 ; 60,4	33,6	31,8 ; 35,5	7,9	6,9 ; 9,1
Quintile 4	63,6	61,7 ; 65,5	29,6	27,8 ; 31,4	6,8	5,7 ; 7,8
Quintile 5 (élevé)	70,6	68,9 ; 72,3	23,4	22,0 ; 25,0	5,9	4,9 ; 7,0
Perception de sa situation financière						
Pauvre ou très pauvre	34,8	32,1 ; 37,6	38,0	35,5 ; 40,7	27,2	25,0 ; 29,5
À l'aise ou revenus suffisants	58,9	58,0 ; 59,9	32,5	31,6 ; 33,3	8,6	8,1 ; 9,1
Occupation principale						
Travailleurs	61,9	60,8 ; 63,0	30,9	29,8 ; 31,9	7,2	6,6 ; 7,8
Étudiants	62,7	59,7 ; 65,8	32,2	29,2 ; 35,2	5,0	3,6 ; 6,6
Personnes sans emploi	36,9	33,5 ; 40,2	37,2	34,1 ; 40,6	25,8	22,9 ; 29,0
Retraités	40,2	38,6 ; 41,8	39,5	37,7 ; 41,1	20,4	19,1 ; 21,7

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 3.2

Perception de l'état de santé selon le statut de fumeur, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	56,1	55,2 ; 56,9	33,1	32,3 ; 34,0	10,8	10,3 ; 11,4
Type de fumeur						
Fumeur actuel ¹	46,9	45,1 ; 48,8	37,6	35,8 ; 39,5	15,4	14,2 ; 16,7
Non-fumeur	59,0	58,0 ; 60,0	31,7	30,8 ; 32,6	9,3	8,8 ; 9,9

1. Fumeur régulier ou fumeur occasionnel.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 3.3

Perception de l'état de santé selon le statut pondéral et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Hommes						
Poids insuffisant	51,1 *	32,4 ; 67,0	33,5 *	19,4 ; 50,5	15,4 **	8,4 ; 25,6
Poids normal	62,7	60,6 ; 64,9	29,7	27,5 ; 31,8	7,6	6,5 ; 8,9
Surplus de poids ¹	52,8	51,1 ; 54,4	36,1	34,6 ; 37,7	11,1	10,1 ; 12,1
Femmes						
Poids insuffisant	56,8	49,8 ; 63,4	30,1	24,5 ; 36,4	13,1 *	8,7 ; 18,3
Poids normal	62,6	61,0 ; 64,2	29,2	27,6 ; 30,7	8,2	7,4 ; 9,1
Surplus de poids ¹	45,5	43,7 ; 47,3	38,4	36,7 ; 40,2	16,1	14,6 ; 17,4

1. Embonpoint ou obésité.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 3.4

Perception de l'état de santé selon le niveau de détresse psychologique et la satisfaction à l'égard de sa vie sociale, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Excellent ou très bon		Bon		Passable ou mauvais	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Niveau sur l'échelle de détresse psychologique						
Faible à modéré	62,0	61,0 ; 62,9	31,1	37,6 ; 41,4	6,9	6,4 ; 7,4
Élevé	37,3	35,5 ; 39,2	39,5	30,2 ; 32,0	23,1	21,7 ; 24,7
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale						
Plutôt ou très satisfaisante	57,9	57,0 ; 58,7	32,9	32,0 ; 33,8	9,3	8,8 ; 9,8
Plutôt ou très insatisfaisante	34,2	30,6 ; 37,8	35,0	31,5 ; 38,5	30,8	27,6 ; 34,2

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Chapitre 4

Tableau 4.1

Insatisfaction à l'égard de sa vie sociale selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Ensemble de la population	6,5	6,0 ; 6,9
Sexe		
Hommes	6,0	5,4 ; 6,7
Femmes	7,0	6,3 ; 7,6
Groupe d'âge		
15-24 ans	3,7*	2,7 ; 4,9
25-44 ans	7,1	6,2 ; 8,1
45-64 ans	7,4	6,8 ; 8,2
65 ans et plus	5,6	4,9 ; 6,4
Composition du ménage		
Personne vivant seule	12,5	11,4 ; 13,6
Couple sans enfant	4,2	3,6 ; 4,9
Couple avec enfants	5,4	4,6 ; 6,1
Famille monoparentale	8,6	7,0 ; 10,3
Autre	9,4*	6,7 ; 12,4

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.2

Insatisfaction à l'égard de sa vie sociale selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Ensemble de la population	6,5	6,0 ; 6,9
Indice du niveau de revenu du ménage		
Quintile 1 (faible)	12,0	10,7 ; 13,5
Quintile 2 et suivants	5,2	4,8 ; 5,7
Perception de sa situation financière		
Pauvre ou très pauvre	19,3	17,2 ; 21,6
À l'aise ou revenus suffisants	4,8	4,4 ; 5,2
Occupation principale		
Travailleurs	6,5	5,9 ; 7,1
Étudiants	3,8*	2,7 ; 5,1
Personnes sans emploi	13,7	11,6 ; 16,0
Retraités	5,3	4,7 ; 6,0

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.3

Insatisfaction à l'égard de sa vie sociale selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Ensemble de la population	6,5	6,0 ; 6,9
Perception de sa santé		
Excellente ou très bonne	3,9	3,4 ; 4,5
Bonne	6,9	6,1 ; 7,7
Passable ou mauvaise	18,7	16,7 ; 20,7
Niveau de détresse psychologique		
Élevé	16,8	15,3 ; 18,3
Faible à modéré	3,5	3,1 ; 3,9
Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois		
Oui	29,4	24,8 ; 34,3
Non	5,8	5,3 ; 6,3

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.4

Niveau élevé¹ sur l'échelle de détresse psychologique (K6) selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Sexe		
Hommes	18,2	17,2 ; 19,3
Femmes	26,0	25,0 ; 27,1
Groupe d'âge		
15-24 ans	24,4	22,2 ; 26,7
25-44 ans	24,3	22,8 ; 25,7
45-64 ans	20,6	19,5 ; 21,7
65 ans et plus	18,8	17,4 ; 20,3
Composition du ménage		
Personne vivant seule	25,7	24,2 ; 27,3
Couple sans enfant	17,7	16,6 ; 18,9
Couple avec enfants	20,8	19,6 ; 22,1
Famille monoparentale	32,2	29,2 ; 35,2
Autre	29,7	25,5 ; 33,9

1. Il est important de ne pas utiliser les proportions du tableau comme des estimations de la prévalence de la détresse psychologique, mais plutôt comme des valeurs à comparer à la proportion correspondant au quintile supérieur (22 %).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 4.1
Niveau élevé¹ sur l'échelle de détresse psychologique (K6) selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Hommes		
15-24 ans	19,0	16,2 ; 22,1
25-44 ans	21,4	19,3 ; 23,6
45-64 ans	15,8	14,4 ; 17,3
65 ans et plus	15,1	12,9 ; 17,4
Femmes		
15-24 ans	29,9	26,5 ; 33,5
25-44 ans	27,2	25,2 ; 29,2
45-64 ans	25,2	23,5 ; 26,8
65 ans et plus	21,6	19,7 ; 23,8

1. Il est important de ne pas utiliser les proportions du tableau comme des estimations de la prévalence de la détresse psychologique, mais plutôt comme des valeurs à comparer à la proportion correspondant au quintile supérieur (22 %).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.5

Niveau élevé¹ sur l'échelle de détresse psychologique (K6) selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Niveau de scolarité		
Niveau inférieur au DES	26,3	24,9 ; 27,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	23,1	21,7 ; 24,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales ²	21,5	20,0 ; 22,9
Diplôme d'études universitaires	18,0	16,4 ; 19,6
Indice du niveau de revenu du ménage		
Quintile 1 (faible)	33,6	31,5 ; 35,8
Quintile 2 et suivants	19,6	18,8 ; 20,4
Perception de sa situation financière		
Pauvre ou très pauvre	44,6	42,0 ; 47,3
À l'aise ou revenus suffisants	19,3	18,6 ; 20,1
Occupation principale		
Travailleurs	20,9	20,0 ; 21,9
Étudiants	24,8	22,4 ; 27,4
Personnes sans emploi	37,9	34,6 ; 41,4
Retraités	18,2	16,9 ; 19,5

1. Il est important de ne pas utiliser les proportions du tableau comme des estimations de la prévalence de la détresse psychologique, mais plutôt comme des valeurs à comparer à la proportion correspondant au quintile supérieur (22 %).

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.6

Niveau élevé¹ sur l'échelle de détresse psychologique (K6) selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Perception de sa santé		
Excellente ou très bonne	14,6	13,8 ; 15,6
Bonne	26,6	25,3 ; 28,0
Passable ou mauvaise	48,8	46,2 ; 51,6
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale		
Très satisfaisante	12,9	12,1 ; 13,9
Plutôt satisfaisante	26,5	25,4 ; 27,8
Plutôt ou très insatisfaisante	57,8	54,3 ; 61,7
Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois		
Oui	71,3	65,9 ; 76,5
Non	20,6	19,9 ; 21,4
Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois		
Oui	83,8	73,9 ; 91,0
Non	21,8	21,1 ; 22,6

1. Il est important de ne pas utiliser les proportions du tableau comme des estimations de la prévalence de la détresse psychologique, mais plutôt comme des valeurs à comparer à la proportion correspondant au quintile supérieur (22 %).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.7

Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus¹, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	2,3	2,1 ; 2,6
Sexe²		
Hommes	2,5	2,1 ; 3,0
Femmes	2,2	1,9 ; 2,6
Groupe d'âge		
15-24 ans	2,9*	2,1 ; 3,9
25-44 ans	2,5	2,0 ; 3,0
45-64 ans	2,4	2,0 ; 2,8
65 ans et plus	1,3*	0,9 ; 1,8
Composition du ménage		
Personne vivant seule	4,0	3,4 ; 4,7
Couple sans enfant	1,6	1,2 ; 2,0
Couple avec enfants	1,7	1,3 ; 2,1
Famille monoparentale	4,4	3,2 ; 5,8
Autre	4,2**	2,4 ; 6,5

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

2. Le test d'association entre les idées suicidaires et la variable sexe n'est pas significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.8

Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus¹, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Indice du niveau de revenu du ménage		
Quintile 1 (faible)	3,7	3,1 ; 4,4
Quintile 2 et suivants	2,0	1,7 ; 2,3
Perception de sa situation financière		
Pauvre ou très pauvre	6,8	5,7 ; 8,1
À l'aise ou revenus suffisants	1,8	1,5 ; 2,1
Occupation principale		
Travailleurs	2,1	1,8 ; 2,4
Étudiants	3,1 *	2,0 ; 4,5
Personnes sans emploi	4,7	3,4 ; 6,3
Retraités	1,5	1,2 ; 1,9

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.9

Idées suicidaires sérieuses au cours d'une période de 12 mois selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus¹, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Perception de sa santé		
Excellente ou très bonne	1,4	1,1 ; 1,7
Bonne	2,5	2,1 ; 3,1
Passable ou mauvaise	6,8	5,6 ; 8,2
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale		
Plutôt ou très satisfaisante	1,7	1,5 ; 2,0
Plutôt ou très insatisfaisante	10,7	9,0 ; 12,6
Niveau de détresse psychologique		
Élevé	7,7	6,6 ; 8,8
Faible à modéré	0,9	0,7 ; 1,1

1. La population de référence exclut les personnes ayant déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.10

Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Ensemble de la population	0,5	0,3 ; 0,6
Sexe		
Hommes	0,2*	0,1 ; 0,3
Femmes	0,7*	0,5 ; 0,9
Groupe d'âge		
15-24 ans	0,5*	0,3 ; 0,8
25-44 ans	0,6*	0,4 ; 0,9
45-64 ans	0,4*	0,2 ; 0,6
65 ans et plus	0,1**	0,0 ; 0,3
Composition du ménage		
Personne vivant seule	0,7*	0,4 ; 1,1
Couple sans enfant	0,3**	0,1 ; 0,4
Couple avec enfants	0,3*	0,1 ; 0,4
Famille monoparentale	1,6**	0,8 ; 2,6
Autre	0,5**	0,2 ; 0,9

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 4.11

Tentative de suicide au cours d'une période de 12 mois selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Perception de sa santé		
Excellente ou très bonne	0,2**	0,1 ; 0,4
Bonne	0,3*	0,2 ; 0,5
Passable ou mauvaise	2,0*	1,3 ; 2,7
Satisfaction à l'égard de sa vie sociale		
Plutôt ou très satisfaisante	0,3*	0,2 ; 0,4
Plutôt ou très insatisfaisante	2,3*	1,3 ; 3,4
Niveau de détresse psychologique		
Élevé	1,7	1,2 ; 2,2
Faible à modéré	0,1**	0,0 ; 0,1

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Chapitre 5

Tableau 5.1

Victimes de blessure non intentionnelle¹ au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	11,0	10,5 ; 11,6
Sexe		
Hommes	12,9	12,0 ; 13,8
Femmes	9,2	8,5 ; 9,9
Groupe d'âge		
15-24 ans	17,5	15,6 ; 19,5
25-44 ans	12,1	11,0 ; 13,2
45-64 ans	9,3	8,6 ; 10,1
65 ans et plus	6,5	5,7 ; 7,4
Composition du ménage		
Personne vivant seule	9,5	8,6 ; 10,5
Couple sans enfant	9,1	8,2 ; 10,0
Couple avec enfants	11,8	10,9 ; 12,8
Famille monoparentale	13,2	11,4 ; 15,4
Autre	14,9	11,8 ; 18,2
Occupation principale		
Travailleurs	11,0	10,3 ; 11,8
Étudiants	17,1	14,7 ; 19,4
Personnes sans emploi	9,5	7,8 ; 11,3
Retraités	7,5	6,6 ; 8,4

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 5.1

Victimes de blessure non intentionnelle¹ au cours d'une période de 12 mois selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Hommes		
15-24 ans	22,5	19,4 ; 25,6
25-44 ans	14,4	12,8 ; 16,2
45-64 ans	9,9	8,8 ; 11,2
65 ans et plus	5,9	4,6 ; 7,3
Femmes		
15-24 ans	12,3	10,0 ; 14,7
25-44 ans	9,7	8,3 ; 11,0
45-64 ans	8,7	7,7 ; 9,7
65 ans et plus	7,0	6,0 ; 8,2

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 5.2

Victimes de blessure¹ causée par une chute selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	34,7	32,1 ; 37,2
Sexe		
Hommes	30,5	26,9 ; 33,8
Femmes	40,4	36,9 ; 44,1
Groupe d'âge		
15 à 24 ans	33,3	27,4 ; 39,1
25 à 44 ans	27,7	23,0 ; 32,4
45 à 64 ans	36,3	32,5 ; 40,4
65 ans et plus	60,0	53,3 ; 66,5

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.2

Circonstances de la blessure¹, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Fréquence des blessures		
Une fois	79,1	77,0 ; 81,0
Deux fois ou plus	20,9	19,0 ; 23,0
Saison de la blessure		
Hiver	26,0	23,6 ; 28,5
Printemps	21,2	18,9 ; 23,6
Été	29,1	26,5 ; 31,6
Automne	23,7	21,5 ; 26,0
Cause de la blessure		
Chute	34,6	32,0 ; 37,1
Effort excessif ou mouvement ardu	22,2	20,0 ; 24,6
Accident de transport	7,9	6,5 ; 9,4
Contact avec une machine	7,8	6,2 ; 9,5
Heurté / écrasé accidentellement	5,7	4,6 ; 6,8
Frappé / poussé / mordu accidentellement	3,8*	2,8 ; 5,1
Contact avec quelque chose de chaud	3,6	2,8 ; 4,7
Fumée / feu / flamme	0,6**	0,2 ; 1,1
Autres	13,7	12,0 ; 15,7

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 5.3

Lieu de la blessure¹ selon le sexe, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Résidentiel	39,7	37,0 ; 42,3	32,0	28,7 ; 35,5	49,8	45,9 ; 53,8
Endroit public	28,1	25,8 ; 30,7	24,8	21,4 ; 28,3	32,5	28,9 ; 36,5
Lieu de sport et de plein air	26,3	23,9 ; 28,8	34,2	30,5 ; 37,9	15,8	12,9 ; 19,1
Zone agricole ou industrielle ou de construction	5,9	4,8 ; 7,2	9,0	7,1 ; 11,0	1,9*	1,0 ; 2,8

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 5.4

Lieu de la blessure¹ selon l'âge, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008

	15-24 ans		25-44 ans		45-64 ans		65 ans et plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Résidentiel	19,4	14,6 ; 24,6	36,1	31,4 ; 41,1	51,8	47,5 ; 56,2	67,5	60,5 ; 74,0
Endroit public	32,9	27,1 ; 38,7	27,8	23,4 ; 32,6	25,8	21,8 ; 29,8	24,1	18,4 ; 30,5
Lieu de sport et de plein air	44,9	38,8 ; 50,8	26,8	22,3 ; 31,5	16,5	13,3 ; 19,8	6,9**	4,0 ; 10,7
Zone agricole ou industrielle ou de construction	2,9**	1,5 ; 4,6	9,3	6,8 ; 12,1	5,8*	4,0 ; 7,8	1,5**	0,1 ; 3,5

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F5.5

Type d'activité pratiquée lors de la blessure¹ selon le sexe, population de 15 ans et plus victime de blessure non intentionnelle, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Sports ou exercice physiques	24,5	21,9 ; 27,0	30,9	27,2 ; 34,6	15,6	12,6 ; 18,7
Loisirs ou passe-temps	12,5	10,9 ; 14,2	12,5	10,5 ; 14,9	12,4	10,1 ; 14,9
Travail rémunéré	20,4	18,3 ; 22,7	24,3	21,3 ; 27,5	15,1	12,2 ; 18,3
Déplacements	7,7	6,4 ; 9,0	4,5*	3,0 ; 6,3	12,0	9,8 ; 14,4
Tâches ménagères, autre travail ou études	18,6	16,8 ; 20,6	17,2	14,5 ; 20,0	20,5	17,8 ; 23,6
Sommeil, repas, soins personnels	4,2	3,1 ; 5,6	2,3**	1,2 ; 3,7	6,9*	4,8 ; 9,5
Autres	12,1	10,5 ; 13,8	8,1	6,3 ; 10,1	17,6	14,8 ; 20,5

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.3

Victimes d'une blessure non intentionnelle¹ causée par une chute selon certaines caractéristiques personnelles, population de 65 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	3,9	3,2 ; 4,6
Sexe		
Hommes	2,8*	1,9 ; 3,9
Femmes	4,8	3,9 ; 5,8
Groupe d'âge		
65-74 ans	3,7	2,9 ; 4,5
75-84 ans	3,9*	2,7 ; 5,3
85 ans et plus	6,0**	2,5 ; 10,6
Composition du ménage		
Personne vivant seule	5,4	4,2 ; 6,7
Personne ne vivant pas seule	3,3*	2,4 ; 4,2
Perception de sa situation financière		
Pauvre ou très pauvre	6,8*	4,4 ; 9,5
À l'aise ou revenus suffisants	3,5	2,7 ; 4,2
Perception de sa santé		
Excellente, très bonne ou bonne	2,8	2,1 ; 3,4
Passable ou mauvaise	7,9	5,7 ; 10,3
Présence de troubles musculosquelettiques²		
Oui	5,9	4,6 ; 7,3
Non	2,7*	1,9 ; 3,6
Niveau de détresse psychologique		
Élevé	6,8	5,1 ; 8,6
Faible à modéré	3,0	2,3 ; 3,9

1. Blessure non due à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

2. Pendant la période de 12 mois au cours de laquelle la chute est survenue.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.4

Circonstances de la chute¹, population de 65 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle causée par une chute, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Saison		
Hiver	21,0*	14,7 ; 28,1
Printemps	27,7*	18,5 ; 36,9
Été	29,3*	20,5 ; 38,8
Automne	22,0*	15,4 ; 30,0
Lieu		
Résidentiel	69,7	60,7 ; 77,7
Endroit public	26,1*	18,2 ; 34,9
Lieu de sport ou de plein air	4,3**	1,9 ; 7,0
Façon dont la chute s'est produite		
En glissant sur une surface (sauf glace ou neige)	41,0	32,2 ; 50,4
En glissant sur de la glace ou de la neige	17,4*	11,2 ; 24,6
En montant ou descendant un escalier	16,8*	9,4 ; 24,9
En chutant d'un meuble	7,9**	4,1 ; 12,6
En tombant d'un endroit élevé	5,6**	2,5 ; 9,3
En patinant, skiant, etc.	2,4**	0,4 ; 4,9
Autre	8,9**	4,5 ; 14,0

1. Les résultats concernent la seule blessure subie au cours d'une période de 12 mois ou la blessure la plus grave s'il y en a plus d'une.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.5

Victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs¹ au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	11,8	11,2 ; 12,4
Sexe²		
Hommes	12,0	11,2 ; 12,9
Femmes	11,6	10,8 ; 12,4
Groupe d'âge		
15-24 ans	10,1	8,5 ; 11,8
25-44 ans	13,7	12,6 ; 14,9
45-64 ans	14,0	13,0 ; 15,0
65 ans et plus	4,9	4,3 ; 5,6
Composition du ménage		
Personne vivant seule	10,0	9,0 ; 11,0
Couple sans enfant	10,4	9,5 ; 11,3
Couple avec enfants	13,2	12,1 ; 14,2
Famille monoparentale	14,2	12,0 ; 16,3
Autre	11,4	8,5 ; 14,6

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Le test d'association entre la blessure attribuable à des mouvements répétitifs et la variable sexe n'est pas significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.6

Victimes d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs¹ au cours d'une période de 12 mois selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	11,8	11,2 ; 12,4
Niveau de scolarité		
Inférieur au DES	9,4	8,4 ; 10,3
Diplôme d'études secondaire (DES)	12,6	11,5 ; 13,7
Diplôme ou certificat d'études collégiales ²	12,5	11,3 ; 13,7
Diplôme d'études universitaires	13,1	11,7 ; 14,6
Indice du niveau de revenu du ménage		
Quintile1 (faible)	10,2	9,0 ; 11,6
Quintiles 2 et suivants	12,2	11,5 ; 12,8
Perception de sa situation financière		
Pauvre ou très pauvre	13,7	11,9 ; 15,7
À l'aise ou revenus suffisants	11,7	11,1 ; 12,3
Occupation principale		
Travailleurs	13,9	13,1 ; 14,7
Étudiants	9,9	8,1 ; 11,9
Personnes sans emploi	12,3	10,0 ; 14,7
Retraités	6,9	6,1 ; 7,7

1. Blessure assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.7

Circonstances de la blessure¹, population de 15 ans et plus victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Activité pratiquée lors de la blessure²		
Travail rémunéré	45,2	42,5 ; 47,9
Sport ou exercice physique	25,4	22,8 ; 27,8
Tâche ménagère	17,6	15,6 ; 19,6
Loisir ou passe-temps	8,1	6,9 ; 9,4
Partie du corps atteinte par la blessure		
Membres supérieurs	54,8	52,2 ; 57,6
Membres inférieurs	18,3	16,1 ; 20,5
Dos inférieur	16,1	14,2 ; 18,2
Dos supérieur	3,7	2,8 ; 4,8
Cou	3,1	2,3 ; 3,9
Autre	4,0*	2,7 ; 5,4

1. Blessure attribuable à des mouvements répétitifs et assez grave pour limiter les activités normales de la personne.

2. Plusieurs activités peuvent avoir été mentionnées pour une même blessure. Seules les quatre activités les plus souvent mentionnées sont présentées dans ce tableau.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.8

Personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)¹ selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	30,3	29,6 ; 31,1
Sexe		
Hommes	25,3	24,3 ; 26,5
Femmes	35,2	34,1 ; 36,4
Groupe d'âge		
15-24 ans	22,3	20,3 ; 24,7
25-44 ans	28,0	26,6 ; 29,4
45-64 ans	34,9	33,7 ; 36,1
65 ans et plus	32,9	31,1 ; 34,7
Composition du ménage		
Personne vivant seule	33,7	32,2 ; 35,3
Couple sans enfant	31,7	30,4 ; 33,0
Couple avec enfants	27,3	26,0 ; 28,6
Famille monoparentale	33,6	30,9 ; 36,5
Autre	34,0	30,1 ; 38,2

1. TMS ayant touché au moins une région corporelle et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes au cours d'une période de 12 mois.

Source Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.9

Personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)¹ selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	30,3	29,6 ; 31,1
Niveau de scolarité		
Inférieur au DES	32,1	30,7 ; 33,7
Diplôme d'études secondaire (DES)	32,7	31,2 ; 34,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales ²	31,5	29,8 ; 33,2
Diplôme d'études universitaires	24,9	23,4 ; 26,6
Indice du niveau de revenu du ménage		
Quintile1 (faible)	34,6	32,7 ; 36,6
Quintiles 2 et suivants	29,5	28,7 ; 30,4
Perception de sa situation financière		
Pauvre ou très pauvre	45,1	42,5 ; 47,9
À l'aise ou revenus suffisants	28,4	27,6 ; 29,2
Occupation principale		
Travailleurs	30,3	29,3 ; 31,3
Étudiants	20,7	18,3 ; 23,2
Personnes sans emploi	37,9	34,7 ; 41,2
Retraités	34,2	32,6 ; 35,8

1. TMS ayant touché au moins une région corporelle et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes au cours d'une période de 12 mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.10

Personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)¹ selon certains indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Perception de sa santé		
Excellente ou très bonne	22,8	21,8 ; 23,8
Bonne	33,9	32,5 ; 35,4
Passable ou mauvaise	57,8	55,2 ; 60,4
Niveau de détresse psychologique		
Élevé	48,5	46,6 ; 50,5
Faible à modéré	24,9	24,0 ; 25,7
Statut pondéral		
Poids insuffisant	27,9	22,7 ; 33,6
Poids normal	28,3	27,0 ; 29,5
Embonpoint	29,8	28,5 ; 31,1
Obésité	37,9	35,9 ; 40,0

1. TMS ayant touché au moins une région corporelle et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes au cours d'une période de 12 mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 5.11

Personnes ayant eu des troubles musculosquelettiques (TMS)¹ selon la région corporelle et le lien avec le travail, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Région corporelle touchée par le TMS		
Cou	9,5	9,0 ; 9,9
Dos	14,5	13,9 ; 15,1
Membres supérieurs	13,5	12,9 ; 14,0
Membres inférieurs	14,5	14,0 ; 15,1
TMS lié au travail actuel ou antérieur		
Total	17,8	17,2 ; 18,5
Cou	5,8	5,4 ; 6,1
Dos	8,8	8,2 ; 9,2
Membres supérieurs	8,2	7,8 ; 8,7
Membres inférieurs	6,4	6,0 ; 6,8
TMS non lié au travail actuel ou antérieur		
Total	14,2	13,6 ; 14,8
Cou	3,5	3,2 ; 3,8
Dos	5,2	4,9 ; 5,7
Membres supérieurs	4,7	4,4 ; 7,1
Membres inférieurs	7,4	7,0 ; 7,8

1. TMS ayant touché au moins une région corporelle et dérangé la personne dans ses activités quotidiennes au cours d'une période de 12 mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Chapitre 6

Tableau 6.1

Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	11,7	11,1 ; 12,3
Sexe		
Hommes	13,3	12,3 ; 14,2
Femmes	10,1	9,3 ; 10,9
Groupe d'âge		
15-24 ans	10,0	8,2 ; 12,0
25-44 ans	10,7	9,6 ; 11,8
45-64 ans	12,7	11,8 ; 13,7
65 ans et plus	13,1	11,8 ; 14,5
Composition du ménage		
Personne vivant seule	13,2	12,0 ; 14,4
Couple sans enfant	10,3	9,4 ; 11,4
Couple avec enfants	10,7	9,7 ; 11,8
Famille monoparentale	13,1	10,7 ; 15,7
Autre	17,7	14,7 ; 21,2
Naissance au Canada ou durée de résidence		
Né au Canada	10,4	9,9 ; 11,0
Au Canada depuis moins de 5 ans	20,9*	14,0 ; 28,0
Au Canada depuis 5 ans et plus	20,1	17,0 ; 23,4
Langue parlée à la maison		
Au moins le français	10,8	10,2 ; 11,3
Au moins l'anglais mais pas le français	15,0	11,8 ; 18,1
Ni français ni anglais	22,5	17,2 ; 27,8

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.2

Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	11,7	11,1 ; 12,3
Niveau de scolarité		
Niveau inférieur au DES	17,1	15,8 ; 18,5
Diplôme d'études secondaire (DES)	11,1	10,0 ; 12,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales ¹	10,1	9,0 ; 11,3
Diplôme d'études universitaires	8,3	7,1 ; 9,5
Indice du niveau de revenu du ménage		
Quintile1 (faible)	19,7	17,9 ; 21,5
Quintiles 2 et suivants	9,7	9,0 ; 10,3
Perception de sa situation financière		
Pauvre ou très pauvre	23,6	21,3 ; 26,0
À l'aise ou revenus suffisants	10,1	9,5 ; 10,7
Occupation principale		
Travailleurs	10,9	10,2 ; 11,6
Étudiants	9,3	7,2 ; 11,4
Personne sans emploi	19,6	16,7 ; 22,6
Retraités	12,2	11,1 ; 13,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.3

Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon certains comportements ou indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	11,7	11,1 ; 12,3
Statut de fumeur		
Fumeur actuel	19,0	17,5 ; 20,6
Non-fumeur	9,4	8,7 ; 10,0
Perception de sa santé		
Excellente ou très bonne	5,8	5,2 ; 6,4
Bonne	16,0	14,7 ; 17,3
Passable ou mauvaise	28,5	26,1 ; 31,1
Niveau de détresse psychologique		
Faible à modéré	9,4	8,8 ; 10,1
Élevé	18,9	17,3 ; 20,5

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.4

Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon certaines situations ou habitudes d'hygiène dentaire, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	11,7	11,1 ; 12,3
Nombre de dents naturelles		
Aucune dent	9,3	8,1 ; 10,7
Au moins une dent	11,9	11,3 ; 12,6
Fréquence du brossage (dents ou prothèses)		
Moins de deux fois par jour	21,8	20,2 ; 23,4
Au moins deux fois par jour	8,9	8,3 ; 9,5
Utilisation de la soie dentaire		
Moins d'une fois par jour	13,6	12,8 ; 14,4
Au moins une fois par jour	8,4	7,4 ; 9,5

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 6.1

Perception de sa santé buccodentaire selon le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Excellente ou très bonne	56,4	55,5 ; 57,3	52,6	51,3 ; 54,0	60,1	58,9 ; 61,3
Bonne	31,9	31,1 ; 32,8	34,1	32,8 ; 35,4	29,8	28,7 ; 30,9
Passable ou mauvaise	11,7	11,1 ; 12,3	13,3	12,3 ; 14,2	10,1	9,3 ; 10,9

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 6.2

Perception de sa santé buccodentaire passable ou mauvaise selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
15-24 ans	10,0	8,2 ; 12,0	11,9	9,2 ; 14,9	8,1 *	5,8 ; 10,5
25-44 ans	10,7	9,6 ; 11,8	12,2	10,5 ; 13,9	9,1	7,8 ; 10,6
45-64 ans	12,7	11,8 ; 13,7	14,4	13,1 ; 15,9	11,1	9,8 ; 12,4
65 ans et plus	13,1	11,8 ; 14,5	14,6	12,5 ; 16,8	11,9	10,3 ; 13,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 6.3

Personnes complètement édentées selon le sexe et l'âge, population de 45 ans et plus, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
45-64 ans	13,1	12,4 ; 13,9	10,5	9,6 ; 11,6	15,7	14,6 ; 16,9
65-74ans	34,6	32,6 ; 36,8	31,3	28,4 ; 34,5	37,5	34,5 ; 40,5
75-84 ans	45,2	42,2 ; 48,6	36,8	31,5 ; 42,3	50,9	47,2 ; 55,0
85 ans et plus	57,7	50,2 ; 65,2	48,2 *	34,9 ; 62,3	61,5	52,4 ; 70,2

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.5

Personnes complètement édentées selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	11,0	10,6 ; 11,4
Sexe		
Hommes	8,6	8,1 ; 9,2
Femmes	13,3	12,7 ; 13,9
Groupe d'âge		
15-24 ans	0,6**	0,3 ; 1,1
25-44 ans	0,6*	0,4 ; 0,8
45-64 ans	13,1	12,4 ; 13,9
65 ans et plus	39,6	37,9 ; 41,4

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.6

Personnes complètement édentées selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	11,0	10,6 ; 11,4
Niveau de scolarité		
Niveau inférieur au DES	26,0	24,9 ; 27,3
Diplôme d'études secondaire (DES)	10,2	9,4 ; 11,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales ¹	5,4	4,7 ; 6,1
Diplôme d'études universitaires	2,5	2,1 ; 3,0
Indice du niveau de revenu du ménage		
Quintile1 (faible)	20,0	18,8 ; 21,4
Quintiles 2 et suivants	8,4	8,0 ; 8,9
Perception de sa situation financière		
Pauvre ou très pauvre	16,9	15,5 ; 18,5
À l'aise ou revenus suffisants	10,0	9,6 ; 10,4

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.7

Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon certaines caractéristiques sociodémographiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	78,8	78,1 ; 79,5
Sexe		
Hommes	69,3	68,1 ; 70,5
Femmes	87,9	87,1 ; 88,7
Groupe d'âge		
15-24 ans	83,5	81,5 ; 85,5
25-44 ans	82,1	80,8 ; 83,3
45-64 ans	76,8	75,7 ; 77,9
65 ans et plus	71,2	69,5 ; 72,9
Composition du ménage		
Personne vivant seule	78,1	76,7 ; 79,5
Couple sans enfant	75,7	74,5 ; 76,9
Couple avec enfants	80,9	79,6 ; 82,1
Famille monoparentale	82,6	80,1 ; 84,9
Autre	75,5	71,7 ; 79,0
Nombre d'enfants de 14 ans et moins		
Aucun enfant	77,2	76,4 ; 78,1
Un enfant	82,9	80,8 ; 84,8
Deux enfants	83,6	81,7 ; 85,5
Trois enfants ou plus	78,3	74,2 ; 82,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.8

Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon certaines caractéristiques socioéconomiques, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	78,8	78,1 ; 79,5
Niveau de scolarité		
Niveau inférieur au DES	70,4	68,8 ; 71,9
Diplôme d'études secondaire (DES)	78,8	77,5 ; 80,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales ¹	81,3	79,9 ; 82,7
Diplôme d'études universitaires	84,4	82,9 ; 85,8
Indice du niveau de revenu du ménage		
Quintile1 (faible)	73,7	71,7 ; 75,5
Quintiles 2 et suivants	80,1	79,4 ; 80,9
Perception de sa situation financière		
Pauvre ou très pauvre	72,1	69,8 ; 74,4
À l'aise ou revenus suffisants	79,7	78,9 ; 80,4
Occupation principale		
Travailleurs	79,6	78,7 ; 80,5
Étudiants	85,7	83,5 ; 87,9
Personnes sans emploi	74,1	70,8 ; 77,1
Retraités	72,9	71,5 ; 74,3

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.9

Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon certains comportements ou indicateurs de santé, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	78,8	78,1 ; 79,5
Statut de fumeur		
Fumeur actuel	74,9	73,2 ; 76,4
Non-fumeur	80,0	79,3 ; 80,8
Perception de sa santé		
Excellente ou très bonne	82,7	81,8 ; 83,6
Bonne	75,1	73,8 ; 76,3
Passable ou mauvaise	69,8	67,5 ; 72,2
Niveau de détresse psychologique		
Faible à modéré	79,6	78,8 ; 80,3
Élevé	77,2	75,5 ; 78,8

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.10

Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon certaines situations ou habitudes d'hygiène dentaire, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	78,8	78,1 ; 79,5
Nombre de dents naturelles		
Aucune dent	69,8	67,8 ; 71,7
Au moins une dent	79,9	79,1 ; 80,6
Utilisation de la soie dentaire tous les jours		
Oui	89,3	88,1 ; 90,3
Non	75,2	74,2 ; 76,2

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 6.4

Fréquence du brossage des dents (ou prothèses) selon le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Au moins deux fois par jour	78,8	78,1 ; 79,5	69,3	68,1 ; 70,5	87,9	87,1 ; 88,7
Une fois par jour	18,7	18,0 ; 19,3	26,3	25,1 ; 27,4	11,3	10,6 ; 12,1
Moins d'une fois par jour	2,6	2,3 ; 2,8	4,4	3,9 ; 5,0	0,7	0,6 ; 0,9

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 6.5

Brossage des dents (ou prothèses) au moins deux fois par jour selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
15-24 ans	83,5	81,5 ; 85,5	76,1	72,8 ; 79,4	91,3	89,0 ; 93,2
25-44 ans	82,1	80,8 ; 83,3	75,2	73,2 ; 77,3	89,2	87,7 ; 90,5
45-64 ans	76,8	75,7 ; 77,9	65,0	63,0 ; 66,8	88,3	87,1 ; 89,4
65 ans et plus	71,2	69,5 ; 72,9	57,4	54,4 ; 60,2	81,9	80,0 ; 83,7

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.11

Utilisation de la soie dentaire tous les jours selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	33,1	32,2 ; 34,0
Sexe		
Hommes	24,6	23,4 ; 25,8
Femmes	41,7	40,3 ; 42,9
Groupe d'âge		
15-24 ans	27,1	24,8 ; 29,5
25-44 ans	29,8	28,3 ; 31,3
45-64 ans	38,6	37,1 ; 40,0
65 ans et plus	36,6	34,2 ; 39,1

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 6.12

Utilisation de la soie dentaire tous les jours selon le niveau de scolarité et l'occupation principale, population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	33,1	32,2 ; 34,0
Niveau de scolarité		
Niveau inférieur au DES	30,4	28,5 ; 32,3
Diplôme d'études secondaire (DES)	32,8	31,1 ; 34,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales ¹	32,1	30,5 ; 33,7
Diplôme d'études universitaires	36,3	34,4 ; 38,2
Occupation principale		
Travailleurs	32,6	31,5 ; 33,8
Étudiants	28,8	26,0 ; 31,6
Personnes sans emploi	37,3	33,6 ; 41,1
Retraités	38,0	36,1 ; 40,0

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 6.6

Fréquence d'utilisation de la soie dentaire selon le sexe, population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Au moins une fois par jour	33,1	32,2 ; 34,0	24,6	23,4 ; 25,8	41,7	40,3 ; 42,9
Moins d'une fois par jour, plus d'une fois par semaine	16,9	16,2 ; 17,6	15,6	14,6 ; 16,7	18,2	17,2 ; 19,2
Une fois par semaine ou moins	50,0	49,1 ; 51,0	59,7	58,3 ; 61,1	40,1	38,9 ; 41,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 6.7

Utilisation de la soie dentaire au moins une fois par jour selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
15-24 ans	27,1	24,8 ; 29,5	22,6	19,5 ; 25,8	31,7	28,2 ; 35,1
25-44 ans	29,8	28,3 ; 31,3	21,7	19,7 ; 23,8	38,2	36,0 ; 40,3
45-64 ans	38,6	37,1 ; 40,0	29,0	27,2 ; 30,9	48,3	46,2 ; 50,3
65 ans et plus	36,6	34,2 ; 39,1	23,8	20,4 ; 27,4	48,0	44,7 ; 51,4

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau A 6.1

Fréquence du brossage des dents (ou prothèses) selon la présence de dents naturelles et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Population totale						
Au moins deux fois par jour	78,8	78,1 ; 79,5	69,3	68,1 ; 70,5	87,9	87,1 ; 88,7
Une fois par jour	18,7	18,0 ; 19,3	26,3	25,1 ; 27,4	11,3	10,6 ; 12,1
Moins d'une fois par jour	2,6	2,3 ; 2,8	4,4	3,9 ; 5,0	0,7	0,6 ; 0,9
Population complètement édentée						
Au moins deux fois par jour	69,8	67,8 ; 71,7	55,1	51,7 ; 58,3	78,9	76,6 ; 81,0
Une fois par jour	25,0	23,2 ; 26,7	35,6	32,5 ; 38,7	18,3	16,3 ; 20,5
Moins d'une fois par jour	5,3	4,4 ; 6,3	9,3	7,4 ; 11,4	2,8 *	2,0 ; 3,7
Population ayant au moins une dent						
Au moins deux fois par jour	79,9	79,1 ; 80,6	70,6	69,3 ; 71,9	89,3	88,5 ; 90,1
Une fois par jour	17,9	17,2 ; 18,6	25,4	24,2 ; 26,6	10,3	9,5 ; 11,1
Moins d'une fois par jour	2,2	1,9 ; 2,5	4,0	3,4 ; 4,5	0,4 *	0,3 ; 0,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Chapitre 7

Tableau 7.1

Statut pondéral selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	2,4	2,1 ; 2,7	47,1	46,3 ; 48,0	34,9	34,1 ; 35,7	15,6	15,0 ; 16,2
15-24 ans	6,1	4,7 ; 7,7	69,6	67,0 ; 72,1	17,5	15,6 ; 19,6	6,8	5,4 ; 8,2
25-44 ans	2,2	1,8 ; 2,8	47,8	46,1 ; 49,4	35,2	33,7 ; 36,7	14,7	13,6 ; 15,8
45-64 ans	1,2	1,0 ; 1,5	39,4	38,2 ; 40,8	39,7	38,4 ; 41,2	19,6	18,5 ; 20,8
65 ans et plus	1,9	1,4 ; 2,4	41,0	39,2 ; 42,8	40,1	38,3 ; 41,9	17,0	15,6 ; 18,5
Hommes	1,0*	0,7 ; 1,4	39,0	37,8 ; 40,3	43,6	42,3 ; 44,8	16,5	15,5 ; 17,5
15-24 ans	3,6**	1,9 ; 5,5	66,4	62,8 ; 70,0	21,7	18,9 ; 24,8	8,3	6,4 ; 10,5
25-44 ans	0,5**	0,2 ; 1,0	37,0	34,7 ; 39,5	46,3	43,8 ; 48,6	16,2	14,5 ; 17,9
45-64 ans	0,5**	0,2 ; 0,7	30,0	28,2 ; 31,8	49,1	46,9 ; 51,1	20,5	18,8 ; 22,2
65 ans et plus	0,7**	0,3 ; 1,2	35,4	32,6 ; 38,4	47,8	44,7 ; 50,7	16,1	14,0 ; 18,2
Femmes	3,8	3,4 ; 4,4	55,3	54,1 ; 56,4	26,1	25,1 ; 27,1	14,8	14,0 ; 15,5
15-24 ans	8,8	6,5 ; 11,4	73,1	69,3 ; 76,6	13,0	10,6 ; 15,9	5,1*	3,5 ; 7,2
25-44 ans	4,2	3,3 ; 5,2	59,8	57,6 ; 62,0	22,9	21,1 ; 24,7	13,1	11,7 ; 14,6
45-64 ans	2,0	1,5 ; 2,4	48,8	46,9 ; 50,7	30,6	28,8 ; 32,3	18,7	17,2 ; 20,2
65 ans et plus	2,8	2,1 ; 3,7	45,4	42,9 ; 47,8	34,1	31,9 ; 36,4	17,8	15,9 ; 19,8

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7.2

Statut pondéral selon le niveau de scolarité et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Niveau de scolarité								
Niveau inférieur au DES	3,1	2,4 ; 3,8	44,2	42,5 ; 45,9	34,2	32,6 ; 35,8	18,5	17,2 ; 19,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	2,0	1,5 ; 2,4	47,3	45,5 ; 49,0	34,2	32,6 ; 35,8	16,6	15,3 ; 17,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales ¹	2,5*	1,8 ; 3,3	46,2	44,5 ; 48,0	35,7	33,9 ; 37,2	15,7	14,4 ; 17,0
Diplôme d'études universitaires	2,2	1,6 ; 2,8	50,6	48,7 ; 52,6	35,6	33,6 ; 37,5	11,6	10,5 ; 12,9
Hommes								
Niveau inférieur au DES	1,6*	0,9 ; 2,5	40,6	38,1 ; 43,1	39,6	37,3 ; 42,1	18,2	16,4 ; 20,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	0,8**	0,4 ; 1,3	39,5	37,1 ; 42,1	41,9	39,5 ; 44,5	17,8	15,9 ; 19,8
Diplôme ou certificat d'études collégiales ¹	1,1**	0,3 ; 2,1	37,2	34,6 ; 39,6	45,7	43,1 ; 48,2	16,1	14,2 ; 18,0
Diplôme d'études universitaires	0,5**	0,2 ; 1,0	38,6	35,7 ; 41,6	47,3	44,1 ; 50,4	13,6	11,7 ; 15,6
Femmes								
Niveau inférieur au DES	4,6	3,5 ; 5,8	47,9	45,6 ; 50,2	28,7	26,7 ; 30,6	18,8	17,2 ; 20,6
Diplôme d'études secondaires (DES)	3,2	2,4 ; 4,0	55,2	52,8 ; 57,5	26,3	24,3 ; 28,5	15,4	13,8 ; 17,0
Diplôme ou certificat d'études collégiales ¹	3,9*	2,8 ; 5,2	55,2	53,0 ; 57,8	25,6	23,5 ; 27,6	15,3	13,5 ; 17,1
Diplôme d'études universitaires	3,8*	2,7 ; 5,0	62,7	60,2 ; 65,1	23,9	21,9 ; 26,2	9,6	8,2 ; 11,1

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou de formation professionnelle.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7.3

Statut pondéral selon l'indice du niveau de revenu du ménage et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Poids insuffisant		Poids normal		Embonpoint		Obésité		
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	
Indice du niveau de revenu du ménage									
Quintile 1 (faible)	2,6	2,0 ; 3,3	46,4	44,3 ; 48,7	32,4	30,4 ; 34,3	18,6	17,1 ; 20,2	
Quintile 2	3,7	2,7 ; 4,7	47,4	45,4 ; 49,5	32,7	30,8 ; 34,6	16,2	14,7 ; 17,6	
Quintile 3	2,3*	1,6 ; 3,1	48,4	46,4 ; 50,6	34,5	32,5 ; 36,4	14,7	13,5 ; 16,2	
Quintile 4	1,9*	1,3 ; 2,5	48,1	46,1 ; 50,2	35,3	33,4 ; 37,4	14,7	13,2 ; 16,3	
Quintile 5 (élevé)	1,7*	1,2 ; 2,3	45,3	43,2 ; 47,2	39,2	37,3 ; 41,1	13,8	12,4 ; 15,2	
Hommes									
Quintile 1 (faible)	0,7*	0,4 ; 1,1	41,9	38,3 ; 45,6	40,3	36,7 ; 43,9	17,1	14,7 ; 19,7	
Quintile 2	1,9**	0,7 ; 3,4	42,0	38,9 ; 45,3	39,2	36,0 ; 42,3	16,9	14,6 ; 19,3	
Quintile 3	1,3**	0,5 ; 2,3	41,9	38,9 ; 45,3	41,5	38,4 ; 44,3	15,4	13,3 ; 17,6	
Quintile 4	0,9**	0,4 ; 1,6	36,5	33,6 ; 39,3	46,3	43,3 ; 49,2	16,3	14,2 ; 18,5	
Quintile 5 (élevé)	0,4**	0,1 ; 0,8	34,1	31,6 ; 36,6	49,1	46,5 ; 51,8	16,4	14,4 ; 18,4	
Femmes									
Quintile 1 (faible)	3,9	2,9 ; 5,1	49,7	47,1 ; 52,4	26,8	24,7 ; 28,9	19,6	17,6 ; 21,6	
Quintile 2	5,2	3,9 ; 6,8	52,1	49,5 ; 54,8	27,1	24,7 ; 29,5	15,5	13,8 ; 17,3	
Quintile 3	3,3*	2,3 ; 4,5	55,5	52,8 ; 58,2	27,1	24,7 ; 29,5	14,1	12,3 ; 15,8	
Quintile 4	2,9*	2,0 ; 3,9	60,4	57,4 ; 63,2	23,6	21,5 ; 26,1	13,1	10,9 ; 15,2	
Quintile 5 (élevé)	3,7*	2,5 ; 5,0	61,3	58,5 ; 64,1	25,1	22,5 ; 27,6	10,0	8,3 ; 11,7	

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7.4

Perception à l'égard de son poids¹ selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal (e)	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	38,6	37,7 ; 39,4	2,9	2,6 ; 3,3	58,5	57,7 ; 59,4
Sexe						
Hommes	36,6	35,3 ; 37,7	3,6	3,0 ; 4,2	59,9	58,7 ; 61,2
Femmes	40,5	39,4 ; 41,7	2,3	1,9 ; 2,7	57,1	55,9 ; 58,2
Groupe d'âge						
15-24 ans	16,6	14,5 ; 18,6	4,9	3,5 ; 6,3	78,5	76,2 ; 80,8
25-44 ans	37,6	36,0 ; 39,2	3,3	2,6 ; 4,0	59,1	57,5 ; 60,7
45-64 ans	48,9	47,5 ; 50,3	1,8	1,5 ; 2,2	49,3	47,9 ; 50,6
65 ans et plus	38,7	36,8 ; 40,5	2,7	2,2 ; 3,3	58,6	56,7 ; 60,4

1. Indicateur construit à partir de la question suivante (Q14) : « Considérez-vous que vous ...1) avez un excès de poids; 2) êtes trop maigre; 3) êtes à peu près normal(e)? ».

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7.5

Perception à l'égard de son poids¹ selon le statut pondéral et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Excès de poids		Trop maigre		À peu près normal (e)	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Perception à l'égard de son poids						
Poids insuffisant	0,2**	0,0 ; 0,7	33,3	26,7 ; 39,8	66,4	60,0 ; 73,2
Poids normal	10,6	9,9 ; 11,4	4,0	3,5 ; 4,6	85,3	84,3 ; 86,2
Embonpoint	55,3	53,8 ; 56,8	0,3**	0,1 ; 0,5	44,4	42,8 ; 45,9
Obésité	90,7	89,4 ; 92,0	—	— ; —	9,1	7,9 ; 10,4
Hommes						
Poids insuffisant	—	— ; —	60,5	42,6 ; 74,1	39,3*	25,6 ; 57,1
Poids normal	4,7	3,9 ; 5,6	6,8	5,6 ; 8,0	88,5	87,0 ; 89,9
Embonpoint	46,8	44,8 ; 48,8	0,5**	0,2 ; 0,8	52,8	50,7 ; 54,8
Obésité	87,5	85,2 ; 89,6	—	— ; —	12,1	10,1 ; 14,3
Femmes						
Poids insuffisant	—	— ; —	26,2	20,5 ; 32,4	73,5	67,3 ; 79,1
Poids normal	14,8	13,7 ; 16,1	2,1	1,6 ; 2,7	83,1	81,8 ; 84,3
Embonpoint	69,6	67,5 ; 71,6	—	— ; —	30,4	28,3 ; 32,5
Obésité	94,2	92,9 ; 95,5	—	— ; —	5,8	4,5 ; 7,1

1. Indicateur construit à partir de la question suivante (Q14) : « Considérez-vous que vous ...1) avez un excès de poids; 2) êtes trop maigre; 3) êtes à peu près normal(e)? ».

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

— Donnée infime.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7.6

Principale action entreprise concernant son poids¹ selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	18,7	18,0 ; 19,4	17,2	16,5 ; 17,8	3,0	2,7 ; 3,4	61,1	60,3 ; 62,0
15-24 ans	14,6	12,7 ; 16,6	12,7	11,1 ; 14,4	8,4	7,0 ; 10,0	64,3	61,7 ; 66,8
25-44 ans	20,3	19,1 ; 21,7	17,7	16,4 ; 18,9	3,1	2,5 ; 3,8	58,9	57,2 ; 60,4
45-64 ans	21,0	20,0 ; 22,1	19,6	18,6 ; 20,7	1,2	0,9 ; 1,5	58,1	56,8 ; 59,4
65 ans et plus	13,8	12,6 ; 15,2	14,9	13,6 ; 16,2	1,4	1,1 ; 1,8	69,9	68,2 ; 71,5
Hommes	15,2	14,3 ; 16,1	15,5	14,6 ; 16,5	4,1	3,5 ; 4,7	65,2	63,9 ; 66,4
15-24 ans	10,8	8,2 ; 13,5	9,5	7,5 ; 11,7	13,6	11,0 ; 16,5	66,1	62,4 ; 69,8
25-44 ans	15,8	14,1 ; 17,6	16,9	15,1 ; 18,8	4,0	2,9 ; 5,2	63,3	60,8 ; 65,6
45-64 ans	17,6	16,1 ; 19,2	17,3	15,8 ; 18,7	1,0*	0,7 ; 1,4	64,2	62,2 ; 66,0
65 ans et plus	12,7	10,9 ; 14,8	14,5	12,5 ; 16,6	1,2*	0,8 ; 1,7	71,6	68,8 ; 74,3
Femmes	22,1	21,1 ; 23,1	18,8	17,9 ; 19,6	1,9	1,6 ; 2,3	57,2	56,0 ; 58,4
15-24 ans	18,5	15,6 ; 21,4	16,0	13,6 ; 18,8	3,0*	1,9 ; 4,4	62,5	58,8 ; 66,0
25-44 ans	25,0	23,1 ; 26,8	18,5	16,9 ; 20,1	2,3*	1,6 ; 3,0	54,3	52,2 ; 56,4
45-64 ans	24,4	22,9 ; 26,0	21,9	20,4 ; 23,4	1,4*	1,0 ; 1,8	52,3	50,5 ; 54,1
65 ans et plus	14,7	13,1 ; 16,5	15,2	13,5 ; 17,0	1,5*	1,0 ; 2,1	68,6	66,4 ; 70,7

1. Au cours d'une période de six mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7.7

Principale action concernant son poids¹ selon le statut pondéral et la perception à l'égard de son poids, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Perdre du poids		Maintenir son poids		Gagner du poids		N'avoir rien fait		
	%	IC (95%)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	
Statut pondéral									
Poids insuffisant	2,0**	0,7 ; 3,5	4,9**	2,5 ; 7,8	16,4*	11,8 ; 21,7	76,7	70,9 ; 81,8	
Poids normal	8,6	7,9 ; 9,4	15,1	14,2 ; 16,0	4,7	4,0 ; 5,3	71,7	70,5 ; 72,8	
Embonpoint	23,5	22,3 ; 24,8	20,3	19,1 ; 21,5	1,1*	0,8 ; 1,5	55,1	53,6 ; 56,5	
Obésité	41,5	39,4 ; 43,9	19,0	17,4 ; 20,7	0,2**	0,1 ; 0,4	39,3	37,1 ; 41,4	
Perception à l'égard de son poids									
Excès de poids	37,6	36,2 ; 39,0	20,6	19,5 ; 21,7	0,2**	0,1 ; 0,4	41,6	40,1 ; 42,9	
Trop maigre	1,9**	0,1 ; 5,0	1,3**	0,5 ; 2,3	33,7	27,8 ; 39,8	63,1	57,3 ; 69,0	
À peu près normal (e)	7,2	6,5 ; 7,8	15,8	14,9 ; 16,6	3,3	2,8 ; 3,8	73,8	72,7 ; 74,8	

1. Au cours d'une période de six mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 7.1

Nombre de tentatives pour perdre du poids¹ selon l'âge, population féminine de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids, Québec, 2008

	Une tentative		Deux ou trois tentatives		Quatre tentatives ou plus		Fait pratiquement toujours attention	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	28,7	26,5 ; 31,0	18,3	16,5 ; 20,4	7,7	6,3 ; 9,2	45,3	42,7 ; 47,8
Groupe d'âge								
15-24 ans	30,9	23,1 ; 39,2	27,4	19,6 ; 35,7	5,3**	1,8 ; 9,7	36,4	28,2 ; 45,2
25-44 ans	34,6	30,6 ; 39,1	17,9	14,7 ; 21,3	6,7*	4,7 ; 8,9	40,8	36,4 ; 45,1
45-64 ans	25,8	22,9 ; 28,9	16,9	14,1 ; 20,2	9,0	6,6 ; 11,8	48,3	44,3 ; 52,3
65 ans et plus	16,6	12,4 ; 21,5	14,7	10,4 ; 19,2	9,3*	5,4 ; 14,1	59,4	53,1 ; 65,3

1. Au cours d'une période de six mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 7.2

Fréquence du recours à une diète ou à un programme d'amaigrissement commercial¹ selon l'âge, population féminine de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008

	Aucun		Une fois		Deux fois ou plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	74,5	72,9 ; 76,1	14,1	12,8 ; 15,3	11,5	10,2 ; 12,8
Groupe d'âge						
15-24 ans	78,8	73,8 ; 83,8	12,0*	8,0 ; 16,2	9,1*	6,0 ; 12,8
25-44 ans	72,3	69,3 ; 75,4	16,0	13,7 ; 18,4	11,7	9,4 ; 14,0
45-64 ans	72,6	69,9 ; 75,2	14,2	12,5 ; 16,1	13,2	11,0 ; 15,4
65 ans et plus	82,0	78,8 ; 85,0	10,1	7,8 ; 12,6	7,8	5,8 ; 10,2

1. Au cours d'une période de six mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7.8

Consultation auprès de professionnels de la santé¹ selon le sexe et le statut pondéral, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008

	Aucune		Une		Deux ou plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	87,1	86,1 ; 88,1	7,2	6,4 ; 8,0	5,7	5,0 ; 6,4
Sexe						
Hommes	88,9	87,5 ; 90,3	6,9	5,8 ; 8,1	4,2	3,3 ; 5,0
Femmes	85,7	84,3 ; 87,1	7,5	6,4 ; 8,5	6,8	5,8 ; 7,9
Statut pondéral						
Poids insuffisant	94,0	84,4 ; 100,0	—	— ; —	—	— ; —
Poids normal	91,8	90,1 ; 93,3	4,8	3,6 ; 6,0	3,5*	2,4 ; 4,7
Embonpoint	87,4	85,7 ; 89,0	7,9	6,6 ; 9,3	4,8	3,8 ; 5,7
Obésité	82,0	79,9 ; 84,1	8,7	7,2 ; 10,3	9,2	7,7 ; 10,9

1. Au cours d'une période de six mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

— Donnée infime.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 7.9

Nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité¹ selon le statut pondéral et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008

	Aucun		Un ou plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	92,2	91,3 ; 93,0	7,8	7,0 ; 8,7
Poids insuffisant	84,4	67,7 ; 96,2	15,6**	3,8 ; 32,3
Poids normal	93,9	92,7 ; 95,1	6,1	4,9 ; 7,3
Embonpoint	93,4	92,0 ; 94,7	6,6	5,3 ; 8,0
Obésité	88,7	86,6 ; 90,6	11,3	9,4 ; 13,4
Hommes	93,4	92,1 ; 94,6	6,6	5,4 ; 7,9
Poids insuffisant	91,4*	29,6 ; 100,0	—	— ; —
Poids normal	97,0	95,3 ; 98,4	3,0*	1,6 ; 4,7
Embonpoint	94,9	93,3 ; 96,4	5,1*	3,6 ; 6,7
Obésité	88,5	85,4 ; 91,4	11,5	8,6 ; 14,6
Femmes	91,4	90,1 ; 92,6	8,6	7,4 ; 9,9
Poids insuffisant	83,1	63,9 ; 96,9	16,9**	3,1 ; 36,1
Poids normal	93,0	91,4 ; 94,4	7,0	5,6 ; 8,6
Embonpoint	91,6	89,2 ; 93,8	8,4	6,2 ; 10,8
Obésité	88,9	86,1 ; 91,4	11,1	8,6 ; 13,9

1. Au cours d'une période de six mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

— Donnée infime.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 7.3

Nombre de méthodes saines¹ selon le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008

	Aucune		Une à quatre méthodes		Cinq à huit méthodes		Neuf méthodes et plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	4,3	3,7 ; 4,8	34,7	33,3 ; 36,1	44,6	43,1 ; 46,1	16,4	15,4 ; 17,6
Sexe								
Hommes	5,4	4,5 ; 6,5	38,5	36,2 ; 40,8	42,3	39,9 ; 44,7	13,8	12,0 ; 15,5
Femmes	3,4	2,8 ; 4,0	31,9	30,2 ; 33,7	46,3	44,4 ; 48,2	18,4	17,0 ; 19,8

1. Au cours d'une période de six mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau A 7.1

Recours aux méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé^{1,2}, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008

	Total ³	
	%	IC (95 %)
Ne pas manger pendant toute une journée	0,8*	0,6 ; 1,1
Sauter des repas	4,6	4,0 ; 5,3
Prendre des substituts de repas	1,9	1,5 ; 2,4
Prendre des laxatifs	0,3**	0,1 ; 0,5
Prendre des pilules qui font uriner (diurétiques)	0,6*	0,3 ; 0,8
Prendre des pilules qui enlèvent l'appétit (coupe-faim)	0,4**	0,2 ; 0,6
Prendre des médicaments pour maigrir prescrits par un médecin	0,5**	0,3 ; 0,8
Prendre des produits amaigrissants	0,3**	0,1 ; 0,5
Commencer ou recommencer à fumer	0,7*	0,5 ; 1,0
Utiliser des crèmes, des timbres ou des machines	0,2**	0,1 ; 0,4
Se faire vomir	0,1**	0,0 ; 0,1

1. Une personne peut avoir eu recours à plus d'une méthode présentant un potentiel de dangerosité pour la santé.

2. Ces méthodes sont celles auxquelles les personnes ont «souvent» eu recours au cours d'une période de six mois.

3. Comme il n'y a pas de lien statistique entre cette variable et la variable sexe, les données relatives aux hommes et aux femmes ne sont pas présentées.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau A 7.2
Recours aux méthodes saines^{1,2} selon le sexe³, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Faire de l'activité physique 30 minutes dans la journée (loisirs, déplacements)	48,2	46,8 ; 49,7	49,6	47,3 ; 51,9	47,3	45,4 ; 49,1
Diminuer les portions	42,6	41,2 ; 44,1	37,3	35,1 ; 39,7	46,5	44,6 ; 48,3
Porter attention à la sensation d'avoir faim et à celle d'avoir assez mangé	43,3	41,8 ; 44,8	36,4	34,0 ; 38,7	48,3	46,4 ; 50,2
Réduire le grignotage entre les repas	44,1	42,6 ; 45,5	41,6	39,2 ; 43,9	46,0	44,1 ; 47,8
Manger plus de fruits et de légumes	64,1	62,7 ; 65,5	57,4	55,0 ; 59,8	69,1	67,4 ; 70,7
Manger des aliments moins gras	64,4	63,0 ; 65,8	56,8	54,3 ; 59,1	70,0	68,3 ; 71,6
Manger des aliments moins sucrés	51,0	49,5 ; 52,4	47,0	44,7 ; 49,5	53,8	52,0 ; 55,7
Réduire la consommation d'alcool	12,6	11,6 ; 13,6	13,9	12,1 ; 15,6	11,6	10,5 ; 12,8
Diminuer la consommation de boissons sucrées	35,4	34,0 ; 36,7	39,3	37,0 ; 41,7	32,5	30,8 ; 34,3
Remplacer les breuvages et boissons sucrés par de l'eau	54,1	52,6 ; 55,6	50,5	48,0 ; 52,9	56,7	54,9 ; 58,5
Cuisiner davantage	37,4	36,0 ; 38,9	31,6	29,4 ; 34,0	41,6	39,9 ; 43,4
Diminuer la consommation de <i>fast-food</i> et de repas livrés	37,5	36,0 ; 38,9	38,2	35,9 ; 40,5	37,0	35,3 ; 38,8

1. Une personne peut avoir eu recours à plus d'une méthode saine.

2. Ces méthodes sont celles auxquelles les personnes ont eu recours «presque à tous les jours» au cours d'une période de six mois.

3. À l'exception des méthodes «faire de l'exercice» et «diminuer la consommation de *fast-food* et de repas livrés», le recours est différent chez les hommes et chez les femmes (test d'association significatif au seuil de 5 %).

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau A 7.3

Nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité pour la santé¹ selon l'âge et l'indice du niveau de revenu du ménage, population féminine de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008

	Aucun		Un ou plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Groupe d'âge				
15-24 ans	87,7	82,5 ; 91,9	12,3*	8,1 ; 17,5
25-44 ans	90,1	87,8 ; 92,2	9,9	7,8 ; 12,2
45-64 ans	92,2	90,3 ; 94,0	7,8	6,0 ; 9,7
65 ans et plus	96,2	94,8 ; 97,4	3,8*	2,6 ; 5,2
Indice du niveau de revenu du ménage				
Quintile 1 (faible)	87,3	83,9 ; 90,3	12,7	9,7 ; 16,1
Quintile 2	90,3	87,0 ; 93,2	9,7*	6,8 ; 13,0
Quintile 3	93,2	91,1 ; 95,1	6,8*	4,9 ; 8,9
Quintile 4	93,9	91,7 ; 96,0	6,1*	4,0 ; 8,3
Quintile 5 (élevé)	91,9	88,9 ; 94,6	8,1*	5,4 ; 11,1

1. Au cours d'une période de six mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau A 7.4

Nombre de recours à des méthodes présentant un potentiel de dangerosité¹ pour la santé selon le niveau de scolarité et le sexe, population de 15 ans et plus ayant tenté de perdre du poids ou de le maintenir, Québec, 2008

	Aucun		Un ou plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Niveau de scolarité				
Niveau inférieur au DES	88,3	85,9 ; 90,5	11,7	9,5 ; 14,1
Diplôme d'études secondaires (DES)	92,3	90,7 ; 93,8	7,7	6,2 ; 9,3
Diplôme ou certificat d'études collégiales ²	92,7	90,8 ; 94,3	7,3	5,7 ; 9,2
Diplôme d'études universitaires	94,5	93,0 ; 96,0	5,5	4,0 ; 7,0
Hommes				
Niveau inférieur au DES	88,9	84,7 ; 92,8	11,1 *	7,2 ; 15,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	93,0	90,5 ; 95,3	7,0 *	4,7 ; 9,5
Diplôme ou certificat d'études collégiales ²	95,7	93,8 ; 97,3	4,3 *	2,7 ; 6,2
Diplôme d'études universitaires	94,7	92,3 ; 96,9	5,3 *	3,1 ; 7,7
Femmes				
Niveau inférieur au DES	87,9	85,1 ; 90,5	12,1	9,5 ; 14,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	91,9	89,6 ; 93,9	8,1	6,1 ; 10,4
Diplôme ou certificat d'études collégiales ²	90,6	87,8 ; 93,2	9,4	6,8 ; 12,2
Diplôme d'études universitaires	94,3	92,3 ; 96,1	5,7 *	3,9 ; 7,7

1. Au cours d'une période de six mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou de formation professionnelle.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Chapitre 8

Tableau 8.1

Type de consommateurs de drogues selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Jamais consommé		Anciens consommateurs ¹		Consommateurs actuels ²	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	54,4	53,5 ; 55,2	32,5	31,7 ; 33,3	13,1	12,5 ; 13,7
15-24 ans	42,3	39,5 ; 44,9	23,2	21,1 ; 25,4	34,5	32,0 ; 37,2
25-44 ans	41,7	40,2 ; 43,3	42,0	40,5 ; 43,7	16,2	15,0 ; 17,5
45-64 ans	56,7	55,4 ; 58,0	37,8	36,5 ; 39,2	5,5	4,9 ; 6,1
65 ans et plus	92,0	90,8 ; 93,2	7,3	6,2 ; 8,5	0,7*	0,4 ; 1,0
Hommes	48,2	46,9 ; 49,5	34,6	33,3 ; 35,8	17,2	16,2 ; 18,3
15-24 ans	40,1	36,2 ; 43,8	20,1	17,4 ; 23,1	39,8	36,1 ; 43,9
25-44 ans	36,4	34,0 ; 38,8	41,2	38,9 ; 43,6	22,4	20,3 ; 24,5
45-64 ans	48,9	46,9 ; 50,9	43,5	41,5 ; 45,5	7,7	6,8 ; 8,7
65 ans et plus	88,7	86,5 ; 90,8	10,4	8,4 ; 12,6	0,9**	0,5 ; 1,5
Femmes	60,4	59,3 ; 61,5	30,6	29,5 ; 31,7	9,0	8,3 ; 9,7
15-24 ans	44,6	40,7 ; 48,5	26,4	23,3 ; 30,0	28,9	25,8 ; 32,5
25-44 ans	47,3	45,1 ; 49,4	42,8	40,7 ; 45,0	9,9	8,7 ; 11,2
45-64 ans	64,3	62,5 ; 66,0	32,4	30,6 ; 34,2	3,3	2,7 ; 4,1
65 ans et plus	94,6	93,4 ; 95,7	4,9	3,9 ; 6,1	0,5**	0,2 ; 0,8

1. Personnes ayant déjà consommé de la drogue, mais aucune au cours des douze derniers mois.

2. Personnes ayant consommé un ou plusieurs types de drogues au cours des douze derniers mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8.2

Nombre de drogues consommées au cours de la vie selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Aucune		Une drogue		Deux drogues		Trois drogues ou plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	54,4	53,5 ; 55,2	26,8	26,0 ; 27,6	8,1	7,6 ; 8,6	10,7	10,1 ; 11,2
15-24 ans	42,3	39,5 ; 44,9	33,4	30,9 ; 36,1	8,4	6,9 ; 9,9	15,9	14,1 ; 17,9
25-44 ans	41,7	40,2 ; 43,3	29,9	28,5 ; 31,3	12,3	11,3 ; 13,4	16,1	14,9 ; 17,3
45-64 ans	56,7	55,3 ; 58,0	29,0	27,7 ; 30,3	7,1	6,4 ; 7,9	7,2	6,5 ; 8,0
65 ans et plus	92,0	90,8 ; 93,2	7,1	6,0 ; 8,2	0,5**	0,3 ; 0,7	0,4**	0,2 ; 0,7
Hommes	48,2	46,8 ; 49,5	28,3	27,1 ; 29,5	9,5	8,7 ; 10,3	14,0	13,1 ; 15,0
15-24 ans	40,1	36,2 ; 43,8	33,0	29,3 ; 36,8	8,7	6,6 ; 11,0	18,3	15,3 ; 21,5
25-44 ans	36,4	34,0 ; 38,8	29,0	27,0 ; 31,1	13,5	11,9 ; 15,3	21,1	19,0 ; 23,1
45-64 ans	48,8	46,8 ; 50,9	32,2	30,4 ; 34,1	9,0	7,8 ; 10,3	10,0	8,8 ; 11,2
65 ans et plus	88,7	86,5 ; 90,8	10,0	7,9 ; 12,1	0,8**	0,3 ; 1,3	0,6**	0,2 ; 1,0
Femmes	60,4	59,3 ; 61,5	25,4	24,3 ; 26,4	6,8	6,3 ; 7,4	7,4	6,8 ; 8,0
15-24 ans	44,6	40,7 ; 48,5	33,8	30,5 ; 37,7	8,1	6,3 ; 10,0	13,5	11,1 ; 16,0
25-44 ans	47,3	45,1 ; 49,4	30,8	28,8 ; 32,7	11,0	9,8 ; 12,4	11,0	9,8 ; 12,4
45-64 ans	64,3	62,5 ; 66,0	25,9	24,3 ; 27,6	5,3	4,5 ; 6,2	4,5	3,7 ; 5,4
65 ans et plus	94,6	93,4 ; 95,7	4,8	3,8 ; 5,9	0,2**	0,1 ; 0,5	0,3**	0,1 ; 0,7

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8.3

Consommation¹ du cannabis ou d'autres drogues selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours d'une période de 12 mois, Québec, 2008

	Cannabis seulement		Autres drogues (avec ou sans cannabis)	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	70,8	68,2 ; 73,4	29,2	26,6 ; 31,8
15-24 ans	66,0	61,9 ; 70,2	34,0	29,8 ; 38,1
25-44 ans	70,8	66,5 ; 75,1	29,2	24,9 ; 33,5
45-64 ans	84,1	79,8 ; 88,1	15,9	11,9 ; 20,2
65 ans et plus	70,6	48,4 ; 90,1	29,4**	9,9 ; 51,6
Hommes²	69,8	66,3 ; 73,3	30,2	26,7 ; 33,7
15-24 ans	64,7	58,7 ; 70,5	35,3	29,5 ; 41,3
25-44 ans	69,6	64,0 ; 75,1	30,4	24,9 ; 36,0
45-64 ans	82,5	76,8 ; 87,5	17,5*	12,5 ; 23,2
65 ans et plus	74,0*	46,0 ; 96,8	26,0**	3,2 ; 54,0
Femmes	72,6	68,9 ; 76,2	27,4	23,8 ; 31,1
15-24 ans	67,8	61,9 ; 73,6	32,2	26,4 ; 38,1
25-44 ans	73,8	68,1 ; 79,7	26,2	20,3 ; 31,9
45-64 ans	87,6	80,9 ; 93,6	12,4**	6,4 ; 19,1
65 ans et plus	65,2**	29,6 ; 96,6	34,8**	3,4 ; 70,4

1. Au cours d'une période de 12 mois.

2. Les tests d'association entre la consommation du cannabis ou celle d'autres drogues et la variable sexe ne sont pas significatifs au seuil de 5%.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 8.4

Type de drogues¹ consommées au cours d'une période de 12 mois selon le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Cannabis (marijuana, hachisch)	12,2	11,6 ; 12,8	16,2	15,2 ; 17,2	8,3	7,6 ; 9,0
Cocaïne (crack)	1,6	1,3 ; 1,9	2,3	1,9 ; 2,8	0,8	0,6 ; 1,1
Amphétamines	1,8	1,5 ; 2,1	2,4	1,9 ; 2,9	1,3	1,0 ; 1,5
Ecstasy	1,4	1,1 ; 1,6	1,7	1,3 ; 2,2	1,0	0,8 ; 1,3
Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)	0,8	0,7 ; 1,0	1,2	0,9 ; 1,6	0,4 *	0,3 ; 0,6
Crystal meth (méthamphétamines) ²	0,1 **	0,0 ; 0,1	—	— ; —	—	— ; —
Kétamine ²	0,1 **	0,0 ; 0,1	0,1 **	0,1 ; 0,2	0,0 **	0,0 ; 0,1
Médicaments non prescrits ²	0,4 *	0,3 ; 0,5	0,4 *	0,3 ; 0,6	0,3 *	0,2 ; 0,5

1. L'héroïne (ou smack) ne figure pas dans le tableau en raison de données infimes, de même que la colle ou le solvant (0,0 %).

2. Le test d'association entre la consommation de cette drogue et la variable sexe n'est pas significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

— Donnée infime.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 8.1

Consommation de drogues¹ selon la composition du ménage, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	13,1	12,5 ; 13,7
Composition du ménage		
Personne seule	9,9	8,9 ; 11,1
Couple sans enfant	7,6	6,6 ; 8,5
Couple avec enfants	13,7	12,6 ; 14,9
Famille monoparentale	21,1	18,6 ; 23,8
Autre	29,1	25,1 ; 33,4

1. Consommation d'un ou de plusieurs types de drogues au cours d'une période de douze mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 8.2

Consommation de drogues¹ selon le niveau de scolarité et l'occupation principale, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	13,1	12,5 ; 13,7
Niveau de scolarité		
Niveau inférieur au DES	14,0	12,6 ; 15,5
Diplôme d'études secondaires (DES)	15,5	14,3 ; 16,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales ²	13,8	12,5 ; 15,2
Diplôme d'études universitaires	9,0	7,7 ; 10,3
Occupation principale		
Travailleurs	13,2	12,4 ; 14,0
Étudiants	29,0	26,3 ; 31,9
Personnes sans emploi	12,3	9,6 ; 15,0
Retraités	1,1	0,8 ; 1,5

1. Consommation d'un ou de plusieurs types de drogues au cours d'une période de douze mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau A 8.1

Type de drogues consommées au cours de la vie selon le sexe, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	Total		Hommes		Femmes	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Cannabis (marijuana, hachisch)	43,9	43,1 ; 44,8	50,1	48,9 ; 51,4	37,9	36,8 ; 39,0
Cocaïne (crack)	10,6	10,0 ; 11,2	14,4	13,5 ; 15,5	6,8	6,3 ; 7,5
Amphétamines	7,3	6,8 ; 7,8	9,1	8,3 ; 10,0	5,5	5,0 ; 6,0
Ecstasy	5,1	4,6 ; 5,5	6,3	5,5 ; 7,0	3,9	3,4 ; 4,4
Hallucinogènes (PCP, LSD, champignons)	12,3	11,8 ; 13,0	16,1	15,2 ; 17,2	8,7	8,0 ; 9,4
Héroïne (smack) ¹	0,5	0,4 ; 0,7	0,6*	0,4 ; 0,9	0,4*	0,2 ; 0,5
Crystal meth (méthamphétamines)	0,5	0,4 ; 0,7	0,8*	0,6 ; 1,1	0,3*	0,2 ; 0,4
Kétamine	0,8	0,6 ; 0,9	1,2	0,9 ; 1,5	0,3*	0,2 ; 0,5
Médicaments non prescrits ¹	1,8	1,6 ; 2,0	1,9	1,6 ; 2,3	1,6	1,4 ; 1,9
Colle (solvant)	1,6	1,4 ; 1,9	2,3	1,9 ; 2,8	0,9	0,7 ; 1,1

1. Le test d'association entre la consommation de cette drogue et la variable sexe n'est pas significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Chapitre 9

Tableau F 9.1

Personnes actives sexuellement¹ selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	78,1	77,5 ; 78,8
Sexe		
Hommes	83,0	82,1 ; 83,9
Femmes	73,4	72,4 ; 74,3
Groupe d'âge		
15-17 ans	45,8	41,6 ; 50,2
18-24 ans	79,9	76,7 ; 83,1
25-44 ans	93,4	92,5 ; 94,3
45-64 ans	82,7	81,7 ; 83,6
65 ans et plus	44,3	42,5 ; 46,0

1. Au cours d'une période de douze mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 9.1

Nombre de partenaires sexuels¹ selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008

	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires et plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	88,9	88,2 ; 89,5	9,2	8,6 ; 9,8	2,0	1,7 ; 2,3
Sexe						
Hommes	86,4	85,3 ; 87,3	10,7	9,9 ; 11,7	2,9	2,4 ; 3,5
Femmes	91,6	90,7 ; 92,4	7,4	6,7 ; 8,2	0,9*	0,7 ; 1,3
Groupe d'âge						
15-17 ans	69,1	63,4 ; 74,4	27,6	22,6 ; 33,0	3,4**	1,4 ; 6,0
18-24 ans	66,7	63,2 ; 70,3	26,8	23,3 ; 30,2	6,5	4,8 ; 8,3
25-44 ans	89,0	88,0 ; 90,0	8,8	7,9 ; 9,8	2,2	1,7 ; 2,7
45-64 ans	95,0	94,3 ; 95,5	4,3	3,8 ; 4,9	0,8*	0,5 ; 1,1
65 ans et plus	95,6	94,3 ; 96,8	4,0*	2,9 ; 5,3	0,4**	0,1 ; 0,9

1. Au cours d'une période de douze mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 9.2

Nombre de partenaires sexuels¹ selon le sexe de la personne et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008

	Un partenaire		Deux à quatre partenaires		Cinq partenaires et plus	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Hommes	86,4	85,3 ; 87,3	10,7	9,9 ; 11,7	2,9	2,4 ; 3,5
Hommes	60,7	48,1 ; 71,9	23,3*	13,5 ; 35,2	16,0**	8,5 ; 24,9
Femmes	87,3	86,2 ; 88,2	10,2	9,3 ; 11,1	2,5	2,1 ; 3,1
Hommes et femmes	...	— ; —	81,7	63,1 ; 96,8	18,3**	3,2 ; 36,9
Femmes	91,6	90,7 ; 92,4	7,4	6,7 ; 8,2	0,9*	0,7 ; 1,3
Hommes	92,5	91,7 ; 93,3	6,8	6,1 ; 7,6	0,6*	0,4 ; 0,9
Femmes	92,1	82,7 ; 99,4	7,9**	0,6 ; 17,3	—	— ; —
Hommes et femmes	...	— ; —	65,5	50,1 ; 81,2	34,5*	18,8 ; 49,9

1. Au cours d'une période de douze mois.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

... N'ayant pas lieu de figurer.

— Donnée infime.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 9.3

Utilisation habituelle d'un moyen contraceptif¹ selon l'âge, le niveau de scolarité et le nombre de partenaires, population féminine de 15 à 49 ans active sexuellement, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	66,6	65,0 ; 68,3
Groupe d'âge		
15-24 ans	90,0	87,1 ; 92,4
25-34 ans	71,0	67,7 ; 74,0
35-49 ans	53,5	51,1 ; 56,1
Niveau de scolarité		
Niveau inférieur au DES	63,9	58,5 ; 68,9
Diplôme d'études secondaires (DES)	62,2	58,9 ; 65,6
Diplôme ou certificat d'études collégiales ²	68,2	65,5 ; 70,9
Diplôme d'études universitaires	69,5	66,1 ; 72,8
Nombre de partenaires		
Un partenaire	64,2	62,4 ; 66,0
Deux à quatre partenaires	85,9	82,5 ; 89,2
Cinq partenaires et plus	78,8	64,7 ; 91,4

1. Au cours d'une période de douze mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 9.4

Utilisation habituelle d'un moyen contraceptif¹ selon l'âge, le niveau de scolarité et le nombre de partenaires, population masculine de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	47,9	46,5 ; 49,3
Groupe d'âge		
15-24 ans	87,9	84,7 ; 90,8
25-44 ans	62,4	59,9 ; 65,0
45-64 ans	29,9	28,0 ; 32,0
65 ans et plus	7,3	5,5 ; 9,2
Niveau de scolarité		
Niveau inférieur au DES	37,9	35,0 ; 40,8
Diplôme d'études secondaires (DES)	49,1	46,4 ; 51,9
Diplôme ou certificat d'études collégiales ²	53,1	50,6 ; 55,7
Diplôme d'études universitaires	49,2	46,1 ; 52,6
Nombre de partenaires		
Un partenaire	43,8	42,4 ; 45,3
Deux à quatre partenaires	72,9	68,4 ; 77,1
Cinq partenaires et plus	83,5	74,3 ; 91,7

1. Au cours d'une période de douze mois.

2. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 9.5

Fréquence d'utilisation du condom¹ selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008

	Toujours		À l'occasion		Jamais	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	14,1	13,3 ; 14,8	14,8	14,0 ; 15,6	71,1	70,3 ; 72,0
Sexe²						
Hommes	14,8	13,7 ; 16,0	14,9	13,8 ; 15,9	70,3	69,0 ; 71,5
Femmes	13,2	12,2 ; 14,4	14,7	13,7 ; 15,8	72,1	70,8 ; 73,3
Groupe d'âge						
15-17 ans	58,5	52,5 ; 64,8	31,4	25,5 ; 36,9	10,1*	6,6 ; 14,0
18-24 ans	35,0	31,5 ; 38,7	35,3	31,8 ; 38,9	29,6	26,7 ; 32,7
25-44 ans	14,5	13,2 ; 15,8	19,9	18,5 ; 21,3	65,6	64,0 ; 67,1
45-64 ans	6,4	5,7 ; 7,2	5,0	4,3 ; 5,7	88,6	87,6 ; 89,6
65 ans et plus	2,5*	1,6 ; 3,5	2,5*	1,5 ; 3,8	95,0	93,5 ; 96,3

1. Au cours d'une période de douze mois.

2. Le test d'association entre la fréquence d'utilisation du condom et la variable sexe n'est pas significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source: Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 9.6

Utilisation du condom lors de la dernière relation sexuelle avec pénétration selon le sexe, l'âge, le nombre de partenaires et le sexe des partenaires, population de 15 ans et plus active sexuellement, Québec, 2008

	%	IC (95 %)
Total	19,1	18,3 ; 20,0
Sexe		
Hommes	20,0	18,8 ; 21,2
Femmes	18,2	17,1 ; 19,5
Groupe d'âge		
15-17 ans	70,1	64,7 ; 75,7
18-24 ans	47,9	44,0 ; 51,5
25-44 ans	21,0	19,5 ; 22,5
45-64 ans	8,3	7,5 ; 9,2
65 ans et plus	3,1 *	2,1 ; 4,1
Nombre de partenaires		
Un partenaire	14,9	14,0 ; 15,8
Deux à quatre partenaires	51,7	48,1 ; 55,3
Cinq partenaires et plus	60,9	52,9 ; 69,0
Hommes		
Hommes	54,0	41,0 ; 65,7
Femmes	19,2	18,0 ; 20,4
Hommes et femmes	46,8 *	26,0 ; 70,1
Femmes		
Hommes	17,9	16,8 ; 19,2
Femmes	...	— ; —
Hommes et femmes	48,6 *	33,3 ; 63,5

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

... N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau 9.7

Proportion de personnes ayant déjà reçu un diagnostic d'infection transmise sexuellement (ITS) selon l'âge et le sexe, population de 15 ans et plus ayant eu des relations sexuelles au cours de sa vie, Québec 2008

	%	IC (95 %)
Total	8,2	7,7 ; 8,7
15-24 ans	4,9	3,7 ; 6,2
25-44 ans	11,3	10,3 ; 12,3
45-64 ans	8,6	7,9 ; 9,4
65 ans et plus	2,7	2,0 ; 3,4
Hommes	7,1	6,4 ; 7,8
15-24 ans	2,4**	1,2 ; 3,8
25-44 ans	9,3	7,9 ; 10,7
45-64 ans	8,0	6,9 ; 9,1
65 ans et plus	3,2*	2,0 ; 4,7
Femmes	9,2	8,6 ; 9,9
15-24 ans	7,4	5,3 ; 9,7
25-44 ans	13,3	12,1 ; 14,8
45-64 ans	9,1	8,1 ; 10,2
65 ans et plus	2,2	1,7 ; 2,9

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Chapitre 10

Tableau F 10.1

Fumeuses actuelles¹ selon l'utilisation de la contraception hormonale combinée (CHC)² et l'âge, population féminine de 15 à 49 ans active sexuellement³, Québec, 2008

	Utilisatrices de la CHC		Non-utilisatrices de la CHC	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	23,5	20,9 ; 26,5	27,1	25,2 ; 28,9
Groupe d'âge				
15-35 ans ⁴	25,6	22,6 ; 29,0	28,1	24,9 ; 31,4
36-49 ans	10,5*	6,8 ; 15,3	26,3	24,2 ; 28,7

1. Fumeuses régulières ou occasionnelles.

2. La CHC inclut la pilule contraceptive, l'anneau vaginal contraceptif et le timbre contraceptif. Il s'agit des moyens indiqués par les femmes ayant utilisé habituellement un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois.

3. Femmes de 15 à 49 ans ayant eu des relations sexuelles avec un ou des partenaires de l'autre sexe au cours des 12 derniers mois.

4. Le test d'association entre la variable type de fumeur et la variable utilisation de la CHC n'est pas significatif au seuil de 5 % pour ce groupe d'âge.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 10.2

Passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans selon l'âge, population féminine de 18 à 69 ans, Québec, 2008

	Passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans		Non-passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	73,3	72,0 ; 74,4	26,7	25,5 ; 28,0
Groupe d'âge				
18-24 ans	62,6	57,7 ; 67,5	37,4	32,5 ; 42,3
25-44 ans	82,5	80,8 ; 84,2	17,5	15,8 ; 19,2
45-69 ans	68,4	66,9 ; 69,9	31,6	30,1 ; 33,1

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 10.3

Passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans selon la naissance au Canada ou la durée de résidence, population féminine de 18 à 69 ans, Québec, 2008

	Passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans		Non-passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	73,3	72,0 ; 74,4	26,7	25,5 ; 28,0
Naissance au Canada ou durée de résidence				
Naissance au Canada	74,2	73,1 ; 75,4	25,8	24,6 ; 26,9
Naissance dans un autre pays et résidence au Canada depuis 5 ans ou plus	70,8	65,4 ; 75,8	29,2	24,2 ; 34,6
Naissance dans un autre pays et résidence au Canada depuis moins de 5 ans	49,7	37,2 ; 63,7	50,3	36,3 ; 62,8

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.

Tableau F 10.4

Passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans selon le niveau de scolarité, population féminine de 18 à 69 ans, Québec, 2008

	Passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans		Non-passation du dernier test de Pap depuis moins de trois ans	
	%	IC (95 %)	%	IC (95 %)
Total	73,3	72,0 ; 74,4	26,7	25,5 ; 28,0
Niveau de scolarité				
Niveau inférieur au DES	60,6	57,7 ; 63,2	39,4	36,8 ; 42,3
Diplôme d'études secondaires (DES)	70,0	67,8 ; 72,2	30,0	27,8 ; 32,2
Diplôme ou certificat d'études collégiales ¹	75,8	73,4 ; 78,0	24,2	22,0 ; 26,6
Diplôme d'études universitaires	80,9	78,8 ; 83,1	19,1	16,9 ; 21,2

1. Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*.